



中国石油大学（北京）2017-2018学年春季学期

《概率论与数理统计》本科期末考试试卷

一、填空题（请在下列各题的空格处填上正确答案，共5题，每空题3分，共15分；（双填空对一个2分，全对3分））

1、设 A, B 为随机事件，已知 $P(A)=0.7$ ， $P(B)=0.5$ ； $P(A-B)=0.3$ 。则

$$P(AB)=\underline{\hspace{2cm}}, \quad P(B-A)=\underline{\hspace{2cm}}.$$

2、已知 $X \sim N(2, 4)$ ， $Y \sim N(0, 1)$ ，且 X, Y 独立，则 $P(X+2Y \geq 2)=\underline{\hspace{2cm}}$ 。

3、设随机变量 X 的方差为 3，则根据契比雪夫不等式估计

$$P(|X-E(X)| < 2) \geq \underline{\hspace{2cm}}.$$

4、设总体 $X \sim N(0, 2^2)$ ，而 X_1, X_2, \dots, X_{15} 是来自总体 X 的简单随机样本，则随机变量

$$Y = \frac{X_1^2 + \dots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + \dots + X_{15}^2)} \text{ 服从 } \underline{\hspace{2cm}} \text{ 分布，参数为 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

5、设 (X, Y) 的联合分布律为

		X		
		0	1	
	Y			
0		0.4	b	
1		a	0.1	

，且事件 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 互

相独立，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

二、单项选择题（请将下列各题的正确答案填在题后的括号内，共5题，每小题3分，共15分）

1、设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是独立同分布的随机变量序列，其分布函数为

$$F(x) = a + \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{x}{b}\right), \quad b \neq 0, \text{ 则由辛钦大数定律对此序列 } \underline{\hspace{2cm}} \text{ 适用}.$$

A. 适用；

B. 当常数 a, b 取适当的数时适用；

C. 不适用；

D. 无法判定。

2、三设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布，则 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



- A. $X+Y$ 服从正态分布; B. X^2+Y^2 服从 χ^2 分布;
- C. X^2 和 Y^2 都服从 χ^2 分布; D. $\frac{X^2}{Y^2}$ 服从 F 分布.
- 3、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 已知, σ^2 未知, X_1, X_2, \dots, X_n 是来自总体 X 的简单随机样本, 则下列表达式中不是统计量的是 【 】 .
- A. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$; B. $\max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$; C. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2$; D. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$.
- 4、若方差 $D(X)$, $D(Y)$ 为非零数, 且 $E(XY) = E(X)E(Y)$, 则 【 】 .
- A. X 与 Y 一定相互独立; B. $D(XY) = D(X)D(Y)$;
- C. X 与 Y 一定不相关; D. $D(X-Y) = D(X) - D(Y)$.
- 5、下列函数中可以作为随机变量的分布函数是 【 】 .
- A. $F(x) = \frac{1}{1+x^2}$; B. $F(x) = \frac{3}{4} + \frac{1}{2\pi} \arctan(x)$;
- C. $F(x) = 1 + \frac{2}{\pi} \arctan(x)$; D. $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x}{1+x}, & x \geq 0 \end{cases}$.

三、(本题满分12分)

病树的主人外出, 委托邻居浇水, 设已知如果不浇水, 树死的概率为0.8, 若浇水则树死的概率为0.15. 有0.9的把握确定邻居会记得浇水.

- (1) 求主人回来树还活着的概率.
- (2) 若主人回来树已死去, 求邻居忘记浇水的概率.

四、(本题满分12分)

设 X 和 Y 是两个互相独立的随机变量, 其概率密度分别为:

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 $Z = X+Y$ 的概率密度.

五、(本题满分12分)

设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为



$$f(x, y) = \begin{cases} k, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

求: (1) 常数 k ;

(2) 随机变量 X 、 Y 的边缘概率密度, 并判断 X 、 Y 是否相互独立;

(3) 条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$;

$$(4) P\left\{Y \leq \frac{1}{2} \mid X = \frac{1}{2}\right\}.$$

六、(本题满分10分)

已知二维随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 并且 X 和 Y 分别服从正态分布

$$N(0, 3^2), N(0, 4^2), X \text{ 与 } Y \text{ 的相关系数 } \rho_{XY} = -\frac{1}{2}, \text{ 设 } Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2},$$

(1) 求 $E(Z)$ 和 $D(Z)$;

(2) 求 ρ_{XZ} ;

(3) 问 X 与 Z 是否相互独立? 为什么?

七、(本题满分10分)

某单位要估计平均每天职工的总医疗费, 设每天总医疗费用服从正态分布. 观察了 30 天, 其总金额的平均值是 170 元, 标准差为 30 元, 试决定职工每天总医疗费用平均值的区间估计 (置信水平为 0.95). 附表: $t_{0.05}(30) = 1.6973$, $t_{0.025}(29) = 2.045$,

$$t_{0.025}(30) = 2.042.$$

八、(本题满分14分)

(1) 设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中

$\theta \left(0 < \theta < \frac{1}{2}\right)$ 是未知参数, 从总体 X 中抽取容量为 8 的一组样本, 其样本值为 3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3, 求 θ 的矩估计值.

(2) 设总体 X 的密度函数为 $f(x, \theta) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}}$, $-\infty < x < +\infty$, 其中未知参数 $\theta > 0$.

X_1, X_2, \dots, X_n 为 X 的一个样本, 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$.