

# Lecture 1

## 1.1 Organisatorisches

Alle Informationen sind Online zu finden aber für die Form von der Mitschrift sollte hier etwas stehen: Die LVA ist eine UE + VO.

### 1.1.1 Übung

Für das Positive absolvieren der Übung benötigt man ca. 60% der Kreuze und zwei positive Tafelleistungen. Man darf einmal fehlen + nachbringen aber nicht ohne guten Grund. Für weiteres fehlen braucht man einen guten Grund ("meine Oma ist gestorben" ist ab dem zweiten Mal kein guter Grund mehr <sup>1</sup>).

### 1.1.2 Vorlesung

Die Vorlesung ist ein Tafelvortrag. Die Prüfung teilt sich auf in schriftlich und mündlich. Die schriftliche Prüfung ist als Ticket für die Mündliche zu verstehen. Der Stoff der Schriftlichen Prüfung sind die Übungsbeispiele. Der Stoff der Mündlichen Prüfung ist der Inhalt der Vorlesung (Wichtig hierbei: "der Vorlesung" heißt hier nicht irgendeine Vorlesung, sondern jene, die zum Zeitpunkt der Entstehung des Skriptes gehalten wurde).

## 1.2 Topologische Grundbegriffe

Da wir für viele Themen die in Analysis 3 behandelt werden, Resultate aus der Maßtheorie benötigen, fangen wir mit einigen Grundlagen der Topologie an. Da man für Topologie nix braucht (man muss nur ein bisschen mit Mengen spielen).

Im Folgenden geht es darum, den Konvergenzbegriff zu verallgemeinern. Dazu betrachten wir Räume, welche gerade noch soviel Struktur tragen, dass man von stetigen Funktionen, Grenzwerten, Kompaktheit und so weiter sprechen kann.

Zur Wiederholung betrachten wir folgendes Beispiel.

### Beispiel 1.2.1 (Offene $\epsilon$ -Kugel)

Sei  $(X, d)$  ein metrischer Raum und  $O$  die Menge aller offenen Teilmengen von  $X$ , wobei  $O \subseteq X$  ist offen, wenn  $\forall x \in O \exists \epsilon > 0$  so dass die  $\epsilon$ -Kugel

$$U_\epsilon(x) = \{y \in X : d(y, x) < \epsilon\}$$

ganz in  $O$  enthalten ist. Die Menge  $O \subseteq \mathcal{P}(X)$  hat die Eigenschaften:

1.  $\emptyset, X \in O$ ,
2.  $O_1, O_2 \in O \implies O_1 \cap O_2 \in O$ ,
3.  $O_i \in O, i \in I$  Indexmenge beliebig  $\implies \bigcup_{i \in I} O_i \in O$ .

<sup>1</sup>Im nachhinein muss ich sagen, es ist schon möglich mehr als zwei Omas zu haben. Ich denke es ist ein guter Grund wenn man es nachweisen kann.

Wörtlich bedeutet (1), dass sowohl die leere Menge als auch der ganze Raum offen sind. (2), dass der Schnitt zweier offener Mengen wieder offen ist. Und (3) dass die Vereinigung beliebig vieler offener Mengen wieder offen ist.

Diese Eigenschaften bilden den Ausgangspunkt unserer Verallgemeinerung. Und wir erhalten die folgende Definition:

### Definition 1.2.2: Topologie

Sei  $X$  eine nichtleere Menge. Eine Menge  $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$  von Teilmengen von  $X$  heißt *Topologie* auf  $X$ , wenn  $\mathcal{T}$  folgende Eigenschaften hat.

(O1)  $\emptyset \in \mathcal{T}, X \in \mathcal{T}$ .

(O2)  $\forall n \in \mathbb{N}$  und  $O_1, \dots, O_n \in \mathcal{T} : \bigcap_{i=1}^n O_i \in \mathcal{T}$ .

(O3) Aus  $O_i \in \mathcal{T}, i \in I$ , mit einer beliebigen Indexmenge  $I$  folgt  $\bigcup_{i \in I} O_i \in \mathcal{T}$ .

Die Elemente von  $\mathcal{T}$  heißen *offene Mengen*. Das Paar  $(X, \mathcal{T})$  bezeichnet man als *topologischen Raum*.

#### Note:-

Die Bedingung (O2) kann auch abgespeckter formuliert werden. Es reicht zu fordern, dass

$$\forall O_1, O_2 \in \mathcal{T} : O_1 \cap O_2 \in \mathcal{T}$$

gilt. Dann folgt die allgemeine Formulierung durch Vollständige Induktion.

### Beispiel 1.2.3 (Topologien)

(i) **Diskrete Topologie:** Sei  $X \neq \emptyset$  und  $\mathcal{T} = \mathcal{P}(X)$ .

(ii) **Indiscrete (Klumpen) Topologie:**  $\mathcal{T} = \{\emptyset, X\}$ .

(iii) **cofinite Topologie:** Sei  $X \neq \emptyset$  und  $\mathcal{T}, \mathcal{O} \subseteq \mathcal{P}(X)$  definiert durch

$$\mathcal{T} := \{A \subseteq X : A = \emptyset \text{ oder } X \setminus A \text{ endlich}\} \quad \text{und} \quad \mathcal{O} := \{A \subseteq X : A = X \text{ oder } A \text{ endlich}\}.$$

*Proof.* Die Beispiele sind so schon sehr schön, aber noch schöner sind sie, wenn wir nicht nur glauben müssen dass es Topologien sind, sondern es auch überprüfen können.

(i) Diskrete Topologie: Überprüfung durch hinsehen.

(ii) Indiscrete Topologie: Überprüfung durch hinsehen.

(iii) cofinite Topologie: überprüfen durch genauer hinschauen

(O1)  $\emptyset, X \in \mathcal{T}$ .

1. Fall  $Y = \emptyset : \bigcup V = \emptyset$

2. Fall  $V = \emptyset : \bigcup V = \emptyset$  Wähle  $O \in V$  dann gilt  $X \setminus \bigcap V \subset X \setminus O$  endlich. <sup>a</sup>

(O2) Sei  $V \in \mathcal{T}$  endlich, dann gilt  $V = \emptyset : \bigcap V = X$

(O3) Sei  $V \neq \emptyset$ , dann gilt  $X \setminus \bigcup V = \bigcap_{\text{endlich}}$  ist endlich.

Damit haben Wir (Das "Wir" impliziert dass es eine Art Gruppenarbeit ist. Diese Implikation ist grundlegend falsch was jedem Besucher einer Vorlesung klar sein sollte.) gezeigt dass die cofinite Topologie Tatsächlich eine Topologie ist.



<sup>a</sup> $\bigcup V := \{x \mid \forall v \in \mathcal{V} : x \in v\}$

Wir widmen uns nun noch weiteren Beispielen für Topologien.

**Beispiel 1.2.4** (Eine durch eine Metrik induzierte Topologie)

Sei  $\langle X, d \rangle$  ein metrischer Raum. mit  $X \times X \rightarrow \mathbb{R}$  Dann ist  $U_r(x) = \{y \in X : d(x, y) < r\}$  eine offene Menge für alle  $x \in X$  und  $r > 0$ . Wir definieren darauf die Topologie

$$\mathcal{T}_d = \{O \subseteq X \mid \forall x \in O \exists r > 0 : U_r(x) \subseteq O\}.$$

Auch hier wollen wir noch zeigen, dass es sich tatsächlich um eine Topologie handelt.

*Proof.* Um einzusehen, dass  $\mathcal{T}_d$  eine Topologie ist, müssen wir wieder die drei Eigenschaften überprüfen bzw. schon zwei mal hinschauen....oder dreimal:

(O1)  $\emptyset, X \in \mathcal{T}_d$ . Wobei

$$X \subseteq X, \quad \forall x \in X, \quad r > 0 : \{y \in X \mid d(x, y) < r\} \subseteq X$$

Hierbei ist interessant zu bemerken, dass die leere Menge eine Teilmenge jeder Menge ist, also insbesondere auch eine Teilmenge von der Umgebung  $U_r(x)$ . Da eine Menge der Form  $U_r(x)$  nie leer sein kann, da  $x \in X$  und  $d(x, x) = 0 < r$ , Das heist das  $U_r(x)$  immer zumindest das Element  $x$  selbst enthält.

(O2) Sei  $V \in \mathcal{T}_d, x \in \bigcup V$ . Dann wähle  $V \in \mathcal{V}$  und  $r > 0$  so dass  $U_r(x) \subseteq V$ . Dann gilt auch

$$U_r(x) \subseteq V \subset \bigcup V$$

.

(O3) Sei  $\mathcal{V} \subset \mathcal{T}_d$  endlich,  $x \in \bigcap V$ . Dann wähle für jedes  $V \in \mathcal{V}$  ein  $r_V > 0$  so dass  $U_{r_V}(x) \subseteq V$   
Dann gilt auch

$$U_{r_V}(x) \subseteq \bigcap V \Rightarrow \bigcap_{V \in \mathcal{V}} U_{r_V}(x) \subseteq \bigcap V$$

Das noch etwas genauer aufgedrösel:

$$\bigcap_{V \in \mathcal{V}} \{y \in X \mid d(x, y) < r_V\} = \{y \in X \mid \forall V \in \mathcal{V} : d(x, y) < r_V\}$$

.



**Beispiel 1.2.5** (Geometrische Regression)

Betrachte  $\mathbb{Z}$ . Für  $k \in \mathbb{Z}$  und  $l \geq 1$  sei  $U_{k,l} := \{k + nl \mid n \in \mathbb{Z}\}$ . Weiters definiere  $\mathcal{T} := \{k \in \mathbb{Z} \mid \forall x \in \mathbb{Z} \exists l \in \mathbb{Z}, l \geq 1 : U_{k,l} \subset 0\}$ . Dann ist  $\mathcal{T}$  eine Topologie auf  $\mathbb{Z}$ .

(O1)  $\emptyset, \mathbb{Z} \in \mathcal{T}$ .


(O2) Sei  $V \subset \mathcal{T}, y \in \bigcup V$ . Dann wähle  $V \in \mathcal{V}$  und  $x \in \mathbb{Z}, l \geq 1$  so dass  $U_{x,l} \subseteq V$ . Dann gilt auch  $U_{x,l} \subseteq V \subset \bigcup V$ .

(O3) Sei  $V \subset \mathcal{B}$  endlich  $x \in \bigcap V$  Ein  $V \in \mathcal{V}$  wähle  $l_v \in \mathbb{Z}, l_v \geq 1$  so dass  $U_{x,l_v} \subseteq V$ .

# Lecture 2

Jetzt etwas für Bastelenthusiasten. Wenn wir eine Metrik haben, dann können wir eine Topologie basteln. Hierfür definieren wir die Menge:

$$Z : U_{x,l} := x + l\mathbb{Z} = \{x + ln \mid n \in \mathbb{Z}\}, x \in \mathbb{Z}, l \in \mathbb{Z}, l \geq 1$$



Das ganze ist sehr lustig, also unanschaulich. Also lustig für Mathematiker halt. Es kann natürlich sein das einem der Witz an dem ganzen bis dato noch nicht aufgefallen ist. Aber nach dem man darauf aufmerksam gemacht wurde, ist es sehr lustig.

Betrachten wir also die Topologie:

$$\mathcal{T} := \{O \subseteq \mathbb{Z} \mid \forall x \in O \exists l \in \mathbb{Z}, l \geq 1 : U_{x,l} \subseteq O\}$$

- Sei  $U_{k,l} \in \mathcal{T}, x \in U_{k,l}$ .  
Dann gilt:  $U_{x,l} = U_{k,l}$ : endlich Denn mit  $n_x \in \mathbb{Z} : x = k + n_x l$ . erhalten wir:
  - Sei  $y \in U_{x,l} : y = x + n_y l = U_{k,l} \ni k + (n_x + n_y)l$ .
  - Sei  $y \in U_{k,l} : y = k + n_y l = U_{x,l} \ni x + (n'_y - n_x)l$ .
- Das folgende ist eine Mengenspielerlei und zur Erinnerung: Das gefällt uns!  
Wir betrachten also die Menge

$$\mathbb{Z} \setminus U_{k,l} \in \mathcal{T} : \mathbb{Z} \setminus U_{k,l} = \bigcup_{x=k+1}^{k+l-1} U_{x,l} \in \mathcal{T}$$

Und weiters

$$\mathbb{Z} \setminus \{1, -1\} = \bigcup_{p \in \mathbb{P}} U_{0,p} \dots \{1, -1\}$$

Hier ist wichtig zu bemerken, dass die Geometrische Progression unendlich ist und die Menge  $\{-1, 1\}$  nicht. Das bedeutet  $\{1, -1\} \notin \mathcal{T}$ .

$= \bigcup_{p \in \mathbb{P}} \mathbb{Z} \setminus U_{0,p}$ .  $\mathbb{P} := \{p \in \mathbb{N} \mid p \text{ Prim}\} \Rightarrow \mathbb{P}$  unendlich. Damit haben wir auch gezeigt, dass die Menge der Primzahlen unendlich ist.

## Definition 2.0.1: Halbordnung auf der Menge der Topologien

Sei  $X$  eine Menge. Betrachte

$$\mathbb{T}(x) := \{\mathcal{T}(X) \subset \mathcal{P}(X) \mid \mathcal{T} \text{ Topologie auf } X\}$$

Die Potenzmenge einer Menge ist in natürlicher Weise halbgeordnet durch die Teilmengenbeziehung  $\subseteq$ . Damit ist auch  $\mathbb{T}(X)$  halbgeordnet durch  $\subseteq$ . Konkreter definieren wir  $\mathbb{T}(X)$  ist eine halbgeordnet mit  $\subseteq$

Seien  $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2 \in \mathbf{T}(X)$  Dann ist  $\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{T}_2$  eine Hablbordnung mit:

$$\forall O \subseteq X : O \in \mathcal{T}_1 \Rightarrow \mathcal{T}_2$$

**Note:-**

**Definition 2.0.2: Feinheit**

Sei  $X$  eine Menge, und  $\mathcal{T}, \mathcal{V} \in \mathbf{T}(X)$ . Wir sagen  $\mathcal{T}$  ist feiner als  $\mathcal{V}$ , wenn  $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{T}$ , und sagen  $\mathcal{T}$  ist gröber als  $\mathcal{V}$ , wenn  $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{V}$ .

Weiters schauen wir uns noch zwei Eigenschaften von  $\mathbf{T}(X)$  an .

- $\{\emptyset, X\} \in \mathbf{T}$  und  $\forall \mathcal{T} \in \mathbf{T} : \{\emptyset, X\} \subset \mathcal{T}$  so wie  $\mathcal{P}(X) \in \mathbf{T}(X)$  und  $\forall \mathcal{T} \in \mathbf{T}(X) : \mathcal{T} \subset \mathcal{P}$
- $\mathbf{V} \subseteq \mathbf{T}(X)$  Dann gilt:  $\mathbf{V} \neq \emptyset^1$  hat ein Infimum in  $\mathbf{T}(X)$ .

Die erste Eigenschaft geht aus vorherigen Beobachtungen hervor. Die zweite Eigenschaft bedarf etwas mehr Arbeit.

*Proof.* Wir wollen zeigen, dass jede nichtleere Teilmenge von  $\mathbf{T}(X)$  ein Infimum hat.

1. Im ersten Schritt wählen wir einen Kandidaten  $\mathbf{V}$  in  $\mathbf{T}(X)$  Hierfür betrachten wir  $\bigcap \mathbf{V} \in \mathbf{T}(X)$

- Sei  $V \in \mathbf{V}$  dann ist  $\emptyset \in V$  und  $X \in V \Rightarrow \emptyset \in \bigcap \mathbf{V}$  und damit auch  $x \in \bigcap \mathbf{V}$
- Betrachte weiters  $\mathcal{V} \subseteq \bigcap \mathbf{V}$  und  $V \in \mathbf{V}$ . Dann gilt:

$$\mathcal{V} \subseteq V \Rightarrow \bigcup \mathcal{V} \in V \Rightarrow \bigcup \mathcal{V} \in \bigcap \mathbf{V}.$$

- $\mathcal{V} \subseteq \bigcap \mathbf{V}$  endlich und sei  $V \in \mathbf{V}$ . Dann gilt:

$$\mathcal{V} \subseteq V \Rightarrow \bigcap \mathcal{V} \in V \Rightarrow \bigcap \mathcal{V} \in \bigcap \mathbf{V}.$$

Damit sehen wir, dass unser gewählter Kandidat in der Grundmenge ist - was ihn zu einem guten Kandidaten macht -. (Hier Politik Bashing einfügen - da, da gibt es zu meist keinen guten Kandidaten etc. -)

2. Im nächsten Schritt zeigen wir, dass  $\bigcap \mathbf{V}$  eine Untere Schranke ist:

Sei  $\mathcal{V} \in \mathbf{V}$  dann gilt  $\bigcap \mathbf{V} \in \mathbf{T}(X)$

Mit  $\mathcal{V} \in \mathbf{V}$  : fehlt zu zeigen, dass  $\mathcal{V} \subseteq \bigcap \mathbf{V}$ . Was direkt daraus folgt das  $V \in \bigcap \mathbf{V}$  : da  $V \in \mathcal{V}$

3. Wir zeigen jetzt noch, dass  $\bigcap \mathbf{V}$  nicht nur irgend eine untere Schranke ist, sondern die GröÙte.

Sei  $\mathcal{W} \in \mathbf{T}(X)$  eine untere Schranke von  $\mathbf{V}$  - hier irgend eine untere Schranke - und fragen uns: Was bedeutet es, eine untere Schranke zu sein?

$$\forall V \in \mathbf{V} : \mathcal{W} \subseteq V$$

Zu zeigen ist noch:  $\mathcal{W} \subseteq \bigcap \mathbf{V}$ . Das heißt  $\forall \mathcal{V} \in \mathbf{V} : \mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$ . Das heißt wiederum  $\forall \mathcal{V} \in \mathbf{V}, \forall O \in \mathcal{W} : O \in \mathcal{V}$ . also  $\forall O \in \mathcal{W} : O \in \bigcap \mathbf{V}$ . Das heißt  $\mathcal{W} \subseteq \bigcap \mathbf{V}$ .



**Note:-**

Jede Menge, die ein Infimum hat und ein größtes Element, dann hat jede Teilmenge auch ein Supremum.

An der Bemerkung angelehnt, wollen wir jetzt noch zeigen, dass jede Teilmenge von  $\mathbf{T}(X)$  auch ein Supremum hat.

<sup>1</sup> um Sonderfälle zu vermeiden

**Note:-**

**Korollar 2.1** Jede Teilmenge von  $\mathbb{T}(X)$  hat ein Supremum.

ergleichen wir das mit der Eigenschaft das  $\mathbb{V} \subseteq \mathbb{T}(X)$  ein Infimum hat. Das wäre das Äquivalent das die Vereinigung der Topologien das Supremum ist. Aber im Allgemeinen ist die Vereinigung von Topologien keine Topologie.

**Proposition 2.0.3**

Sei  $X$  eine Menge und sei  $\mathcal{S}^a \subseteq \mathcal{P}(X)$ . Dann ist

$$\star := \left\{ \bigcup_{i \in I} \bigcap_{j=1}^{n_i} O_{ij} \mid I \text{ Menge, } n_i \in \mathbb{N}, O_{ij} \in \mathcal{S} \right\}.$$

eine Topologie

<sup>a</sup>Weil  $\mathcal{S}$  oder  $\mathcal{S}^a$  macht keinen Unterschied - Die Begründung begründet etwas -

*Proof.* Proposition: 2.0.4:

(O1)  $\emptyset, X \in \mathcal{T}$ . Folgt direkt aus  $I = \emptyset \Rightarrow \emptyset$  und  $n_i = 0 \Rightarrow X$ ,

(O2) Sei  $V \subseteq \mathcal{T}$  endlich, dann gilt  $V = \emptyset : \bigcap V = X$

(O3) Es fehlt zu zeigen, dass  $\mathcal{T}$  unter endlichen Durchschnitten abgeschlossen ist. Seien also

$$\bigcup_{i \in I_k} \bigcap_{j=1}^{n_{ik}} O_{ijk} \in \mathcal{T}, \quad k = 1, \dots, m.$$

Dann gilt

$$\bigcap_{k=1}^m \left[ \bigcup_{i \in I_k} \bigcap_{j=1}^{n_{ik}} O_{ijk} \right] = \bigcup_{(i_1, \dots, i_m) \in I_1 \times \dots \times I_m} \left( \bigcap_{j=1}^{n_{i_1 1}} O_{i_1 j 1} \cap \dots \cap \bigcap_{j=1}^{n_{i_m k}} O_{i_m j k} \right)$$

und diese Menge ist wieder eine Vereinigung von endlichen Durchschnitten von Mengen aus  $\mathcal{S}$ , gehört also zu  $\mathcal{T}$ .



**Lemma 2.0.4**  $\star$  ist die kleinste Topologie, die  $\mathcal{S}$  enthält.

Sei  $X$  eine Menge und sei  $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ . Dann ist  $\star$  die kleinste <sup>a</sup> Topologie, die  $\mathcal{S}$  enthält

<sup>a</sup>Die größte

*Proof.* Lemma 2.0.5:

jede Topologie, die  $\mathcal{S}$  umfasst, muss auch  $\mathcal{T}$  umfassen. Also ist  $\star \subseteq \mathcal{T}$ .



**Korollar 2.2**

Sei  $\mathbb{V} \subseteq \mathbb{T}(X)$ . Dann ist  $\sup \mathbb{V}$  die von  $\bigcup \mathbb{V}$  erzeugte Topologie.

*Proof.* Korollar 2.0.6:

$$\forall \mathcal{V} \in \mathbb{V} : \sup \mathbb{V} \geq \mathcal{V} \Rightarrow \sup \mathbb{V} \supseteq \bigcup \mathbb{V} \Rightarrow \sup \mathbb{V} \geq \mathcal{R}.$$



### Definition 2.0.5: Stetig

Seien  $(X, \mathcal{T}), (Y, \mathcal{V})$  topologische Räume, und  $f : X \rightarrow Y$  eine Funktion. Dann heißt  $f$  **stetig**, wenn

$$\forall O \in \mathcal{V} : f^{-1}(O) \in \mathcal{T}.$$

Muss man sich spezifischer ausdrücken, so sagt man auch:  $f$  ist  $\mathcal{T}$ - $\mathcal{V}$ -stetig.<sup>a</sup>

<sup>a</sup>An diesem Punkt ist es angebracht, Panik zu bekommen, da wir hier den Begriff der Stetigkeit mit einer zweiten Definition belegen

## 2.0.1 Einschub: Metrik

Welche Begriffe kennen wir? - das wir \{Woracheck\}- (Er kennt vermutlich auch noch viele andere Begriffe, von denen wir bis jetzt noch "verschont geblieben" sind.)

- konvergente Folge
- $A \subseteq X$ . Der **Innere** von  $A$  ( $=: \mathfrak{B}$ ) ist

$$\text{int}(A) = \{x \in A \mid \exists r > 0 : U_r(x) \subseteq A\}.$$

- $A \subseteq X$  heißt **offen**  $\Leftrightarrow A = \mathfrak{B}$ .
- $A \subseteq X$  heißt **abgeschlossen**  $\Leftrightarrow A = \overline{A}$ .
- $A \subseteq X$  heißt **Abschluss** von  $A$  ( $\overline{A}$ ) ist

$$\overline{A} = \{x \in X \mid \forall r > 0 : U_r(x) \cap A \neq \emptyset\}.$$

- $\partial A = \overline{A} \setminus \mathfrak{B}$ .
- $(X, d_X), (Y, d_Y)$  metrische Räume,  $f : X \rightarrow Y$  heißt **stetig**  $\Leftrightarrow$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x, x' \in X : d_X(x, x') < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(x')) < \varepsilon.$$

- $A \subseteq X$  heißt **kompakt**  $\Leftrightarrow$  jede offene Überdeckung  $(O_i)_{i \in I}$  von  $A$  besitzt eine endliche Teilüberdeckung, d. h.

$$A \subseteq \bigcup_{i \in I} O_i \Rightarrow \exists I_0 \subseteq I \text{ endlich mit } A \subseteq \bigcup_{i \in I_0} O_i.$$

- **Satz:**  $f$  ist stetig  $\Leftrightarrow \forall A \subseteq Y$  offen  $\Rightarrow f^{-1}(A)$  offen.

## 2.0.2 Definitionen in topologischen Räumen

### Definition 2.0.6: Offen und abgeschlossen

Sei  $\langle X, \mathcal{T} \rangle$  ein topologischer Raum.

- $A \subseteq X$  heißt **offen**  $:\Leftrightarrow A \in \mathcal{T}$ .
- $A \subseteq X$  heißt **abgeschlossen**  $:\Leftrightarrow X \setminus A$  offen.

### Lemma 2.0.7 Lemmachen

Sei  $\langle X, \mathcal{T} \rangle$  topologisch und  $A \subseteq X$ .

1.  $\bigcup \{O \subseteq X \mid O \in \mathcal{T}, O \subseteq A\}$  ist die größte offene Menge, die in  $A$  enthalten ist.

2.  $\underbrace{\bigcap \{C \subseteq X \mid X \setminus C \in \mathcal{T}, A \subseteq C\}}_{\text{Dieser}}$  ist die kleinste abgeschlossene Menge, die  $A$  umfasst.

*Proof.* Lemma 2.1.3:

(ii)+(iii)  $\forall C$  aus **Dieser** Menge halt: Erfüllt  $C \supseteq A$ , so gilt auch  $\bigcap \{C \dots\} \supseteq A$ .

Denn:  $X \setminus \bigcap \{C\} \subseteq X \setminus A$ . Also ist  $\bigcap C \supseteq A$ .

Sei  $D \subseteq X$ , sodass  $D \supseteq A$ .  $\Rightarrow D$  kann noch in  $\bigcap C$  enthalten sein.

$$X \setminus \bigcap_{C \in \mathcal{C}} C = \bigcup_{C \in \mathcal{C}} (X \setminus C) \subseteq X \setminus A \Rightarrow \bigcap_{C \in \mathcal{C}} C \supseteq A.$$

Sei  $D \subseteq X$ , also  $D \supseteq A$ .

$\Rightarrow D$  kann nur in  $\bigcap_{C \in \mathcal{C}} C$  enthalten sein.



### Definition 2.0.8: Innere, Äußere und Rand

- Das *Innere*  $B^\circ$  einer Teilmenge  $B$  eines topologischen Raumes  $(X, \mathcal{T})$  ist definiert durch

$$\mathring{B} = \bigcup \{O \in \mathcal{T} : O \subseteq B\}.$$

- Das *Äußere*  $B^\circ$  einer Teilmenge  $B$  eines topologischen Raumes  $(X, \mathcal{T})$  ist definiert durch

$$\bar{B} = \bigcap \{C \subseteq X : X \setminus C \in \mathcal{T}, B \subseteq C\}.$$

- Der *Rand*  $\partial B$  einer Teilmenge  $B$  eines topologischen Raumes  $(X, \mathcal{T})$  ist definiert durch

$$\partial B = \bar{B} \setminus \mathring{B}.$$

### Definition 2.0.9: kompakt

Eine Teilmenge  $K$  eines topologischen Raumes  $(X, \mathcal{T})$  heißt **kompakt**, wenn jede offene Überdeckung von  $K$ , also  $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{T}$  mit

$$\bigcup_{V \in \mathcal{V}} V \supseteq K,$$

eine endliche Teilüberdeckung besitzt, es also  $V_1, \dots, V_n \in \mathcal{V}$  gibt mit

$$V_1 \cup \dots \cup V_n \supseteq K.$$

Eine Teilmenge  $A \subseteq X$  heißt **relativ kompakt**, wenn  $\text{cl}(A) \subseteq X$  kompakt ist.

Sei  $\mathcal{C}$  eine Familie von Teilmengen einer Menge  $X$ , also  $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$ . Wir sagen, dass  $\mathcal{C}$  die **endliche Durchschnittseigenschaft** hat, wenn für je endlich viele  $C_1, \dots, C_n \in \mathcal{C}$  stets

$$C_1 \cap \dots \cap C_n \neq \emptyset$$

gilt.



**Satz 2.0.10** Zusammenhang Zwischen Metrischen und Topologischen Räumen

Sei  $\langle X, d \rangle$  ein metrischer Raum. Dann betrachte den Topologischen Raum  $\langle X, \mathcal{T}_d \rangle$  mit. Dann sind alle Begriffe die wir in metrischen Räumen definiert haben auch in topologischen Räumen definiert.

- $\forall A \subseteq X : A$  ist offen im Metrischen Sinne  $\Leftrightarrow A$  ist offen im topologischen Sinne
- usw

# Lecture 3

Ein großes Problem in der Mathematik ist die Benennung von Objekten. Hier wird einem diese Problem deutlich vor Augen geführt. Um eine kleine Orientierung zu bieten lege ich jetzt fest, und hoffe, dass ich mich auch daran halte, welche Schriftarten ich für welche Objekte festlegen möchte.

## Note:-

Notation:

- Standard Menge:  $A, B, C, \dots X$
- Umgebungen (Spezifischere Mengen):  $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}, \dots \mathcal{X}$
- Topologie (Menge mit Offenen Mengen):  $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}, \dots \mathcal{X}$
- Filter (Menge mit bestimmten Eigenschaften):  $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \dots \mathfrak{X}$
- Punkte (Elemente der Menge);  $a, b, c, \dots x$

Wir haben ( leider<sup>1</sup> ) noch mehr Objekte, und mehr Schriftarten würden nicht zur besseren Übersichtlichkeit beitragen. - Ich persönlich weiß auch das ich früher oder noch früher durcheinander kommen werde wenn ich neben: `mathcal`, `mathbf` `mathfrak`, `mathbb`, `mathscr` noch mehr schriftarten verwende.- <sup>2 3</sup>

### Definition 3.0.1: Dichtigkeit, Häufungspunkt, Isolierter Punkt

Sei  $\langle X, \mathcal{T} \rangle$  ein Topologischer Raum und  $A \subset X$ .

- $A$  ist **dicht** in  $X$ , falls  $\bar{A} = X$ .
- $x \in X$  ist ein **Häufungspunkt** von  $A$ , falls:  $\forall U \in \mathfrak{U}(x) \exists y \in A : y \in U \setminus \{x\}$ .
- $x \in X$  ist ein **isolierter Punkt** von  $A$ , falls:  $\exists O \in \mathcal{T} : x \in O : O \cap A = \{x\}$ .

### Definition 3.0.2: Umgebung

Sei  $\langle X, \mathcal{T} \rangle$  ein Topologischer Raum und  $x \in X$ . Eine Menge  $\mathcal{U} \subset X$  heißt **Umgebung** von  $x$ , falls

$$\exists O \in \mathcal{T} : x \in O \subset \mathcal{U}$$

### Definition 3.0.3: Filter

Für eine nichtleere Menge  $M$  heißt  $\mathfrak{F} \subseteq \mathcal{P}(M)$  ein *Filter* auf  $M$ , wenn

<sup>1</sup>Die Mathematik wäre möglicherweise einfacher mit weniger

<sup>2</sup>Es sind so schon zu viele für meinen Geschmack.

<sup>3</sup> $\mathbb{S} \mathfrak{S} \mathfrak{S} \mathcal{S}$

- (F1)  $\mathfrak{F} \neq \emptyset$  und  $\emptyset \notin \mathfrak{F}$ ,  
(F2)  $F_1 \cap F_2 \in \mathfrak{F}$ , falls  $F_1, F_2 \in \mathfrak{F}$ ,  
(F3)  $F_2 \in \mathfrak{F}$ , falls  $F_1 \in \mathfrak{F}$  und  $F_1 \subseteq F_2 \subseteq M$ .

### Lemma 3.0.4

Sei  $\langle X, \mathcal{T} \rangle$  ein topologischer Raum und  $x \in X$ . Dann ist die Menge aller Umgebungen

$$\mathcal{U}(x) = \{U \in \mathcal{T} \mid x \in U\}$$

von  $x$  ein Filter auf  $X$ .

*Proof.* Lemma: 3.0.4

Wir überprüfen die Filtereigenschaften.:

(F1)  $x \in \mathcal{U}(x)$  und  $X \in \mathcal{T}, x \in X \subseteq X$  Damit haben wir

$$\emptyset \notin \mathcal{U}(x) \text{ und } \forall U \in \mathcal{U}(x) : x \in U$$

(F2)  $U_1, U_2 \in \mathcal{U}(x) \forall O_1, O_2 \in \mathcal{O}$  mit  $x \in O_1 \subseteq U_1, x \in O_2 \subseteq U_2$

$$\Rightarrow x \in O_1 \cap O_2 \subseteq U_1 \cap U_2 \Rightarrow U_1 \cap U_2 \in \mathcal{U}(x)$$

(F3)  $U \in \mathcal{U}(x), V \supseteq U$  Wähle

$$O \in \mathcal{T} \text{ und } x \in O \subseteq U \subseteq V$$



Hier ist meine Notationelle Einführung schon an seine Grenze gekommen. Wie nehmen die Menge (also  $\mathcal{U}$ ) aller Umgebungen von  $x$  und nennen sie  $\mathcal{U}(x)$ . aber wir zeigen, dass es ein Filter ist. Damit wäre ja  $\mathcal{U}(x)$  die Richtige Notation. - Ich will konsistent bleiben aber habe es schon aufgegeben. -

### Proposition 3.0.5

Sei  $\langle X, \mathcal{T} \rangle$  Top-Raum und  $\langle Y, \mathcal{V} \rangle$  Top-Raum Dann gilt:

1.  $\forall O \in X \Leftrightarrow (\forall x \in O : O \in \mathcal{U}(x))$
2. Sei  $f : X \rightarrow Y$ , dann gilt:  $f$  stetig  $\Leftrightarrow$

$$\forall x \in X \forall V \in \mathcal{V}(f(x)) \in \mathcal{U}^X(f(x)) \exists U \in \mathcal{U}^X(f(x)) : f(U) \subseteq V$$

3. Sei  $A \in X$ , dann ist  $\overline{A} = \{x \in X \mid \forall U \in \mathcal{U}(x) : U \cap A \neq \emptyset\}$

*Proof.* Prop: 3.0.5

1. " $\Rightarrow$ " Sei  $x \in O \in \mathcal{T}$ , dann gilt:

$$x \in O \subseteq O$$

" $\Leftarrow$ "  $\forall x \in O$  wähle  $\mathcal{Q}_x \subseteq O$  Dann haben wir:

$$\{x\} \subseteq O_x \subseteq O \Rightarrow \bigcup_{x \in O} \{x\} \subseteq \underbrace{\bigcup_{x \in O} \mathcal{Q}_x}_{\text{Offen}} \subseteq \bigcup_{x \in O} O = O$$

2. "⇒" Sei  $x \in X$ ,  $V \in \mathcal{U}^Y(f(x))$ . Wähle  $Q \in \mathfrak{B}$   
mit  $f(x) \in Q \subseteq V$   
⇒  $f^{-1}(Q) \in \mathcal{T}$  Das Folgt aus unserer Charakterisierung von stetigen Funktionen.  
Betrachte  $x \in f^{-1}(Q) \in \mathcal{U}^X(x)$  damit haben wir:

$$f(f^{-1}(Q)) \subseteq Q \subseteq \mathfrak{B}$$

- "⇐" Sei  $O \in \mathfrak{B}$  Wir wollen zeigen dass, das Vollständige Urbild wieder offen ist. Sei  $x \in f^{-1}(O)$ , d.h.  
 $(f(x) \in O \Rightarrow O \in \mathcal{U}^Y(f(x)))$   
Wähle  $U \in \mathcal{U}^X(x)$  mit  $f(U) \subseteq O$

$$\Rightarrow U \subseteq f^{-1}(f(U)) \subseteq f^{-1}(O)$$

und

$$U \in \mathcal{U}^X(x) \Rightarrow f^{-1}(O) \in \mathcal{U}^X(x) \Rightarrow f^{-1}(O) \in \mathcal{T}$$

3. "⊆" Sei  $x \notin \bar{A}$ , d.h.  $x \in X \setminus \bar{A}$  (Wobei  $X \setminus \bar{A}$  ist offen :↔ Offen ⇔  $X \setminus \bar{A} \in \mathcal{U}(x)$ )

$$\bar{A} \supseteq A \Rightarrow X \setminus \bar{A} \Rightarrow A \cap (X \setminus \bar{A}) = \emptyset$$

- "⊇" Sei  $x \in X$  und  $\exists U \in \mathcal{U}(x) : U \cap A = \emptyset$  wähle  $O \in \mathcal{T}$  mit  $x \in O \subseteq U$

$$\Rightarrow O \cap A = \emptyset \Rightarrow A \subseteq X \setminus O$$

$$\Rightarrow \bar{A} \subseteq X \setminus O \Rightarrow x \in \bar{A}$$



### Lemma 3.0.6

- $\langle X, \mathcal{T} \rangle$  Topologischer-Raum, dann ist  $id_X$  stetig.
- $\langle X, \mathcal{T} \rangle$ ,  $\langle Y, \mathcal{V} \rangle$  und  $\langle Z, \mathcal{W} \rangle$  Topologische-Räume und  $f : X \rightarrow Y$  und  $g : Y \rightarrow Z$  stetig, dann ist  $g \circ f : X \rightarrow Z$  stetig.

*Proof.* Lemma: 3.0.6

- $X \xrightarrow{id:X} X$  Sei  $O \in \mathcal{T}$ , dann gilt:

$$id_X^{-1}(O) = O \in \mathcal{T}$$

- $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$  Sei  $O \in \mathcal{W}$ , dann gilt:

$$g^{-1}(O) \in \mathcal{V} \text{ und } f^{-1}(g^{-1}(O)) \in \mathcal{T}$$

$$\Rightarrow (g \circ f)^{-1}(O) = f^{-1}(g^{-1}(O)) \in \mathcal{T}$$

$$\Rightarrow g \circ f \text{ ist stetig.}$$



### Note:-

Zur Wiederholung: Aus Analysis 1 wissen wir, dass jede Folge  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  höchstens einen Grenzwert hat.

*Proof.* Eindeutigkeit des Grenzwerts

Seien  $x_n \rightarrow x$  und  $x_n \rightarrow y$  mit  $x \neq y (\Leftrightarrow d(x, y) > 0)$ .

Wähle  $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ , sodass  $d(x_n, x) < \frac{d(x, y)}{3} \forall n \geq N_1$ , und  $d(x_n, y) < \frac{d(x, y)}{3} \forall n \geq N_2$ .

Dann folgt für  $N := \max\{N_1, N_2\}$  der Widerspruch:

$$d(x, y) \leq d(x, x_N) + d(x_N, y) < \frac{d(x, y)}{3} + \frac{d(x, y)}{3} = \frac{2d(x, y)}{3} < d(x, y).$$



Im Folgenden betrachten wir Hausdorff-Räume. Das sind Räume in denen sich Punkte trennen lassen (Die T2-Eigenschaft bzw. Hausdorff-Eigenschaft). Diese Eigenschaft ist im Grunde vergleichbar mit der Eindeutigkeit von Grenzwerten in metrischen Räumen.

### Definition 3.0.7: Hausdorff-Raum

Ein topologischer Raum  $\langle X, \mathcal{T} \rangle$  heißt *Hausdorff-Raum* oder *(T2)-Raum*, wenn folgendes Trennungsaxiom erfüllt ist:

**(T2)** Zu je zwei Punkten  $x, y \in X$ ,  $x \neq y$ , gibt es disjunkte, offene Mengen  $O_x$  und  $O_y$  mit  $x \in O_x$  und  $y \in O_y$ .

Bevor wir weiter mit der Hausdorff-Eigenschaft arbeiten, betrachten wir bzw definieren wir noch gerichtete Mengen.

Die nebenbei viel mehr Sinn machen um das Riemann-Integral zu definieren.

### Definition 3.0.8: Gerichtete Menge

Sei  $I$  eine nicht leere Menge und  $\leq$  eine Relation auf  $I$ . Dann heißt  $(I, \leq)$  eine *gerichtete Menge*, wenn  $\leq$  folgenden drei Bedingungen genügt:

- **Reflexivität:**

$$\forall i \in I : i \leq i.$$

- **Transitivität:**

$$\forall i, j, k \in I : (i \leq j \wedge j \leq k) \Rightarrow i \leq k.$$

- **Richtungseigenschaft:**

$$\forall i, j \in I \exists k \in I : i \leq k \wedge j \leq k.$$

Nach dem Wir jetzt wissen was eine gerichtete Menge ist, können wir uns auch gleich die Riemannsumme anschauen.

### Beispiel 3.0.9 (Riemansumme)

Wir nennen das Paar

$$\mathcal{R} = ((\xi_j)_{j=0}^{n(\mathcal{R})}, (\eta_j)_{j=1}^{n(\mathcal{R})})$$

eine *Riemann-Zerlegung* eines Intervalls  $[a, b]$ , falls

$$a = \xi_0 < \xi_1 < \dots < \xi_{n(\mathcal{R})} = b, \quad \eta_j \in [\xi_{j-1}, \xi_j], \quad j = 1, \dots, n(\mathcal{R}),$$

und nennen

$$|\mathcal{R}| := \max\{\xi_j - \xi_{j-1} ; j = 1, \dots, n(\mathcal{R})\}$$

die *Feinheit der Zerlegung*.

Weiter sei

$$\mathcal{R}_1 \leq \mathcal{R}_2 : \Longleftrightarrow |\mathcal{R}_2| \leq |\mathcal{R}_1|$$

Ist  $\mathfrak{R}$  die Menge aller solcher Zerlegungen, dann ist  $(\mathfrak{R}, \leq)$  eine gerichtete Menge. In diesem Beispiel ist  $\leq$  sicher nicht antisymmetrisch.

Dieser gerichteten Menge und Jener aus dem letzten Beispiel werden wir bei der Einführung des Integrals wieder begegnen.

### Proposition 3.0.10

Sei  $\langle X, \mathcal{T} \rangle$  ein Topologischer Raum. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

- (i)  $X$  ist ein Hausdorff-Raum.
- (ii) Jedes Netz in  $X$  hat höchstens einen Grenzwert

*Proof.* Prop: 3.0.9

- (i)  $\Rightarrow$  (ii) Wären  $x, y$  zwei verschiedene Grenzwerte, so könnten wir disjunkte Umgebungen  $U \in \mathcal{U}(x)$  und  $V \in \mathcal{U}(y)$  wählen und infolge  $i_1 \in I$  und  $i_2 \in I$  derart wählen, dass

$$x_i \in U \quad \text{für alle } i \geq i_1 \quad \text{und} \quad x_i \in V \quad \text{für alle } i \geq i_2.$$

Da  $I$  gerichtet ist, gibt es ein  $i \in I$  mit  $i \geq i_1$  und  $i \geq i_2$ , und daher  $x_i \in U \cap V$ , was aber im Widerspruch zu  $U \cap V = \emptyset$  steht.

- (ii)  $\Rightarrow$  (i) Beweis durch Kontraposition. ( $[\neg(\text{ii}) \Rightarrow \neg(\text{i})]$ )

– Wir definieren eine gerichtete Menge:

Wähle  $x, y \in X$  und  $x \neq y$ .

Da  $(X, \mathcal{T})$  Hausdorff ist, existieren offene Mengen  $O_x, O_y \in \mathcal{T}$  mit

$$x \in O_x, \quad y \in O_y \quad \text{und} \quad O_x \cap O_y = \emptyset.$$

Sei nun

$$I := \{ (O_1, O_2) \in \mathcal{T} \times \mathcal{T} \mid x \in O_1 \wedge y \in O_2 \}$$

und definiere die Ordnung

$$(O_1, O_2) \leq (O'_1, O'_2) : \Longleftrightarrow O'_1 \subseteq O_1 \wedge O'_2 \subseteq O_2.$$

– Damit ist  $(I, \leq)$  gerichtet.

\* Reflexivität:

$$(O_x, O_y) \in I \quad \text{und} \quad (O_x, O_y) \leq (O_x, O_y)$$

.

\* Transitivität: Für  $(O_1, O_2) \leq (O'_1, O'_2)$  und  $(O'_1, O'_2) \leq (O''_1, O''_2)$  gilt offensichtlich auch

$$(O_1, O_2) \leq (O''_1, O''_2)$$

.

\* Richtungseigenschaft: Für  $(O_1, O_2), (O'_1, O'_2) \in I$  ist

$$(O_1 \cap O_2, O'_1 \cap O'_2) \in I$$

ist größer

- Die Menge  $\{O_1 \cap O_2 \mid (O_1, O_2) \in I\}$  ist nicht leer, da  $(x, y) \in I$ .

Wähle nun eine  $\alpha : I \rightarrow \bigcup_{(O_1, O_2) \in I}$  eine Abbildung

mit

$$\forall (O_1, O_2) \in I : \alpha(O_1, O_2) \in O_1 \cap O_2$$

4

- Es fehlt noch zu zeigen, dass  $\alpha$  ein konvergierendes Netz ist.

$$\lim_{(O_1, O_2)} \alpha(O_1, O_2) = x.$$

Sei  $U \in \mathcal{U}(x)$ , wähle  $O \in \mathcal{T} : x \in O \subseteq U$

$$\forall (O_1, O_2) \in I : \exists O \Rightarrow (O_1, O_2) \succeq (O, O_x) \Rightarrow O_1 \cap O_2 \subseteq O_1 \subseteq O^5$$

mit  $i_0 := (O, x)$

Auf der anderen Seite haben wir:

$\forall (O_1, O_2) \in I : O_2 \subseteq O$  (Das selbe spiel umgekehrt)

Sei  $U \in \mathcal{U}(y)$ , wähle  $O \in \mathcal{T} : y \in O \subseteq U$

$$\forall (O_1, O_2) \in I : O_2 \subseteq O \Rightarrow \alpha((O_1, O_2)) \in O_1 \cap O_2 \subseteq O_2 \subseteq O \subseteq U$$



Die Richtung (ii)  $\Rightarrow$  (i) hat keinen wirklichen Mehrwert - Ausser dass wir über zwei offene Mengen indexiert haben (WOW)-. Wir haben diese Richtung also vorallem dem Beweis zu liebe gemacht.

---

<sup>4</sup>Das ist die Stelle an der das Auswahlaxiom verwendet wird. Also lobpreiset das Auswahlaxiom. (Das Auswahlaxiom ist in der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre nicht beweisbar, aber auch nicht widerlegbar.)

<sup>5</sup>Das geht wegen dem Auswahl axiom

# Lecture 4

Um die Folgenden Sachverhalte leichter einsehen zu können macht es Sinn, sich zuerst schon bekannte Objekte/Dinge/Sachverhalte vor Augen zu führen.



Figure 4.1: <https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/>

In diesem Fall macht es vor allem Sinn, Folgen zu betrachten. Sei also  $\alpha$  eine Abbildung von  $\mathbb{N} \rightarrow X$  also die Folge  $\alpha(0), \alpha(1), \alpha(2), \dots \alpha(n), \dots$ . Weiters betrachte die Abbildung  $\beta : \mathbb{N} \rightarrow X$  wobei wir  $\beta$  als Teilfolge von  $\alpha$  bezeichnen. Wenn es eine streng monoton wachsende Abbildung  $k : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  gibt, so dass  $\beta(n) = \alpha(k(n))$  für alle  $n \in \mathbb{N}$  gilt.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{N} & \xrightarrow{\alpha} & X \\ \uparrow \kappa & \nearrow \beta & \\ \mathbb{N} & & \end{array}$$

mit  $\beta = \alpha \circ \kappa$

## Definition 4.0.1: Teilnetz

Sind  $(I, \leq_I)$  und  $(J, \leq_J)$  zwei gerichtete Mengen, ist  $X$  eine Menge und  $\alpha : I \rightarrow X$  ein Netz in  $X$ , Und  $\kappa : J \rightarrow I$  eine Funktion, so dass

$$\star \forall i_0 \in I \exists j_0 \in J : \forall j \geq_J j_0 \Rightarrow \kappa(j) \geq_I i.$$

Dann ist  $\alpha \circ \kappa : J \rightarrow X$  ein **Teilnetz** von  $\alpha$ . Ist  $(J, \leq_J) = (\mathbb{N}, \leq)$ , dann wäre  $\alpha \circ \kappa : J \rightarrow X$  Eine **Teilfolge**.

### Note:-


Seien  $\langle I, \leq_I \rangle$  und  $\langle J, \leq_J \rangle$  gerichtete Mengen und  $\kappa : J \rightarrow I$  eine monotone Abbildung. wenn

- $\kappa$  monoton
- $\forall i \in I \exists j_0 \in J : \kappa(j_0) \geq_I i$



dann ist  $\alpha \circ \kappa(j)$  ein Teilnetz von  $\alpha$ .

*Proof.* Beweis der Implikation:

Sei  $i_0 \in I$  beliebig. Dann gibt es ein  $j_0 \in J$  mit  $\kappa(j_0) \geq_I i_0$ . Für alle  $j \geq_J j_0$  gilt  $\kappa(j) \geq_I \kappa(j_0) \geq_I i_0$ . 

Das soll *nicht* zur Verwirrung führen. Aber:

Der Implikationspfeil ist in diesem Fall nicht nur eine stilistische Entscheidung, sondern wir erfahren später, dass es sich eigentlich um eine Äquivalenz handelt. Es handelt sich also wirklich nur um eine Implikation (dh. die andere Richtung gilt nicht) In der mathematischen Literatur werden anstelle unserer Definition der Teilnetze die in der Bemerkung aufgeführten Eigenschaften als Definition verwendet.

### Satz 4.0.2

ei  $(X, \mathcal{T})$  topologischer Raum,  $(I, \leq_I)$  gerichtete Menge,  $\varphi : I \rightarrow X$ , Netz in  $X$ ,  $x \in X$ .

Dann sind äquivalent:

- (i)  $\varphi$  konvergiert gegen  $x$ .
- (ii) Jedes Teilnetz von  $\varphi$  konvergiert gegen  $x$ .
- (iii) Jedes Teilnetz von  $\varphi$  hat ein Teilnetz, das gegen  $x$  konvergiert.

*Proof.* Satz: 4.0.2:

(i)  $\Rightarrow$  (ii) Sei  $\langle J, \leq_J \rangle$  und  $\kappa : J \rightarrow I$  ein Teilnetz von  $\varphi$  also erfüllt  $\star$ .

Sei  $U \in \text{test}U(x)$  Wähle  $i_0 \in I$  so dass  $\forall i \geq_I i_0 : \varphi(i) \in U$  Nach  $\star$  gibt es ein  $j_0 \in J$  so dass  $\forall j \geq_J j_0 : \kappa(j) \geq_I i_0$ . Also gilt für alle  $j \geq_J j_0$ :

$$\varphi(\kappa(j)) \in U$$

Also konvergiert das Teilnetz gegen  $x$ .

(ii)  $\Rightarrow$  (iii) Jedes Netz ist ein Teilnetz von sich selbst.  $I \xrightarrow{\text{id}} I \xrightarrow{\text{id}} X$  Sei  $\varphi \circ \kappa$  Teilnetz von  $\varphi \Rightarrow \varphi \circ \kappa$  konvergiert gegen  $x \Rightarrow \varphi \circ \text{id}$  konvergiert gegen  $x$ .

(iii)  $\Rightarrow$  (i) Für diese richtung verwenden wir Kontraposition. - Weil wir das schon länger nicht gemacht haben -  $\neg(i) \Rightarrow \neg(iii)$ :

Wähle  $U \in \mathcal{U}(x) \forall i_0 \in I \exists i \geq i_0$  sodass  $\varphi(i) \notin U$

$$(**) \quad J := \{i \in I \mid \varphi(i) \notin U\} \subseteq I$$

Diesmal ist es leichter, die Bemerkung zu verwenden

Definiere  $j_1, j_2 \in J : j_1 \leq_J j_2 \Leftrightarrow j_1 \leq_I j_2$ .

- Die Einschränkung der Ordnung auf  $I$  als Ordnung auf  $J$  -

Damit ist  $(J, \leq_J)$  reflexiv und transitiv. Seien  $j_1, j_2 \in J$ . Wähle  $i \in I : j_1 \geq_I i, j_2 \geq_I i \Rightarrow j_1 \geq_I i, j_1 \geq_J i, j_2 \geq_J i$ .

$\Rightarrow (J, \geq_J)$  ist gerichtete Menge.

Definiere:

$$\kappa : \begin{cases} j \mapsto j \\ i \mapsto i \end{cases}$$

Sei  $i \in I$ . Wegen  $(**)$  wähle  $j_0 \in I$  sodass  $\varphi(j_0) \notin U$ .  $j_0 \in J$ .

Sei  $(K, \leq_K)$  eine gerichtete Menge, mit  $\lambda : K \rightarrow J$  mit  $(\star)$ . Also  $(\varphi \circ \kappa) \circ \lambda : K \rightarrow X$ .

Angenommen

$$\lim_{k \in K} [(\varphi \circ \kappa) \circ \lambda](k) = x.$$

Wähle  $k_0 \in K : \forall k \geq k_0 : [(\varphi \circ \kappa) \circ \lambda](k) \in U$ .

Was ein Widerspruch ist, da  $\varphi(\kappa(\lambda(k_0))) \notin U$  Per definition von  $(\varphi \circ \kappa) \circ \lambda$ .



Wir sehen also: im Vergleich zu Folgen haben wir keine Indexschlacht mehr. Dafür haben wir jetzt sehr viele Abbildungen  $\circ$  abbildungen.

### Satz 4.0.3

Sei  $\langle X, \mathcal{T} \rangle$  ein topologischer Raum.

- (i)  $A \subseteq X$  ist abgeschlossen  $\Leftrightarrow$  für jedes Netz  $\varphi : I \rightarrow A \subseteq X$  in  $A$ , das gegen  $x \in X$  konvergiert, gilt  $x \in A$ .
- (ii) Sei  $\langle Y, \mathcal{S} \rangle$  ein weiterer topologischer Raum. Eine Abbildung  $f : X \rightarrow Y$  ist stetig  $\Leftrightarrow$  für jedes Netz  $\alpha : I \rightarrow X$  in  $X$ , das gegen ein  $x \in X$  konvergiert, gilt,

$$\lim_{i \in I} \alpha(i) \leftarrow \lim_{i \in I} (f \circ \alpha)(i) = f(x)$$

Der zweite Punkt ist so zu verstehen, dass wenn  $x$  ein Grenzwert von  $\alpha$  ist, dann ist  $f(x)$  der Grenzwert von  $f \circ \alpha$ . Der Grenzwert muss hier nicht eindeutig sein.

*Proof.* Satz: 4.0.3:

"(i) $\Rightarrow$ " Sei  $A \subseteq X$  abgeschlossen, angenommen  $\alpha : I \rightarrow A$  ist ein Netz in  $X$ , mit  $x \in X$ . So dass  $\lim_{i \in I} \alpha(i) = x$ . und  $x \notin A$ . Sei  $U := X \setminus A \in \mathcal{U}(x)$ . aber  $\forall i \in I : \alpha(i) \in A \Rightarrow \alpha(i) \notin U$ .

"(i) $\Leftarrow$ " Sei  $A \subseteq X$  nicht abgeschlossen. Dann ist  $X \setminus A$  nicht offen. Also gibt es ein  $x \in X \setminus A$  so dass  $\forall U \in \mathcal{U}(x) : U \not\subseteq X \setminus A \Rightarrow \forall U \in \mathcal{U}(x) : \neg(U \subseteq X \setminus A)$  (dh.:  $U \cap A \neq \emptyset$ ). Wähle  $\alpha : \mathcal{U}(x) \rightarrow X$  mit  $\alpha(U) \in U_1$ . Das können wir dank des Auswahlaxioms. So machen Für  $U_1, U_2 \in \mathcal{U}(x)$  mit  $U_1 \leq U_2 \Leftrightarrow U_1 \supseteq U_2$ . Sei  $\langle \mathcal{U}(x), \leq \rangle$  eine gerichtete Menge. Also Transitivität und Reflexivität sind klar. Seien  $U_1, U_2 \in \mathcal{U}(x)$ . Wähle  $U_3 \in \mathcal{U}(x)$  mit  $U_3 \subseteq U_1 \cap U_2$ . Dann ist  $U_3 \leq U_1$  und  $U_3 \leq U_2$ . Also ist  $\langle \mathcal{U}(x), \leq \rangle$  eine gerichtete Menge. Sei  $U \in \mathcal{U}(x)$ .

$\alpha$  ist konvergent gegen  $x$ . Sei  $U \in \mathcal{U}(x)$ . Setze  $U_0 := U$ . Sei  $V \in \mathcal{U}(x)$  mit  $V \leq U_0$ . Das heißt  $V \subseteq U_0$ . Also gilt  $\alpha(V) \in V \subseteq U_0$ . Damit haben wir ein netz in  $A$  gefunden das gegen  $x$  konvergiert.

(ii)" $\Leftarrow$ " Sei  $\alpha : I \rightarrow A$  ein Netz in  $X$  mit  $\lim_{i \in I} \alpha(i) = x$ .  $A \subseteq \bar{\{A\}}$

"(ii) $\Rightarrow$ " Sei  $x \in \bar{A} \Rightarrow \forall U \in \mathcal{U}(x) : U \cap A \neq \emptyset$ .

"(i) $\Rightarrow$ (ii)" Sei  $A \subseteq Y$  Abgeschlossen Und  $\alpha : I \rightarrow f^{-1}(A)$ , mit  $\lim_{i \in I} \alpha(i) = x$ ,  $x \in X$ .  $\Rightarrow \lim_{i \in I} (f \circ \alpha)(i) = f(x)$   
Da  $(f \circ \alpha)(i) \in A$  für alle  $i \in I$ , folgt  $f(x) \in \bar{A} \Rightarrow x \in f^{-1}(A)$



# Lecture 5

## Satz 5.0.1 Charakterisierung der Stetigkeit

Seien  $\langle X, \sqcup \rangle$  und  $\langle Y, \mathcal{V} \rangle$  Topologische Räume und  $f : X \rightarrow Y$

$$\begin{aligned} f \text{ ist stetig} &: \Leftrightarrow \forall O \in \mathcal{V} : f^{-1}(O) \in \mathcal{T} \\ &\Leftrightarrow \forall A \subseteq Y \text{ abgeschlossen} : f^{-1}(A) \text{ ist Abgeschlossen} \\ &\Leftrightarrow \forall x \in X \forall \mathcal{U} \in \mathcal{U}^Y(f(x)) : \exists v \in \mathcal{U}^X(x) : f(V) \in \mathcal{U} \\ &\Leftrightarrow \text{Für jedes Netz } \phi \in X, x \in X : x \text{ ist Grenzwert von } \phi \Rightarrow f(x) \text{ ist Grenzwert von } f \circ \phi \end{aligned}$$

In der letzten Vorlesung haben wir die Hinrichtung von der dritten Äquivalenz schon im Zuge vom Beweis von 4.0.5 schon gesehen es fehlt also noch die Hinrichtung in die andere Richtung  
- Gängiger wäre Rückrichtung -  
zu zeigen<sup>1</sup>.

*Proof.* Satz 5.0.1:

Seien  $\langle I, \leq \rangle$  eine gerichtete Menge und  $\varphi : I \rightarrow X$  ein Netz in  $X$  mit Grenzwert  $x \in X$ .


Sei  $U \in \mathcal{U}^Y(f(x))$  Da  $f$  stetig können wir per Definition ein  $V$  wählen so dass

$$\begin{aligned} &V \in \mathcal{U}^X(x) : f(V) \subseteq U \\ \text{Weiters wähle} \quad &i_0 \in I : \forall i \geq i_0 : \varphi(i) \in V \\ &\Rightarrow \forall i \geq i_0 : (f \circ \varphi)(i) \in f(V) \subseteq U \end{aligned}$$



## 5.1 Initiale Topologie\*

Seien  $(Y_i, \mathcal{V}_i)$  topologische Räume,  $X$  eine Menge und  $f_i : X \rightarrow Y_i$  Abbildungen. Wir nennen die größte Topologie, die alle  $f_i$  stetig macht, die **initiale Topologie** bezüglich der  $f_i$ .



Das bedeutet (vgl.: Kaltenböck: Aufbau Analysis )

<sup>1</sup>Aber Hinrichtung hört sich lustiger an und passt auch besser zum Mathematik studium

- Unter allen Topologien  $\mathcal{V}'$  auf  $X$  so, dass  $f_i : (X, \mathcal{V}') \rightarrow (X_i, \mathcal{V}_i)$  für alle  $i \in I$  stetig ist, ist

$$\mathcal{V} := \mathcal{V} \left( \bigcup_{i \in I} f_i^{-1}(\mathcal{V}_i) \right),$$

also die Topologie mit  $\bigcup_{i \in I} f_i^{-1}(\mathcal{V}_i)$  als Subbasis, die größte. Man bezeichnet  $\mathcal{V}$  als **initiale Topologie** bezüglich der Abbildungen  $f_i, i \in I$ .

- Für diese initiale Topologie  $\mathcal{V}$  und einen weiteren topologischen Raum  $(Y, \mathcal{O})$  ist eine Abbildung  $f : (Y, \mathcal{O}) \rightarrow (X, \mathcal{V})$  genau dann stetig, wenn  $f_i \circ f : (Y, \mathcal{O}) \rightarrow (X_i, \mathcal{V}_i)$  für alle  $i \in I$  stetig ist.

## 5.2 Produkttopologie

Betrachte eine Menge  $X$  die nicht leer ist und eine Menge  $Y_x$  mit  $x \in X$ . Damit definieren wir:

$$\prod_{x \in X} Y_x := \left\{ f : X \rightarrow \bigcup_{x \in X} Y_x \mid \forall x \in X : f(x) \in Y_x \right\}.$$

Weiters führen wir die Notation:

$$Y_1 \times Y_2 := \{(y_1, y_2) : y_1 \in Y_1, y_2 \in Y_2\}$$

### Note:-

Analog zu der eingeführten Notation schreiben wir:

Für ein Element  $f \in \prod_{x \in X} Y_x$  schreiben wir auch als Tupel  $(y_x)_{x \in X}$  was  $(f(x))_{x \in X}$  entspricht.

### Definition 5.2.1: Produkttopologie

Sei  $X$  eine nicht leere Menge,  $(Y_x, x \in X)$  eine Familie von Mengen die nicht leer sind, und für jedes  $x \in X$  sei  $(Y_x, \mathcal{T}_x)$  ein topologischer Raum. Wir betrachten:

$$S := \{\pi_x^{-1}(O_x) \mid x \in X, O_x \in \mathcal{T}_x\}$$

Die von  $S$  erzeugte Topologie ist die **Produkttopologie** und wir schreiben auch  $\prod_{x \in X} \mathcal{T}_x$

### Note:-

### Definition 5.2.2: Produkttopologie (Kaltenbäck)

Sei  $X$  eine nicht leere Menge und für jedes  $x \in X$  sei  $(Y_x, \mathcal{V}_x)$  ein topologischer Raum. Die **Produkttopologie** auf  $\prod_{x \in X} Y_x$  ist die initiale Topologie bezüglich der Projektionen

$$\pi_x : \prod_{x \in X} Y_x \rightarrow Y_x, \quad (y_x)_{x \in X} \mapsto y_x,$$

für alle  $x \in X$ .

### Proposition 5.2.3

Sei  $(I, \leq)$  eine gerichtete Menge und  $\varphi : I \rightarrow \prod_{x \in X} Y_x$  ein Netz. Weiter sein  $g \in \prod_{x \in X} Y_x$ . Dann gilt:

$$\lim_{i \in I} \varphi(i) = g \Leftrightarrow \forall x_0 \in X : \lim_{i \in I} (\pi_{x_0} \circ \varphi)(i) = \pi_{x_0}(g)$$

Was Punktweise Konvergenz bedeutet.

*Proof.* Proposition: 5.2.3:

" $\Rightarrow$ ": Die Richtung ist klar, da die Projektionen  $(\pi_{x_0})$  stetig sind. und stetigkeit erhält Konvergenz.Dh. es folgt aus der Definition von  $S$ .

" $\Leftarrow$ ": Sei  $U \in \mathcal{U}^{\prod_{x \in X} Y_x}(g)$ . Dann gilt:

$$\begin{aligned} \exists O \in \prod_{x \in X} \mathcal{T}_x : g \in O \subseteq U \\ \Rightarrow \exists x_1, \dots, x_n \in X, O_{x_1} \in \mathcal{T}_{x_1}, \dots, O_{x_n} \in \mathcal{T}_{x_n} : g \in \bigcap_{k=1}^n \pi_{x_k}^{-1}(O_{x_k}) \subseteq O \subseteq U \\ \forall k \in \{1, \dots, n\} : g \in \pi_{x_k}^{-1}(O_{x_k}) \in \prod_{x \in X} \mathcal{T}_x \\ \Rightarrow \forall k \in \{1, \dots, n\} : \pi_{x_k}(g) \in O_{x_k} (\text{Umgebung von } g(x_k)) \\ \stackrel{\text{VS}}{\Rightarrow} \text{Wähle } i_k \in I : \forall i \geq i_k : \underbrace{(\pi_{x_k} \circ \varphi)(i)}_{\Leftrightarrow \phi(i) \in \pi_{x_k}^{-1}(O_{x_k})} \in O_{x_k} \\ \text{Wähle } i_k \in I : \forall i \geq i_k : \forall k \in \{1, \dots, n\} : \varphi(i) \in \pi_{x_k}^{-1}(O_{x_k}) \\ \Leftrightarrow \varphi(i) \in \bigcap_{k=1}^n \pi_{x_k}^{-1}(O_{x_k}) \subseteq U \end{aligned}$$



#### Proposition 5.2.4

Sei  $X$  überabzählbar,  $|Y_x| \geq 2$  für alle  $x \in X$ . Dann gibt es keine Metrik  $d$  auf  $\prod_{x \in X} Y_x$  so dass  $d$  die Produkttopologie induziert.

#### Lemma 5.2.5

$\langle Z, d \rangle$  ein Metrischer Raum.  $z \in Z \Rightarrow \exists U_n, n \in \mathbb{N}^a$  Umgebungen von  $z$  mit  $\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n = \{z\}$

<sup>a</sup>Abzählbar viele

*Proof.* Lemma: 5.2.5:

Sei  $n \in \mathbb{N}$ . Definiere  $U_n := B_{1/2}(z)$ . Sei:

$$w \in \bigcap_{n=1}^{\infty} B_{1/2}(z) \Rightarrow d(w, z) < 1/n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Dann gilt  $d(w, z) = 0 \Rightarrow w = z$ .



**Proof:** Proposition: 5.2.4:

Sei  $f \in \prod_{x \in X} Y_x$ ,  $U_n \in \mathcal{U}^{\prod_{x \in X} Y_x}(f(x_n)) \forall n \in \mathbb{N}$ .

Wähle  $O_n \in \prod_{x \in X} \mathcal{T}_x : f \in O_n \subseteq U_n$ .

Vereinigung von endlichen Durchschnitten von Mengen aus (char. erzeugte Top.).

Wähle

$$\begin{cases} x_{n,1}, \dots, x_{n,m_n} \in X \\ O_{x_{n,1}}, \dots, O_{x_{n,m_n}} \in \mathcal{T}_{x_{n,m_n}} \end{cases}$$

So dass:  $f \in \bigcap_{k=1}^{m_n} \pi_{x_{n,k}}^{-1}(O_{x_{n,k}}) \subseteq O_n \subseteq U_n$ .

$\Rightarrow f \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=1}^{m_n} \pi_{x_{n,k}}^{-1}(O_{x_{n,k}})$ .

Da  $X$  überbzählbar ist, gibt es ein  $x_0 \in \{x_{n,j} \mid n \in \mathbb{N}, j \in \{1, \dots, m_n\}\} \not\subseteq X$   
Das geht da  $X$  überbzählbar ist,  $Y_{x_0} \setminus \{f(x_0)\} \neq \emptyset$  (da  $|Y_{x_0}| \geq 2 \forall x \in X$ )  
 $\rightsquigarrow$  wähle  $y \in Y_{x_0} \setminus \{f(x_0)\}$   
Definiere:

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \neq x_0, \\ y, & x = x_0. \end{cases}$$

$\Rightarrow \tilde{f} \neq f$  und

$\Rightarrow \tilde{f} \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{j=1}^{m_n} \pi_{x_{n,j}}^{-1}(O_{x_{n,j}}) \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n.$



**Note:-**

**Wiederholung:**  $\langle X, \mathcal{T} \rangle$  Topologischer Raum.

$K \subseteq X$  heißt Kompakt  $\Leftrightarrow \forall C \in \mathcal{T} : \cup C \supseteq K \Rightarrow (\exists C' \subseteq C \text{ endlich} : \cup C' \supseteq K).$

**Proposition 5.2.6**

$\langle X, \mathcal{T} \rangle$  topologischer Raum. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

- (i)  $K \subseteq X$  ist endlich  $\Rightarrow$  ist kompakt.
- (ii)  $K_1, \dots, K_n \subseteq X$  sind kompakt  $\Rightarrow K_1 \cup \dots \cup K_n$  ist kompakt.
- (iii)  $K \subseteq X$  ist kompakt  $A \subseteq X$  abgeschlossen  $\Rightarrow K \cap A$  ist kompakt.
- (iv) Sei  $\langle Y, \mathcal{V} \rangle$   $K \subseteq X$  kompakt und  $f : X \rightarrow Y$  stetig. Dann ist  $f(K)$  kompakt.

*Proof.* Proposition: 5.3.2:

- (i)  $K = \{x_1, \dots, x_n\}, C \subseteq \mathcal{T}$  mit  $\cup C \supseteq K.$

Für  $j \in \{1, \dots, n\}$  wähle  $O_j \in C$  mit  $x_j \in O_j.$

Dann ist  $K = \{x_1, \dots, x_n\} \subseteq \bigcup_{j=1}^n O_j.$

- (ii) Sei  $C \subseteq \mathcal{T}$  mit  $\cup C \supseteq K_1 \cup \dots \cup K_n.$

$\Rightarrow \forall j \in \{1, \dots, n\} : \cup C \supseteq K_j.$

$\Rightarrow \forall j \in \{1, \dots, n\} : \exists C_j \subseteq C$  endlich mit  $\cup C_j \supseteq K_j.$

$\Rightarrow \underbrace{\cup C' := \{O \mid \exists j \in \{1, \dots, n\} : O \in C_j\}}_{\text{endlich}} \supseteq K_1 \cup \dots \cup K_n.$

endlich

- (iii) Sei  $C \subseteq \mathcal{T}$  mit  $\cup C \supseteq K \cap A.$

$C \cup \{X \setminus A\} \subseteq \mathcal{T} \rightsquigarrow \cup C \cup (X \setminus A) \supseteq K \cap A.$

Wähle  $O_1, \dots, O_m \in C$  so dass

$O_1 \cup \dots \cup O_m \cup (X \setminus A) \supseteq K.$

Dann gilt  $(O_1 \cup \dots \cup O_m \cap (X \setminus A)) \cap A \supseteq K \cap A.$

- (iv) Sei  $C \subseteq \mathcal{V}$  mit  $\cup C = \bigcup_{O \in C} O \supseteq f(K).$

$\Rightarrow f^{-1}\left(\underbrace{\bigcup_{O \in C} O}_{\text{offen}}\right) \supseteq K.$

$\underbrace{\bigcup_{O \in C} f^{-1}(O)}_{\text{offen}}$

Definiere  $D := \{f^{-1}(O) \mid O \in C\} \subseteq \mathcal{T}$  und  $\cup D \supseteq K.$

Wähle  $O_1, \dots, O_n \in C$  so dass  $\bigcup_{j=1}^n f^{-1}(O_j) \supseteq K.$

$\Rightarrow f(\bigcup_{j=1}^n f^{-1}(O_j)) \supseteq f(K).$

wobei  $f(\bigcup_{j=1}^n f^{-1}(O_j)) = \bigcup_{j=1}^n f(f^{-1}(O_j)) \subseteq \bigcup_{j=1}^n O_j$ .



### Korollar 5.1

- (i) Sei  $\langle X, \mathcal{T} \rangle$  Hausdorff'scher Raum:  $K \subseteq X$  kompakt  $\Rightarrow K$  ist abgeschlossen.
- (ii) Sei  $\langle X, \mathcal{T} \rangle$  Topologischer Raum,  $X$  kompakt,  $\langle Y, \mathcal{V} \rangle$  Hausdorff'scher Raum,  $f : X \rightarrow Y$  stetig und bijektiv. Dann ist  $f^{-1} : Y \rightarrow X$  stetig.

### Lemma 5.2.7

Sei  $\langle X, \mathcal{T} \rangle$  ein Hausdorff'scher Raum. Und  $K_1, K_2 \subseteq X$  kompakt,  $\neq \emptyset$  und disjunkt.  $\Rightarrow \exists O_1, O_2$  offen und disjunkt, so dass  $K_1 \subseteq O_1$  und  $K_2 \subseteq O_2$ .

*Proof.* Lemma 5.3.4:

1. Schritt: Sei  $x \in X, K \subseteq X$  kompakt,  $x \notin K$ .

$\forall y \in K : x \neq y \xrightarrow{X \text{ Hausdorff}} \text{wähle } O_y, \tilde{O}_y \text{ offen mit } O_y \cap \tilde{O}_y = \emptyset, x \in O_y, y \in \tilde{O}_y.$

$K = \bigcup_{y \in K} \{y\} \subseteq \tilde{O}_y \xrightarrow{K \text{ kompakt}} \text{wähle } y_1, \dots, y_n \in K : K \subseteq \bigcup_{j=1}^n \tilde{O}_{y_j}.$

$$\underbrace{\bigcup_{j=1}^n \tilde{O}_{y_j}}_{\text{offen, } \supseteq K} \cap \underbrace{\bigcap_{j=1}^n O_{y_j}}_{\text{offen, } x \in} = \bigcup_{j=1}^n [\tilde{O}_{y_j} \cap \bigcap_{k=1}^n O_{y_k}] \subseteq \bigcup_{j=1}^n [\tilde{O}_{y_j} \cap O_{y_j}] = \emptyset$$

2. Schritt: Sei  $K_1, K_2 \subseteq X$  kompakt, disjunkt.

Für jedes  $x \in K_1$  wähle  $O_x, \tilde{O}_x$  disjunkt und  $x \in \tilde{O}_x, K_2 \subseteq O_x$ .

$K_1 = \bigcup_{x \in K_1} \{x\} \subseteq \tilde{O}_x \xrightarrow{K_1 \text{ kompakt}} \text{wähle } x_1, \dots, x_m \in K_1 : K_1 \subseteq \bigcup_{i=1}^m \tilde{O}_{x_i}.$

$$\underbrace{\bigcup_{j=1}^n \tilde{O}_{x_j}}_{\text{offen, } \supseteq K_1} \cap \underbrace{\bigcap_{j=1}^n O_{x_j}}_{\text{offen, } \supseteq K_2} = \emptyset \quad (\text{wie oben})$$



*Proof.* Korollar 5.3.3:

(i) Sei  $K \subseteq X$  kompakt und  $x \in X \setminus K$ .

$\xrightarrow{\text{Lemma 5.3.4}} \exists O_1, O_2 \text{ Offen und disjunkt, } x \in O_1, O_2 \supseteq K$

$\Rightarrow x \in O_1 \subseteq X \setminus K$

Also ist  $X \setminus K$  offen und  $K$  abgeschlossen.

(ii) Betrachte  $Y \xrightarrow{f^{-1}} X$  Sei  $A \subseteq X$  abgeschlossen.

$\xrightarrow{\text{Proposition 5.3.2}} A = A \cap X \text{ ist kompakt.}$

$\Rightarrow f(A) \subseteq Y \text{ ist kompakt.}$

$\xrightarrow{Y \text{ Hausdorff}} f(A) \text{ ist abgeschlossen.}$





# Lecture 6

Wiederholung was ist eine Basis einer Topologie?

## Definition 6.0.1: Basis einer Topologie

Sei  $(X, \mathcal{T})$  ein topologischer Raum. Eine Menge  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$  heißt **Basis** der Topologie  $\mathcal{T}$ , wenn für jedes  $O \in \mathcal{T}$  eine Teilmenge  $\mathcal{B}_O \subseteq \mathcal{B}$  existiert, so dass

$$O = \bigcup_{B \in \mathcal{B}_O} B.$$

Die Frage konnte sich mein imaginärer Läser jetzt sehr schnell durch weiterlesen beantworten.

Ein andere Frage die ich mir stelle ist:

Die Vorlesungsprüfung umfasst den Stoff der Vorlesung jedoch zb, der Begriff der Basis wurde in der Übung eingeführt. Wäre die Basis nicht wiederholt worden, wäre sie dann prüfungsrelevant?

Aber naja ... Weiter mit Stoff: Zur einleitung ein äher Kreifbares Beispiel.

## Beispiel 6.0.2

Sei  $(X, \mathcal{T})$  ein Metrischer Raum. Und  $\mathcal{T}_d$  die von der Metrik induzierte Topologie. Dann ist

$$\mathcal{B} = \{U_{\frac{1}{n}}(x) : x \in X, n \in \mathbb{N}\}$$

eine Basis der Topologie  $\mathcal{T}_d$ .

## Definition 6.0.3: Subbasis

Sei  $(X, \mathcal{T})$  ein topologischer Raum. Eine Menge  $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$  heißt **Subbasis** der Topologie

$:\Leftrightarrow \mathcal{T}$  ist die kleinste Topologie, die  $\mathcal{S}$  umfasst.

**Note:-**

**Definition 6.0.4: Kaltenbäck (12.5.2)**

Sei  $(X, \mathcal{T})$  ein topologischer Raum und  $\mathcal{B}, \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$ .

- $\mathcal{B}$  heißt **Basis** von  $\mathcal{T}$ , wenn  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$  und wenn es für alle  $O \in \mathcal{T}$  und  $x \in O$  ein  $B \in \mathcal{B}$  mit  $x \in B \subseteq O$  gibt.
- $\mathcal{C}$  heißt **Subbasis** von  $\mathcal{T}$ , wenn  $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{T}$  und wenn es für alle  $O \in \mathcal{T}, O \neq X$ , und  $x \in O$  endlich viele  $C_1, \dots, C_n \in \mathcal{C}$  mit

$$x \in C_1 \cap \dots \cap C_n \subseteq O$$

gibt.

- Man sagt, ein topologischer Raum  $(X, \mathcal{T})$  erfüllt das **zweite Abzählbarkeitsaxiom (ABII)**, wenn  $\mathcal{T}$  eine abzählbare Basis besitzt.



Figure 6.1: <https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/>

Mensch Umfasst Lamm (Lemmachen).

Wäre der Mensch die kleinste Topologie, die das Lamm umfasst,

so wäre das Lamm eine Subbasis des Menschen.... missed chance Menschen sollten Topologien sein

**Beispiel 6.0.5**

Sei  $X \neq \emptyset, x \in X$  ein topologischer Raum auf  $\mathcal{T}_S$ . Die Produkttopologie auf  $\prod_{x \in X} \mathcal{T}_1$  auf  $\prod_{x \in X} \mathcal{T}$

$$S := \{\pi_x^{-1}(O_x) : x \in X, O_x \subseteq \mathcal{T}_x\}$$

ist eine Subbasis für  $\prod_{x \in X} \mathcal{T}_x$ .

**Satz 6.0.6**

$\langle X, \mathcal{T} \rangle$  ein topologischer Raum und  $K \subseteq X$ . Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

(i)  $X$  ist kompakt.  $(\forall C \subseteq \mathcal{T}), \bigcup C = X \Rightarrow \exists \tilde{C} \subseteq C$  endlich mit  $\bigcup \tilde{C} = X$ )

(i\*) Sei  $\mathcal{B}$  eine Basis von  $\mathcal{T}$ . Dann gilt:

$$\forall C \subseteq \mathcal{B}, \bigcup C = X \Rightarrow \exists \tilde{C} \subseteq C \text{ endlich mit } \bigcup \tilde{C} = X.$$

(i\*\*) Sei  $(A_i)_{i \in I}$  eine Familie abgeschlossener Mengen in  $X$ , für die gilt:

$$(\forall \text{ endliches } J \subseteq I : \bigcap_{j \in J} A_j \neq \emptyset) \Rightarrow \bigcap_{i \in I} A_i \neq \emptyset.$$

(ii) Sei  $\mathcal{S}$  eine Subbasis von  $\mathcal{T}$ . Dann gilt:

$$\forall C \subseteq \mathcal{S}, \bigcup C = X \Rightarrow \exists \tilde{C} \subseteq C \text{ endlich mit } \bigcup \tilde{C} = X.$$

(iii) Jedes Netz in  $X$  hat ein Teilnetz, welches einen Grenzwert hat

*Proof.* Satz: 6.0.5 (Erster Teil):

- [(i)  $\Rightarrow$  (i\*)]: Klar, da jede Basis eine Teilmenge der Topologie ist.
- [(i\*)  $\Rightarrow$  (i)]: Sei  $C \subseteq \mathcal{T}$  mit  $\bigcup C \supseteq K$  beliebig.  
Für jedes  $O \in C$  gibt es eine Teilmenge  $\mathcal{B}_O \subseteq \mathcal{B}$  mit

$$O = \bigcup_{B \in \mathcal{B}_O} B.$$

Also gilt:

$$\bigcup C = \bigcup_{O \in C} O = \bigcup_{O \in C} \bigcup \mathcal{B}_O$$

Betrachte nun die Menge

$$D := \{U \subseteq X : \exists O \in C : U \subseteq O\} \subseteq \mathcal{B}$$

. Dann gilt:  $\cap D \supseteq K$ . Nach Voraussetzung gibt es eine endliche Teilmengen

$$U_1, \dots, U_n \in D : \bigcup_{j=1}^n U_j \supseteq K.$$

Wähle  $O_j \in C : U_j \in \mathcal{B}_{O_j} \Rightarrow U_j \subseteq \bigcup \mathcal{B}_{O_j} = O_j$

Dann gilt:  $K \subseteq \bigcup_{j=1}^n U_j \subseteq \bigcup_{j=1}^n O_j$

- [(i)  $\Leftrightarrow$  (i\*\*)]:

$$\left[ \begin{array}{l} (\forall I' \subseteq I, \text{ endlich: } X \setminus \bigcap_{i \in I'} A_i \neq X) \Rightarrow X \setminus \bigcap_{i \in I} A_i \neq X, \\ (\forall J \subseteq I, \text{ endlich: } \bigcup_{i \in J} (X \setminus A_i) \neq X) \Rightarrow \bigcup_{i \in I} (X \setminus A_i) \neq X \end{array} \right]$$

Seien  $A_i \subseteq X$  abgeschlossene Mengen.

Setze  $O_i := X \setminus A_i$  offen.

Sei  $\forall J \subseteq I$  endlich mit  $\bigcap_{i \in J} A_i \neq \emptyset$ . Das heißt  $\forall J \subseteq I$  endlich mit  $\bigcup_{i \in J} O_i \neq X$ .

Also  $\{O_i : i \in I\}$  hat kein endliche Teilfamilie, die  $X$  überdeckt ( $\nexists J$  : endlich mit  $\bigcup_{i \in J} O_i = X$ ).

$$\stackrel{(i)}{\Rightarrow} \bigcup_{i \in I} O_i \neq X \Rightarrow \bigcap_{i \in I} (X \setminus A_i) \neq X$$

- [(i\*\*)  $\Rightarrow$  (i)]: Sei  $O_j, i \in I$  offen in  $X$  mit  $\bigcup_{i \in I} O_i = X$  Das heißt  $\bigcap_{i \in I} A_i = \emptyset$ . Dan erhalten wir eine Kontraposition zu (i\*\*) mit  $\exists J \subseteq I$  endlich mit  $\bigcap_{j \in J} A_j = \emptyset$ . Das heißt  $\bigcup_{j \in J} O_j = X$ .



Die Aufmerksame Leserin wird bemerken, dass noch ein die Implikationen (i)  $\Leftrightarrow$  (ii) und (ii)  $\Leftrightarrow$  (i) fehlen.

Die eine ist klar und die andere ist ein Satz Die, die klar ist wird nicht weiter Behandelt. Die andere würde ich gerne nicht Behandeln, da sie lang ist und ich müde.

### Satz 6.0.7 Die eine Implikation, die nicht klar ist

(ii)  $\Rightarrow$  (i)

*Proof.* Satz: 6.0.6:

Wir machen einen Beweis durch **Kontraposition**: Angenommen  $\neg$  (ii) gilt  $\Rightarrow$  (i) gilt nicht.

1. Sei

$$Q := \{C \subseteq \mathcal{T} : \bigcup C = X \forall \tilde{C} \subseteq C \text{ endlich}; \bigcup \tilde{C} = X\} \neq \emptyset$$

Sei  $\tilde{Q} \subseteq Q$  Total geordnet durch Inklusion. Zu zeigen ist dann:  $D \in Q$

- $\forall \tilde{T} \in \tilde{Q} : \tilde{C} \subseteq \mathcal{T} \Rightarrow \bigcup \tilde{C} \subseteq X$ .
- Wähle  $C_o \in \tilde{Q} : \bigcup C_o = X$ .  $\bigcup D = \bigcup \bigcup_{C \in \tilde{Q}} \tilde{C} \supseteq \bigcup C_o = X$ .
- Seien  $O_1, \dots, O_n \in D$   
wähle  $\tilde{C}_1, \dots, \tilde{C}_n \in \tilde{Q} : O_j \in C \in \tilde{C}_j$  mit  $j = 1, \dots, n$   
Daraus folgt:  $\bigcup_{j=1}^n O_j \neq X$ .

2. Wähle  $C_o \in Q$  maximales Element.

$$\mathcal{S} := I_o \cap \mathcal{S}$$

$$\text{Zeige } \bigcup \mathcal{S}_o = X$$

Angenommen  $x \notin \bigcup \mathcal{S}_o$  Wähle  $O_o \in I_o$ .  $x \in O_o$

$$\text{Wähle } V_1, \dots, V_n \in \mathcal{S} : x \in \bigcap_{j=1}^n V_j \subseteq O_o$$

$$\Rightarrow \forall j \in \{1, \dots, n\} : \forall V_j \notin \mathcal{S}_o$$

$$\Rightarrow \forall j \in \{1, \dots, n\} : V_j \in \{1, \dots, n\} : V_j \notin C_o$$

$$C_o \cup \{V_j\} \supseteq C_o \Rightarrow C_o \cup \{V_j\} \notin Q \Rightarrow W_{j,1}, \dots, W_{j,n} \cup V_j = X$$

$$\Rightarrow \bigcup_{j=1}^n (W_{j,1}, \dots, W_{j,n}) \cup \bigcap_{j=1}^n V_j = X$$

$$\text{Sei } x \in X \quad \begin{cases} x \in \bigcap_{j=1}^n V_j, \\ x \in \bigcap_{j=1}^n V_j. \end{cases} \quad \text{Wähle } j : x \notin V_j \Rightarrow x \in W_{j,1} \cup \dots \cup W_{j,n} \subseteq \bigcup_{j=1}^n (U_{j,1} \cup \dots \cup U_{j,nj})$$

Damit haben wir einen Widerspruch da wir eine endliche Teilüberdeckung mit Mengen aus  $C_o$



*Proof.* Satz: 6.0.5 (Rest):

- [(iii)  $\Rightarrow$  (i)]: Diese Implikation zeigen wir wieder durch Kontraposition. Wir betrachten also  $\neg$ (i)  $\Rightarrow$   $\neg$ (iii).  
Sei also  $C \subseteq \mathcal{T}$  mit  $\bigcup C = X$ , endlich,

$$\forall \tilde{C} \subseteq C \text{ endlich} : \bigcup \tilde{C} \neq X.$$

$I := \{\tilde{C} \subseteq C \mid \tilde{C} \text{ endlich}\}$ ,  $\tilde{C} \leq_I \tilde{\tilde{C}}$  Damit ist  $(I, \leq_I)$  eine gerichtete Menge.

- Reflexivität:  $\tilde{C} \leq_I \tilde{C}$ .

- Transitivität: Sei  $\tilde{C}_1 \leq_I \tilde{C}_2$  und  $\tilde{C}_2 \leq_I \tilde{C}_3$ .  
Dann ist:

$$\tilde{C}_1 \subseteq \tilde{C}_2 \text{ und } \tilde{C}_2 \subseteq \tilde{C}_3.$$

Also ist

$$\tilde{C}_1 \subseteq \tilde{C}_3 \text{ und somit } \tilde{C}_1 \leq_I \tilde{C}_3.$$

- Gerichtetheit: Sei  $\tilde{C}_1, \tilde{C}_2 \in I$ .  $\Rightarrow \tilde{C}_1 \cup \tilde{C}_2 \in I$  damit

$$\tilde{C}_1 \subseteq \tilde{C}_1 \cup \tilde{C}_2 \text{ und } \tilde{C}_2 \subseteq \tilde{C}_1 \cup \tilde{C}_2$$

Definiere nun das Netz  $\varphi : I \rightarrow X$  und

$$\forall \tilde{C} \in I : \varphi(\tilde{C}) \subseteq X \setminus \underbrace{\bigcup_{\neq \emptyset} \tilde{C}}$$

Sei  $J$  eine gerichtete Menge und  $\kappa : J \rightarrow I$  ein Teilnetz von  $\varphi$ .<sup>1</sup>

Zu zeigen ist, dass  $\varphi \circ \kappa$  keinen Grenzwert

$$\begin{aligned} & \neg(\forall U \in \mathcal{U}(x) \exists j_0 \in J \forall j \geq_I j_0 : \varphi \circ \kappa(j) \in U) \\ & \Leftrightarrow \\ & (\exists U \in \mathcal{U}(x) \forall j_0 \in J \exists j \geq_I j_0 : \varphi \circ \kappa(j) \notin U) \end{aligned}$$

Wähle  $O_o \in C : x \in O_o \in \mathcal{U}(x)$  Sei  $i_o := \{O_o\} \in I_o$ . Für jedes  $\tilde{C} \in I, \tilde{C} \supseteq \{O_o\} : \phi(\tilde{C}) \notin \mathcal{U} \supseteq \{O_o\}$ . Wähle  $j_0 \in J \forall j \geq_I j_0 : \kappa(j) \geq_I \{O_o\} \Rightarrow \varphi \circ \kappa(j) \notin O_o \forall j \geq_I j_0$ . Damit haben wir eigentlich schon mehr als notwendig gezeigt also jetzt folgern wir aus dem mehr das weniger :-)

$$U := O_o \text{ Sei } j_0 \in J \forall j \text{ Wähle } i \in J : j \geq_I j_0 \wedge j \geq_I i \Rightarrow \varphi \circ \kappa(i) \notin O_o$$

- [(i\*\*)  $\Rightarrow$  (iii)]:

- Sei  $I$  eine gerichtete Menge und  $\varphi : I \rightarrow X$  ein Netz in  $X$ .

$$\left\{ \underbrace{\{\varphi(i)_1 \mid j \geq i\}}_{\text{abgeschlossene Menge}} \mid i \in I \right\}$$

$$\{\varphi(i_1)_1 \mid j \geq i_1\} \cap \cdots \cap \{\varphi(i_n)_1 \mid j \geq i_n\} \supseteq \{\varphi(i_{n+1})_1 \mid j \geq i_0\} \neq \emptyset$$

- Wähle  $x \in \bigcap_{i \in I} \overline{\{\varphi(i)_1 \mid j \geq i\}}$
- $J := \{(j, u) \in I \times \mathcal{U}(x) \mid \varphi(i) \in u\} \neq \emptyset \forall j \in I : (j, X) \in J$   $(j, u) \geq_J (\tilde{j}, \tilde{U}) : \Leftrightarrow i \geq_I \tilde{j}$  und  $u \subseteq \tilde{U}$ 
  - \* Reflexivität, und Transitivität vererben sich von  $I$  und  $\mathcal{U}(x)$ .
  - \* Gerichtetheit: Sei  $(j_1, U_1), (j_2, U_2) \in J$ . Wähle  $j_0 \in I : j_0 \geq_I j_1, j_0 \geq_I j_2$ . Wähle  $U_0 \in \mathcal{U}(x) : U_0 \subseteq U_1 \cap U_2$ . Dann ist  $(j_0, U_0) \geq_J (j_1, U_1)$  und  $(j_0, U_0) \geq_J (j_2, U_2)$ .

$$\kappa : \begin{cases} J \mapsto I \\ (j, U) \mapsto j \end{cases}$$

Wen  $\kappa$  monoton ist und  $\forall i \in I \exists j \in J : \kappa(j) \geq_I i$ .

Dann ist  $\varphi \circ \kappa$  ein Teilnetz von  $\varphi$ .

(Also  $\forall i \in I \exists (j, U) \in J : \kappa((j, U)) = j \geq_I i$ )

$$(j, u) \geq_J (\tilde{j}, \tilde{U}) \Leftrightarrow j \leq_I \tilde{j} \wedge u \supseteq \tilde{U}$$

$$\Rightarrow j \leq_I \tilde{j}$$

Sei  $i \in I$  Wähle  $j := (i, X) \in J \kappa((i, x)) = i \geq_I j$ .

---

<sup>1</sup>  $\forall i \in I \exists j_0 \in J \forall j \geq j_0 : \kappa(j) \geq_I i$

– Wähle  $i_o \in I$  Wähle  $l \in I$  und  $l \geq i_o \wedge \phi(l) \in U, (l, U) \in J$

Sei

$$(j, \tilde{U}) \leq_j (l, U) \Rightarrow j \leq_l l \wedge \tilde{U} \subseteq U$$

.

$$\Rightarrow \varphi \circ \kappa(j, \tilde{U}) = \varphi(j) \in \tilde{U} \subseteq U$$

. Also konvergiert das Teilnetz gegen  $x$ .



# Lecture 7

## Lemma 7.0.1

Sei  $\langle X, \mathcal{T} \rangle$  ein topologischer Raum und  $K \subseteq X$ . Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

- (i)  $K$  ist kompakte Teilmenge von  $X$  bezüglich auf  $\mathcal{T}$ .
- (ii)  $K$  ist betrachtet als Teilmenge des Teilraums  $\langle K, \mathcal{T}_K \rangle$  ein kompakter Raum.

*Proof.* Lemma 7.0.1:

(i)  $\Rightarrow$  (ii): Sei  $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{T}_K$  eine offene Überdeckung von  $K$  in  $(K, \mathcal{T}_K)$ . Zu  $V \in \mathcal{V}$  existiert ein  $U_V \in \mathcal{T}$  mit  $U_V \cap K = V$ , womit  $\mathcal{U} := \{U_V : V \in \mathcal{V}\} \subseteq \mathcal{T}$  eine offene Überdeckung von  $K$  in  $(X, \mathcal{T})$  ist. Voraussetzungsgemäß gibt es  $U_{V_1}, \dots, U_{V_n} \in \mathcal{U}$  derart, dass  $U_{V_1} \cup \dots \cup U_{V_n} \supseteq K$  und folglich

$$V_1 \cup \dots \cup V_n = (U_{V_1} \cap K) \cup \dots \cup (U_{V_n} \cap K) = (U_{V_1} \cup \dots \cup U_{V_n}) \cap K = K.$$

(ii)  $\Rightarrow$  (i): Für eine Überdeckung  $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{T}$  von  $K$  ist

$$\mathcal{V} := \{U \cap K : U \in \mathcal{U}\}$$

eine offene Überdeckung von  $K$  in  $(K, \mathcal{T}_K)$ . Voraussetzungsgemäß existiert eine endliche Teilüberdeckung  $U_1 \cap K, \dots, U_n \cap K$ , womit auch  $U_1 \cup \dots \cup U_n \supseteq K$ .



## Satz 7.0.2 Satz von Tychonoff

Sei  $I$  eine Menge und seien  $\langle X_i, \mathcal{T}_i \rangle$ ,  $i \in I$ , topologische Räume. mit  $I \neq \emptyset$  und  $X_i \neq \emptyset \forall i \in I$ . Weiters sei  $X := \prod_{i \in I} X_i$ , und  $\mathcal{T}$  die Produkttopologie auf  $X$ . Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

- (i)  $\langle X, \mathcal{T} \rangle$  ist kompakt.
- (ii) Für jedes  $i \in I$  ist  $\langle X_i, \mathcal{T}_i \rangle$  kompakt.

*Proof.* Satz: 7.0.2 (Tychonoff):

(i)  $\Rightarrow$  (ii): Angenommen,  $\langle X, \mathcal{T} \rangle$  ist kompakt. Für ein festes  $j \in I$  betrachten wir die kanonische Projektion

$$\pi_j : X \rightarrow X_j, \quad \pi_j((x_i)_{i \in I}) = x_j.$$

Die Projektion  $\pi_j$  ist stetig und surjektiv: Stetigkeit folgt aus der Definition der Produkttopologie, Surjektivität, weil alle  $X_i \neq \emptyset$  sind. Da das stetige Bild eines kompakten Raumes kompakt ist, folgt aus der Kompaktheit von  $X$  die Kompaktheit von  $\pi_j(X) = X_j$ . Somit ist  $\langle X_j, \mathcal{T}_j \rangle$  kompakt für alle  $j \in I$ .

(ii)  $\Rightarrow$  (i): Angenommen, jedes  $(X_i, \mathcal{T}_i)$  ist kompakt. Wir zeigen, dass  $X = \prod_{i \in I} X_i$  kompakt ist.

Nach dem Netz-Kriterium für Kompaktheit genügt es zu zeigen, dass jedes Netz  $(f_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$  in  $X$  einen Häufungspunkt besitzt.

Für jedes  $i \in I$  betrachten wir das Bildnetz  $(f_\lambda(i))_{\lambda \in \Lambda}$  in  $X_i$ . Da  $X_i$  kompakt ist, besitzt dieses Netz mindestens einen Häufungspunkt  $y_i \in X_i$ .

Wir definieren die Menge

$$\mathcal{H} := \{g : D_g \rightarrow \prod_{i \in I} X_i \mid D_g \subseteq I, g(i) \in X_i \text{ und } g(i) \text{ ist Häufungspunkt von } (f_\lambda(i))_{\lambda \in \Lambda}\}.$$

Diese Menge  $\mathcal{H}$  ist nichtleer, da für jedes einzelne  $i \in I$  die Funktion  $g_i = \{(i, y_i)\}$  darin liegt.

Wir ordnen  $\mathcal{H}$  durch Inklusion:  $g \leq h$  genau dann, wenn  $D_g \subseteq D_h$  und  $h|_{D_g} = g$  gilt.

Sei nun  $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{H}$  eine totalgeordnete Teilmenge. Definiere

$$D_h := \bigcup_{g \in \mathcal{N}} D_g, \quad h(i) := g(i) \text{ für ein } g \in \mathcal{N} \text{ mit } i \in D_g.$$

Dann ist  $h$  wohldefiniert, und für jedes  $i \in D_h$  ist  $h(i)$  ein Häufungspunkt von  $(f_\lambda(i))$ . Somit liegt  $h \in \mathcal{H}$ . Also besitzt jede Kette in  $\mathcal{H}$  eine obere Schranke.

Nach dem Lemma von Zorn existiert daher ein maximales  $f \in \mathcal{H}$  mit Definitionsbereich  $D_f \subseteq I$ .

Angenommen,  $D_f \neq I$ . Dann gibt es  $i_0 \in I \setminus D_f$ . Da  $X_{i_0}$  kompakt ist, hat  $(f_\lambda(i_0))$  einen Häufungspunkt  $x_{i_0} \in X_{i_0}$ . Setze

$$h := f \cup \{(i_0, x_{i_0})\}, \quad D_h = D_f \cup \{i_0\}.$$

Dann ist  $h \in \mathcal{H}$ , aber  $h$  erweitert  $f$  echt – Widerspruch zur Maximalität von  $f$ . Also gilt  $D_f = I$ .

Damit ist  $f \in X = \prod_{i \in I} X_i$ . Wir zeigen nun, dass  $f$  ein Häufungspunkt des Netzes  $(f_\lambda)$  ist.

Eine Basis der Produkttopologie besteht aus Mengen

$$W = \prod_{i \in I} U_i,$$

wobei  $U_i$  offen in  $X_i$  ist und  $U_i = X_i$  für fast alle  $i$ . Für solches  $W$  mit  $f \in W$  hängt nur endlich viele Koordinaten von  $U_i$  ab. Da  $f(i)$  Häufungspunkt von  $(f_\lambda(i))$  ist, gibt es für jede dieser endlichen Koordinaten ein  $\lambda$ , sodass  $f_\lambda(i) \in U_i$  gilt. Für endlich viele Indizes können diese Bedingungen gleichzeitig erfüllt werden, also existiert  $\lambda$  mit  $f_\lambda \in W$ .

Somit ist  $f$  Häufungspunkt von  $(f_\lambda)$ . Da jedes Netz einen Häufungspunkt besitzt, ist  $X$  kompakt.



### Definition 7.0.3: Durchmesser, Totalbeschränkt

Sei  $\langle X, d \rangle$  ein metrischer Raum.  $Y \subseteq X$  sei eine Teilmenge.

- Wir definieren  $\delta(Y) := \text{diam}(Y) := \sup\{d(x, y) : x, y \in Y\} \in [0, \infty]$  als den *Durchmesser* von  $Y$ .
- Der Raum  $(X, d)$  heißt *totalbeschränkt*, wenn für jedes  $\varepsilon > 0$  eine endliche Überdeckung von  $X$  durch Mengen mit Durchmesser kleiner als  $\varepsilon$  existiert. Also  $\forall \varepsilon > 0 \exists M_1, \dots, M_n \subseteq X$  mit

$$\bigcup_{i=1}^n M_i \supseteq Y \quad \forall i : \text{diam}(M_i) < \varepsilon$$

### Lemma 7.0.4

- (i) Sei  $Y$  Totalbeschränkt dann ist  $Y$  beschränkt.



(ii) Sei  $Y$  Totalbeschränkt  $\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \exists x_1, \dots, x_n \in Y$  so dass

$$Y \subseteq \bigcup_{i=1}^n U_\epsilon(x_i, \epsilon)$$

*Proof.* Lemma 7.0.3:

(i)  $Y = \emptyset$  ✓

$Y \neq \emptyset$  Sei  $y \in Y$  beliebig Wähle  $M_{x_1}, \dots, M_{x_n} \subset X$ ,

$$\bigcup_{k=1}^n M_{x_k} \supset Y \quad \text{und} \quad \delta(M_{x_k}) < 1.$$

O.B.d.A. sei  $M_l \neq \emptyset \forall l$  Wähle  $y_l \in M_l$ .

Wähle  $l_0 : y \in M_{l_0}$  und  $\tilde{l}_0 : x \in M_{\tilde{l}_0}$ .

Sei  $x \in Y$  mit

$$d(x, y) \leq \underbrace{d(x, y_{\tilde{l}_0})}_{<1} + \underbrace{d(y_{\tilde{l}_0}, y_{l_0})}_{\leq \max_{i,j} d(y_i, y_j)} + \underbrace{d(y_{l_0}, y)}_{<1}.$$

<sup>1</sup> Definiere  $R := 2 + \max_{i,j} d(y_i, y_j)$  damit ist  $Y \subseteq U_R(y)$  also beschränkt.

(ii) Um den teil zu beweisen zeigen wir das

$$\bigcup_{i=1}^n M_i \supseteq Y \forall i : \text{diam}(M_i) < \epsilon \Leftrightarrow \exists x_1, \dots, x_n \in Y : Y \subseteq \bigcup_{i=1}^n U_\epsilon(x_i, \epsilon)$$

– ” $\Rightarrow$ ”:

– Sei  $\epsilon > 0$ . Wähle  $M_1, \dots, M_m$  mit

$$\bigcup_{k=1}^m M_k \supseteq Y, \quad \delta(M_k) < \epsilon.$$

o.B.d.A. sei  $M_k \neq \emptyset$ . Wähle  $y_k \in M_k \Rightarrow M_k \subset U_{\frac{\epsilon}{2}}(y_k) \subset U_\epsilon(y_k)$ .

Daraus folgt:

$$Y \subset \bigcup_k M_k \subset \bigcup_k U_\epsilon(y_k).$$

– ” $\Leftarrow$ ”:

– Sei  $\epsilon > 0$  wähle  $y \supseteq \bigcup_{k=1}^m U_{\epsilon/3}(x_k)$ . Dann ist  $\delta(U_{\epsilon/3}(x_k)) \leq \frac{2}{3}\epsilon < \epsilon$ .



### Satz 7.0.5

Für eine Teilmenge  $K$  eines metrischen Raumes  $\langle X, d \rangle$  sind folgende Aussagen äquivalent:

- (i)  $K$  ist kompakt in  $\langle X, \mathcal{T}_d \rangle$ . Wobei  $\mathcal{T}_d$  die von  $d$  induzierte Topologie ist.
- (ii) Jede Folge in  $K$  hat eine gegen einen Punkt in  $K$  konvergente Teilfolge.
- (iii)  $K$  ist total beschränkt, und  $\langle K, d|_{K \times K} \rangle$  ist ein vollständig metrischer Raum.

<sup>1</sup>  $\max_{i,j} \{d(y_i, y_j) \mid i, j \in \{1, \dots, n\}\}$

*Proof.* Satz 7.0.4:

(i)  $\Rightarrow$  (ii) Betrachte  $\langle K, \mathcal{T}_d|_K \rangle$  und eine Folge  $\alpha : \mathbb{N} \rightarrow K$ .

Wähle eine gerichtete Menge  $I$  und die Abbildung  $\kappa : I \rightarrow \mathbb{N}$ , so dass  $\alpha \circ \kappa : I \rightarrow K$  ein Teilnetz in  $K$  ist.

Mit  $\lim_{i \in I} (\alpha \circ \kappa)(i) =: y \in K$  existiert. (dh.  $\forall n \in \mathbb{N} \exists i_0 \in I \forall i \geq i_0 : \kappa(i) \geq n$ )

Damit gibt es Umgebungen von  $y$  der Form  $\{U_{1/n}(y) : n \in \mathbb{N}\}$

Wir definieren rekursiv die Folge

$$(n_k)_{k=1}^\infty \text{ mit } n_k \in \mathbb{N} : n_1 < n_2 < \dots \forall k : \alpha(n_k) \in U_{1/k}(y).$$

$k=1$ : Wähle  $i_1 \in I : \forall i \geq i_1 : d((\alpha \circ \kappa)(i), y) \in U_1(y)$  Wähle  $n_1 := \kappa(i_1)$

$k \rightarrow k+1$ : Angenommen wir haben  $n_1 < n_2 < \dots < n_k$  konstruiert.

Wähle  $i_{\bar{k}} \in I : \forall i \geq i_{\bar{k}} : \kappa(i) > n_k + 1$  und  $i \in I : i \geq i_{\bar{k}}$  so dass  $i \geq i_{\bar{k}}$

$\Rightarrow n_{k+1} \geq n_k + 1$  und damit  $\alpha(n_{k+1}) \in U_{\frac{1}{k+1}}(y)$

Sei nun  $\varepsilon > 0$  wähle  $k_0$  so, dass  $\frac{1}{n_{k_0}} < \varepsilon$ .

Damit gilt für alle  $k \geq k_0$ :

$$\alpha(n_k) \in U_{\frac{1}{k}}(y) \subseteq U_{\frac{1}{k_0}}(y) \subseteq U_\varepsilon(y).$$

Also folgt:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \alpha(n_k) = y.$$

(ii)  $\Rightarrow$  (iii) Diese Implikation zeigen wir mit dem Kontrapositiv:  $\neg(iii) \Rightarrow \neg(ii)$

Sei  $\langle Y, d|_{Y \times Y} \rangle$  nicht vollständig. Wähle eine Cauchyfolge  $(x_n)_{n=1}^\infty$  in  $Y$  die nicht konvergiert.  $\Rightarrow (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  hat keine konvergente Teilfolge.  $\ominus$

#### Note:-

$\ominus$  Da  $Y$  totalbeschränkt ist, gibt es für  $\varepsilon = 1$  eine endliche Überdeckung von  $Y$  durch Mengen mit Durchmesser kleiner als 1. Also gibt es  $M_1, \dots, M_k \subset Y$  mit

$$\bigcup_{i=1}^k M_i \supseteq Y, \quad \forall i : \text{diam}(M_i) < 1.$$

Da unendlich viele Folgenglieder in  $Y$  liegen, gibt es ein  $M_{i_1}$  das unendlich viele Folgenglieder enthält. Wähle daraus eine Teilfolge  $(x_n^{(1)})_{n=1}^\infty$ . Induktiv wählen wir nun für  $m \geq 1$  eine Teilfolge  $(x_n^{(m)})_{n=1}^\infty$  von  $(x_n^{(m-1)})_{n=1}^\infty$  und eine Menge  $M_{i_m}$  so dass unendlich viele Folgenglieder von  $(x_n^{(m)})_{n=1}^\infty$  in  $M_{i_m}$  liegen. Wähle nun  $y_m := x_{n_m}^{(m)}$  für  $m \in \mathbb{N}$ . Dann ist  $(y_m)_{m=1}^\infty$  eine Teilfolge von  $(x_n)_{n=1}^\infty$  so dass für alle  $m, n \in \mathbb{N}$  gilt:

$$d(y_m, y_n) < 1.$$

Widerspruch zur Wahl von  $(x_n)_{n=1}^\infty$  als Cauchyfolge.



#### Lemma 7.0.6

Sei  $\langle X, d \rangle$  ein metrischer Raum  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  eine Cauchyfolge in  $X$  und  $(x_{n_n})$  eine Teilfolge von  $(x_n)$ . mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n_n} = x$ .

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x.$$

*Proof.* Lemma 7.0.5:

Sei  $\varepsilon > 0$  beliebig. Wähle  $N_1$ , sodass für alle  $n, m \geq N_1$  gilt:

$$d(x_n, x_m) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Wähle  $k_0$ , sodass für alle  $n \geq k_0$  gilt:

$$d(x_{n_1}, x) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Mit  $n_1 < n_2 < \dots$  Wähle  $k_1$ , sodass für alle  $k \geq k_1$  gilt:  $n_k \geq N_1$  Sei  $k \geq \max\{k_0, k_1\}$  und  $n \geq N_1$ . Dann folgt:

$$d(x_k, x) \leq d(x_n, x_{n_1}) + d(x_{n_1}, x) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$



# Lecture 8

In der letzten haben wir begonnen Satz 7.0.4 zu beweisen. Uns fehlt noch die Richtung (ii)  $\Rightarrow$  (i). Um die zu zeigen benötigen wir noch ein Lemma.

## Lemma 8.0.1

Seien  $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$  endliche und nicht leere Mengen in  $X$ . Und sei

$$f : \bigcup_{n \geq 1} V_n \rightarrow \bigcup_{n \geq 0} V_n$$

eine Abbildung. Wobei  $\forall n \geq 1 : f(V_n) \subseteq f(V_n) \subseteq V_{n+1}$ .

Dann gibt es eine Folge  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  mit

$$\forall n \in \mathbb{N} : x_n \in V_n \text{ und } \forall n \geq 1 : f(x_n) = x_{n+1}.$$

*Proof.* Lemma 8.0.1:

Sei

$$M := \{(x_0, \dots, x_n) \mid N \in \mathbb{N}, \quad (\forall n \in \{1, \dots, N\} : x_n \in V_n) \text{ und } (\forall n \in \{1, \dots, N\} : f(x_n) = x_{n+1})\}$$

Sei weiters  $x_n \in V_n$  beliebig.

Dann gilt  $(f^{(N)}(x_N), \dots, f \circ f(x_N), f(x_N), x_N) \in M$ .

$$\text{Definiere } g : \begin{cases} \bigcup_{n \geq 0} V_n \rightarrow M \\ x \mapsto (f^{(N)}(x), \dots, f \circ f(x), f(x), x) \end{cases} \text{ Wähle } N \text{ so dass für } x \in V_N$$

Da  $g$  injektiv ist, ist  $M$  unendlich.

Wähle  $z_0 \in V_0, \dots, z_n \in V_n$  so dass  $M_{z_0, \dots, z_n} := \{(x_0, \dots, x_k) \in M \mid N \geq n \text{ und } \forall k \in \{0, \dots, n\} : x_k = z_k\}$

Definiere die Rekursive Folge  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  so dass  $\forall n \in \mathbb{N} : z_n \in V_n$  und  $M_{z_0, \dots, z_n}$  ist unendlich.

$n=0$ :  $V_n$  endlich  $M$  unendlich ist.  $M = \bigcup_{x \in V_0} M_{x_0} \Rightarrow \exists z_0 \in V_0 : M_{z_0}$  unendlich.

$n \rightarrow n+1$ : Angenommen wir haben  $z_0, \dots, z_n$  konstruiert.

$$\underbrace{M_{z_0, \dots, z_{n+1}}}_{\text{unendlich}} = \bigcup_{x \in V_{n+1}} M_{z_0, \dots, z_n, x} \\ \Rightarrow \exists z_{n+1} \in V_{n+1} : M_{z_0, \dots, z_{n+1}}$$

unendlich.

$\forall n \in \mathbb{N} \exists (x_0, \dots, x_n) \in M_{z_0, \dots, z_n}$  Damit gilt per Konstruktion:  $(x_0, \dots, x_N) \in M, N \geq n, x_0 = z_0, \dots, x_n = z_n$  für alle  $k \in \{1, \dots, N\} : f(x_k) = x_{k+1} \Rightarrow \underbrace{f(x_n)}_{z_n} = \underbrace{x_{n+1}}_{z_{n+1}}$ .



**Note:-**

**Satz 7.0.4:**

- (i)  $K$  ist kompakt in  $\langle X, \mathcal{T}_d \rangle$ . Wobei  $\mathcal{T}_d$  die von  $d$  induzierte Topologie ist.
- (ii) Jede Folge in  $K$  hat eine gegen einen Punkt in  $K$  konvergente Teilfolge.
- (iii)  $K$  ist total beschränkt, und  $\langle K, d|_{K \times K} \rangle$  ist ein vollständig metrischer Raum.

*Proof.* (iii)  $\Rightarrow$  (i) Satz 7.0.5:

(1) Wir konstruieren rekursiv eine Folge  $(Q_n)_{n=1}^\infty$  von Funktionen mit

- (i)  $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1; \forall A \in Q_n : \delta(A) \leq \frac{1}{n}$  (wobei  $\delta(A)$  der Durchmesser von  $A$  ist).
- (ii)  $\forall n \geq 1 \forall A \in Q_{n+1} \exists! B \in Q_n : A \subseteq B$

$n=1$ : Wähle  $M_1, \dots, M_n$  so dass  $K \subseteq \bigcup_{i=1}^n M_i$  und  $\forall i \delta(M_i) \leq 1$ . Wir definieren  $A_m := (M_m \cap K) \setminus \bigcup_{i=1}^{m-1} (M_i \cap K)$ .

$$\begin{aligned} & \Rightarrow \bigcup_{m=1}^n A_m \\ & = \bigcup_{m=1}^n (M_m \cap K) = \left( \bigcup_{m=1}^n M_m \right) \cap K = K \end{aligned}$$

$$\forall m \neq m' : A_m \cap A_{m'} = \emptyset$$

$$\text{Setze } Q_1 := \{A_1, \dots, A_n\}.$$

$n \rightarrow n+1$ : Angenommen wir haben  $Q_1, \dots, Q_n$  konstruiert.

Wähle  $M_1, \dots, M_k$  so dass  $K \subseteq \bigcup_{i=1}^k M_i$  und  $\forall i : \delta(M_i) \leq \frac{1}{n+1}$ . Setze

$$A_m := (M_m \cap K) \setminus \bigcup_{i=1}^{m-1} (M_i \cap K).$$

Dann gilt wieder:

$$\{A_1, \dots, A_N\}$$

Sind Partitionen von  $K$

Definiere  $Q_{n+1} := \{B \cap A_i \mid B \in Q_n, i = 1, \dots, N\}$ . Partition von  $K$

**Note:-**

**Begründung: Paarweise disjunkt und Vereinigung ergibt  $K$**

– **Paarweise disjunkt:**

$$B \cap A_i, \quad B' \cap A_j$$

sind disjunkt, falls entweder  $i \neq j$  (da  $A_i \cap A_j = \emptyset$ ) oder  $B \neq B'$  (da  $B \cap B' = \emptyset$ ).

– **Vereinigung ergibt  $K$ :**

$$\begin{aligned} & \bigcup_{B \in Q_n} \bigcup_{i=1}^N (B \cap A_i) = \bigcup_{i=1}^N \bigcup_{B \in Q_n} (B \cap A_i) \\ & = \bigcup_{i=1}^N (A_i \cap \underbrace{\bigcup_{B \in Q_n} B}_{=K}) = \bigcup_{i=1}^N A_i = K. \end{aligned}$$

Definiere  $f : \dot{\bigcup}_{n \geq 2} \rightarrow \dot{\bigcup}_{n \geq 1} Q_n$  Sei  $A \in Q_n$ , Sei  $n \geq 2$ . So dass  $A \in Q_n$  Sei  $B \in Q_{n-1}$  mit  $B \subseteq A$ . Dann ist  $f(A) := B$ .

(2) Sei



### Definition 8.0.2: Relativ Kompakt

Eine Teilmenge  $A$  eines topologischen Raumes heißt **relativ kompakt**, wenn der Abschluss  $\overline{A}$  von  $A$  kompakt ist. Wir definieren  $A_m := (M_m \cap K) \setminus \bigcup_{i=1}^{m-1} (M_i \cap K)$ .