1. Objetivo:

Promover formação de barreira contra a invasão de microrganismos no sítio cirúrgico e proteger os profissionais envolvidos no ato cirúrgico contra fluídos corpóreos. Executar cuidados conforme Protocolo de Cirurgia Segura.

2. Definição do Procedimento:

Procedimentos específicos e padronizados realizados pela equipe cirúrgica na preparação para o ato cirúrgico.

3. Responsável:

Equipe médica, Enfermagem e instrumentadores no Centro Cirúrgico.

4. Materiais necessários:

- Roupa privativa do Centro Cirúrgico;
- Gorro;
- Propés;
- Máscara;
- Avental Cirúrgico (de tecido ou descartável);
- Compressas estéreis;
- Luvas estéreis;

5. Procedimento:

1. Vestir a roupa privativa do bloco, propés, gorro e máscara ao entrar no Centro Cirúrgico;

2. Antes de realizar a degermação das mãos, coloque a máscara;

3. Realizar a degermação cirúrgica das mãos na pia mais próxima a Sala de Cirurgia;

4. Entrar na sala operatória com os membros superiores fletidos para cima, sem encostá-los em áreas não estéreis e de costas;

5. Seguir até a disposição de compressas em campos cirúrgicos abertos ou solicitar compressas estéreis ao circulante de sala e aguardar sua abertura;

6. Retirar a compressa acondicionada sobre o campo cirúrgico e realizar a secagem das mãos, iniciando pelos dedos, unhas, espaços interdigitais, punho e por último o antebraço e, com movimentos compressivos;

7. Pegar o avental cirúrgico no campo cirúrgico pela parte interna, pelas dobras do decote e abri-lo com movimentos delicados e firmes, ficando em frente à posição certa para ser vestida. Não encostar a parte externa do avental em nenhuma área não estéril;

8. Segurar o avental com ambas as mãos e vestir ao mesmo tempo nas respectivas mangas, enquanto o circulante de sala traciona-o para trás, segurando pelo lado interno, e amarra os cordões posteriores;

9. Solicitar luvas estéreis;

10. Calçar as luvas estéreis;

11. Soltar os cordões laterais e vire em torno de si mesmo a fim de que o avental encubra toda a parte posterior do corpo. Peça para um colega já paramentado amarrar os cordões laterais ou fazê-lo sozinho conforme orientações;

12. Iniciar o procedimento sem encostar-se às superfícies do ambiente e pessoas.

Periodicidade: Deverá ser realizado antes do ato cirúrgico e sempre que necessário.

Observação: Em caso de contaminação da roupa cirúrgica, ela deverá ser trocada por outra estéril, repetindo o procedimento

Controle de revisões			
Rev.	**Data**	**Revisão efetuada**	**Responsável**
00	27/04/2026	Emissão inicial	Lana Carolina

Elaboração	*Análise Crítica e Aprovação*
Nome: Lana Carolina **Data:** 27/04/2026	**Nome:** Dr Ary Leite **Data:**