1. Objetivo:

Proporcionar a absorção mais rápida do medicamento do que pela via oral; administrar medicamentos irritantes ao trato digestivo ou ao tecido subcutâneo.

2. Responsável:

Equipe de enfermagem.

3. Material Necessário:

- Bandeja, rótulo de identificação;
- Luvas de procedimento;
- Seringa;
- Agulha 25 x 7 ou 30 x 8;
- Medicamento prescrito;
- Gaze estéril;
- Algodão;
- Clorexidina alcoólica ou álcool 70%.

4. Descrição da Atividade:

- Realizar a higienização das mãos;
- Conferir os certos: paciente certo, medicamento certo, dose certa, hora certa, via certa, registro certo, diluição certa s/n, riscos aos profissionais e riscos aos pacientes;

- Certificar-se sobre a possibilidade de alergia de material, medicamento ou produto;
- Fazer e colocar o rótulo de identificação do medicamento com: nome, dose, horário, via de administração e paciente;
- Realizar a higienização das mãos;

- Separar o material necessário;
- Fazer o rótulo de identificação do medicamento: nome, dose, horário, via de administração e paciente;
- Realizar a desinfecção da bandeja com álcool 70%;
- Fazer a desinfecção no frasco ou ampola com algodão umedecido em clorexidina alcoólica ou álcool 70%;
- Fazer a reconstituição com o líquido recomendado, s/n;
- Aspirar o conteúdo do frasco;
- •Trocar agulha (25 x 7 ou 30 x 8);
- •Retirar o ar da seringa;
- •Colocar o rótulo de identificação do medicamento na seringa.
- •Reunir o material a ser colocado na bandeja;
- •Levar a bandeja até a unidade do paciente e colocá-la na mesa de cabeceira;
- •Informar e explicar o procedimento ao paciente;
- Conferir os rótulos com os dados do paciente;
- Realizar a higienização das mãos;
- Posicionar o paciente de forma adequada ao procedimento;
- Calçar as luvas de procedimento;
- Expor a área de aplicação e definir o local de administração;
- Palpar o músculo (medicação local);
- Fazer a antissepsia do local;

- Pinçar com os dedos a pele ao redor do local de administração;
- Inserir a agulha da injeção em um ângulo de 90º em relação ao músculo;
- Aspirar lentamente o êmbolo da seringa e certifica-se de que não atingiu nenhum vaso sanguíneo;
- Injetar lentamente o conteúdo da seringa;
- Retirar a agulha e a seringa em um movimento rápido;
- Aplicar leve compressão ao local com gaze;
- Recolher o material utilizado, deixando a unidade do paciente em ordem;
- Desprezar os resíduos;
- Descartar o material pérfuro cortante em local apropriado;
- Retirar a luva de procedimento;
- Lavar a bandeja com água e sabão, secar com papel toalha e realizar a desinfecção com álcool 70%;
- Realizar a higienização das mãos;
- Checar o horário de administração do medicamento na prescrição médica;
- Fazer anotação de enfermagem, se houver intercorrências notificar;
- Checar o medicamento após a sua administração e se não foi administrado circular o horário e anotar o motivo;
- Se o medicamento for dado fora do horário prescrito, checar o novo horário de administração e anotar o motivo;
- Registrar qualquer tipo de reação que o paciente possa ter após receber a medicação e comunicar o enfermeiro responsável e/ou médico;
- Realizar rodízio nos locais de aplicação;
- Não reencapar a agulha;
- Higienizar as mãos;
- Realizar registro no prontuário, carimbar e assinar;

- Fazer anotação de enfermagem se houver intercorrências.

Músculos indicados para a administração e volume permitido em adultos são:

Região Vasto lateral da coxa: até 3 ml.

Região Dorso Glútea - Quadrante Superior Externo: até 4 ml.

Região Ventro Glútea: até 5 ml.

Região Deltóide: até 2 ml.

Controle de revisões			
Rev.	**Data**	**Revisão efetuada**	**Responsável**
00	27/04/2026	Emissão inicial	Lana Carolina

Elaboração	*Análise Crítica e Aprovação*
Nome: Lana Carolina **Data:** 27/04/2026	**Nome:** Dr Ary Leite **Data:**