

Karolinska sväljbedömning 2018

Patient:

Personnr:

Undersökt av:

Datum:

Del 1. Funktion

1. Anatomi, funktion och sensorik

Poängsumma
/ antal utförda
uppgifter

Medel
värde

Del 2. Sväljning

2a. Sväljtest

Tunnflytande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tunnflytande, kolsyra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lätt trögflytande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Extremt trögflytande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lättuggad konsistens	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fast konsistens	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


2b. Tecken på dysfagi/aspiration

☐ Resultat på KIS2018 indikerar att instrumentell bedömning behövs

Bedömning:

Sammanfattande figur

Dysfagipoäng:



Grad av dysfagi:

- ☐ normal
- ☐ lätt dysfagi
- ☐ måttlig dysfagi
- ☐ grav dysfagi

Rekommendationer:

Konsistensanpassning:

Terapeutisk manöver:

Anamnes

Tidigare/nuvarande sjukdomar:

Mediciner:

Allergier/restriktioner:

Syn:

Hörsel:

Viktninskning:

Nuv. nutrition:

Position vid måltid:

Ja

Nej

☐ Rökning

☐ Trachealkanyl

☐ Intubation (>1vecka)

☐ Pneumonier

Övrigt:

Aktuella besvär: *(T.ex. Vilken typ av föda är svår? Undvikande av mat?)*

Snabbsvar:

☐ Tidskrävande måltider

☐ Hosta under måltid

☐ Andningspåverkan

☐ Smakförändringar

☐ Sura uppstötningar

☐ Inskränkt livskvalité

Beteende & kommunikation

Kommentar:

Vakenhet	<input type="checkbox"/> Ua	<input type="checkbox"/> Nedsatt	
Medverkan	<input type="checkbox"/> Ua	<input type="checkbox"/> Nedsatt	<input type="checkbox"/> Uttröttbar
Kognition	<input type="checkbox"/> Ua	<input type="checkbox"/> Nedsatt	
Afasi	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
Dysartri	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
Oral apraxi	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	

Del 1. Anatomi, funktion & sensorik

0= normal
1= lätt avvikande
2= måttligt avvikande
3= gravt avvikande

Orofacial funktion

Kommentar:

1.	Truta resp. le (VII)	0	1	2	3	
2.	Växlevis truta-le (VII)	0	1	2	3	
3.	Blåsa upp kinder (VII)	0	1	2	3	
4.	Räck ut tungan (XII)	0	1	2	3	<input type="checkbox"/> Deviation höger/vänster
5.	Tungan hö resp. vä mungipa (XII)	0	1	2	3	
6.	Tungväxling hö-vä (XII)	0	1	2	3	
7.	Slicka runt munnen (XII)	0	1	2	3	
8.	Tungstyrka hö resp. vä (XII)	0	1	2	3	
9.	Käköppning (V)	0	1	2	3	
10.	Velar höjning /æ/ (IX)	0	1	2	3	<input type="checkbox"/> Ridåtecken
11.	Oral sensorik (tunga, insida/utsida kinder) (V)	0	1	3		

Röst och andning

Fonationstid vid maximalt uthållet /a/ ____ sek

12.	Röstkvalitet (vid spontant och uthållen fonation)	0	1	2	3	<input type="checkbox"/> Afonisk	<input type="checkbox"/> Läckande/hes	<input type="checkbox"/> Gurglig
13.	Andning	0	1	2	3	<input type="checkbox"/> Höghäufig	<input type="checkbox"/> Rossig	<input type="checkbox"/> Stridor

Laryngeal funktion

14.	Viljemässig hosta (X)	0	1	2	3	
15.	Viljemässig harkling (X)	0	1	2	3	

Totalpoäng
Antal uppgifter

Munhåla, svalg

Tunga

- ☐ Ua
- ☐ Sår
- ☐ Beläggning
- ☐ Atrofi höger/vänster

Oral slemhinna

- ☐ Ua
- ☐ Sår
- ☐ Beläggning
- ☐ Torr
- ☐ Irriterad

Tänder

- ☐ Ua
- ☐ Plack
- ☐ Nedsatt tandstatus
- ☐ Protes
- ☐ Luckor

Övrigt

- ☐ Dregling
- ☐ Matrester
- ☐ Oral candida

Övrigt:

DEL 2. Sväljning

Bedömningen utförd med:

- ☐ Cervical auskultation
- ☐ Pulsoximeter

0= normal

1= lätt avvikande

2= måttligt avvikande

3= gravt avvikande

2a. Sväljtest

Tunnflytande, tex. vatten (IDDSI-nivå 0)

Antal
sväljningar

Tsk		0	1	2	3
Dsk		0	1	2	3
Klunk		0	1	2	3

Summa

Antal uppgifter

Lätt trögflytande, tex. Ekströms nyponsoppa (IDDSI-nivå 2)

Antal
sväljningar

Läpp-till-lyft ½ tsk		____ sek			
Tsk		0	1	2	3
Dsk		0	1	2	3
Klunk		0	1	2	3

Summa

Antal uppgifter

Lättuggad konsistens, tex. banan (IDDSI-nivå 6)

Antal
sväljningar

Bit stor som tsk		0	1	2	3
Fri tugga		0	1	2	3

Summa

Antal uppgifter

Tunnflytande kolsyrat, tex. vatten

Antal
sväljningar

Tsk		0	1	2	3
Dsk		0	1	2	3
Klunk		0	1	2	3

Summa

Antal uppgifter

Extremt trögflytande, tex. Ekströms aprikoskräm (IDDSI-nivå 4)

Antal
sväljningar

Tsk		0	1	2	3
Dsk		0	1	2	3
Msk		0	1	2	3

Summa

Antal uppgifter

Fast konsistens, tex. kex (IDDSI-nivå 7)

Antal
sväljningar

Bit stor som tsk		0	1	2	3
Fri tugga		0	1	2	3

Summa

Antal uppgifter

Totalpoäng

Antal uppgifter
(max=16)

2b. Tecken på dysfagi/aspiration

Oral fas	1.	Läppslutning	0	1	2	3	
	2.	Oral retention	0	1	2	3	
	3.	Tuggmönster	0	1	2	3	<input type="checkbox"/> ineffektiv avbitning
	4.	Oral bolustransport	0	1	2	3	
Faryngeal fas	5.	Röstpåverkan	0	1	2	3	<input type="checkbox"/> gurglig
	6.	Andning	0	1	2	3	<input type="checkbox"/> rosslig <input type="checkbox"/> ansträngd <input type="checkbox"/> nedsatt saturation
	7.	Andningsmönster	0	1	2	3	<input type="checkbox"/> andfädd <input type="checkbox"/> okoordinerad <input type="checkbox"/> inspiratoriska tics
	8.	Hosta/harkling	0	1	2	3	<input type="checkbox"/> hosta/harkling <input type="checkbox"/> ineffektiv hosta <input type="checkbox"/> ingen hosta vid misstänkt aspiration
	9.	Larynxhöjning	0	1	2	3	<input type="checkbox"/> långsam initiering <input type="checkbox"/> ofullständig
	10.	Multipla sväljningar	0	1	3		

Totalpoäng

Antal uppgifter