# 令和 6 年度 修士学位論文

論文用テンプレート

- ○○所属
- ○○課程○○専攻
  - ○○分野

指導教員 〇〇 〇〇教授

令和〇年入学

学籍番号 82313206 氏名 八木颯仁

## 目次

第1章	緒言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 1
第2章	Introduction · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• 2
2.1	セクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 2
第3章	Torsions	• 7
3.1	セクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 7
第4章	Reductions · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4.1	$E_{0,s}^{(1+3s)}$	• 8
第5章	本論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 9
5.1	セクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 9
5.1.1	サブセクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 9
参考文献		• 10

# 第1章 緒言

ここに諸元を書く [1]

## 第2章 Introduction

#### 2.1 セクション

**Theorem 2.1.1.** (Shioda-Tate formula, [2] Theorem 3.4)

$$\rho(S) = 2 + \sum_{v \in R} (m_v - 1) + \text{rank}(E(K))$$
(2.1)

である.

Theorem 2.1.2.

$$E_{1.s}: y^2 = x(x - 4s^2)(x + (s^2 - 1)^2)$$
(2.2)

の $\overline{\mathbb{Q}}(s)$ 上のランクは0である.

証明

$$\Delta_{E_{1,s}} = 256s^4(s+1)^4(s-1)^4(s^2+1)^4 \tag{2.3}$$

Table 2.1 Singular fibers of  $E_{1,s}$ 

Place	Туре	$m_v$
s = 0	$I_4$	4
$s = \pm 1$	$I_4$	4
$s = \pm i$	$I_4$	4
$s = \infty$	$I_4$	4

$$e(\mathcal{E}_{1,s}) = 24 \tag{2.4}$$

したがって  $\mathcal{E}_{1,s}$  は K3 曲面であり.  $\rho(\mathcal{E}_{1,s}) \leq 20$  である. Theorem 2.1.1 より

$$\operatorname{rank}(E_{1,s}) = 0 \tag{2.5}$$

**Theorem 2.1.3.** 

$$E_{4,t}: y^2 = x(x - 4s^2)(x + (s^2 - 1)^2), s = \frac{2t}{t^2 - 3}$$
 (2.6)

は

$$\left(s^2 - 1, \sqrt{-1}s(s^2 - 1)\frac{t^2 + 3}{t^2 - 3}\right) \tag{2.7}$$

を通る.

$$1 \le \operatorname{rank} E_{4,t}(\overline{\mathbb{Q}}(t)) \le 2 \tag{2.8}$$

証明

$$\Delta_{E_{4,t}} = 4096t^4(t-1)^4(t+1)^4(t-3)^4(t+3)^4(t^2-3)^4(t^4-2t^2+9)^4$$
 (2.9)

Table 2.2 Singular fibers of  $E_{4,t}$ 

Place	Туре	$m_v$
t = 0	$I_4$	4
$t = \pm 1$	$I_4$	4
$t = \pm 3$	$I_4$	4
$t = \pm \sqrt{3}$	$I_4$	4
$t^4 - 2t^2 + 9 = 0$	$I_4$	4
$t = \infty$	$I_4$	4

$$e(\mathcal{E}_{4,t}) = 48\tag{2.10}$$

TODO:  $\rho(\mathcal{E}_{4,t}) \le 40$  である. Theorem 2.1.1 より

$$\operatorname{rank} E_{4,t}(\overline{\mathbb{Q}}(t)) \le 2 \tag{2.11}$$

上の評価は不十分. 生成元は1つしか見つかっていないので、ランクの上界が1であることを示したい.

**Theorem 2.1.4.** ([2] Proposition 4.1.)

$$\operatorname{rank} E(k(C)) + \operatorname{rank} E^{(u)}(k(C)) = \operatorname{rank} E(k(C)(\sqrt{u}))$$
(2.12)

#### Theorem 2.1.5.

$$E_{4,t}(\overline{\mathbb{Q}}(t)) = E_{1,s}(\overline{\mathbb{Q}}(s)(\sqrt{1+3s^2}))$$
 (2.13)

$$E_{1,s}^{(1+3s^2)}: (1+3s^2)y^2 = x(x-4s^2)(x+(s^2-1)^2)$$
 (2.14)

$$\operatorname{rank} E_{1,s}(\overline{\mathbb{Q}}(s)) + \operatorname{rank} E_{1,s}^{(1+3s^2)}(\overline{\mathbb{Q}}(s)) = \operatorname{rank} E_{4,t}(\overline{\mathbb{Q}}(t))$$
 (2.15)

さらに

$$E_{0,s}: y^2 = x(x-4s)(x+(s-1)^2)$$
 (2.16)

$$E_{0,s}^{(1+3s)}: (1+3s)y^2 = x(x-4s)(x+(s-1)^2)$$
 (2.17)

$$E_{0,s}^{(s(1+3s))}: s(1+3s)y^2 = x(x-4s)(x+(s-1)^2)$$
 (2.18)

$$\operatorname{rank} E_{0,s}^{(1+3s)}(\overline{\mathbb{Q}}(s)) + \operatorname{rank} E_{0,s}^{(s(1+3s))}(\overline{\mathbb{Q}}(s)) = \operatorname{rank} E_{1,s}^{(1+3s^2)}(\overline{\mathbb{Q}}(s))$$
 (2.19)

証明

$$s = \frac{2t}{t^2 - 3} \tag{2.20}$$

をtについて解くと

$$t = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 3s^2}}{s} \tag{2.21}$$

したがって

$$E_{4,t}(\overline{\mathbb{Q}}(t)) = E_{1,s}(\overline{\mathbb{Q}}(s)(\sqrt{1+3s^2}))$$
(2.22)

Theorem 2.1.6. TODO

$$\operatorname{rank} E_{1,s}^{(1+3s^2)}(\overline{\mathbb{Q}}(s)) = ? \tag{2.23}$$

証明

$$\Delta(E_{1,s}^{(1+3s^2)}) = (1+3s^2)^6 \Delta(E_{1,s})$$
 (2.24)

$$e(\mathcal{E}_{1,s}^{(1+3s^2)}) = 36$$
 (2.25)

Theorem 2.1.1 からは

$$\operatorname{rank} E_{1,s}^{(1+3s^2)}(\overline{\mathbb{Q}}(s)) \le 2 \tag{2.26}$$

しか分からない。K3 ですらないので, $H^2$  の次元が分からず, reduction を取る方法でも計算が進められない.

$$\operatorname{rank} E_{1,s}^{(1+3s^2)}(\overline{\mathbb{Q}}(s)) = ?(1or2) \tag{2.27}$$

Table 2.3 Singular fibers of  $E_{1,s}^{(1+3s^2)}$ 

Place	Type	$m_v$
s = 0	$I_4$	4
$s = \pm 1$	$I_4$	4
$s = \pm i$	$I_4$	4
$s = \pm \frac{1}{\sqrt{-3}}$	$I_0^*$	5
$s = \infty$	$I_4$	4

#### Theorem 2.1.7. TODO

 $\operatorname{rank} E_{0,s}^{(1+3s)}(\overline{\mathbb{Q}}(s)) \le 1 \tag{2.28}$ 

証明

$$\Delta(E_{0,s}^{(1+3s)}) = 256s^2(s-1)^4(s+1)^4(3s+1)^6$$
 (2.29)

Table 2.4 Singular fibers of  $E_{0,s}^{(1+3s)}$ 

Place	Туре	$m_v$
s = 0	$I_2$	2
$s = \pm 1$	$I_4$	4
$s = -\frac{1}{3}$	$I_0^*$	5
$s = \infty$	$I_2^*$	7

$$e(\mathcal{E}_{0,s}^{(1+3s)}) = 24$$
 (2.30)

Theorem 2.1.1 からは

$$\operatorname{rank} E_{0,s}^{(1+3s)}(\overline{\mathbb{Q}}(s)) \le 1 \tag{2.31}$$

Theorem 2.1.8. TODO

$$\operatorname{rank} E_{0,s}^{(s(1+3s))}(\overline{\mathbb{Q}}(s)) \le 1 \tag{2.32}$$

証明

$$\Delta(E_{0,s}^{(s(1+3s))}) = 256s^8(s-1)^4(s+1)^4(3s+1)^6$$
(2.33)

Table 2.5 Singular fibers of  $E_{0,s}^{(s(1+3s))}$ 

Place	Туре	$m_v$
s = 0	$I_2^*$	7
$s = \pm 1$	$I_4$	4
$s = -\frac{1}{3}$	$I_0^*$	5
$s = \infty$	$I_2$	2

上と同様に

$$\operatorname{rank} E_{0,s}^{(s(1+3s))}(\overline{\mathbb{Q}}(s)) \le 1 \tag{2.34}$$

## 第3章 Torsions

#### 3.1 セクション

**Theorem 3.1.1.** 

$$E_{4,t}(\overline{\mathbb{Q}}(t))_{\text{tors}} = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$
(3.1)

$$T_1 = (2s(s+1)^2, 2s(s+1)^2(s^2+1))$$
 (3.2)

$$T_2 = (2is(s^2 - 1), 2is(s + i)^2(s^2 - 1))$$
(3.3)

で生成される.

証明

$$E_{4,t}(\overline{\mathbb{Q}}(t))[2] = E_{1,s}(\overline{\mathbb{Q}}(s))[2] = \{O, (0,0), (4s^2, 0), (-(s^2 - 1)^2, 0)\}$$
(3.4)

$$2T_1 = (4s^2, 0) (3.5)$$

$$2T_2 = (0,0) (3.6)$$

[2] の Lem.3.5 より

$$E_{4,t}(\overline{\mathbb{Q}}(t))_{\text{tors}} \hookrightarrow (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^{12}$$
 (3.7)

なので位数8の点は存在しない.

Remark 3.1.2. これは

$$E_{1,s}(\mathbb{Q}(s))_{\text{tors}} = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$
(3.8)

の別証明になっている.

## 第4章 Reductions

4.1 
$$E_{0,s}^{(1+3s)}$$

K3 なので

$$\dim_{\mathbb{Q}_l} H^2_{\text{\'et}}(\tilde{S}, \mathbb{Q}_l) = 22 \tag{4.1}$$

である. Let V be the subspace of  $NS(\tilde{S})$  generated by the singular fibers and the zero section. Then V is of rank 19, on which the Frobenius automorphism acts by multiplication by p.

## 第5章 本論

#### 5.1 セクション

ここに本論を書く[3][4][5]. Fig. 5.1 と Eq. 5.1 はに示すように, hoge である.

#### 5.1.1 サブセクション

# Dummy Image

Fig. 5.1 caption

#### 5.1.1.1 サブサブセクション

色は匂へど散りぬるを 我が世誰ぞ常ならむ 有為の奥山今日越えて 浅き夢見じ酔ひもせず A quick brown fox jumps over the lazy dog.

$$\left(\int_0^\infty \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx\right)^2 = \sum_{k=0}^\infty \frac{(2k)!}{2^{2k} (k!)^2} \frac{1}{2k+1} = \prod_{k=1}^\infty \frac{4k^2}{4k^2 - 1} = \frac{\pi}{2}$$
 (5.1)

### 参考文献

- [1] V. Mnih, K. Kavukcuoglu, D. Silver, A. Graves, I. Antonoglou, D. Wierstra, and M. Riedmiller. Playing atari with deep reinforcement learning. arXiv preprint arXiv:1312.5602, (2013).
- [2] B. Naskręcki. Mordell-Weil ranks of families of elliptic curves associated to Pythagorean triples. eng. Acta Arithmetica 160.2, pp. 159–183, (2013). URL: http://eudml.org/doc/279803.
- [3] L. Yao, Y.-W. A. Wu, L. Yao, and Z. Z. Liao. An integrated IMU and UWB sensor based indoor positioning system. 2017 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN). IEEE. 2017, pp. 1–8.
- [4] D. Ugarte. Curling and closure of graphitic networks under electron-beam irradiation. Nature 359.6397, pp. 707–709, (1992).
- [5] 野村篤史, 須ヶ崎聖人, 坪内孝太, 西尾信彦, 下坂正倫, et al. UWB の測定距離と直接波の減衰度を利用したデバイスフリー複数人屋内測位. 研究報告ユビキタスコンピューティングシステム (UBI) 2022.1, pp. 1–8, (2022).