

Estadística Multivariada

Haydeé Peruyero

Contents

1	Estadística Multivariada	5
1.1	Temario	5
1.2	Evaluación	6
1.3	Proyecto final	6
1.4	Referencias	7
1.5	Material interesante	7
1.6	DataCamp	7
2	Regresión múltiple	9
2.1	¿Por qué estadística multivariada?	9
2.2	Regresión múltiple	13
2.3	Estimación de parámetros	17
2.4	Pruebas de Hipótesis	23
2.5	Intervalos de confianza	28
2.6	Ejercicios Regresión Lineal Multiple	32
2.7	Validación de Supuestos	37
2.8	Análisis de Varianza	50
2.9	Selección del modelo	61
3	Análisis de Componentes Principales	81
3.1	Componentes principales para matriz de covarianza	81
3.2	Componentes principales para matriz de correlación	87
3.3	El número de Componentes Principales	92

3.4	Visualización de los componentes principales	100
3.5	Ejemplos con Bases de datos	112
3.6	Ejercicios PCA	135
3.7	Tutoriales de DataCamp sugeridos	137
4	Análisis Factorial	139
4.1	Modelo de factores ortogonales con m factores comunes	141
4.2	Métodos de estimación	146
4.3	Rotación de factores	150
4.4	Ejemplos	150
4.5	Ejercicios	150
5	Análisis de Conglomerados	151
6	Análisis de Discriminante	153
7	Apéndices	155
7.1	Introducción a R	155
7.2	Git + Github	155
7.3	Correlaciones y distancias	155
7.4	Plots Multivariados	156

Chapter 1

Estadística Multivariada

1.1 Temario

1. Regresión múltiple

1.1 Mínimos cuadrados.

1.2 Medidas de bondad de ajuste.

1.3 Determinación del número de variables predictorias.

2. Análisis de componentes principales

2.1 Descripción de la metodología.

2.2 Técnicas de extracción de componentes principales.

2.3 Determinación del número de componentes principales.

3. Análisis factorial

3.1 Descripción de la metodología del análisis factorial.

3.2 Descripción del modelo básico.

3.3 Método de cálculo.

3.4 Comparación con la técnica del análisis de componentes principales.

3.5 Usos de software (R, Minitab, SciPy, entre otros).

4. Análisis de conglomerados

4.1 Descripción de la metodología de análisis de conglomerados.

4.2 Técnicas de jerarquización y de particionamiento.

4.3 Implementación computacional.

4.4 Usos de los dendogramas.

4.5 Usos de software (R, Minitab, SciPy, entre otros).

5. Análisis discriminante

5.1 Descripción de la metodología del análisis discriminante.

5.2 Discriminación entre dos grupos.

5.3 Contribución por variable.

5.4 Discriminación logística.

5.5 Discriminación múltiple.

5.6 Usos de software (R, Minitab, SciPy, entre otros).

A1. R

A2. Git + Github

A3. Gráficas Multivariadas

A4. Escalas de Medición

A5. Valores Faltantes

1.2 Evaluación

- Exámenes 50%
- Tareas 25%
- Proyecto 20%
- DataCamp 5%

1.3 Proyecto final

- Buscar una base de datos “real”
- Aplicar 3 métodos de estadística multivariada
- Entregar documento con:
 - Descripción de los datos
 - Planteamiento del problema
 - Métodos usados

- Interpretación de resultados
- Código usado
- Repositorio con código reproducible
- Exposición de resultados

1.4 Referencias

[1]

1.5 Material interesante

- Bookdown.
- Software Carpentry.
- Git
- Why Git
- R Markdown Cookbook
- STHDA
- YaRrr! The Pirate's Guide to R
- Learn ggplot2 Using Shiny App
- Ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis
 - Versión online
- Use R! Colección Springer
- Lattice: Multivariate Data Visualization with R
- R Graphics cookbook
- Cuenta pro de Github

1.6 DataCamp



Figure 1.1: DataCamp

Chapter 2

Regresión múltiple

2.1 ¿Por qué estadística multivariada?

El proceso de modelado consiste en construir expresiones matemáticas que permitan representar el comportamiento de una variable que queremos estudiar. Cuando contamos con varias variables, suele interesarnos analizar cómo unas influyen sobre otras, determinando si existe una relación, su intensidad y su forma. En muchos casos, estas relaciones pueden ser complejas y difíciles de describir directamente; por ello, se busca aproximarlas mediante funciones matemáticas sencillas como polinomios, que conserven los elementos esenciales para explicar el fenómeno de interés.

Cuando estudiamos fenómenos deterministas, es común vincular una variable dependiente con una o más variables independientes. Por ejemplo, en la ecuación de la velocidad ($v = d/t$), la distancia depende de la velocidad y del tiempo. En la práctica, cuando realizamos distintos experimentos, las fórmulas deterministas podrían no capturar por completo el comportamiento observado. Esto puede deberse a factores no controlados, a la presencia de variabilidad natural o a efectos aleatorios. Por esta razón, además de la parte determinista del modelo, se incorpora un término que represente la discrepancia aleatoria entre lo que se predice y lo que efectivamente se observa. De forma general, esta idea se resume como:

$$\text{Observación} = \text{Modelo} + \text{Error}$$

Cuando se supone que la relación entre las variables puede representarse mediante una ecuación lineal, hablamos de *análisis de regresión lineal*. Si intervienen únicamente dos variables, una dependiente y y independiente x , se trata de **regresión lineal simple**. En cambio, cuando la variable de interés y depende

de dos o más variables independientes $x_1, x_2, \dots$ hablamos de **regresión lineal múltiple**.

Supongamos que queremos predecir el rendimiento académico de un estudiante, ¿solo necesitamos las horas que estudia?

En este caso se tiene que el puntaje o rendimiento lo podemos representar con y y las horas de estudio con x . Entonces esta propuesta de modelo, la podríamos representar como:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x$$

Donde β_0 es la ordenada al origen y β_1 la pendiente. Esta recta podría no ajustarse al modelo por diferentes razones, entonces lo que se hace es considerar un error aleatorio ϵ . El modelo que ya considera este error se representa como:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon.$$

A este modelo se le conoce como modelo de **regresión lineal simple** y a β_0, β_1 se les conoce como **coeficientes de regresión**.

En problemas reales, casi nunca una sola variable explica el fenómeno. Las decisiones y predicciones mejoran cuando integramos múltiples fuentes de información.

Ejemplos: - Salud: riesgo de una enfermedad según edad, IMC, actividad física, dieta y antecedentes. - Ingeniería: vida útil de una pieza según temperatura, vibración, material y carga. - Biología: crecimiento de una planta por agua, luz, fertilizante, temperatura.

Ejemplo: Si queremos predecir el rendimiento académico de un estudiante, ¿solo necesitamos las horas que estudia? ¿qué otras variables podrían influir en el puntaje de un examen?

Rendimiento escolar

```
set.seed(123)
n <- 10
data_intro <- tibble(
  estudiante = paste0("E", 1:n),
  horas_estudio = c(2,3,4,5,1,3,2,4,5,6),
  horas_sueno = c(7,8,6,7,5,8,7,6,9,7),
  asistencia = c(0.9,0.95,0.8,0.85,0.7,0.9,0.8,0.9,1,0.95),
  puntaje = c(65,70,68,80,60,75,65,78,88,85)
)
data_intro
```

```
## # A tibble: 10 x 5
##   estudiante horas_estudio horas_sueno asistencia puntaje
##   <chr>         <dbl>         <dbl>         <dbl>    <dbl>
## 1 E1           2           7           0.9       65
## 2 E2           3           8           0.95      70
## 3 E3           4           6           0.8       68
## 4 E4           5           7           0.85      80
## 5 E5           1           5           0.7       60
## 6 E6           3           8           0.9       75
## 7 E7           2           7           0.8       65
## 8 E8           4           6           0.9       78
## 9 E9           5           9           1         88
## 10 E10        6           7           0.95      85
```


¿Qué pasa si solo graficamos horas de estudio vs puntaje?

Plot horas de estudio vs puntaje sugerida

```
library(ggplot2)
ggplot(data_intro, aes(horas_estudio, puntaje)) +
  geom_point(size=3) +
  geom_smooth(method="lm", se=FALSE) +
  labs(title="¿Solo horas de estudio explican el puntaje?")
```

```
## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```

¿Solo horas de estudio explican el puntaje?



¿Se ajusta un modelo lineal? ¿Porqué?

2.1.1 ¿Qué es “multivariado” y por qué lo necesitamos?

Idea central: cuando **varias** x influyen sobre y , estudiar cada x por separado puede engañarnos. El análisis multivariado permite:

- **Aislar efectos:** estimar el efecto de x_1 *manteniendo constantes* $x_2, x_3, \dots$
- **Mejorar predicción:** reducir error al añadir información relevante.
- **Controlar confusores:** variables que cambian la relación aparente entre y y x .

Ejemplo: Si ajustamos ahora un modelo con varias variables, ¿vamos a observar un cambio? ¿se ajustará mejor?

Código (modelos + comparaciones)

```
# Modelo simple
m1 <- lm(puntaje ~ horas_estudio, data = data_intro)

# Modelo múltiple
m2 <- lm(puntaje ~ horas_estudio + horas_sueno + asistencia, data = data_intro)

# Medidas clave
R2_m1 <- glance(m1)$r.squared
R2_m2 <- glance(m2)$r.squared

print(paste("El R2 del modelo simple:", R2_m1))

## [1] "El R2 del modelo simple: 0.824317362184441"

print(paste("El R2 del modelo multiple:", R2_m2))

## [1] "El R2 del modelo multiple: 0.895428180549875"

#R2adj_m1 <- glance(m1)$adj.r.squared
#R2adj_m2 <- glance(m2)$adj.r.squared
```

- ¿Aumentó R^2 al incluir más variables? ¿Por qué tiende a subir?
- ¿Qué cambia en la interpretación de horas_estudio al controlar por horas_sueno y asistencia?
- ¿Puede un predictor ser importante en bivariado y no en multivariado (o viceversa)?

2.2 Regresión múltiple

2.2.1 Modelo y estimación

Los modelos en regresión lineal múltiple están dados por la siguiente forma, donde y depende de p variables predictoras:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_p x_{ip} + \epsilon_i.$$

Se suele asumir que los errores ϵ_i son i.i.d. con distribución normal de media 0 y varianza σ^2 desconocida. Los coeficientes β_i son constantes desconocidas y son los parámetros del modelo. Cada β_j representa el cambio esperado en la respuesta y por el cambio unitario en x_i cuando todas las demás variables independientes $x_i (i \neq j)$ se mantienen constantes.

```
# Forma general
ajuste <- lm(y ~ x1 + x2 + ... + xp, data = datos)
# summary(ajuste)
```

Los coeficientes los podemos interpretar como sigue:

- **Intercepto** (β_0): valor esperado de y cuando todas las $x=0$.
- **Pendiente** β_j : efecto **parcial** de x_j sobre y manteniendo las demás constantes.

En los modelos de regresión lineal, solemos usar las siguientes medidas de bondad de ajuste:

- R^2 : proporción de varianza de y explicada.
- R^2 **ajustado**: penaliza por número de predictores (mejor para comparar modelos con distinto número de x).
- **RMSE** (σ): error típico de predicción en unidades de y .

```
comp <- dplyr::bind_rows(
  glance(m1) %>% mutate(modelo="simple"),
  glance(m2) %>% mutate(modelo="multiple")
) %>% select(modelo, r.squared, adj.r.squared)
comp
```

```
## # A tibble: 2 x 3
##   modelo   r.squared adj.r.squared
```


##	<chr>	<dbl>	<dbl>
##	1 simple	0.824	0.802
##	2 multiple	0.895	0.843

Para este modelo algunos de los supuestos se siguen del modelo de regresión lineal simple y se agregan algunos que tienen que ver con la relación que pudiera existir entre las variables regresoras.

- El modelo es lineal en los parámetros.
Chequeo: residuales vs ajustados sin patrón claro.
- El modelo está especificado correctamente.
- Covarianza cero entre variables regresoras y el error.
- Esperanza del error igual a cero.
- Homocedasticidad.
- No autocorrelación entre los errores.
- Los errores siguen una distribución normal.
- Mas observaciones que parámetros a estimar.
- Variación entre los valores de las variables regresoras.
- No colinealidad (multicolinealidad) entre las variables regresoras, es decir, no existe una relación lineal entre x_i y x_j (es decir, las variables son linealmente independientes).

Supuestos

```
# Modelo m2
par(mfrow=c(1,2))
plot(m2, which=1) # Residuales vs ajustados
plot(m2, which=2) # QQ-plot
```



Ejercicio: Supongamos que tenemos los siguientes datos: precio de vivienda según metros, habitaciones y distancia al centro.

Dataset

```
set.seed(42)
n <- 14
casas <- tibble::tibble(
  precio = c(200,220,250,275,300,180,210,260,280,320,190,240,230,305),
  metros = c(80,90,100,110,120,70,85,105,115,130,75,95,92,125),
  habitaciones = c(2,3,3,4,4,2,3,3,4,5,2,3,3,4),
  distancia_centro = c(5,4,6,3,2,8,6,3,2,1,7,5,4,2)
)
casas
```

```
## # A tibble: 14 x 4
##   precio metros habitaciones distancia_centro
##   <dbl> <dbl>         <dbl>         <dbl>
## 1    200     80             2             5
## 2    220     90             3             4
## 3    250    100             3             6
## 4    275    110             4             3
## 5    300    120             4             2
## 6    180     70             2             8
```

##	7	210	85	3	6
##	8	260	105	3	3
##	9	280	115	4	2
##	10	320	130	5	1
##	11	190	75	2	7
##	12	240	95	3	5
##	13	230	92	3	4
##	14	305	125	4	2

- 1) Ajusta $\text{precio} \sim \text{metros}$ (simple) y $\text{precio} \sim \text{metros} + \text{habitaciones} + \text{distancia_centro}$ (múltiple).
- 2) Compara R^2 , R^2 ajustado y (RMSE).
- 3) Interpreta el coeficiente de `distancia_centro`.
- 4) Revisa QQ-plot y residuales vs ajustados. ¿Algún patrón?

Solución

```
m_s <- lm(precio ~ metros, data=casas)
m_m <- lm(precio ~ metros + habitaciones + distancia_centro, data=casas)

broom::glance(m_s)[,c("r.squared", "adj.r.squared")]
```

```
## # A tibble: 1 x 2
##   r.squared adj.r.squared
##   <dbl>      <dbl>
## 1    0.996        0.996
```

```
broom::glance(m_m)[,c("r.squared", "adj.r.squared")]
```


```
## # A tibble: 1 x 2
##   r.squared adj.r.squared
##   <dbl>      <dbl>
## 1    0.997        0.996
```

```
broom::tidy(m_m)
```

```
## # A tibble: 4 x 5
```


##	term	estimate	std.error	statistic	p.value
##	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
## 1	(Intercept)	-8.67	14.9	-0.583	0.573
## 2	metros	2.53	0.162	15.6	0.0000000236
## 3	habitaciones	-0.505	2.80	-0.180	0.861
## 4	distancia_centro	1.38	0.974	1.42	0.187

```
par(mfrow=c(1,2))
plot(m_m, which=1)
plot(m_m, which=2)
```



2.3 Estimación de parámetros

Ejemplo (Montgomery, 2002): : Un embotellador de bebidas gaseosas analiza las rutas de servicio de las máquinas expendedoras en su sistema de distribución. Le interesa predecir el tiempo necesario para que el representante de ruta atienda las máquinas expendedoras en una tienda.

Esta actividad de servicio consiste en abastecer la máquina con productos embotellados, y algo de mantenimiento o limpieza. El ingeniero industrial responsable del estudio ha sugerido que las dos variables más importantes que afectan el tiempo de entrega y son la cantidad de cajas de producto abastecido, x_1 , y la distancia caminada por el representante, x_2 .

El ingeniero ha reunido 25 observaciones de tiempo de entrega que se ven en la tabla siguiente. Se ajustará el modelo de regresión lineal múltiple siguiente:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \varepsilon$$

Archivo: *refrescos.csv*.

Base de datos

```
#
datos <- data.frame(
  Observacion = 1:25,
  y = c(16.68, 11.50, 12.03, 14.88, 13.75,
        18.11, 8.00, 17.83, 79.24, 21.50,
        40.33, 21.00, 13.50, 19.75, 24.00,
        29.00, 15.35, 19.00, 9.50, 35.10,
        17.90, 52.32, 18.75, 19.83, 10.75),
  x1 = c(7, 3, 3, 4, 6,
        7, 2, 7, 30, 5,
        16, 10, 4, 6, 9,
        10, 6, 7, 3, 17,
        10, 26, 9, 8, 4),
  x2 = c(560, 220, 340, 80, 150,
        330, 110, 210, 1460, 605,
        688, 215, 255, 462, 448,
        776, 200, 132, 36, 770,
        140, 810, 450, 635, 150)
)


datos
```

##	Observacion	y	x1	x2
## 1	1	16.68	7	560
## 2	2	11.50	3	220
## 3	3	12.03	3	340
## 4	4	14.88	4	80
## 5	5	13.75	6	150
## 6	6	18.11	7	330
## 7	7	8.00	2	110
## 8	8	17.83	7	210
## 9	9	79.24	30	1460
## 10	10	21.50	5	605
## 11	11	40.33	16	688
## 12	12	21.00	10	215
## 13	13	13.50	4	255
## 14	14	19.75	6	462
## 15	15	24.00	9	448

```
## 16      16 29.00 10  776
## 17      17 15.35  6  200
## 18      18 19.00  7  132
## 19      19  9.50  3   36
## 20      20 35.10 17  770
## 21      21 17.90 10  140
## 22      22 52.32 26  810
## 23      23 18.75  9  450
## 24      24 19.83  8  635
## 25      25 10.75  4  150
```

Veamos un gráfico de dispersión de los datos. ¿Qué observamos?

```
pairs(datos[-1])
```



1) Estimar β

Primero, vamos a crear la matriz X y el vector y .

Matrices

```
# Columna de 1 para el intercepto
idv <- rep(1, nrow(datos))
```

```
# Creamos matriz X
X <- matrix(c(idv,datos$x1,datos$x2),nrow=25,ncol=3)
# Creamos el vector y
y <- matrix(datos$y, nrow = 25, ncol = 1)
```

Ya sabemos que nuestro estimador está dado por

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y$$

Entonces podemos encontrar el estimador.

Estimador beta

```
beta <- solve(t(X) %*% X) %*% t(X) %*% y
beta
```

```
##           [,1]
## [1,] 2.34123115
## [2,] 1.61590721
## [3,] 0.01438483
```

Entonces el ajuste por el método de mínimos cuadrados, con los coeficientes de regresión que encontramos está dado por:

$$\hat{y} = 2.3412311 + 1.6159072 x_1 + 0.0143848 x_2$$

Esto lo podemos hacer más rápido usando la función de `lm`. Construimos el modelo.

Modelo en R

```
M1 <- lm(y ~ x1 + x2, datos)
M1

##
## Call:
## lm(formula = y ~ x1 + x2, data = datos)
##
## Coefficients:
## (Intercept)          x1          x2
##      2.34123      1.61591      0.01438
```

¿Cómo accedemos a los valores del modelo?

Coeficientes

```
beta_0 <- M1$coefficients[1]
beta_1 <- M1$coefficients[2]
beta_2 <- M1$coefficients[3]
```

Los valores son $\beta_0 = 2.3412311$, $\beta_1 = 1.6159072$ y $\beta_2 = 0.0143848$.

2) Estimación de la varianza del error σ^2

Ya tenemos que la suma de los cuadrados de los errores está dada por

$$SSE = y'y - \hat{\beta}X'y$$

Sustituimos los valores que tenemos y obtenemos el SSE.

SSE

```
SSE <- t(y) %*% y - t(beta) %*% t(X) %*% y
SSE
```

```
##           [,1]
## [1,] 233.7317
```

Y de esta forma, podemos encontrar el estimador de σ^2 .

Estimador

```
varest <- SSE / (nrow(y) - nrow(beta))
varest
```

```
##           [,1]
## [1,] 10.62417
```

Directo con las funciones de R, podemos acceder a los parámetros que se guardaron en el modelo que ya calculamos.

Resumen del modelo

```
summary(M1)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = y ~ x1 + x2, data = datos)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -5.7880 -0.6629  0.4364  1.1566  7.4197
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  2.341231    1.096730   2.135 0.044170 *
## x1           1.615907    0.170735   9.464 3.25e-09 ***
## x2           0.014385    0.003613   3.981 0.000631 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 3.259 on 22 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9596, Adjusted R-squared:  0.9559
## F-statistic: 261.2 on 2 and 22 DF,  p-value: 4.687e-16
```

Algunos de los parámetros almacenados en el modelo nos permiten obtener también el resultado previo.

Estimador

```
sum(residuals(M1)^2) / df.residual(M1)
```

```
## [1] 10.62417
```

2.3.1 Ejercicios

Ejercicio 1: Un analista hace un estudio químico y espera que el rendimiento de cierta sustancia se vea afectado por dos factores. Se realizan 17 experimentos cuyos datos se registran en el cuadro siguiente. Por experimentos similares, se sabe que los factores x_1 y x_2 no están relacionados; por ello, el analista decide utilizar un modelo de regresión lineal múltiple. Calcule el modelo de regresión y gráfiquelo sobre las observaciones.

Archivo: *est_quimico.csv*

Datos Ejercicio 1

```
datos2 <- data.frame(
  Experimento = 1:17,
  x1 = c(41.9, 43.4, 43.9, 44.5, 47.3, 47.5, 47.9, 50.2, 52.8, 53.2, 56.7, 57.0, 63.5, 64.3, 71.1, 77.0, 77.8),
  x2 = c(29.1, 29.3, 29.5, 29.7, 29.9, 30.3, 30.5, 30.7, 30.8, 30.9, 31.5, 31.7, 31.9, 32.0, 32.1, 32.5, 32.9),
  y = c(251.3, 251.3, 248.3, 267.5, 273.0, 276.5, 270.3, 274.9, 285.0, 290.0, 297.0, 302.5, 304.5, 309.3, 321.7, 330.7, 349.0)
)
```

```
datos2
```

```
##      Experimento  x1  x2    y
## 1              1 41.9 29.1 251.3
## 2              2 43.4 29.3 251.3
## 3              3 43.9 29.5 248.3
## 4              4 44.5 29.7 267.5
## 5              5 47.3 29.9 273.0
## 6              6 47.5 30.3 276.5
## 7              7 47.9 30.5 270.3
## 8              8 50.2 30.7 274.9
## 9              9 52.8 30.8 285.0
## 10             10 53.2 30.9 290.0
## 11             11 56.7 31.5 297.0
## 12             12 57.0 31.7 302.5
## 13             13 63.5 31.9 304.5
## 14             14 64.3 32.0 309.3
## 15             15 71.1 32.1 321.7
## 16             16 77.0 32.5 330.7
## 17             17 77.8 32.9 349.0
```

Ejercicio 2: Repetir el ejemplo con los datos `datasets::trees` de R que proporciona mediciones del diámetro, altura y volumen de madera en 31 cerezos negros talados.

Ejercicio 3: Subir a Github los dos ejercicios previos tanto con solución en R como en Python. Comparar las funciones. Ventajas y desventajas de ambas.

2.4 Pruebas de Hipótesis

Cuando revisamos el `summary` del modelo, nos arroja si son significativas o no y a que nivel de significancia las variables que estamos considerando. Veamos el siguiente ejemplo.

2.4.1 Prueba de la significancia de la regresión

Ejemplo: Con los datos del embotellador de bebidas gaseosas, se probará la significancia de la regresión.

Sumas de Cuadrados

```
SCT <- t(y) %*% y - sum(y)**2 / nrow(datos)
SCT
```

```
##           [,1]
## [1,] 5784.543
```

```
SCE <- t(beta) %*% t(X) %*% y - sum(y)**2 / nrow(datos)
SCE
```

```
##           [,1]
## [1,] 5550.811
```

```
SSE <- SCT - SCE
SSE
```

```
##           [,1]
## [1,] 233.7317
```

Para probar

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$$

se calcula el estadístico:

Estadístico F

```
F0 <- (SCE / (ncol(X) - 1)) / (SSE / (nrow(X) - (ncol(X) - 1) - 1))
F0
```

```
##           [,1]
## [1,] 261.2351
```


Como el valor de F_0 es mayor que el valor tabulado de $F_{\alpha;p,n-p-1} = F_{0.05;2;22} = 3.44$, se rechaza H_0 . Lo cual implica que el tiempo de entrega depende del volumen de entrega y/o de la distancia.

Ahora, usando los modelos que ya calculamos.

Sumas de cuadrados

```
SCT.m<-sum((datos$y-mean(datos$y))^2)
SCT.m
```

```
## [1] 5784.543
```

```
SCE.m <-sum((M1$fitted-mean(datos$y))^2)
SCE.m
```

```
## [1] 5550.811
```

```
SSE.m <-sum(M1$residuals^2)
SSE.m
```

```
## [1] 233.7317
```

Grados de libertad

```
n<-nrow(y)
n
```

```
## [1] 25
```

```
GLT<- n-1
GLT
```

```
## [1] 24
```

```
GLRes<- df.residual(M1)
GLRes
```

```
## [1] 22
```

```
GLR<- GLT-GLRes
GLR
```

```
## [1] 2
```

Cuadrados medios

```
CMR <- SCE /GLR
CMR
```

```
##           [,1]
## [1,] 2775.405
```

```
CMRes <- SSE / GLRes
CMRes
```

```
##           [,1]
## [1,] 10.62417
```

Estadístico F_0

```
F0 <- CMR/CMRes
F0
```

```
##           [,1]
## [1,] 261.2351
```

p-valor

```
pv <- 1 - pf(F0, GLR,GLRes)
pv
```

```
##           [,1]
## [1,] 4.440892e-16
```

Valor tabulado de F

```
alpha <- 0.05; df1 <- 2; df2 <- 22
F_crit <- qf(1 - alpha, df1, df2)
F_crit
```

```
## [1] 3.443357
```

2.4.2 Pruebas sobre coeficientes individuales de regresión

Ejemplo: Usando los datos del embotellador de bebidas gaseosas, se desea evaluar la importancia de la variable regresora *distancia* (x_2) dado que el regresor *cajas* (x_1) está en el modelo.

Estadístico t_0

```
C22 <- solve(t(X) %*% X)[3,3]
C22
```

```
## [1] 1.228745e-06
```

```
t0 <- beta_2 / sqrt(varest * C22)
t0
```

```
##           [,1]
## [1,] 3.981313
```

```
## t tabulado con confianza 95% y 22 grados de libertad
tt <- qt(p = 0.95 + 0.05/2, df = 22, lower.tail = TRUE)
tt
```

```
## [1] 2.073873
```

Usando el modelo que ya tenemos calculado M1 podemos obtener estos mismos resultados de la siguiente forma.

Prueba sobre coeficientes

```
summary(M1)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = y ~ x1 + x2, data = datos)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -5.7880 -0.6629  0.4364  1.1566  7.4197
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  2.341231    1.096730   2.135 0.044170 *
## x1           1.615907    0.170735   9.464 3.25e-09 ***
## x2           0.014385    0.003613   3.981 0.000631 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 3.259 on 22 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9596, Adjusted R-squared:  0.9559
## F-statistic: 261.2 on 2 and 22 DF,  p-value: 4.687e-16
```

2.5 Intervalos de confianza

2.5.1 Intervalos de confianza en los coeficientes de regresión

Ejemplo: Usando los datos del embotellador de bebidas gaseosas, queremos calcular el intervalo de confianza del 95% para β_1 . Recordemos que el estimador puntual de β_1 es 1.6159072.

Intervalo de confianza

```
C11 <- solve(t(X) %*% X)[2,2]

izq <- beta_1 - tt * sqrt(varest*C11)
izq
```

```
##           [,1]
## [1,] 1.261825
```

```
der <- beta_1 + tt * sqrt(varest*C11)
der
```

```
##           [,1]
## [1,] 1.96999
```

2.5.2 Intervalo de confianza de la respuesta media

Ejemplo: El embotellador de bebidas gaseosas quiere establecer un intervalo de confianza del 95% para el tiempo medio de entrega para una tienda donde se requieren $x_1 = 8$ cajas y la distancia es de $x_2 = 275$ pies.

Nuestro vector X_0 está dado por:

X_0

```
X0 <- matrix(c(1, 8, 275), nrow = 3)
X0
```

```
##           [,1]
## [1,]      1
## [2,]      8
## [3,]     275
```

El valor ajustado en ese punto es:

Valor ajustado

```
y0 <- t(X0) %*% beta
y0
```

```
##           [,1]
## [1,] 19.22432
```

La varianza de $\hat{y}_0$

Varianza

```
var_y0 <- varest * t(X0) %*% solve(t(X) %*% X) %*% X0
var_y0
```

```
##           [,1]
## [1,] 0.5734134
```

Entonces el intervalo de confianza en este punto es:

Intervalo de confianza

```
l_izq <- y0 - tt * sqrt(var_y0)
l_izq
```

```
##           [,1]
## [1,] 17.6539
```

```
l_der <- y0 + tt * sqrt(var_y0)
l_der
```

```
##           [,1]
## [1,] 20.79474
```

Ejemplo: Usaremos el conjunto de datos `data("marketing")` que contiene 200 observaciones de un experimento publicitario que evalúa el impacto de tres medios de anuncio en las ventas. Para cada observación se registran los presupuestos de publicidad (en miles de dólares) y las ventas obtenidas. Variables:

- **youtube:** presupuesto invertido en anuncios de YouTube (miles de USD).
- **facebook:** presupuesto invertido en Facebook (miles de USD).
- **newspaper:** presupuesto invertido en prensa escrita (miles de USD).
- **sales:** ventas registradas (variable respuesta).

Cargamos los datos:

```
library(datarium)
data("marketing")
```

Exploramos rápidamente la base para ver qué variables contiene y la dimensión:

```
str(marketing)
```

```
## 'data.frame':    200 obs. of  4 variables:
## $ youtube : num  276.1 53.4 20.6 181.8 217 ...
## $ facebook : num  45.4 47.2 55.1 49.6 13 ...
## $ newspaper: num  83 54.1 83.2 70.2 70.1 ...
## $ sales    : num  26.5 12.5 11.2 22.2 15.5 ...
```

```
##marketing
```

Ajustamos un modelo lineal que incluya todas las variables, es decir,

$$sales = \beta_0 + \beta_1 youtube + \beta_2 facebook + \beta_3 newspaper + \epsilon$$

Modelo marketing

```
modelo1<-lm(sales~youtube+facebook+newspaper,data=marketing)
summary(modelo1)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = sales ~ youtube + facebook + newspaper, data = marketing)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -10.5932  -1.0690   0.2902   1.4272   3.3951
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  3.526667   0.374290   9.422  <2e-16 ***
## youtube      0.045765   0.001395  32.809  <2e-16 ***
## facebook     0.188530   0.008611  21.893  <2e-16 ***
## newspaper   -0.001037   0.005871  -0.177    0.86
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 2.023 on 196 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8972, Adjusted R-squared:  0.8956
## F-statistic: 570.3 on 3 and 196 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

¿Qué se puede decir sobre la significancia de la variable *newspaper*?

Veamos qué ocurre con el modelo al eliminar la variable *newspaper*

Modelo marketing 2

```
modelo2<-lm(sales~facebook+youtube,data=marketing)
summary(modelo2)
```

```
##
## Call:
```

```
## lm(formula = sales ~ facebook + youtube, data = marketing)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -10.5572  -1.0502   0.2906   1.4049   3.3994
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  3.50532    0.35339   9.919  <2e-16 ***
## facebook     0.18799    0.00804  23.382  <2e-16 ***
## youtube      0.04575    0.00139  32.909  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 2.018 on 197 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8972, Adjusted R-squared:  0.8962
## F-statistic: 859.6 on 2 and 197 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Lo que sigue, es hacer pruebas de hipótesis tanto en las variables como en los coeficientes de regresión.

2.5.3 Ejercicios

Ejercicio 1: Realizar las pruebas de hipótesis sobre la significancia de la regresión y sobre los coeficientes. Encontrar los intervalos de confianza respectivos del 95%. Para una tienda con presupuestos: $youtube = 150$, $facebook = 30$, $newspaper = 20$ (en miles de USD): (a) Calcula el intervalo de confianza del 95% para la media de ventas $E(sales|X_0)$. (b) Calcula el intervalo de predicción del 95% para una nueva observación de ventas. (c) Comenta la diferencia entre ambos intervalos. Subir respuesta y explicación de sus resultados a github.

2.6 Ejercicios Regresión Lineal Multiple

Realiza los siguientes ejercicios. En cada inciso:

- explica y comenta la solución,
- incluye el código utilizado, y
- añade las gráficas (plots) correspondientes con su interpretación.

Asegúrate de que el código sea reproducible y que las figuras tengan títulos, ejes y leyendas.

Ejercicio 1: Para los datos de la Liga Nacional de Fútbol. Realizar tanto con las funciones de R y Python como con las fórmulas que usan matrices.

- a) Ajustar un modelo de regresión lineal múltiple que relacione la cantidad de juegos ganados con las yardas por aire del equipo (x_2), el porcentaje de jugadas por tierra (x_7) y las yardas por tierra del contrario (x_8).
- b) Formar la tabla de análisis de varianza y probar la significancia de la regresión.
- c) Calcular el estadístico t para probar las hipótesis $H_0 : \beta_2 = 0$, $H_0 : \beta_7 = 0$ y $H_0 : \beta_8 = 0$. ¿Qué conclusiones se pueden sacar acerca del papel de las variables x_2 , x_7 y x_8 en el modelo?
- d) Calcular R^2 y R_{adj}^2 para este modelo.
- e) Trazar una gráfica de probabilidad normal de los residuales. ¿Parece haber algún problema con la hipótesis de normalidad?
- f) Trazar e interpretar una gráfica de los residuales en función de la respuesta predicha.
- g) Trazar las gráficas de los residuales en función de cada una de las variables regresoras. ¿Implican esas gráficas que se especificó en forma correcta el regresor?
- h) Calcular un intervalo de confianza de 95% para β_7 y un intervalo de confianza de 95% para la cantidad media de juegos ganados por un equipo cuando $x_2 = 2300$, $x_7 = 56$ y $x_8 = 2100$.
- i) Ajustar un modelo a esos datos, usando solo x_7 y x_8 como regresores y probar la significancia de la regresión.
- j) Calcular R^2 y R_{adj}^2 . Compararlos con los resultados del modelo anterior.
- k) Calcular un intervalo de confianza de 95% para β_7 . También, un intervalo de confianza de 95% para la cantidad media de juegos ganados por un equipo cuando $x_7 = 56$ y $x_8 = 2100$. Comparar las longitudes de esos intervalos de confianza con las longitudes de los correspondientes al modelo anterior.
- l) ¿Qué conclusiones se pueden sacar de este problema, acerca de las consecuencias de omitir un regresor importante de un modelo?

Descripción de las variables:

y : Juegos ganados (por temporada de 14 juegos)

x_1 : Yardas por tierra (temporada)

x_2 : Yardas por aire (temporada)

- x_3 : Promedio de pateo (yardas/patada)
- x_4 : Porcentaje de goles de campo (GC hechos/GC intentados, temporada)
- x_5 : Diferencia de pérdidas de balón (pérdidas ganadas/pérdidas perdidas)
- x_6 : Yardas de castigo (temporada)
- x_7 : Porcentaje de carreras (jugadas por tierra/jugadas totales)
- x_8 : Yardas por tierra del contrario (temporada)
- x_9 : Yardas por aire del contrario (temporada)

Ejercicio 2: Véase los datos de rendimiento de gasolina. Realizar el ejercicio en R.

- a) Ajustar un modelo de regresión lineal múltiple que relacione el rendimiento de la gasolina y , en millas por galón, la cilindrada del motor (x_1) y la cantidad de gargantas del carburador (x_6).
- b) Formar la tabla de análisis de varianza y probar la significancia de la regresión.
- c) Calcular R^2 y R_{adj}^2 para este modelo. Compararlas con las R^2 y R_{adj}^2 Ajustado para el modelo de regresión lineal simple, que relaciona las millas con la cilindrada.
- d) Determinar un intervalo de confianza para β_1 .
- e) Determinar un intervalo de confianza de 95% para el rendimiento promedio de la gasolina, cuando $x_1 = 225\text{pulg}^3$ y $x_6 = 2$ gargantas.
- f) Determinar un intervalo de predicción de 95% para una nueva observación de rendimiento de gasolina, cuando $x_1 = 225\text{pulg}^3$ y $x_6 = 2$ gargantas.
- g) Considerar el modelo de regresión lineal simple, que relaciona las millas con la cilindrada. Construir un intervalo de confianza de 95% para el rendimiento promedio de la gasolina y un intervalo de predicción para el rendimiento, cuando $x_1 = 225\text{pulg}^3$. Comparar las longitudes de estos intervalos con los intervalos obtenidos en los dos incisos anteriores. ¿Tiene ventajas agregar x_6 al modelo?
- h) Trazar una gráfica de probabilidad normal de los residuales. ¿Parece haber algún problema con la hipótesis de normalidad?
- i) Trazar e interpretar una gráfica de los residuales en función de la respuesta predicha.
- j) Trazar las gráficas de los residuales en función de cada una de las variables regresoras. ¿Implican esas gráficas que se especificó en forma correcta el regresor?

Descripción de variables: Variables (Fuente: Motor Trend, 1975)

y : Millas/galón

x_1 : Cilindrada (pulgadas cúbicas)

x_2 : Potencia (Hp)

x_3 : Par de torsión (pies-lb)

x_4 : Relación de compresión

x_5 : Relación de eje trasero

x_6 : Carburador (gargantas)

x_7 : Número de velocidades en la transmisión

x_8 : Longitud total (pulgadas)

x_9 : Ancho (pulgadas)

x_{10} : Peso (lb)

x_{11} : Tipo de transmisión (1 = automática, 0 = manual)

Ejercicio 3: Véase los datos sobre precios de viviendas. Realizar el ejercicio en Python.

- a) Ajustar un modelo de regresión lineal múltiple que relacione el precio de venta con los nueve regresores.
- b) Probar la significancia de la regresión. ¿Qué conclusiones se pueden sacar?
- c) Usar pruebas t para evaluar la contribución de cada regresor al modelo.
- d) Calcular R^2 y R_{adj}^2 para este modelo.
- e) ¿Cuál es la contribución del tamaño del lote y el espacio vital para el modelo, dado que se incluyeron todos los demás regresores?.
- f) En este modelo, ¿la colinealidad es un problema potencial?
- g) Trazar una gráfica de probabilidad normal de los residuales. ¿Parece haber algún problema con la hipótesis de normalidad?
- h) Trazar e interpretar una gráfica de los residuales en función de la respuesta predicha.
- i) Trazar las gráficas de los residuales en función de cada una de las variables regresoras. ¿Implican esas gráficas que se especificó en forma correcta el regresor?.

Descripción de las variables:

y : Precio de venta de la casa / 1000

x_1 : Impuestos (locales, escuela, municipal) / 1000

x_2 : Cantidad de baños

x_3 : Tamaño del terreno (pies cuadrados $\times$ 1000)

x_4 : Superficie construida (pies cuadrados $\times$ 1000)

x_5 : Cantidad de cajones en cochera

x_6 : Cantidad de habitaciones

x_7 : Cantidad de recámaras

x_8 : Edad de la casa (años)

x_9 : Cantidad de chimeneas

Ejercicio 4: Explica lo siguiente.

- a) ¿Qué supuestos del modelo de regresión lineal múltiple deben verificarse?
- b) ¿Cómo se interpretan los intervalos de confianza? Si construimos un intervalo de confianza del 95% para un coeficiente β_j , ¿cuál sería la lectura correcta o interpretación correcta sobre este intervalo?
- c) Describe los métodos de selección de variables y sus ventajas y desventajas:
- d) Selección hacia adelante (forward)
 - ii) Selección hacia atrás (backward)
 - iii) selección por pasos (stepwise) y/o mejor subconjunto (best subset)

Explica cómo se utilizan para elegir el modelo final.

Ejercicio 5: Para los datos del ejercicio 1 de la liga de Fútbol. Realizar el ejercicio en R y Python.

- a) Usar el algoritmo de selección hacia adelante para seleccionar un modelo de regresión.
- b) Usar el algoritmo de selección hacia atrás para seleccionar un modelo de regresión.
- c) Usar el algoritmo de regresión por pasos para seleccionar un modelo de regresión.
- d) Comenta los modelos finales en cada uno de los casos anteriores. ¿Cuál tiene más sentido? ¿Cuál modelo usarían?

Table 2.1: Factores que influyen en el tiempo de coccion segun diferentes niveles de ancho del horno y diferentes temperaturas

yp	x1	x2
6.40	1.32	1.15
15.05	2.69	3.40
18.75	3.56	4.10
30.25	4.41	8.75
44.85	5.35	14.82
48.85	6.20	15.15
51.55	7.12	15.32
61.50	8.87	18.18
100.44	9.80	35.19
111.42	10.65	40.40

2.7 Validación de Supuestos

Ejemplo: Se llevó a cabo un conjunto de ensayos experimentales con un horno para determinar una forma de predecir el tiempo de cocción, y , a diferentes niveles de ancho del horno, x_1 , y a diferentes temperaturas, x_2 . Se registraron los siguientes datos:

```
yp <-c(6.40, 15.05, 18.75, 30.25, 44.85, 48.85, 51.55, 61.50, 100.44, 111.42)
x1 <-c(1.32, 2.69, 3.56, 4.41, 5.35, 6.20, 7.12, 8.87, 9.80, 10.65)
x2 <-c(1.15, 3.40, 4.10, 8.75, 14.82, 15.15, 15.32, 18.18, 35.19, 40.40)
datos<-data.frame(yp, x1, x2)
kable(datos, caption = "Factores que influyen en el tiempo de coccion segun diferentes niveles de
```

- Variable dependiente y = tiempo de cocción
- Variable independiente x_1 = ancho del horno
- Variable independiente x_2 = diferentes temperaturas

Vamos a visualizar los datos:

Plot

```
g1 <- ggplot(data = datos, mapping = aes(x = x1, y = yp)) +
  geom_point(color = "forestgreen", size = 2) +
  labs(title = 'yp ~ x1', x = 'x1') +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "black") +
```

```

theme_bw() +
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))

g2 <- ggplot(data = datos, mapping = aes(x = x2, y = yp)) +
  geom_point(color = "orange", size = 2) +
  labs(title = 'yp ~ x2', x = 'x2') +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "black") +
  theme_bw() +
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))


g1+g2

```

```

## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'

```



Ahora, vamos a analizar algunos de los supuestos.

2.7.1 Multicolinealidad

Multicolinealidad

```
variables <- data.frame(x1,x2)
m_cor <- cor(variables,method = "pearson")
m_cor
```


```
##           x1           x2
## x1 1.0000000 0.9375592
## x2 0.9375592 1.0000000
```

Plot

```
library(corrplot)
```

```
## corrplot 0.95 loaded
```

```
corrplot(m_cor)
```



Hay una fuerte correlación entre las variables, lo cual es un problema dado que las variables deberían ser independientes.

Vamos a construir dos modelos.

Modelos

```
modelo1 <- lm(formula = yp ~ x1 + x2, data = datos)

summary(modelo1)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = yp ~ x1 + x2, data = datos)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.8475 -0.3438  0.0043  0.2554  1.1578
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  0.57723     0.59865   0.964   0.367
## x1           2.70957     0.19935  13.592 2.75e-06 ***
## x2           2.05033     0.04743  43.227 9.26e-10 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.6481 on 7 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9997, Adjusted R-squared:  0.9997
## F-statistic: 1.304e+04 on 2 and 7 DF,  p-value: 3.166e-13
```

El intercepto parece no ser significativo. Vamos a construir un segundo modelo usando solo x_2 que parece ser más significativa.

Modelo 2

```
modelo2 <- lm(formula = yp ~ x2, data = datos)

summary(modelo2)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = yp ~ x2, data = datos)
##
```



```
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -4.0226 -1.7338 -0.3497  1.0695  5.8668
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  7.36967    1.61355   4.567  0.00183 **
## x2           2.65476    0.08077  32.869 8.01e-10 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 3.173 on 8 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9926, Adjusted R-squared:  0.9917
## F-statistic: 1080 on 1 and 8 DF,  p-value: 8.005e-10
```

El ANOVA nos puede ayudar a ver cual modelo es más significativo. Se usan las hipótesis siguientes:

H_0 : Las variables que eliminamos no tienen significancia.

H_1 : Las variables son significativas.

Si el nuevo modelo es una mejora del modelo original, entonces no podemos rechazar H_0 . Si ese no es el caso, significa que esas variables fueron significativas; por lo tanto rechazamos H_0 .

ANOVA

```
anova(modelo1, modelo2)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Model 1: yp ~ x1 + x2
## Model 2: yp ~ x2
##   Res.Df    RSS Df Sum of Sq    F    Pr(>F)
## 1      7  2.940
## 2      8 80.532 -1    -77.592 184.74 2.745e-06 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Como el p-valor es muy pequeño, menor al valor de significancia 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, lo que nos dice que el segundo modelo no es una mejora del primero.

Como desde el inicio vimos que el coeficiente correspondiente a β_0 no era significativo, vamos a eliminarlo.

Modelo 3

```

modelo3 <- lm(formula = yp ~ x1 + x2 -1, data = datos)

summary(modelo3)

##
## Call:
## lm(formula = yp ~ x1 + x2 - 1, data = datos)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.8103 -0.3698  0.1963  0.3955  1.1807
##
## Coefficients:
##      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## x1   2.87003     0.10927   26.27 4.74e-09 ***
## x2   2.02140     0.03657   55.28 1.27e-11 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.6452 on 8 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9999, Adjusted R-squared:  0.9999
## F-statistic: 4.188e+04 on 2 and 8 DF,  p-value: < 2.2e-16

```

2.7.2 Normalidad en los residuales

Recordemos que los residuos se calculan como la diferencia entre el valor observado (y) y el valor predicho ($\hat{y}$) para cada punto de datos, es decir:

$$e = y - \hat{y}$$

Vamos a hacer un plot de los residuales.


QQ-plot

```

residuales = modelo3$residuals

## Q-Q plot
qqnorm(residuales)
qqline(residuales)


```





Otra forma de obtener este plot es la siguiente.

Plots supuestos

```
plot(modelo3)
```







El test de Shapiro-Wilks plantea la hipótesis nula que una muestra proviene de una distribución normal. Eligimos un nivel de significanza, por ejemplo 0.05, y tenemos una hipótesis alternativa que sostiene que la distribución no es normal. Tenemos entonces lo siguiente:

H_0 : La distribución es normal.

H_1 : La distribución no es normal.

Test Shapiro-Wilks

```
shapiro.test(residuales)
```

```
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  residuales
## W = 0.95058, p-value = 0.6754
```

Como el p-valor es más grande que el valor de significancia, no podemos rechazar la hipótesis nula, por lo tanto los residuales siguen una distribución normal.

2.7.3 Homocedasticidad

Homocedasticidad = varianza constante

- *Correcto*: Si los residuales están dispersos uniformemente a lo largo de todos los valores predichos.
- *Problema*: Si vemos un patrón de embudo (residuales pequeños para predichos bajos y grandes para predichos altos, o viceversa). Esto indica heterocedasticidad.


Linealidad y errores independientes: Si se notan curvas, arcos o patrones sistemáticos, podría indicar que:

- La relación no es estrictamente lineal.
- Falta alguna variable importante en el modelo.
- O hay correlación entre errores.

Una forma de verlo es con el plot de residuales vs valores predichos.

Plots

```
par(mfrow = c(2, 2))
plot(modelo3)
```



En R, existe la función `bptest()`, que es el test de Breusch-Pagan para la heterocedasticidad. Esta función toma como entrada un modelo de regresión y devuelve el resultado de la prueba de hipótesis para la homocedasticidad de los residuos.

H_0 : los residuos tienen varianza constante (homocedasticidad)

H_1 : hay heterocedasticidad en los residuos

El resultado incluye el valor del estadístico de prueba (el valor de la prueba de Breusch-Pagan), el p-valor y el número de grados de libertad. Si el p-valor es menor que el nivel de significancia elegido, se rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad y se concluye que hay heterocedasticidad en los residuos.

Breusch-Pagan

```
library(lmtest)
```

```
## Cargando paquete requerido: zoo
```

```
##
```

```
## Adjuntando el paquete: 'zoo'
```

```
## The following objects are masked from 'package:base':
```

```
##
```

```
##      as.Date, as.Date.numeric
```

```
bptest(modelo3)
```

```
##
```

```
## studentized Breusch-Pagan test
```

```
##
```

```
## data:  modelo3
```

```
## BP = 5.7517, df = 1, p-value = 0.01647
```

Entonces como el p-valor es menor al valor de significancia 0.05, rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe heterocedasticidad en los residuales.

La heterocedasticidad es un problema porque la regresión de mínimos cuadrados ordinarios asume que todos los residuales se extraen de una población que tiene una varianza constante (homocedasticidad).

Una forma de corregirlo es haciendo una transformación de los datos. Vamos a transformar la variable x_1 . *Nota:* Estas transformaciones deben de justificarse y explicar el porque.

Modelo 4

```
modelo4 <- lm(formula = yp ~ log(x1) + x2 -1, data = datos)

summary(modelo4)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = yp ~ log(x1) + x2 - 1, data = datos)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -2.4546 -0.7961 -0.3458  0.9207  2.5270
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## log(x1)    7.52724     0.72213   10.42 6.22e-06 ***
## x2         2.34013     0.06306   37.11 3.05e-10 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 1.578 on 8 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9994, Adjusted R-squared:  0.9993
## F-statistic: 6997 on 2 and 8 DF, p-value: 1.065e-13
```

Si realizamos la prueba de la homocedasticidad.

Test

```
bptest(modelo4)
```


```
##
## studentized Breusch-Pagan test
##
## data: modelo4
## BP = 0.13878, df = 1, p-value = 0.7095
```

Vemos que ahora el p-valor es más grande que el valor de significancia, lo cual nos indica que no podemos rechazar H_0 , es decir ahora si podemos asumir que hay homocedasticidad.

En el modelo final, tendríamos $\beta_0 = 0$, $\beta_1^* = 7.5272361$ y $\beta_2 = 2.3401283$.

Plots finales


```
par(mfrow = c(2, 2))
plot(modelo4)
```



Otras dos pruebas que se pueden usar son `fligner.test` y `leveneTest`.

2.7.4 No autocorrelación

Una forma de revisar este supuesto es con el test de Durbin-Watson. Las hipótesis que se tienen son:

H_0 : No hay autocorrelación en los errores (los residuales son independientes).

H_1 : Hay autocorrelación en los errores (generalmente, autocorrelación positiva de primer orden).

El estadístico DW toma valores entre 0 y 4:

- DW aproximadamente 2, entonces no hay autocorrelación (se cumple el supuesto).
- $DW < 2$, entonces indica autocorrelación positiva (los errores tienden a repetirse).
- $DW > 2$, entonces indica autocorrelación negativa (los errores tienden a alternar signo).

Test D-W

```
dwtest(modelo4)

##
## Durbin-Watson test
##
## data: modelo4
## DW = 1.036, p-value = 0.02046
## alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0
```

2.7.5 Predicciones

Vamos a predecir por último un valor. Para 2.10 de ancho del horno y una temperatura de 3.10 , ¿cuánto sería el tiempo de cocción?

Predicciones

```
nuevo.dato <- data.frame(x1 = 2.10, x2 = 3.10)

prediccion <- predict(modelo4, newdata = nuevo.dato)

paste("La cantidad estimada de tiempo de coccion es:", round(prediccion, 2))

## [1] "La cantidad estimada de tiempo de coccion es: 12.84"
```

2.7.6 Ejercicios

Ejercicio 1: Para los datos de `Datarium marketing`, analiza los supuestos. Explica tus resultados y sube tus respuestas a github.

2.8 Análisis de Varianza

Ejemplo 1: Supongamos que un cierto tipo de motor de cohete se fabrica uniendo un propulsor tipo A y un propulsor tipo B. La fuerza del enlace entre los dos propulsores es una característica de importancia y se sospecha que está relacionada con la edad (en semanas) del lote del propulsor tipo B. Se tiene una muestra de tamaño 20 de la fuerza del enlace y la edad del lote del propulsor tipo B que fue utilizado.

```

datos <- data.frame(
  Fuerza_enlace = c(
    2158.70, 1678.15, 2316.00, 2061.30, 2207.50,
    1708.30, 1784.70, 2575.00, 2357.90, 2256.70,
    2165.20, 2399.55, 1779.80, 2336.75, 1765.30,
    2053.50, 2414.40, 2200.50, 2654.20, 1753.70
  ),
  Edad_lote = c(
    15.50, 23.75, 8.00, 17.00, 5.50,
    19.00, 24.00, 2.50, 7.50, 11.00,
    13.00, 3.75, 25.00, 9.75, 22.00,
    18.00, 6.00, 12.50, 2.00, 21.50
  )
)

datos

```

##	Fuerza_enlace	Edad_lote
## 1	2158.70	15.50
## 2	1678.15	23.75
## 3	2316.00	8.00
## 4	2061.30	17.00
## 5	2207.50	5.50
## 6	1708.30	19.00
## 7	1784.70	24.00
## 8	2575.00	2.50
## 9	2357.90	7.50
## 10	2256.70	11.00
## 11	2165.20	13.00
## 12	2399.55	3.75
## 13	1779.80	25.00
## 14	2336.75	9.75
## 15	1765.30	22.00
## 16	2053.50	18.00
## 17	2414.40	6.00
## 18	2200.50	12.50
## 19	2654.20	2.00
## 20	1753.70	21.50


Un modelo completo sería $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i$, el cual se ve como:

```

modelo_completo <- lm(Fuerza_enlace ~ Edad_lote, data = datos)


```

```
plot(datos$Edad_lote, datos$Fuerza_enlace,  
     main = "Modelo completo",  
     xlab = "Edad del lote (semanas)",  
     ylab = "Fuerza del enlace (psi)",  
     pch = 19, col = "blue")  
  
# Agregar la recta de regresión  
abline(modelo_completo, col = "red", lwd = 2)
```



```
ggplot(datos, aes(x = Edad_lote, y = Fuerza_enlace)) +  
  geom_point(color = "blue", size = 3) +  
  geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, color = "red") +  
  labs(  
    title = "Modelo completo",  
    x = "Edad del lote (semanas)",  
    y = "Fuerza del enlace (psi)"  
  ) +  
  theme_minimal()
```

```
## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```




Queremos ver si un modelo reducido explica mejor o no a los datos. En este caso el modelo con menos parámetros o modelo reducido es el modelo que describirá la hipótesis nula H_0 . En regresión lineal simple, es común plantear $H_0 : \beta_1 = 0$, de manera que el modelo reducido es $y_i = \beta_0 + \epsilon_i$, es decir, cada valor y_i es función de una constante (la media) y un error, este modelo se vería como:


```
modelo_reducido <- lm(Fuerza_enlace ~ 1, data = datos)

plot(datos$Edad_lote, datos$Fuerza_enlace,
     main = "Modelo reducido",
     xlab = "Edad del lote (semanas)",
     ylab = "Fuerza del enlace (psi)",
     pch = 19, col = "blue")

# Agregar la recta de regresión
abline(modelo_reducido, col = "red", lwd = 2)
```



```
ggplot(datos, aes(x = Edad_lote, y = Fuerza_enlace)) +  
  geom_point() +  
  stat_smooth(method = "lm", formula = y ~ 1, se = TRUE, fullrange = TRUE) +  
  labs(title = "Modelo reducido",  
        x = "Edad del lote (semanas)", y = "Fuerza del enlace (psi)") +  
  theme_minimal()
```



¿Cuál modelo es mejor? Debemos obtener los estimadores para cada modelo y la suma de cuadrados de los errores.

- La suma de los cuadrados de los errores $SSE(C) = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$, la cual tiene $n - 2$ grados de libertad para el modelo completo.
- La suma de los cuadrados de los errores del modelo reducido $SSE(R) = \sum (y_i - \bar{y})^2$, la cual tiene $n - 1$ grados de libertad para el modelo reducido.

Hay que tener en cuenta que $SSE(R)$ siempre es mayor a $SSE(C)$, por lo tanto si la diferencia es muy pequeña, entonces tiene sentido utilizar el modelo reducido, pero si la diferencia es muy grande, entonces el parámetro adicional agrega información importante al modelo.

Se usa la prueba F general:

$$F_0 = \frac{\left(\frac{SSE(R) - SSE(C)}{(n-1) - (n-2)} \right)}{\frac{SSE(C)}{n-2}} = \frac{SCE(C)}{\frac{SSE(C)}{n-2}}$$

La cantidad $SSE(R) - SSE(C)$ representa la suma de cuadrados explicada por la variable x , a esta cantidad la vamos a denotar por SCE .

Entonces, rechazar la hipótesis nula H_0 implica rechazar el modelo reducido y no rechazar H_0 implica rechazar el modelo completo.

```
anova(modelo_completo)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Response: Fuerza_enlace
##           Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## Edad_lote  1 1527483 1527483   165.38 1.643e-10 ***
## Residuals 18  166255    9236
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Como el p-valor es muy pequeño, se rechaza H_0 por lo que se concluye que hay pruebas suficientes sobre la existencia de asociación lineal de la edad de lote y la fuerza del enlace.

Todo esto, se puede llevar al caso de regresión lineal múltiple.

Ejemplo: Considere los siguientes datos en los que se tienen mediciones del tamaño de infarto, área de la región en riesgo y dos variables que identifican el tipo de tratamiento utilizado en 32 pacientes. Se busca describir el tamaño del infarto a través de las otras 3-variables. Para este caso, vamos a ajustar un modelo de regresión lineal múltiple completo y después vamos a hacer pruebas sobre quitar algunas variables.

```
datos <- data.frame(
  Paciente = 1:32,
  Infarc = c(
    0.119, 0.190, 0.395, 0.469, 0.130, 0.311, 0.418, 0.480,
    0.687, 0.847, 0.062, 0.122, 0.033, 0.102, 0.206, 0.249,
    0.220, 0.299, 0.350, 0.350, 0.588, 0.379, 0.149, 0.316,
    0.390, 0.429, 0.477, 0.439, 0.446, 0.538, 0.625, 0.974
  ),
  Area = c(
    0.34, 0.64, 0.76, 0.83, 0.73, 0.82, 0.95, 1.06,
    1.20, 1.47, 0.44, 0.77, 0.90, 1.07, 1.01, 1.03,
    1.16, 1.21, 1.20, 1.22, 0.99, 0.77, 1.05, 1.06,
    1.02, 0.99, 0.97, 1.12, 1.23, 1.19, 1.22, 1.40
  ),
  X2 = c(
    0,0,0,0,0,0,0,0,
    0,0,1,1,1,1,1,1,
    1,1,1,1,1,0,0,0,
    0,0,0,0,0,0,0,0
  ),
)
```



```

X3 = c(
  0,0,0,0,0,0,0,0,
  0,0,0,0,0,0,0,0,
  0,0,0,0,0,0,1,1,
  1,1,1,1,1,1,1,1
)
)
datos

```

##	Paciente	Infarc	Area	X2	X3
## 1	1	0.119	0.34	0	0
## 2	2	0.190	0.64	0	0
## 3	3	0.395	0.76	0	0
## 4	4	0.469	0.83	0	0
## 5	5	0.130	0.73	0	0
## 6	6	0.311	0.82	0	0
## 7	7	0.418	0.95	0	0
## 8	8	0.480	1.06	0	0
## 9	9	0.687	1.20	0	0
## 10	10	0.847	1.47	0	0
## 11	11	0.062	0.44	1	0
## 12	12	0.122	0.77	1	0
## 13	13	0.033	0.90	1	0
## 14	14	0.102	1.07	1	0
## 15	15	0.206	1.01	1	0
## 16	16	0.249	1.03	1	0
## 17	17	0.220	1.16	1	0
## 18	18	0.299	1.21	1	0
## 19	19	0.350	1.20	1	0
## 20	20	0.350	1.22	1	0
## 21	21	0.588	0.99	1	0
## 22	22	0.379	0.77	0	0
## 23	23	0.149	1.05	0	1
## 24	24	0.316	1.06	0	1
## 25	25	0.390	1.02	0	1
## 26	26	0.429	0.99	0	1
## 27	27	0.477	0.97	0	1
## 28	28	0.439	1.12	0	1
## 29	29	0.446	1.23	0	1
## 30	30	0.538	1.19	0	1
## 31	31	0.625	1.22	0	1
## 32	32	0.974	1.40	0	1

El modelo completo sería $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \beta_3 x_{3i} + \epsilon_i$.

```
modelo_c <- lm(Infarc ~ Area + X2 + X3, data = datos)
summary(modelo_c)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Infarc ~ Area + X2 + X3, data = datos)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.28175 -0.06704 -0.01658  0.06294  0.35970
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -0.14927     0.10377  -1.439 0.161376
## Area         0.63395     0.10927   5.802 3.12e-06 ***
## X2          -0.25005     0.06053  -4.131 0.000295 ***
## X3          -0.08563     0.06641  -1.289 0.207831
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.138 on 28 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6456, Adjusted R-squared:  0.6076
## F-statistic:    17 on 3 and 28 DF,  p-value: 1.748e-06
```

Con este modelo se obtiene la siguiente tabla de ANOVA.

```
anov <- anova(modelo_c)
anov
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Response: Infarc
##           Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## Area       1  0.62492  0.62492  32.8245 3.801e-06 ***
## X2         1  0.31453  0.31453  16.5210 0.0003533 ***
## X3         1  0.03165  0.03165   1.6624 0.2078307
## Residuals 28  0.53307  0.01904
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
## los p-valores en la última columna se pueden obtener con:
#pf(F_0, df1, df2, lower.tail = FALSE)
```

1) Pruebas sobre uno de los parámetros: $H_0 : \beta_1 = 0$, modelo reducido $y_i = \beta_0 + \beta_2 x_{2i} + \beta_3 x_{3i} + \epsilon_i$. Vamos a denotar a la suma de los cuadrados de los errores asociada a este modelo $SSE(x_1)$, la cual tiene $n - 3$ grados de libertad asociados (tenemos 3 parámetros a estimar $\beta_0, \beta_2, \beta_3$). Como el p-valor es muy pequeño, se rechaza a H_0 y se concluye que hay suficiente evidencia para decir que el tamaño del infarto está significativamente relacionado con el tamaño del área de riesgo.

```
SCE_X1 <- anov$`Sum Sq`[1]
SSE_C <- anov$`Sum Sq`[4]
df2 <- anov$Df [4]
df1 <- nrow(datos) - 3 - df2
F_g <- (SCE_X1/df1) / (SSE_C/df2)
F_g
```

```
## [1] 32.82447
```

2) Pruebas sobre todos los parámetros: En este caso tenemos $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ vs $H_1 : \beta_j \neq 0$ p.a. j . Es decir, el modelo reducido sería $y_i = \beta_0 + \epsilon_i$. La prueba F general es la misma, pero ahora la suma de cuadrados asociada al modelo reducido $SSE(x_1, x_2, x_3)$ tiene $n - 1$ grados de libertad ya que solo debemos estimar β_0 .

```
SCE_X1X2X3 <- sum(anov$`Sum Sq`[1:3])
df1 <- nrow(datos) - 1 - df2

F_all <- (SCE_X1X2X3 / df1) / (SSE_C / df2)
F_all
```

```
## [1] 17.00263
```

El cual tiene un p -valor asociado a una distribución F con 3 y 28 grados de libertad.

```
pf(F_all, df1 = 3, df2 = 28, lower.tail = FALSE)
```

```
## [1] 1.747583e-06
```

Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula. Notemos que este valor coincide con el que nos da el `summary` del modelo.

```
summary(modelo_c)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Infarc ~ Area + X2 + X3, data = datos)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.28175 -0.06704 -0.01658  0.06294  0.35970
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -0.14927     0.10377  -1.439  0.161376
## Area         0.63395     0.10927   5.802 3.12e-06 ***
## X2          -0.25005     0.06053  -4.131 0.000295 ***
## X3          -0.08563     0.06641  -1.289 0.207831
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.138 on 28 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6456, Adjusted R-squared:  0.6076
## F-statistic:    17 on 3 and 28 DF,  p-value: 1.748e-06
```

3) Pruebas sobre un subconjunto de los parámetros: Supongamos ahora que $H_0 : \beta_2 = \beta_3 = 0$. Es decir, el modelo reducido sería $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \epsilon_i$. La prueba es similar pero solo usamos x_2 y x_3 .

```
SCE_X2X3 <- sum(anov$`Sum Sq`[2:3])
df1 <- nrow(datos) - 2 - df2

F_dos <- (SCE_X2X3 / df1) / (SSE_C / df2)
F_dos
```

```
## [1] 9.091716
```

El p -valor asociado a la prueba F con 2 y 28 grados de libertad es:

```
pf(F_dos, df1 = 2, df2 = 28, lower.tail = FALSE)
```

```
## [1] 0.0009065789
```

Por lo que se rechaza de nuevo la hipótesis nula.

2.8.1 Ejercicios

Ejercicio 1(R): Para el datasets `datasets::trees`, realice las pruebas de hipótesis para determinar si: 1) El modelo solo con la variable `Girth` es mejor que el modelo completo. 2) El modelo sin `Girth` y `Height` es mejor que el completo. Usar la tabla de ANOVA para calcular el estadístico F_0 y encontrar el p-valor asociado usando `pf(F_0, df1, df2, lower.tail = FALSE)`. Justifique su respuesta y suba su código en R a github.

Ejercicio 2(Python): Para el dataset de `marketing`, realice las pruebas de hipótesis utilizando la tabla de ANOVA sobre: 1) Uno de los parámetros, justificar cual. 2) Todos los parámetros. 3) Un subconjunto de parámetros, justificar cual. Usar la tabla de ANOVA para calcular el estadístico F_0 y encontrar el p-valor asociado usando `pf(F_0, df1, df2, lower.tail = FALSE)`. Justifique su respuesta y suba su código en Python a github.

2.9 Selección del modelo

Suponga que se busca una ecuación de regresión lineal entre la variable respuesta y y las variables predictoras $x_1, \dots, x_p$. Suponga que se tiene el conjunto de todas las posibles variables a incluir en el modelo $z_1, \dots, z_k$ que son funciones de las x 's. Se busca entonces un modelo que incluya la mayor cantidad de variables z posible para que el error sea pequeño. Pero, considerando la varianza y el costo de obtener más datos, también se busca incluir el menor número de posibles variables z en el modelo.

No existe un solo método de selección de modelos y no todos conducen a la misma solución. Vamos a analizar tres métodos:

- 1) Todos los modelos posibles y el mejor subconjunto de modelos.
- 2) Selección paso a paso.
- 3) Eliminación hacia atrás.

2.9.1 Todos los modelos posibles

Si el número de variables z es grande, esto puede ser un problema. Supongamos que tenemos k variables, donde cada variable puede o no estar en el modelo, entonces tenemos un total de 2^k posibles modelos de los cuales se debe elegir el

mejor a partir de criterios como R^2 , R_{adj}^2 , etc. Vamos a ver algunos de estos criterios.

Estadística C_p de Mallows

Supongamos que tenemos $k + 1$ variables regresoras incluyendo el intercepto, de las cuales vamos a elegir p . Denotemos por SSE_p la suma de cuadrados de la regresión respectiva de tomar p variables, la estadística C_p de Mallows está dada por

$$C_p = \frac{SSE_p}{\hat{\sigma}^2} - (n - 2p)$$

donde $\hat{\sigma}^2$ corresponde al modelo con todas las variables y se supone que es un estimador insesgado para la varianza σ^2 . Si el modelo ajusta bien, esperaríamos que $\mathbb{E}(SSE_p) = (n - p)\sigma^2$, de manera que:

$$\mathbb{E}(C_p) \approx p,$$

en consecuencia, si graficamos C_p en función de p , los modelos adecuados arrojarán puntos cerca de la recta $C_p = p$.

Criterio de información de Akaike (CIA)

Se define como

$$CIA = e^{\frac{2p}{n}} \frac{SSE}{n},$$

donde p es el número de variables regresoras incluyendo el intercepto. Esta función incluye una penalización por imponer regresoras. Al comparar modelos, se busca el que tenga menor CIA . Muchas veces esta estadística se define como $\log(CIA)$, es decir:

$$\frac{2p}{n} + \log\left(\frac{SSE}{n}\right)$$

con el cual las conclusiones son las mismas.

Criterio de información de Schwars (CIS)

Similar al CIA, el CIS se define como

$$CIS = n^{\frac{p}{n}} \frac{SSE}{n},$$

cuyo logaritmo es

$$\frac{p}{n} \log n + \log \frac{SSE}{n}.$$

Este criterio impone mayor penalización por agregar variables. Al comparar modelos, se busca el que tenga menor CIS.

2.9.1.1 Mejor subconjunto

Una alternativa a la comparación de todos los modelos posibles es la búsqueda del mejor subconjunto de modelos que se pueden hacer en distintos programas y compararlos. En R, existe la función `regsubsets`, la cual incluye los criterios de comparación R^2 , C_p , BIC (Bayesian Information Criterion). Esta función utiliza los métodos *forward and backward stepwise*.

2.9.2 Selección paso a paso

Las técnicas de selección paso a paso consisten en elaborar un modelo inicial a partir del cual se agrega o se elimina una variable para comparar hasta encontrar el mejor modelo.

2.9.2.1 Selección paso a paso hacia adelante

Conocido como *forward regression*, consiste en comenzar con el modelo en el que la única variable regresora es la que mejor describe el comportamiento de y y a partir de ahí ir agregando variables regresoras una por una.

El orden en el que se agregan puede variar y se pueden usar diferentes estadísticas o criterios para decidir cual agregar. Se calculan las estadísticas del modelo actual al agregar variable y elegir el modelo con la mejor estadística, siempre que sea un mejor modelo.

2.9.2.2 Selección paso a paso hacia atrás

Conocido como *backward regression*, consiste en comenzar con el modelo que incluye todas las variables e ir eliminando una a una de acuerdo a algún criterio.

Ambas técnicas se pueden mezclar, de manera que en cada paso se evalúa la estadística correspondiente al quitar o agregar alguna de las variables y se elige la mejor opción.

2.9.3 Ejemplos

2.9.3.1 Todos los modelos posibles

En este ejemplo veremos cómo aplicar el método de selección de modelos que implica el análisis de todos los modelos posibles. Primero, necesitaremos varios paquetes.

```
library(ggplot2)
library(olsrr)
```


```
##
## Adjuntando el paquete: 'olsrr'
```

```
## The following object is masked from 'package:datasets':
##
##      rivers
```

```
library(leaps)
library(GGally)
```


Ejemplo 1: Cargamos los datos de `cemento.txt` y hacemos un rápido análisis con el diagrama de dispersión:

```
cemento<-read.table("D:/Users/hayde/Documents/R_sites/MultivariateStatisticalAnalysis/cemento.txt")
ggpairs(cemento)
```

A continuación ajustamos el modelo con TODAS las variables independientes y calculamos la estadística C_p . Para facilitar la interpretación graficamos la C_p para cada modelo:

```
modelo.full<-lm(y~., cemento, x=T, y=T)
## calcula el AIC, CIS, etc sobre todos los subconjuntos posibles
outs<-leaps(modelo.full$x, cemento$y, int=FALSE)
plot(outs$size,outs$Cp, log="y",cex=0.3)
lines(outs$size,outs$size)
text(outs$size, outs$Cp, labels=row(outs$which), cex=0.5, pos=4)
```



```
#Mejor modelo por la regla Cp  p  (p = número de predictores)

idx_best_rule <- which.min(abs(outs$Cp - outs$size))

#Variables que entran en cada mejor modelo
noms_x <- colnames(modelo.full$x)           # nombres de los predictores
vars_rule <- noms_x[ outs$which[idx_best_rule, ] ]


vars_rule
```

```
## [1] "(Intercept)" "x1"          "x2"          "x3"          "x4"
```

Recordemos que nos interesan los modelos en los que $C_p = p$.

Ejemplo 2: Vamos a usar la base de datos `mtcars`. Otra manera de analizar todos los modelos posibles:

```
library(olsrr)
modelo.full.cars<-lm(mpg~., mtcars)
ejemplo<-ols_step_all_possible(modelo.full.cars)
plot(ejemplo)
```




Observe que en los triángulos rojos aparecen los mejores modelos para cada p en función de la estadística correspondiente.

Ejemplo 3: R tiene una función que nos muestra el mejor modelo para cada número de variables. Vamos a regresar al conjunto de datos `cemento`.

```
mejor<-regsubsets(y~., cemento)
summary(mejor)
```

```
## Subset selection object
## Call: regsubsets.formula(y ~ ., cemento)
## 4 Variables (and intercept)
##    Forced in Forced out
## x1      FALSE      FALSE
## x2      FALSE      FALSE
## x3      FALSE      FALSE
## x4      FALSE      FALSE
## 1 subsets of each size up to 4
## Selection Algorithm: exhaustive
##      x1 x2 x3 x4
## 1 ( 1 ) " " " " " "*"
## 2 ( 1 ) "*" "*" " " " "
## 3 ( 1 ) "*" "*" " " "*"
## 4 ( 1 ) "*" "*" "*" "*"
##
```

```
plot(mejor,scale="Cp")
```



La gráfica muestra los cuatro modelos y su C_p , por ejemplo, el modelo que incluye al intercepto, a x_1 y a x_2 tiene una C_p cercana a 2.7.

2.9.4 Selección paso a paso

Ejemplo 1: Para analizar el método de selección paso a paso usaremos los datos *swiss* del paquete *MASS*. Para ello, el primer paso es ajustar el modelo con TODAS las variables independientes

```
library(MASS)
```

```
##
## Adjuntando el paquete: 'MASS'

## The following object is masked from 'package:olsrr':
##
##      cement

## The following object is masked from 'package:patchwork':
##
##      area

## The following object is masked from 'package:dplyr':
##
##      select
```

```
modelo_completo<-lm(Fertility~., swiss)
```

Podemos usar la función *step* en las tres direcciones (*forward*, *backward* o *both*)

```
paso_a_paso<-stepAIC(modelo_completo, direction="both", trace=T)
```

```
## Start:  AIC=190.69
## Fertility ~ Agriculture + Examination + Education + Catholic +
##      Infant.Mortality
##
##              Df Sum of Sq    RSS    AIC
## - Examination      1      53.03 2158.1 189.86
## <none>                  2105.0 190.69
## - Agriculture      1     307.72 2412.8 195.10
## - Infant.Mortality  1     408.75 2513.8 197.03
## - Catholic         1     447.71 2552.8 197.75
## - Education        1    1162.56 3267.6 209.36
```

```
##
## Step:  AIC=189.86
## Fertility ~ Agriculture + Education + Catholic + Infant.Mortality
##
##              Df Sum of Sq    RSS    AIC
## <none>                2158.1 189.86
## + Examination         1     53.03 2105.0 190.69
## - Agriculture          1    264.18 2422.2 193.29
## - Infant.Mortality     1    409.81 2567.9 196.03
## - Catholic             1    956.57 3114.6 205.10
## - Education            1   2249.97 4408.0 221.43
```

```
summary(paso_a_paso)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Fertility ~ Agriculture + Education + Catholic +
##     Infant.Mortality, data = swiss)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -14.6765  -6.0522   0.7514   3.1664  16.1422
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   62.10131     9.60489   6.466 8.49e-08 ***
## Agriculture   -0.15462     0.06819  -2.267  0.02857 *
## Education     -0.98026     0.14814  -6.617 5.14e-08 ***
## Catholic       0.12467     0.02889   4.315 9.50e-05 ***
## Infant.Mortality 1.07844     0.38187   2.824 0.00722 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 7.168 on 42 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6993, Adjusted R-squared:  0.6707
## F-statistic: 24.42 on 4 and 42 DF,  p-value: 1.717e-10
```

Ejemplo 2: O podemos usar el paquete *olsrr*. Base de datos surgical.

```
modelo_completo_sur<-lm(y~., surgical)
ols_step_forward_aic(modelo_completo_sur, details = T)
```

```
## Forward Selection Method
```

```
## -----
##
## Candidate Terms:
##
## 1. bcs
## 2. pindex
## 3. enzyme_test
## 4. liver_test
## 5. age
## 6. gender
## 7. alc_mod
## 8. alc_heavy
##
##
## Step      => 0
## Model     => y ~ 1
## AIC       => 802.606
##
## Initiating stepwise selection...
##
##                               Table: Adding New Variables
## -----
## Predictor      DF      AIC      SBC      SBIC      R2      Adj. R2
## -----
## liver_test      1    771.875    777.842    616.009    0.45454    0.44405
## enzyme_test     1    782.629    788.596    626.220    0.33435    0.32154
## pindex          1    794.100    800.067    637.196    0.17680    0.16097
## alc_heavy       1    794.301    800.268    637.389    0.17373    0.15784
## bcs             1    797.697    803.664    640.655    0.12010    0.10318
## alc_mod         1    802.828    808.795    645.601    0.03239    0.01378
## gender          1    802.956    808.923    645.725    0.03009    0.01143
## age            1    803.834    809.801    646.572    0.01420    -0.00476
## -----
##
## Step      => 1
## Added     => liver_test
## Model     => y ~ liver_test
## AIC       => 771.8753
##
##                               Table: Adding New Variables
## -----
## Predictor      DF      AIC      SBC      SBIC      R2      Adj. R2
## -----
## alc_heavy      1    761.439    769.395    605.506    0.56674    0.54975
## enzyme_test    1    762.077    770.033    606.090    0.56159    0.54440
## pindex         1    770.387    778.343    613.737    0.48866    0.46861
```

[illegible]


```

## Predictor    DF      AIC      SBC      SBIC      R2      Adj. R2
## -----
## bcs          1    730.620    744.543    579.638    0.78091    0.75808
## age          1    737.680    751.603    585.012    0.75030    0.72429
## gender       1    737.712    751.635    585.036    0.75016    0.72413
## alc_mod      1    737.713    751.636    585.037    0.75015    0.72413
## -----
##
## Step        => 5
## Added       => bcs
## Model       => y ~ liver_test + alc_heavy + enzyme_test + pindex + bcs
## AIC         => 730.6204
##
##                               Table: Adding New Variables
## -----
## Predictor    DF      AIC      SBC      SBIC      R2      Adj. R2
## -----
## age          1    732.494    748.406    581.938    0.78142    0.75351
## gender       1    732.551    748.463    581.978    0.78119    0.75325
## alc_mod      1    732.614    748.526    582.023    0.78093    0.75297
## -----
##
##
## No more variables to be added.
##
## Variables Selected:
##
## => liver_test
## => alc_heavy
## => enzyme_test
## => pindex
## => bcs
##
##
##                               Stepwise Summary
## -----
## Step  Variable      AIC      SBC      SBIC      R2      Adj. R2
## -----
## 0      Base Model    802.606    806.584    646.794    0.00000    0.00000
## 1      liver_test    771.875    777.842    616.009    0.45454    0.44405
## 2      alc_heavy     761.439    769.395    605.506    0.56674    0.54975
## 3      enzyme_test   750.509    760.454    595.297    0.65900    0.63854
## 4      pindex        735.715    747.649    582.943    0.75015    0.72975
## 5      bcs           730.620    744.543    579.638    0.78091    0.75808
## -----

```

```
##
## Final Model Output
## -----
##
##                               Model Summary
## -----
## R                               0.884          RMSE                184.276
## R-Squared                       0.781          MSE                33957.712
## Adj. R-Squared                  0.758          Coef. Var           27.839
## Pred R-Squared                  0.700          AIC                 730.620
## MAE                             137.656         SBC                 744.543
## -----
## RMSE: Root Mean Square Error
## MSE: Mean Square Error
## MAE: Mean Absolute Error
## AIC: Akaike Information Criteria
## SBC: Schwarz Bayesian Criteria
##
##                               ANOVA
## -----
##                               Sum of
##                               Squares      DF      Mean Square      F      Sig.
## -----
## Regression    6535804.090           5      1307160.818    34.217    0.0000
## Residual      1833716.447          48        38202.426
## Total         8369520.537          53
## -----
##
##                               Parameter Estimates
## -----
## model      Beta      Std. Error      Std. Beta      t      Sig.      lower
## -----
## (Intercept) -1178.330      208.682           -5.647      0.000      -1597.914
## liver_test   58.064       40.144           0.156       1.446      0.155      -22.652
## alc_heavy    317.848       71.634           0.314       4.437      0.000      173.818
## enzyme_test   9.748        1.656           0.521       5.887      0.000        6.419
## pindex        8.924        1.808           0.380       4.935      0.000        5.288
## bcs          59.864       23.060           0.241       2.596      0.012       13.498
## -----
```

```
ols_step_backward_aic(modelo_completo_sur)
```

```
##
##
```

```

##                               Stepwise Summary
## -----
## Step      Variable      AIC      SBC      SBIC      R2      Adj. R2
## -----
## 0         Full Model    736.390  756.280  586.665  0.78184  0.74305
## 1         alc_mod      734.407  752.308  583.884  0.78177  0.74856
## 2         gender       732.494  748.406  581.290  0.78142  0.75351
## 3         age          730.620  744.543  578.844  0.78091  0.75808
## -----
##
## Final Model Output
## -----
##
##                               Model Summary
## -----
## R              0.884      RMSE              184.276
## R-Squared      0.781      MSE              33957.712
## Adj. R-Squared 0.758      Coef. Var      27.839
## Pred R-Squared 0.700      AIC              730.620
## MAE            137.656     SBC              744.543
## -----
## RMSE: Root Mean Square Error
## MSE: Mean Square Error
## MAE: Mean Absolute Error
## AIC: Akaike Information Criteria
## SBC: Schwarz Bayesian Criteria
##
##                               ANOVA
## -----
##                               Sum of
##                               Squares      DF      Mean Square      F      Sig.
## -----
## Regression    6535804.090      5      1307160.818    34.217    0.0000
## Residual      1833716.447     48      38202.426
## Total         8369520.537     53
## -----
##
##                               Parameter Estimates
## -----
## model      Beta      Std. Error      Std. Beta      t      Sig.      lower      upper
## -----
## (Intercept) -1178.330    208.682           -5.647    0.000    -1597.914    -758.74
## bcs         59.864     23.060           0.241    2.596     13.498    106.23
## pindex      8.924      1.808           0.380    4.935     5.288    12.55
## enzyme_test  9.748      1.656           0.521    5.887     6.419    13.07
## liver_test  58.064     40.144           0.156    1.446    -22.652    138.77

```

```
## alc_heavy 317.848 71.634 0.314 4.437 0.000 173.818
## -----
```

```
ols_step_forward_aic(modelo_completo_sur)
```

```
##
##
## Stepwise Summary
## -----
## Step Variable AIC SBC SBIC R2 Adj. R2
## -----
## 0 Base Model 802.606 806.584 646.794 0.00000 0.00000
## 1 liver_test 771.875 777.842 616.009 0.45454 0.44405
## 2 alc_heavy 761.439 769.395 605.506 0.56674 0.54975
## 3 enzyme_test 750.509 760.454 595.297 0.65900 0.63854
## 4 pindex 735.715 747.649 582.943 0.75015 0.72975
## 5 bcs 730.620 744.543 579.638 0.78091 0.75808
## -----
##
## Final Model Output
## -----
##
## Model Summary
## -----
## R 0.884 RMSE 184.276
## R-Squared 0.781 MSE 33957.712
## Adj. R-Squared 0.758 Coef. Var 27.839
## Pred R-Squared 0.700 AIC 730.620
## MAE 137.656 SBC 744.543
## -----
## RMSE: Root Mean Square Error
## MSE: Mean Square Error
## MAE: Mean Absolute Error
## AIC: Akaike Information Criteria
## SBC: Schwarz Bayesian Criteria
##
## ANOVA
## -----
## Sum of
## Squares DF Mean Square F Sig.
## -----
## Regression 6535804.090 5 1307160.818 34.217 0.0000
## Residual 1833716.447 48 38202.426
## Total 8369520.537 53
```

```
## -----
##
##                                     Parameter Estimates
## -----
##      model      Beta      Std. Error      Std. Beta      t      Sig      lower      upper
## -----
## (Intercept)    -1178.330      208.682              -5.647      0.000      -1597.914      -758.74
## liver_test      58.064       40.144              0.156      1.446      0.155      -22.652      138.77
## alc_heavy       317.848       71.634              0.314      4.437      0.000      173.818      461.87
## enzyme_test      9.748        1.656              0.521      5.887      0.000        6.419      13.07
## pindex          8.924        1.808              0.380      4.935      0.000        5.288      12.55
## bcs             59.864       23.060              0.241      2.596      0.012       13.498      106.23
## -----
```

Ojo: el parámetro *details=T* nos dará en detalle el proceso con el que se llegó al modelo correspondiente. También hay que tener en cuenta que podríamos llegar a modelos diferentes si usamos métodos diferentes.

Si podemos llegar a resultados diferentes, ¿cómo sabemos cuál es el mejor modelo?

Recordemos que estos métodos se basan en UNA SOLA estadística para ir mejorando el modelo, de manera que, aunque tengamos el modelo con el AIC menor, este podría no ser el mejor en términos del cumplimiento de los supuestos.

Ejemplo 3 Veamos con mas detalle el modelo de *cement.txt*.

```
#Modelo elegido por el algoritmo
modelo.bueno<-lm(y~.-x3, cemento)
summary(modelo.bueno)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = y ~ . - x3, data = cemento)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -3.0919 -1.8016  0.2562  1.2818  3.8982
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  71.6483    14.1424   5.066 0.000675 ***
## x1           1.4519     0.1170  12.410 5.78e-07 ***
## x2           0.4161     0.1856   2.242 0.051687 .
## x4          -0.2365     0.1733  -1.365 0.205395
## ---
```

```
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 2.309 on 9 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9823, Adjusted R-squared:  0.9764
## F-statistic: 166.8 on 3 and 9 DF,  p-value: 3.323e-08
```

```
#Modelo sin x3 y x4
modelo.12<-lm(y~x1+x2, cemento)
summary(modelo.12)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = y ~ x1 + x2, data = cemento)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -2.893 -1.574 -1.302  1.363  4.048
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  52.57735     2.28617   23.00 5.46e-10 ***
## x1           1.46831     0.12130   12.11 2.69e-07 ***
## x2           0.66225     0.04585   14.44 5.03e-08 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 2.406 on 10 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9787, Adjusted R-squared:  0.9744
## F-statistic: 229.5 on 2 and 10 DF,  p-value: 4.407e-09
```

```
#Modelo sin x3 y x2
modelo.14<-lm(y~x1+x4, cemento)
summary(modelo.14)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = y ~ x1 + x4, data = cemento)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -5.0234 -1.4737  0.1371  1.7305  3.7701
##
## Coefficients:
```

```
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 103.09738    2.12398   48.54 3.32e-13 ***
## x1          1.43996     0.13842   10.40 1.11e-06 ***
## x4          -0.61395     0.04864  -12.62 1.81e-07 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 2.734 on 10 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9725, Adjusted R-squared:  0.967
## F-statistic: 176.6 on 2 and 10 DF,  p-value: 1.581e-08
```

Observamos que en el modelo que elige el algoritmo, la variable X4 no es significativa, y por el diagrama de dispersión vemos que está correlacionada con X2, por ello decidimos analizar el modelo eliminando X2 y X4. En ambos modelos las variables son significativas y R^2 es alta.

Comparemos su AIC

```
AIC(modelo.bueno, modelo.12, modelo.14)
```

```
##              df          AIC
## modelo.bueno  5 63.86629
## modelo.12     4 64.31239
## modelo.14     4 67.63411
```

Entre los tres, preferimos al *modelo.12* ya que es el segundo en R^2 , todas las variables son significativas y, aunque no tiene el mínimo AIC, sí es muy parecido y es menor que el AIC del *modelo.14*. Es decir, en conjunto es el *modelo.12* es el que mejor cumple los supuestos y tiene buenas estadísticas.

2.9.4.1 Ejercicios

Ejercicio 1: Para los datos de rendimiento de gasolina. Aplica los tres métodos vistos de selección de modelos. Compara los resultados y especifica cual sería el mejor modelo con cuales estadísticas.

Chapter 3

Análisis de Componentes Principales

El análisis de componentes principales tiene como objetivo reducir la dimensión y conservar en lo posible su estructura, es decir la **forma** de la nube de datos para esto el primer paso es obtener la matriz de correlaciones y la matriz de covarianzas.

Cuando se trabaja con distintas unidades de medición, conviene hacer el análisis de componentes principales haciendo los cálculos con la matriz R de correlaciones.

3.1 Componentes principales para matriz de covarianza

Ejemplo 1: Calcular los componentes principales. Supongamos que las variables aleatorias X_1, X_2, X_3 tienen matriz de covarianza:

```
Sigma <- matrix(c(1, -2, 0,
                  -2, 5, 0,
                  0, 0, 2),
                nrow = 3, byrow = TRUE)
```

Sigma

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]    1  -2    0
```

```
## [2,]  -2    5    0
## [3,]   0    0    2
```

Descomposición en valores y vectores propios:

```
eig <- eigen(Sigma)
# por defecto para matrices simétricas devuelve autovalores en orden decreciente

lambda <- eig$values      # autovalores (orden descendente)
lambda
```

```
## [1] 5.8284271 2.0000000 0.1715729
```

```
P <- eig$vectors      # autovectores (columnas)
P
```

```
##           [,1] [,2]      [,3]
## [1,] -0.3826834  0 0.9238795
## [2,]  0.9238795  0 0.3826834
## [3,]  0.0000000  1 0.0000000
```

Vamos a ordenarlos:

```
autovalores <- eig$values
autovectores <- eig$vectors

cat("Autovalores:\n"); print(round(autovalores, 6))
```

```
## Autovalores:
```

```
## [1] 5.828427 2.000000 0.171573
```

```
cat("Autovectores (columnas):\n"); print(round(autovectores, 6))
```

```
## Autovectores (columnas):
```

```
##           [,1] [,2]      [,3]
## [1,] -0.382683  0 0.923880
## [2,]  0.923880  0 0.382683
## [3,]  0.000000  1 0.000000
```

3.1. COMPONENTES PRINCIPALES PARA MATRIZ DE COVARIANZA83

Verifiquemos que $P'\Sigma P$ debe ser diagonal con los autovalores en la diagonal.

```
P <- autovectores
D <- t(P) %*% Sigma %*% P
cat("P' Sigma P (debe ser diagonal con los autovalores):\n")
```

```
## P' Sigma P (debe ser diagonal con los autovalores):
```

```
print(round(D, 8))
```

```
##          [,1] [,2]      [,3]
## [1,] 5.828427  0 0.0000000
## [2,] 0.000000  2 0.0000000
## [3,] 0.000000  0 0.1715729
```

Comprobación directa: la varianza de cada componente principal y covarianzas entre ellas

$$Y_i = t(a_i) * X \rightarrow var(Y_i) = t(a_i) * \Sigma * a_i$$

$$Y_i = t(P[,i]) * X \rightarrow var(Y_i) = t(P[,i]) * \Sigma * P[,i]$$

```
vars_pc <- sapply(1:3, function(i) as.numeric(t(P[,i]) %*% Sigma %*% P[,i]))
covs_pc <- matrix(0, 3, 3)
for(i in 1:3) for(j in 1:3) covs_pc[i,j] <- as.numeric(t(P[,i]) %*% Sigma %*% P[,j])
cat("Varianzas de las CP (deben ser los autovalores):\n"); print(round(vars_pc, 8))
```

```
## Varianzas de las CP (deben ser los autovalores):
```

```
## [1] 5.8284271 2.0000000 0.1715729
```

```
cat("Matriz de covarianzas entre CP (debe ser prácticamente 0 fuera de la diagonal):\n"); print(r
```

```
## Matriz de covarianzas entre CP (debe ser prácticamente 0 fuera de la diagonal):
```

```
##          [,1] [,2]      [,3]
## [1,] 5.828427  0 0.0000000
## [2,] 0.000000  2 0.0000000
## [3,] 0.000000  0 0.1715729
```

Verificamos que la traza de Σ sea la suma de los autovalores.

```
traza_sigma <- sum(diag(Sigma))
suma_autovalores <- sum(autovalores)
cat("Traza(Sigma) = ", traza_sigma, "\n")
```

```
## Traza(Sigma) = 8
```

```
cat("Suma de autovalores = ", round(suma_autovalores, 8), "\n")
```

```
## Suma de autovalores = 8
```

Las fórmulas explícitas de cada componente principal (coeficientes) son:

```
cat("\nFormas lineales (cada componente principal Yi = ai1 * X1 + ai2 * X2 + ai3 * X3)
```

```
##
```

```
## Formas lineales (cada componente principal Yi = ai1 * X1 + ai2 * X2 + ai3 * X3):
```

```
for(i in 1:3){
  coeffs <- round(P[,i], 6)
  cat(sprintf("Y%d = %6.6f * X1 + %6.6f * X2 + %6.6f * X3\n", i, coeffs[1], coeffs[2],
  })
}
```

```
## Y1 = -0.382683 * X1 + 0.923880 * X2 + 0.000000 * X3
```

```
## Y2 = 0.000000 * X1 + 0.000000 * X2 + 1.000000 * X3
```

```
## Y3 = 0.923880 * X1 + 0.382683 * X2 + 0.000000 * X3
```

Proporción de varianza explicada por cada componente

```
total_var <- sum(diag(Sigma))
prop_explained <- lambda / total_var
cum_prop <- cumsum(prop_explained)
cat("\nProporción de varianza explicada por componente:\n")
```

```
##
```

```
## Proporción de varianza explicada por componente:
```

3.1. COMPONENTES PRINCIPALES PARA MATRIZ DE COVARIANZA85

```
for(i in 1:length(lambda)){
  cat(sprintf("PC%d: lambda=%.6f prop=%.4f cumul=%.4f\n",
              i, lambda[i], prop_explained[i], cum_prop[i]))
}
```

```
## PC1: lambda=5.828427 prop=0.7286 cumul=0.7286
## PC2: lambda=2.000000 prop=0.2500 cumul=0.9786
## PC3: lambda=0.171573 prop=0.0214 cumul=1.0000
```

Correlaciones entre CPs (Y_i) y variables originales (X_j)

$$\rho_{Y_i, X_j} = e_{j,i} * \sqrt{\lambda_i} / \sqrt{\sigma_{jj}}$$

```
sigma_diag <- diag(Sigma)
ncomp <- length(lambda)
rho <- matrix(NA, nrow = ncomp, ncol = ncol(P),
              dimnames = list(paste0("Y", 1:ncomp), paste0("X", 1:ncol(P))))

for(i in 1:ncomp){
  for(j in 1:ncol(P)){
    rho[i,j] <- P[j,i] * sqrt(lambda[i]) / sqrt(sigma_diag[j])
  }
}

cat("\nCorrelaciones rho_{Yi, Xj} (filas = Yi, columnas = Xj):\n")
```

```
##
## Correlaciones rho_{Yi, Xj} (filas = Yi, columnas = Xj):
```

```
print(round(rho, 6))
```

```
##           X1           X2 X3
## Y1 -0.923880 0.997484  0
## Y2  0.000000 0.000000  1
## Y3  0.382683 0.070889  0
```

La variable X_2 , con coeficiente 0.924 recibe el mayor peso en la componente Y_1 . Tiene la mayor correlación con Y_1 . La correlación de X_1 con Y_1 también es alta, casi como la de X_2 , esto indica que las variables son casi igual de importantes en la primer componente. Los tamaños de los coeficientes X_1 y X_2 sugieren que

X_2 contribuye más a la determinación de Y_1 que X_1 . Como ambos coeficientes son grandes y tienen signos opuestos, podemos argumentar que ambas variables son importantes para la interpretación de Y_1 .

Comprobaciones adicionales

$$1) \text{Var}(Y_i) = \lambda_i$$

```
cat("\nVarianzas de Yi (por construccion, deben ser los autovalores):\n")
```

```
##
## Varianzas de Yi (por construccion, deben ser los autovalores):
```

```
print(round(lambda, 6))
```

```
## [1] 5.828427 2.000000 0.171573
```

$$2) \text{Cov}(Y_i, Y_j) = 0 \text{ para } i \neq j.$$

```
cov_Y <- t(P) %*% Sigma %*% P
cat("\nCovarianzas entre Yi (t(P) %*% Sigma %*% P) (debe ser diagonal):\n")
```

```
##
## Covarianzas entre Yi (t(P) %*% Sigma %*% P) (debe ser diagonal):
```

```
print(round(cov_Y, 8))
```

```
##          [,1] [,2]          [,3]
## [1,] 5.828427  0 0.0000000
## [2,] 0.000000  2 0.0000000
## [3,] 0.000000  0 0.1715729
```

$$3) \text{Traza}$$

```
cat("\nTraza(Sigma) = ", sum(diag(Sigma)), " Suma autovalores = ", round(sum(lambda), 8))
```

```
##
## Traza(Sigma) = 8 Suma autovalores = 8
```

3.2 Componentes principales para matriz de correlación

Ejemplo 2: Consideremos la siguiente matriz de covarianza

```
Sigma <- matrix(c(1, 4,
                  4, 100), nrow = 2, byrow = TRUE)
```

Sigma

```
##      [,1] [,2]
## [1,]    1    4
## [2,]    4   100
```

y la siguiente matriz de correlaciones

```
# Matriz de correlacion (estandarizando Sigma)
sd_vec <- sqrt(diag(Sigma))
R_mat <- diag(1/ sd_vec) %*% Sigma %*% diag(1/ sd_vec)
round(R_mat, 6)
```

```
##      [,1] [,2]
## [1,]  1.0  0.4
## [2,]  0.4  1.0
```

Descomposición en valores/vectores propios de Σ :

```
eig_Sigma <- eigen(Sigma)
lambda_S <- eig_Sigma$values
P_S <- eig_Sigma$vectors

cat("Eigen Sigma:\n"); print(round(lambda_S,6))
```

```
## Eigen Sigma:
```

```
## [1] 100.161353  0.838647
```

```
cat("Autovectores Sigma (columnas):\n"); print(round(P_S,6))
```

```
## Autovectores Sigma (columnas):
```

```
##           [,1]      [,2]
## [1,] 0.040306 -0.999187
## [2,] 0.999187  0.040306
```

Componentes principales (formas lineales) - para Σ :

```
cat("\nFormas lineales (Sigma): Yi = a1 * X1 + a2 * X2  (autovectores col)\n")
```

```
##
## Formas lineales (Sigma): Yi = a1 * X1 + a2 * X2  (autovectores col)
```

```
for(i in 1:2){
  coefs <- round(P_S[,i], 6)
  cat(sprintf("Y%d = %6.6f * X1 + %6.6f * X2\n", i, coefs[1], coefs[2]))
}
```

```
## Y1 = 0.040306 * X1 + 0.999187 * X2
## Y2 = -0.999187 * X1 + 0.040306 * X2
```

Descomposición en valores/vectores propios de R :

```
eig_R <- eigen(R_mat)
lambda_r <- eig_R$values
P_r <- eig_R$vectors

cat("\nEigen R:\n"); print(round(lambda_r,6))
```

```
##
## Eigen R:
```

```
## [1] 1.4 0.6
```

```
cat("Autovectores R (columnas):\n"); print(round(P_r,6))
```

```
## Autovectores R (columnas):
```


3.2. COMPONENTES PRINCIPALES PARA MATRIZ DE CORRELACIÓN⁸⁹

```
##           [,1]      [,2]
## [1,] 0.707107 -0.707107
## [2,] 0.707107  0.707107
```

Componentes principales R , equivalente a trabajar con Z estandarizadas:

```
cat("\nFormas lineales (R, sobre Z estandarizadas): Yi = b1 * Z1 + b2 * Z2\n")
```

```
##
## Formas lineales (R, sobre Z estandarizadas): Yi = b1 * Z1 + b2 * Z2
```

```
for(i in 1:2){
  coefs <- round(P_r[,i], 6)
  cat(sprintf("Y%d = %6.6f * Z1 + %6.6f * Z2\n", i, coefs[1], coefs[2]))
}
```

```
## Y1 = 0.707107 * Z1 + 0.707107 * Z2
## Y2 = -0.707107 * Z1 + 0.707107 * Z2
```

Que es lo mismo que:

$$Y_1 = e_{11} \left(\frac{X_1 - \mu_1}{\sqrt{\sigma_{11}}} \right) + e_{12} \left(\frac{X_2 - \mu_2}{\sqrt{\sigma_{22}}} \right) = 0.707 \left(\frac{X_1 - \mu_1}{1} \right) + 0.707 \left(\frac{X_2 - \mu_2}{10} \right)$$

y

$$Y_2 = e_{21} \left(\frac{X_1 - \mu_1}{\sqrt{\sigma_{11}}} \right) + e_{22} \left(\frac{X_2 - \mu_2}{\sqrt{\sigma_{22}}} \right) = -0.707 \left(\frac{X_1 - \mu_1}{1} \right) + 0.707 \left(\frac{X_2 - \mu_2}{10} \right)$$

Debido a su gran varianza, X_2 domina por completo la primer componente principal determinada por Σ .

Proporciones de varianza explicada (Σ):

```
total_var_S <- sum(diag(Sigma))
prop_S <- lambda_S / total_var_S
cat("\nProporciones (Sigma):\n")
```

```
##
## Proporciones (Sigma):
```

```
for(i in 1:2) cat(sprintf("PC%d: lambda=%6.6f prop=%6.4f cumul=%6.4f\n",
                          i, lambda_S[i], prop_S[i], cumsum(prop_S)[i]))
```

```
## PC1: lambda=100.161353 prop=0.9917 cumul=0.9917
## PC2: lambda=0.838647 prop=0.0083 cumul=1.0000
```

Proporciones de varianza explicada (R , variables estandarizadas):

```
total_var_r <- sum(diag(R_mat)) # = 2
prop_r <- lambda_r / total_var_r
cat("\nProporciones (R - variables estandarizadas):\n")
```

```
##
## Proporciones (R - variables estandarizadas):
```

```
for(i in 1:2) cat(sprintf("PC%d: lambda=%.6f prop=%.4f cumul=%.4f\n",
                          i, lambda_r[i], prop_r[i], cumsum(prop_r)[i]))
```

```
## PC1: lambda=1.400000 prop=0.7000 cumul=0.7000
## PC2: lambda=0.600000 prop=0.3000 cumul=1.0000
```

Correlaciones R_{Y_i, X_j} usando la formula:

$$R_{Y_i, X_j} = e_{j,i} * \sqrt{\lambda_i} / \sqrt{\sigma_{jj}}$$

```
sigma_diag <- diag(Sigma)
rho_YX_Sigma <- matrix(NA, 2, 2, dimnames=list(paste0("Y",1:2), paste0("X",1:2)))
for(i in 1:2) for(j in 1:2){
  rho_YX_Sigma[i,j] <- P_S[j,i] * sqrt(lambda_S[i]) / sqrt(sigma_diag[j])
}
cat("\nCorrelaciones entre Yi (de Sigma) y Xj:\n")
```

```
##
## Correlaciones entre Yi (de Sigma) y Xj:
```

```
print(round(rho_YX_Sigma,6))
```

```
##           X1           X2
## Y1  0.403380 0.999993
## Y2 -0.915032 0.003691
```

3.2. COMPONENTES PRINCIPALES PARA MATRIZ DE CORRELACIÓN⁹¹

Correlaciones para las variables estandarizadas Z , se deben usar autovectores y autovalores de R :

En ese caso $\sigma_{jj} = 1$, y la formula reduce a $e_{j,i} * \sqrt{\lambda_i}$

```
R_YZ_R <- matrix(NA, 2, 2, dimnames=list(paste0("Y",1:2), paste0("Z",1:2)))
for(i in 1:2) for(j in 1:2){
  R_YZ_R[i,j] <- P_r[j,i] * sqrt(lambda_r[i])    # / sqrt(1) = 1
}
cat("\nCorrelaciones entre Yi (de R) y Zj (variables estandarizadas):\n")
```

```
##
## Correlaciones entre Yi (de R) y Zj (variables estandarizadas):
```

```
print(round(R_YZ_R,6))
```

```
##           Z1          Z2
## Y1  0.836660 0.836660
## Y2 -0.547723 0.547723
```

Comprobación: reconstruir $t(P) * \Sigma * P$, debe ser diagonal con las λ de Σ :

```
cat("\nP_S' Sigma P_S  (debe ser diagonal = autovalores de Sigma)\n")
```

```
##
## P_S' Sigma P_S  (debe ser diagonal = autovalores de Sigma)
```

```
print(round(t(P_S) %*% Sigma %*% P_S, 8))
```

```
##           [,1]      [,2]
## [1,] 100.1614 0.0000000
## [2,]  0.0000 0.8386468
```

Comprobación para R : $t(P_r) * R * P_r$

```
cat("\nP_r' R P_r (debe ser diagonal = autovalores de R)\n")
```

```
##
## P_r' R P_r (debe ser diagonal = autovalores de R)
```

```
print(round(t(P_r) %*% R_mat %*% P_r, 8))
```

```
##      [,1] [,2]
## [1,]  1.4  0.0
## [2,]  0.0  0.6
```

3.3 El número de Componentes Principales

Uno de los pasos fundamentales en el análisis de componentes principales (PCA) consiste en determinar cuántos componentes deben retenerse para describir adecuadamente la estructura de los datos. No existe un criterio único y universal, por lo que en la práctica se suelen combinar varias estrategias complementarias. A continuación se describen tres de los métodos más utilizados: el scree plot, la regla de Kaiser y el procedimiento de Horn.

3.3.1 Scree plot

El *scree plot* es una herramienta gráfica propuesta por Cattell (1966), en la que se representan los valores propios (varianzas explicadas) en función del número de componente. La idea es identificar el punto a partir del cual los valores propios dejan de decrecer de manera pronunciada y se estabilizan. Esta “zona de estabilización” se conoce como codo (elbow). Los componentes anteriores al codo explican la mayor parte de la variabilidad estructural, mientras que los posteriores suelen corresponderse con ruido. Aunque el criterio del codo es visual y puede ser subjetivo, es una aproximación muy útil como primera guía.

En R, el scree plot se puede obtener con funciones como `screeplot(obj_pca)` o haciendo un plot usual de los eigenvalores.


Ejemplo: Vamos a cargar la base de datos `USArrests`. Calculamos los componentes principales con la función `prcomp` y guardaremos los eigenvalores en una variable.

```
data("USArrests")
datos <- na.omit(USArrests)
pca_obj <- prcomp(datos, scale. = TRUE)
eigenvalues <- pca_obj$sdev^2
eigenvalues
```


```
## [1] 2.4802416 0.9897652 0.3565632 0.1734301
```

Tenemos tres formas de realizar este plot, unos usando los valores de los eigenvalores y el segundo usando la función de `screeplot` o usando la función `fviz_eig` de `factoextra`.

```
plot(eigenvalues, type = "b", xlab = "Componente principal", ylab = "Eigenvalor",  
     main = "Scree plot")  
abline(h = 1, lty = 2) # línea de referencia en 1 (útil para Kaiser)
```



```
screeplot(pca_obj, type="lines")
```




Si utilizamos el paquete `factoextra`, el scree plot también puede mostrar directamente la proporción de varianza explicada:

```
library(factoextra)
```

```
## Welcome! Want to learn more? See two factoextra-related books at https://goo.gl/ve3l
```

```
fviz_eig(pca_obj, addlabels = TRUE, ylim = c(0, 100))
```



La interpretación consiste en buscar el “codo” en la gráfica: el punto a partir del cual la pendiente deja de ser pronunciada y los eigenvalores se estabilizan. En los tres plots, podemos ver que en la componente dos, se forma el “codo”, además de que las primeras dos componentes tienen una mayor variabilidad. Este método nos sugiere quedarnos con las primeras dos componentes principales.

3.3.2 Regla de Kaiser

La regla de , fue propuesta por Kaiser en 1959. Propone retener únicamente los componentes cuyos eigenvalores sean mayores que 1 (cuando el PCA se realiza sobre la **matriz de correlaciones**). La justificación es que cada componente debe explicar al menos tanta variabilidad como una variable original estandarizada. Este criterio es sencillo de aplicar, pero puede sobrestimar el número de componentes cuando el número de variables es grande o cuando la estructura de los datos es débil.

Una forma de hacer esto es la siguiente:

```
componentes_kaiser <- which(eigenvalues > 1)
componentes_kaiser
```

```
## [1] 1
```

```
length(componentes_kaiser)
```

```
## [1] 1
```

Podríamos resumir también esto en una tabla:

```
prop_var <- eigenvalues / sum(eigenvalues)
tabla_pca <- data.frame(
  Componente = paste0("PC", seq_along(eigenvalues)),
  Eigenvalor = eigenvalues,
  PropVar     = prop_var,
  PropVarAcum = cumsum(prop_var),
  Kaiser      = eigenvalues > 1
)
tabla_pca
```

```
##   Componente Eigenvalor   PropVar PropVarAcum Kaiser
## 1      PC1  2.4802416 0.62006039  0.6200604   TRUE
## 2      PC2  0.9897652 0.24744129  0.8675017  FALSE
## 3      PC3  0.3565632 0.08914080  0.9566425  FALSE
## 4      PC4  0.1734301 0.04335752  1.0000000  FALSE
```

Aunque la componente 2 es menor a 1, si podría considerarse.

3.3.3 Procedimiento de Horn (parallel analysis)

El procedimiento de Horn, propuesto por Horn en 1965, también llamado análisis paralelo, es uno de los métodos más robustos para decidir el número de componentes. Consiste en comparar los eigenvalores obtenidos a partir de los datos reales con los eigenvalores obtenidos de matrices aleatorias generadas bajo ausencia de estructura (ruido). En lugar de tomar todos los eigenvalores mayores a 1, propone tomar otro corte dependiendo de los valores obtenidos de matrices aleatorias. Se retienen únicamente aquellos componentes cuyo eigenvalor sea mayor al correspondiente eigenvalor promedio de las matrices aleatorias.

Este procedimiento reduce los riesgos tanto de incluir componentes irrelevantes como de descartar componentes importantes. En R se puede implementar con el paquete `psych` mediante la función `fa.parallel()` o con funciones específicas de análisis paralelo para PCA.


```
library(psych)


##
## Adjuntando el paquete: 'psych'

## The following objects are masked from 'package:ggplot2':
##
##      %+%, alpha

set.seed(123) # para reproducibilidad

fa.parallel(datos,
  fa = "pc", # especifica que queremos análisis de componentes principales
  n.iter = 100, # número de matrices aleatorias
  show.legend = TRUE,
  main = "Análisis paralelo (Procedimiento de Horn)"
)
```

Análisis paralelo (Procedimiento de Horn)



```
## Parallel analysis suggests that the number of factors = NA and the number of components = 1
```

Además de los criterios clásicos, como el scree plot o la regla de Kaiser, el paquete `nFactors` ofrece una forma integrada de comparar varios métodos para decidir cuántos componentes principales deben retenerse. Este enfoque combina:

- Los eigenvalores reales obtenidos del PCA;
- Los eigenvalores simulados mediante análisis paralelo (procedimiento de Horn);
- Criterios gráficos, como el scree plot refinado (Cattell);
- La regla de Kaiser (eigenvalores mayores que 1 cuando se usa una matriz de correlaciones).

A continuación se describe el procedimiento y el significado de cada paso.

Eigenvalores reales: El primer paso consiste en obtener los eigenvalores de la matriz de correlaciones. Si los datos han sido estandarizados o se usa directamente la matriz de correlaciones, cada variable tiene varianza igual a 1 y la regla de Kaiser puede aplicarse de manera directa.

```
cor_mat <- cor(datos, use = "pairwise.complete.obs")
# Eigenvalores de la matriz de correlaciones
ev_cor <- eigen(cor_mat)
```

Análisis paralelo (Procedimiento de Horn): El análisis paralelo compara los eigenvalores reales con eigenvalores obtenidos a partir de matrices aleatorias sin estructura (ruido). Los componentes se retienen únicamente si su eigenvalor es mayor que el correspondiente eigenvalor simulado bajo el escenario nulo.

En **nFactors**, esto se realiza con:

```
library(nFactors)
ap <- parallel(
  subject = nrow(datos), # número de observaciones
  var      = ncol(datos), # número de variables
  rep      = 100,         # número de simulaciones
  cent     = .05          # percentil usado para ajustar los eigenvalores simulados
)
```

La salida `ap$eigen$gevpea` contiene los eigenvalores simulados promediados y ajustados, que se usarán más adelante para la comparación.

Función `nScree()`: Kaiser + Scree + Análisis paralelo en una sola función. El paquete **nFactors** permite integrar todos los criterios anteriores usando la función `nScree()`. Esta función toma:

- los eigenvalores reales
- los eigenvalores simulados del análisis paralelo

- información adicional si se trabaja con la matriz de correlaciones (`cor = TRUE`)

y produce una recomendación conjunta.

```
num_cp <- nSree(x = ev_cor$values,          # eigenvalores reales
               aparallel = ap$eigen$gevpea, # eigenvalores simulados
               cor        = TRUE           # indica que provienen de una matriz de correlaciones
               )
num_cp
```


```
## $Components
##   noc naf nparallel nkaiser
## 1   1   1           1       1
##
## $Analysis
##   Eigenvalues      Prop      Cumu Par.Analysis  Pred.eig      OC Acc.factor
## 1   2.4802416 0.62006039 0.6200604    1.1460230 1.3979327 (< OC)      NA
## 2   0.9897652 0.24744129 0.8675017    0.9951257 0.5396963           0.8572745
## 3   0.3565632 0.08914080 0.9566425    0.7977450      NA           0.4500689
## 4   0.1734301 0.04335752 1.0000000    0.5471219      NA           NA
##      AF
## 1 (< AF)
## 2
## 3
## 4
##
## $Model
## [1] "components"
##
## attr(,"class")
## [1] "nSree"
```

La salida `num_cp` resume cuántos componentes recomienda cada criterio:

- *Regla de Kaiser*: componentes con eigenvalor > 1 .
- *Scree Test (Cattell)*: número de componentes hasta el “codo”.
- *Parallel analysis*: eigenvalores observados mayores que los simulados.
- *nSree solution*: recomendación final combinada.

Puede visualizarse con:

```
plotnScree(num_cp)
```



Esta gráfica muestra simultáneamente los eigenvalores reales y los simulados, así como las líneas marcando los puntos de corte según cada método.

Interpretación

Usar `nScree()` tiene la ventaja de ofrecer una visión amplia e integradora:

- La regla de Kaiser es rápida pero puede sobreestimar componentes.
- El scree plot puede ser subjetivo.
- El análisis paralelo es el más estable y recomendado en literatura moderna.
- La solución `nScree` combina los tres, ofreciendo un punto de vista equilibrado.

La recomendación final debe tomarse considerando la interpretación sustantiva del problema, la proporción de varianza explicada y la finalidad del PCA.

3.4 Visualización de los componentes principales

Una vez seleccionado el número adecuado de componentes principales, es fundamental apoyarse en diversas visualizaciones para interpretar la estructura de

los datos y la contribución de las variables. En PCA, los gráficos más comunes son:

- el score plot (individuos en el espacio de los componentes),
- el loading plot (contribución de variables),
- el biplot o bibiplot, que combina ambos.

3.4.1 Score plot: individuos en el espacio PCA

El score plot muestra las observaciones proyectadas en los ejes principales (típicamente PC1 y PC2). Permite identificar:


- agrupamientos naturales,
- valores atípicos,
- diferencias entre grupos (si se colorean por una variable categórica).

Veamos un ejemplo en Factoextra

```
library(factoextra)

# PCA
pca_obj <- prcomp(datos, scale. = TRUE)

# Score plot PC1 vs PC2
fviz_pca_ind(pca_obj,
  geom = "point",
  pointsize = 2,
  col.ind = "steelblue",
  addEllipses = FALSE,
  title = "Score plot: individuos en el espacio PC1-PC2"
)
```



3.4.2 Loading plot: contribución de las variables

Los loadings representan cuánto contribuye cada variable a los componentes principales.


Un loading alto (positivo o negativo) indica que la variable influye fuertemente en ese componente.

Las variables agrupadas en el gráfico suelen estar correlacionadas. En el plano definido por los componentes principales, el ángulo entre dos vectores (flechas) refleja el signo y la fuerza de la correlación entre las variables:

- Ángulos menores a 90° : correlación positiva.
- Ángulo aproximadamente de 90° : variables prácticamente no correlacionadas en el plano PC1-PC2.
- Ángulos mayores a 90° : correlación negativa.
- Ángulo cercano a 180° : correlación negativa muy fuerte.

```
fviz_pca_var(pca_obj,
  col.var = "contrib",
  gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),
  repel = TRUE, # evita que las etiquetas se traslapen
```

```
)  
    title = "Loading plot: contribución de variables"  
)
```



3.4.3 Biplot y Bibiplot

El biplot es una visualización conjunta de:

- scores (puntos = observaciones)
- loadings (flechas = variables)

Esto permite ver simultáneamente:

- cómo se distribuyen las observaciones en el espacio PCA,
- qué variables explican esa distribución.

Interpretación esencial del biplot


- Flechas largas: variables con mayor contribución.
- Flechas cercanas: variables correlacionadas.
- Observaciones proyectadas en dirección de una flecha: altas en esa variable.

Ángulos entre flechas:

- $< 90^\circ$: correlación positiva
- $\sim 90^\circ$: independencia
- $> 90^\circ$: correlación negativa

En R base se puede obtener de la siguiente forma:


```
biplot(pca_obj, scale = 0, cex = 0.8)
```



Sin embargo, el biplot base suele ser poco estético y difícil de interpretar cuando hay muchas variables.

Con el paquete `factoextra` podemos personalizarlo un poco más.

```
fviz_pca_biplot(pca_obj,
  repel = TRUE,
  col.ind = "gray30",
  col.var = "firebrick",
  geom.ind = "point",
  label = "var",
  title = "Bibiplot de componentes principales"
)
```



Se puede colorear individuos según un grupo. Vamos a agregar una columna de las regiones.

```
# Crear variable de grupo por región
region <- state.region # vector ya incluido en R, en el mismo orden de estados


# Hacemos de nuevo el PCA
pca_obj <- prcomp(USArrests, scale. = TRUE)

fviz_pca_biplot(pca_obj,
  repel = TRUE,
  col.ind = region,      # vector con factor o variable categórica
```

```

palette = "Dark2",
geom.ind = "point",
addEllipses = TRUE,
title = "Bibiplot coloreado por grupo"
)

```



3.4.4 Gráficos adicionales útiles


Además de los gráficos tradicionales del PCA (score plot, loading plot y biplot), existen otras visualizaciones que permiten comprender mejor la importancia y calidad de representación de cada variable en los componentes principales. A continuación se describen tres tipos de gráficos muy utilizados en análisis exploratorio: contribuciones, calidad de representación ($\cos^2$) y visualización separada de individuos y variables.

a) Contribuciones por componente: Las contribuciones indican qué porcentaje del total de varianza explicada por un componente proviene de cada variable. Este gráfico permite identificar cuáles variables son las más influyentes en cada componente principal.


```

fviz_contrib(pca_obj, choice = "var", axes = 1)

```



```
fviz_contrib(pca_obj, choice = "var", axes = 2)
```



Cómo interpretarlo:


- Las barras más altas representan variables que explican mayor parte de la varianza del componente.
- Una variable con alta contribución en PC1 influye más en la dirección en que PC1 separa las observaciones.
- Si una variable contribuye poco a todos los componentes, tiene poca relevancia estructural para el PCA.
- **Factoextra** suele marcar con una línea roja la “contribución esperada” si todas las variables aportaran por igual.
 - Barras por arriba de esa línea: variables relevantes.
 - Barras por abajo: variables menos informativas.

Es un gráfico muy útil para responder preguntas como:

“¿Qué variables están definiendo principalmente el primer componente?”

b) Mapa de calidad de representación ($\cos^2$): El valor $\cos^2$ es la calidad de representación de una variable o individuo en el plano principal (usualmente PC1–PC2). Es decir, indica qué tan bien está proyectada la variable en ese plano.

```
fviz_pca_var(pca_obj,
             col.var = "cos2",
             gradient.cols = c("blue", "yellow", "red"),
             repel = TRUE
            )
```



Cómo interpretarlo:


- Un valor alto de $\cos^2$ (cercano a 1) indica que la variable está bien representada en el plano PC1–PC2.
- Valores bajos (cercanos a 0) indican que la variable tiene componente importante en PC3, PC4, etc.
- El color indica la calidad de representación:
 - Rojo: excelente representación ($\cos^2$ alto)
 - Amarillo: intermedia
 - Azul: pobre representación

Regla práctica:

- Solo interpretar direcciones, ángulos y correlaciones para variables con $\cos^2$ alto.
- Variables con $\cos^2$ bajo pueden llevar a interpretaciones erróneas.

c) **Variables y observaciones en paneles separados:** Aunque el biplot combina individuos y variables en una sola figura, a veces es más claro analizarlos por separado:

```
fviz_pca_ind(pca_obj)
```



```
fviz_pca_var(pca_obj)
```




Gráfico	Es útil para...	Interpretación clave
Contribuciones	Ver qué variables definen los componentes	Barras grandes = variables muy influyentes
$\cos^2$	Evaluar calidad de representación	Colores cálidos = buena representación en PC1–PC2
Individuos	Ver similitudes entre observaciones	Puntos cercanos = perfiles similares
Variables	Analizar correlaciones y direcciones	Ángulos $< 90^\circ$ = correlación positiva; $> 90^\circ$ = correlación negativa

3.4.5 Recomendaciones prácticas de interpretación

Usar PC1 y PC2 como primera aproximación, pero revisar también PC3 si la varianza explicada no es alta. Interpretar siempre el biplot considerando:

- magnitud y dirección de las flechas,

- ángulos entre variables,
- ubicación de individuos respecto a las flechas.

Evitar interpretaciones fuertes cuando las $\cos^2$ sean bajas (mala representación en el plano).

3.5 Ejemplos con Bases de datos

En R existen varios paquetes que nos permiten realizar análisis de componentes principales. Algunas de las funciones son `prcomp()`, `princomp()`, `PCA()`.

Los argumentos de la función `prcomp()` son:

- **x**: una matriz numérica o dataframe.
- **scale**: un valor lógico indicando si las variables deberían ser escaladas para tener varianza unitaria antes de realizar el análisis.

Los argumentos de `princomp()` son los siguientes:

- **x**: una matrix numérica o dataframe.
- **cor**: un valor lógico indicando si los datos se centraran y escalaran antes de realizar el análisis.
- **scores**: un valor lógico indicando si se calcularan las coordenadas de cada componente principal.

Ambas funciones nos regresan los siguientes valores:

- **sdev**: las desviaciones estándar de las componentes principales.
- **rotation, loadings**: la matriz de las cargas donde las columnas son los eigenvectores.
- **center**: las medias de las variables, las que fueron restadas.
- **scale**: las desviaciones estandar de las variables.
- **x, scores**: las coordenadas de las observaciones/individuos de las componentes principales.

Vamos a usar el paquete `factoextra` para visualizar los resultados.

```
library(factoextra)
```

Ejemplo 1: Vamos a cargar la base de datos siguiente:

NationalTrackRecords


```
library(readxl)
records <- read_excel("data/NationalTrackRecords2.xlsx")
```

```
## New names:
## * `` -> `...1`
```

```
head(records)
```

```
## # A tibble: 6 x 8
##   ...1    `100m` `200m` `400m` `800m` `1500m` `3000m` Marathon
##   <chr>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 argentin  11.6   22.9   54.5   2.15   4.43   9.79   179.
## 2 australi  11.2   22.4   51.1   1.98   4.13   9.08   152.
## 3 austria   11.4   23.1   50.6   1.99   4.22   9.34   159.
## 4 belgium   11.4   23.0   52      2      4.14   8.88   158.
## 5 bermuda   11.5   23.0   53.3   2.16   4.58   9.81   170.
## 6 brazil    11.3   23.2   52.8   2.1     4.49   9.77   169.
```

¿Necesitamos escalar los datos? ¿Cómo son las varianzas y covarianzas? ¿Es conveniente trabajar con la matriz de correlación en vez de con la de varianzas y covarianzas?


```
records2 <- records[,2:8]
rownames(records2) <- records$...1
```

```
var(records2)
cor(records2)
```

¿Es apropiado hacer un análisis de componentes principales? ¿por qué? Si lo es, ya que hay muchas correlaciones altas, entonces se podría disminuir la dimensión.

```
library(corrplot)
res1 <- cor.mtest(records2, conf.level= .95)
res2 <- cor.mtest(records2, conf.level= .99)
cor.mat <- cor(records2, use="complete.obs")

corrplot(cor.mat)
```



Vamos a calcular los componentes principales primero con la función `princomp`.

```
cp1 <- princomp(records2, cor = TRUE)
summary(cp1)
```

```
## Importance of components:
##               Comp.1   Comp.2   Comp.3   Comp.4   Comp.5
## Standard deviation  2.4094991 0.80848347 0.54761522 0.35422802 0.231984732
## Proportion of Variance 0.8293837 0.09337793 0.04284035 0.01792536 0.007688131
## Cumulative Proportion 0.8293837 0.92276161 0.96560196 0.98352731 0.991215445
##               Comp.6   Comp.7
## Standard deviation  0.197608919 0.149808546
## Proportion of Variance 0.005578469 0.003206086
## Cumulative Proportion 0.996793914 1.000000000
```

Con la instrucción `loadings` lo que obtenemos son las cargas de los componentes principales. Es decir, lo que obtenemos son los coeficientes que se usarán en las

combinaciones lineales para calcular cada componente principal. Por ejemplo, para un conjunto de datos $X_1, X_2, \dots, X_p$ la primera columna que está denotada por `Comp.1` tiene los coeficientes $\phi_{11}, \phi_{21}, \dots, \phi_{p1}$ de la combinación lineal con la que se obtiene la primera componente principal:

$$Z_1 = \phi_{11}X_1 + \phi_{21}X_2 + \dots + \phi_{p1}X_p$$

Esta primera componente principal será la que refleje la mayor variabilidad de los datos. Las cargas son las entradas de cada eigenvector son las siguientes:

```
cp1$loadings
```

```
##
## Loadings:
##      Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 Comp.6 Comp.7
## 100m      0.368  0.490  0.286  0.319  0.231  0.620
## 200m      0.365  0.537  0.230           -0.711 -0.109
## 400m      0.382  0.247 -0.515 -0.347 -0.572  0.191  0.208
## 800m      0.385 -0.155 -0.585           0.620       -0.315
## 1500m     0.389 -0.360           0.430       -0.231  0.693
## 3000m     0.389 -0.348  0.153  0.363 -0.463       -0.598
## Marathon 0.367 -0.369  0.484 -0.672  0.131  0.142
##
##      Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 Comp.6 Comp.7
## SS loadings  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000
## Proportion Var 0.143  0.143  0.143  0.143  0.143  0.143  0.143
## Cumulative Var 0.143  0.286  0.429  0.571  0.714  0.857  1.000
```

Usando estos valores, la fórmula de la primer componente principal se escribiría como:

$(0.368, 0.365, 0.382, 0.385, 0.389, 0.389, 0.367)(100m - \text{mean}(100m), 200m - \text{mean}(200m), \dots, \text{Marathon} - \text{mean}(\text{Marathon}))$

Las desviaciones estándar son las raíces de las lambdas.

```
cp1$sdev
```

```
##      Comp.1      Comp.2      Comp.3      Comp.4      Comp.5      Comp.6      Comp.7
## 2.4094991  0.8084835  0.5476152  0.3542280  0.2319847  0.1976089  0.1498085
```

Para calcular la varianza debemos elevar al cuadrado cada una de las entradas.

```
varianza.cp1 <- (cp1$sdev)^2
varianza.cp1
```

```
##      Comp.1      Comp.2      Comp.3      Comp.4      Comp.5      Comp.6      Comp.7
## 5.80568576 0.65364552 0.29988243 0.12547749 0.05381692 0.03904928 0.02244260
```

Para obtener la proporción de la varianza que explica cada componente lo que tenemos que hacer es dividir el valor de la varianza de la componente j entre la suma de las varianzas de todas las componentes. El siguiente código muestra como realizarlo. Además, en la instrucción `summary` vemos que estos valores coinciden con los de la segunda fila.

```
proporcion.varianza.cp1 <- (cp1$sdev)^2/sum((cp1$sdev)^2)
proporcion.varianza.cp1
```

```
##      Comp.1      Comp.2      Comp.3      Comp.4      Comp.5      Comp.6
## 0.829383680 0.093377931 0.042840347 0.017925356 0.007688131 0.005578469
##      Comp.7
## 0.003206086
```

Si lo que queremos es el porcentaje, entonces solo hay que multiplicar por 100

```
porcentaje_varianza <- (cp1$sdev)^2*100/sum((cp1$sdev)^2)
porcentaje_varianza
```

```
##      Comp.1      Comp.2      Comp.3      Comp.4      Comp.5      Comp.6      Comp.7
## 82.9383680  9.3377931  4.2840347  1.7925356  0.7688131  0.5578469  0.3206086
```

Para encontrar la proporción de varianza acumulada, lo que tenemos que hacer es dividir la suma de los primeros j -ésimos eigenvalores entre la suma de todos los eigenvalores.

```
proporcion_acumulada_varianza <- cumsum(proporcion.varianza.cp1)
proporcion_acumulada_varianza
```

```
##      Comp.1      Comp.2      Comp.3      Comp.4      Comp.5      Comp.6      Comp.7
## 0.8293837 0.9227616 0.9656020 0.9835273 0.9912154 0.9967939 1.0000000
```

Cálculamos los eigenvalores de la matriz cuadrada de correlación.

```
eigen_base <- (eigen(cor.mat))
eigen_base
```

```
## eigen() decomposition
## $values
## [1] 5.80568576 0.65364552 0.29988243 0.12547749 0.05381692 0.03904928 0.02244260
##
## $vectors
##           [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]      [,6]
## [1,] -0.3683561  0.4900597  0.28601157 -0.31938631 -0.23116950 -0.619825234
## [2,] -0.3653642  0.5365800  0.22981913  0.08330196 -0.04145457  0.710764580
## [3,] -0.3816103  0.2465377 -0.51536655  0.34737748  0.57217791 -0.190945970
## [4,] -0.3845592 -0.1554023 -0.58452608  0.04207636 -0.62032379  0.019089032
## [5,] -0.3891040 -0.3604093 -0.01291198 -0.42953873 -0.03026144  0.231248381
## [6,] -0.3888661 -0.3475394  0.15272772 -0.36311995  0.46335476 -0.009277159
## [7,] -0.3670038 -0.3692076  0.48437037  0.67249685 -0.13053590 -0.142280558
##           [,7]
## [1,]  0.05217655
## [2,] -0.10922503
## [3,]  0.20849691
## [4,] -0.31520972
## [5,]  0.69256151
## [6,] -0.59835943
## [7,]  0.06959828
```

La varianza de las Componentes Principales, es igual a los eigenvalores. Es decir, la desviación estándar de las componentes, es igual a la raíz de los valores propios.

```
desv_base <- cp1$sdev
desv_base
```

```
##   Comp.1   Comp.2   Comp.3   Comp.4   Comp.5   Comp.6   Comp.7
## 2.4094991 0.8084835 0.5476152 0.3542280 0.2319847 0.1976089 0.1498085
```

```
desv_rounded_base <- round(cp1$sdev, 1)
desv_rounded_base
```

```
## Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 Comp.6 Comp.7
##    2.4    0.8    0.5    0.4    0.2    0.2    0.1
```

```
round(sqrt(eigen_base$values),1) == desv_rounded_base
```

```
## Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 Comp.6 Comp.7
## TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
```

Por otra parte, se puede afirmar que la traza de la matriz lambda es igual a la suma de la varianza de cada valor observado.

```
lambda_matriz <- round(diag(eigen_base$values), 2)
lambda_matriz
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7]
## [1,] 5.81 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
## [2,] 0.00 0.65 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
## [3,] 0.00 0.00 0.3 0.00 0.00 0.00 0.00
## [4,] 0.00 0.00 0.0 0.13 0.00 0.00 0.00
## [5,] 0.00 0.00 0.0 0.00 0.05 0.00 0.00
## [6,] 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.04 0.00
## [7,] 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.02
```

```
traza_lambda <- sum(diag(lambda_matriz))
traza_lambda
```

```
## [1] 7
```

Además, el porcentaje de la varianza generalizada que es explicado por la componente j -ésima es igual a la relación que hay entre los eigenvalores divididos por la suma de la diagonal de eigenvalores. Es decir, esto es igual al porcentaje de varianza acumulada por la función `summary`, y hecho a mano con la suma acumulada de los valores propios.

```
cumsum(eigen_base$values/traza_lambda)
```

```
## [1] 0.8293837 0.9227616 0.9656020 0.9835273 0.9912154 0.9967939 1.0000000
```

Esta matriz es la diagonal con los eigenvalores.

```
lambda_matriz <- round(diag(eigen_base$values), 2)
lambda_matriz
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7]
## [1,] 5.81 0.00  0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
## [2,] 0.00 0.65  0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
## [3,] 0.00 0.00  0.3 0.00 0.00 0.00 0.00
## [4,] 0.00 0.00  0.0 0.13 0.00 0.00 0.00
## [5,] 0.00 0.00  0.0 0.00 0.05 0.00 0.00
## [6,] 0.00 0.00  0.0 0.00 0.00 0.04 0.00
## [7,] 0.00 0.00  0.0 0.00 0.00 0.00 0.02
```


La traza de la matriz Λ es igual a la suma de las varianzas acumuladas por los Componentes.

```
traza_lambda <- sum(diag(lambda_matriz))
traza_lambda
```

```
## [1] 7
```

Una forma de ver con cuantos componentes nos conviene trabajar es con el gráfico de codo.


```
screeplot(cp1, type="lines")
```



¿Con cuántas componentes nos conviene quedarnos?

El biplot es una forma de representar los resultados de PCA.

```
biplot(cp1)
```



Vamos a analizar el biplot a detalle.

¿Qué mide la primera componente? o ¿Cómo la interpretas?

La interpretación no se hace en función de los individuos sino de las variables que explica cada componente. Como en esta primera componente, todas las cargas son positivas y muy similares para todas las variables, podríamos nombrar a esta variable “velocidad en las carreras” por ejemplo.

En el biplot, los países que quedan a la derecha del cero, ¿qué tipo de corredores tienen? Los lentos.

En el biplot, los países que quedan con puntajes altos en la segunda componente, tienen velocistas rápidos y fondistas lentos o viceversa?

Los pesos positivos están en las carreras de velocidad y los pesos negativos en las de fondo. Es decir, un país con valores altos (tiempos grandes) en las carreras X100, X200, X400, tendrá valores positivos y grandes al multiplicar por las

cargas de componente 2, y sí tiene tiempos bajos en las carreras de fondo, al multiplicar por las cargas negativas de la componente 2, el score para ese país en el componente 2 será positivo. Caso contrario pasaría con un país con tiempos cortos en las carreras de 100 a 200 m, y tiempos largos en las carreras de fondo.

¿En qué cuadrante se encuentran los países que tienen a los velocistas más rápidos? Sería III, pues es el cuadrante opuesto a la dirección de los vectores de las variables X100, X200, X400 (cuadrante I, en donde se ubican los velocistas más lentos).

¿En qué cuadrante se encuentran los países que tienen a los fondistas más rápidos? Sería el cuadrante II, opuesto a la dirección de los vectores de marathon, X800, X1500 (ubicados en cuadrante IV, en donde están los fondistas más lentos).

¿Qué país tiene los velocistas más lentos? Si observas el biplot CP1 vs CP2, Cookis está hacia donde están apuntando los vectores positivos de las carreras de velocidad, lo cual quiere decir que ese país tiene tiempos largos en esas carreras de velocidad y en consecuencia, su score en componente 2 resulta muy positiva.

¿Qué país tiene los fondistas más lentos?

Si observas el biplot CP1 vs CP2, wsamoa está hacia donde están apuntando los vectores de las carreras de fondo (X800, X1500, Xmarathon), lo cual quiere decir que ese país tiene tiempos largos en esas carreras de fondo y en consecuencia, su score en componente 2 resulta muy negativa.

Ejemplo 2: Vamos a cargar la base de datos `decathlon2` del paquete `factoextra` y vamos a extraer los individuos del 1:23 y las variables 1:10.

```
data("decathlon2")
decathlon2_activos <- decathlon2[1:23,1:10]
head(decathlon2_activos[,1:6])
```

##		X100m	Long.jump	Shot.put	High.jump	X400m	X110m.hurdle
##	SEBRLE	11.04	7.58	14.83	2.07	49.81	14.69
##	CLAY	10.76	7.40	14.26	1.86	49.37	14.05
##	BERNARD	11.02	7.23	14.25	1.92	48.93	14.99
##	YURKOV	11.34	7.09	15.19	2.10	50.42	15.31
##	ZSIVOCZKY	11.13	7.30	13.48	2.01	48.62	14.17
##	McMULLEN	10.83	7.31	13.76	2.13	49.91	14.38


¿Necesitamos escalar los datos? ¿Cómo son las varianzas y covarianzas?

```
var(decathlon2_activos)
cor(decathlon2_activos)
```

Vamos a calcular la matriz de correlaciones.

```
library(corrplot)
res1 <- cor.mtest(decathlon2_activos, conf.level= .95)
res2 <- cor.mtest(decathlon2_activos, conf.level= .99)
cor.mat <- cor(decathlon2_activos, use="complete.obs")


corrplot(cor.mat)
```



Removemos algunas de las variables correlacionadas.

```
library(tidyverse)
base.cp1 <- decathlon2_activos
base.cp1 <- base.cp1 %>%
  dplyr::select(-Pole.vault)
```

```
cor.mat.aj <- cor(base.cp1, use = "complete.obs")
corrplot(cor.mat.aj)
```




Usaremos la función `prcomp()` y primero realizaremos el análisis sin quitar la variable anterior.

```
res.pca <- prcomp(decathlon2_activos, scale = TRUE )
```

Visualizamos lo eigenvalores.

```
fviz_eig(res.pca)
```



```
summary(res.pca)
```


```
## Importance of components:
##               PC1    PC2    PC3    PC4    PC5    PC6    PC7
## Standard deviation  2.0308 1.3559 1.1132 0.90523 0.83759 0.65029 0.55007
## Proportion of Variance 0.4124 0.1839 0.1239 0.08194 0.07016 0.04229 0.03026
## Cumulative Proportion 0.4124 0.5963 0.7202 0.80213 0.87229 0.91458 0.94483
##               PC8    PC9    PC10
## Standard deviation  0.52390 0.39398 0.3492
## Proportion of Variance 0.02745 0.01552 0.0122
## Cumulative Proportion 0.97228 0.98780 1.0000
```

¿Cuál es la proporción de la varianza explicada de las componentes?

¿Con cuántas componentes nos conviene quedarnos? ¿Porqué?


Vamos a graficar a los individuos y corolearlos por perfiles similares.

```
fviz_pca_ind(res.pca,
  col.ind = "cos2", # color por la calidad de representación
  gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),
  repel = TRUE      # evitar que se sobrelape el texto
)
```




Para graficar las variables y ver sus correlaciones realizamos lo siguiente. Variables correlacionadas negativamente apuntan a lados opuestos.

```
fviz_pca_var(res.pca,
  col.var = "contrib", # Color por contribución al PCA
  gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),
  repel = TRUE
)
```




Un objeto importante en estos análisis de PCA son los biplots.

```
fviz_pca_biplot(res.pca, repel = TRUE,
  col.var = "#2E9FDF", # Variables
  col.ind = "#696969" # Individuos
)
```



```
fviz_pca_biplot(res.pca, repel = TRUE, axes = c(1,3),
  col.var = "#2E9FDF", # Variables
  col.ind = "#696969" # Individuos
)
```



Vamos a acceder a los resultados del PCA.

```
# Eigenvalores
eig.val <- get_eigenvalue(res.pca)
eig.val
```

```
##          eigenvalue variance.percent cumulative.variance.percent
## Dim.1      4.1242133          41.242133          41.24213
## Dim.2      1.8385309          18.385309          59.62744
## Dim.3      1.2391403          12.391403          72.01885
## Dim.4      0.8194402           8.194402          80.21325
## Dim.5      0.7015528           7.015528          87.22878
## Dim.6      0.4228828           4.228828          91.45760
## Dim.7      0.3025817           3.025817          94.48342
## Dim.8      0.2744700           2.744700          97.22812
## Dim.9      0.1552169           1.552169          98.78029
## Dim.10     0.1219710           1.219710         100.00000
```

```
# Resultados para las variables
res.var <- get_pca_var(res.pca)
res.var$coord          # Coordenadas
```

```
##          Dim.1      Dim.2      Dim.3      Dim.4      Dim.5
```



```
## X100m      -0.850625692 -0.17939806 -0.30155643  0.03357320 -0.1944440
## Long.jump  0.794180641  0.28085695  0.19054653 -0.11538956  0.2331567
## Shot.put   0.733912733  0.08540412 -0.51759781  0.12846837 -0.2488129
## High.jump  0.610083985 -0.46521415 -0.33008517  0.14455012  0.4027002
## X400m      -0.701603377  0.29017826 -0.28353292  0.43082552  0.1039085
## X110m.hurdle -0.764125197 -0.02474081 -0.44888733 -0.01689589  0.2242200
## Discus     0.743209016  0.04966086 -0.17652518  0.39500915 -0.4082391
## Pole.vault -0.217268042  0.80745110 -0.09405773 -0.33898477 -0.2216853
## Javeline   0.428226639  0.38610928 -0.60412432 -0.33173454  0.1978128
## X1500m     0.004278487  0.78448019  0.21947068  0.44800961  0.2632527
##           Dim.6      Dim.7      Dim.8      Dim.9      Dim.10
## X100m      -0.035374780 -0.091336386 -0.104716925 -0.30306448  0.044417974
## Long.jump  0.033727883 -0.154330810 -0.397380703 -0.05158951  0.029719453
## Shot.put   0.239789034 -0.009886612  0.024359049  0.04778655  0.217451948
## High.jump  0.284644846  0.028157465  0.084405578 -0.11213822 -0.133566774
## X400m      0.049289996  0.286106008 -0.233552216  0.08216041 -0.034170673
## X110m.hurdle -0.002632395 -0.370072158 -0.008344682  0.16176025 -0.015629914
## Discus     -0.198544870 -0.142725641 -0.039559255  0.01336209 -0.172590426
## Pole.vault -0.327464549 -0.010393176  0.032914942 -0.02576874 -0.137211339
## Javeline   -0.362097598  0.133564318  0.052841099 -0.04045397 -0.003854347
## X1500m     -0.042050151 -0.111367083  0.194469730 -0.10224014  0.062834809
```

```
res.var$contrib      # Contribuciones a las componentes
```

```
##           Dim.1      Dim.2      Dim.3      Dim.4      Dim.5
## X100m      1.754429e+01  1.7505098  7.3386590  0.13755240  5.389252
## Long.jump  1.529317e+01  4.2904162  2.9300944  1.62485936  7.748815
## Shot.put   1.306014e+01  0.3967224  21.6204325  2.01407269  8.824401
## High.jump  9.024811e+00  11.7715838  8.7928883  2.54987951  23.115504
## X400m      1.193554e+01  4.5799296  6.4876363  22.65090599  1.539012
## X110m.hurdle 1.415754e+01  0.0332933  16.2612611  0.03483735  7.166193
## Discus     1.339309e+01  0.1341398  2.5147385  19.04132022  23.755756
## Pole.vault 1.144592e+00  35.4618611  0.7139512  14.02307063  7.005084
## Javeline   4.446377e+00  8.1086683  29.4531777  13.42963254  5.577615
## X1500m     4.438531e-04  33.4728757  3.8871610  24.49386930  9.878367
##           Dim.6      Dim.7      Dim.8      Dim.9      Dim.10
## X100m      0.295915322  2.75705260  3.99520353  59.1740009  1.61756139
## Long.jump  0.269003613  7.87159392  57.53322220  1.7146826  0.72414393
## Shot.put   13.596858744  0.03230371  0.21618512  1.4712015  38.76768578
## High.jump  19.159607001  0.26202607  2.59565787  8.1015517  14.62649091
## X400m      0.574509906  27.05274658  19.87344405  4.3489667  0.95730504
## X110m.hurdle 0.001638634  45.26163460  0.02537025  16.8579392  0.20028870
## Discus     9.321746508  6.73226823  0.57016606  0.1150295  24.42174410
## Pole.vault 25.357622290  0.03569883  0.39472201  0.4278065  15.43559151
```

```
## Javeline      31.004964393  5.89573984  1.01729950  1.0543458  0.01217993
## X1500m       0.418133591  4.09893563 13.77872941  6.7344755  3.23700871
```

```
res.var$cos2      # Calidad de la representación
```

```
##              Dim.1      Dim.2      Dim.3      Dim.4      Dim.5
## X100m      7.235641e-01 0.0321836641 0.090936280 0.0011271597 0.03780845
## Long.jump  6.307229e-01 0.0788806285 0.036307981 0.0133147506 0.05436203
## Shot.put   5.386279e-01 0.0072938636 0.267907488 0.0165041211 0.06190783
## High.jump  3.722025e-01 0.2164242070 0.108956221 0.0208947375 0.16216747
## X400m      4.922473e-01 0.0842034209 0.080390914 0.1856106269 0.01079698
## X110m.hurdle 5.838873e-01 0.0006121077 0.201499837 0.0002854712 0.05027463
## Discus     5.523596e-01 0.0024662013 0.031161138 0.1560322304 0.16665918
## Pole.vault 4.720540e-02 0.6519772763 0.008846856 0.1149106765 0.04914437
## Javeline   1.833781e-01 0.1490803723 0.364966189 0.1100478063 0.03912992
## X1500m     1.830545e-05 0.6154091638 0.048167378 0.2007126089 0.06930197
##              Dim.6      Dim.7      Dim.8      Dim.9      Dim.10
## X100m      1.251375e-03 0.0083423353 1.096563e-02 0.0918480768 1.972956e-03
## Long.jump  1.137570e-03 0.0238179990 1.579114e-01 0.0026614779 8.832459e-04
## Shot.put   5.749878e-02 0.0000977451 5.933633e-04 0.0022835540 4.728535e-02
## High.jump  8.102269e-02 0.0007928428 7.124302e-03 0.0125749811 1.784008e-02
## X400m      2.429504e-03 0.0818566479 5.454664e-02 0.0067503333 1.167635e-03
## X110m.hurdle 6.929502e-06 0.1369534023 6.963371e-05 0.0261663784 2.442942e-04
## Discus     3.942007e-02 0.0203706085 1.564935e-03 0.0001785453 2.978746e-02
## Pole.vault 1.072330e-01 0.0001080181 1.083393e-03 0.0006640282 1.882695e-02
## Javeline   1.311147e-01 0.0178394271 2.792182e-03 0.0016365234 1.485599e-05
## X1500m     1.768215e-03 0.0124026272 3.781848e-02 0.0104530472 3.948213e-03
```

```
# Resultados para individuos
res.ind <- get_pca_ind(res.pca)
res.ind$coord
```

```
##              Dim.1      Dim.2      Dim.3      Dim.4      Dim.5
## SEBRLE      0.1912074  1.5541282 -0.62836882  0.08205241  1.1426139415
## CLAY        0.7901217  2.4204156  1.35688701  1.26984296 -0.8068483724
## BERNARD     -1.3292592  1.6118687 -0.19614996 -1.92092203  0.0823428202
## YURKOV      -0.8694134 -0.4328779 -2.47398223  0.69723814  0.3988584116
## ZSIVOCZKY   -0.1057450 -2.0233632  1.30493117 -0.09929630 -0.1970241089
## McMULLEN    0.1185550 -0.9916237  0.84355824  1.31215266  1.5858708644
## MARTINEAU   -2.3923532 -1.2849234 -0.89816842  0.37309771 -2.2433515889
## HERNU       -1.8910497  1.1784614 -0.15641037  0.89130068 -0.1267412520
## BARRAS      -1.7744575 -0.4125321  0.65817750  0.22872866 -0.2338366980
## NOOL        -2.7770058 -1.5726757  0.60724821 -1.55548081  1.4241839810
```

```

## BOURGUIGNON -4.4137335  1.2635770 -0.01003734  0.66675478  0.4191518468
## Sebrle      3.4514485  1.2169193 -1.67816711 -0.80870696 -0.0250530746
## Clay       3.3162243  1.6232908 -0.61840443 -0.31679906  0.5691645854
## Karpov     4.0703560 -0.7983510  1.01501662  0.31336354 -0.7974259553
## Macey      1.8484623 -2.0638828 -0.97928455  0.58469073 -0.0002157834
## Warners    1.3873514  0.2819083  1.99969621 -1.01959817 -0.0405401497
## Zsivoczky  0.4715533 -0.9267436 -1.72815525 -0.18483138  0.4073029909
## Hernu      0.2763118 -1.1657260  0.17056375 -0.84869401 -0.6894795441
## Bernard    1.3672590 -1.4780354  0.83137913  0.74531557  0.8598016482
## Schwarzl   -0.7102777  0.6584251  1.04075176 -0.92717510 -0.2887568007
## Pogorelov  -0.2143524  0.8610557  0.29761010  1.35560294 -0.0150531057
## Schoenbeck -0.4953166  1.3000530  0.10300360 -0.24927712 -0.6452257128
## Barras     -0.3158867 -0.8193681 -0.86169481 -0.58935985 -0.7797389436
##           Dim.6      Dim.7      Dim.8      Dim.9      Dim.10
## SEBRLE      0.46389755 -0.20796012  0.043460568 -0.659344137  0.03273238
## CLAY       -1.30420016 -0.21291866  0.617240611 -0.060125359 -0.31716015
## BERNARD     0.40062867 -0.40643754  0.703856040  0.170083313 -0.09908142
## YURKOV     -0.10286344 -0.32487448  0.114996135 -0.109524039 -0.11969720
## ZSIVOCZKY  -0.89554111  0.08825624 -0.202341299 -0.523103099 -0.34842265
## McMULLEN   -0.18657283  0.47828432  0.293089967 -0.105623196 -0.39317797
## MARTINEAU   0.45666350 -0.29975522 -0.291628488 -0.223417655 -0.61640509
## HERNU      -0.43623496 -0.56609980 -1.529404317  0.006184409  0.55368016
## BARRAS     -0.09026010  0.21594095  0.682583078 -0.669282042  0.53085420
## NOOL       -0.49716399 -0.53205687 -0.433385655 -0.115777808 -0.09622142
## BOURGUIGNON 0.08200220 -0.59833739  0.563619921  0.525814030  0.05855882
## Sebrle      0.08279306  0.01016177 -0.030585843 -0.847210682  0.21970353
## Clay       -0.77715960  0.25750851 -0.580638301  0.409776590 -0.61601933
## Karpov     0.32958134 -1.36365568  0.345306381  0.193055107  0.21721852
## Macey      0.19728082 -0.26927772 -0.363219506  0.368260269  0.21249474
## Warners    0.55673300 -0.26739400 -0.109470797  0.180283071  0.24208420
## Zsivoczky  0.11383190  0.03991159  0.538039776  0.585966156 -0.14271715
## Hernu      0.33168404  0.44308686  0.247293566  0.066908586 -0.20868256
## Bernard    0.32806564  0.36357920  0.006165316  0.279488675  0.32067773
## Schwarzl   0.68891640  0.56568604 -0.687053339 -0.008358849 -0.30211546
## Pogorelov  1.59379599  0.78370119 -0.037623661 -0.130531397 -0.03697576
## Schoenbeck -0.16172381  0.85752368 -0.255850722  0.564222295  0.29680481
## Barras     -1.17415412  0.94512710  0.365550568  0.102255763  0.61186706

```

```
res.ind$contrib
```

```

##           Dim.1      Dim.2      Dim.3      Dim.4      Dim.5
## SEBRLE      0.03854254  5.7118249 1.385418e+00  0.03572215  8.091161e+00
## CLAY       0.65814114 13.8541889 6.460097e+00  8.55568792  4.034555e+00
## BERNARD     1.86273218  6.1441319 1.349983e-01 19.57827284  4.202070e-02

```

## YURKOV	0.79686310	0.4431309	2.147558e+01	2.57939100	9.859373e-01
## ZSIVOCZKY	0.01178829	9.6816398	5.974848e+00	0.05231437	2.405750e-01
## McMULLEN	0.01481737	2.3253860	2.496789e+00	9.13531719	1.558646e+01
## MARTINEAU	6.03367104	3.9044125	2.830527e+00	0.73858431	3.118936e+01
## HERNU	3.76996156	3.2842176	8.583863e-02	4.21505626	9.955149e-02
## BARRAS	3.31942012	0.4024544	1.519980e+00	0.27758505	3.388731e-01
## NOOL	8.12988880	5.8489726	1.293851e+00	12.83761115	1.257025e+01
## BOURGUIGNON	20.53729577	3.7757623	3.534995e-04	2.35877858	1.088816e+00
## Sebrle	12.55838616	3.5020697	9.881482e+00	3.47006223	3.889859e-03
## Clay	11.59361384	6.2315181	1.341828e+00	0.53250375	2.007648e+00
## Karpov	17.46609555	1.5072627	3.614914e+00	0.52101693	3.940874e+00
## Macey	3.60207087	10.0732890	3.364879e+00	1.81387486	2.885677e-07
## Warners	2.02910262	0.1879390	1.403071e+01	5.51585696	1.018550e-02
## Zsivoczky	0.23441891	2.0310492	1.047894e+01	0.18126182	1.028128e+00
## Hernu	0.08048777	3.2136178	1.020764e-01	3.82170515	2.946148e+00
## Bernard	1.97075488	5.1661961	2.425213e+00	2.94737426	4.581507e+00
## Schwarzl	0.53184785	1.0252129	3.800546e+00	4.56119277	5.167449e-01
## Pogorelov	0.04843819	1.7533304	3.107757e-01	9.75034337	1.404313e-03
## Schoenbeck	0.25864068	3.9969003	3.722687e-02	0.32970059	2.580092e+00
## Barras	0.10519467	1.5876667	2.605305e+00	1.84296038	3.767994e+00
##	Dim.6	Dim.7	Dim.8	Dim.9	Dim.10
## SEBRLE	2.21256620	0.621426384	2.992045e-02	12.177477305	0.03819185
## CLAY	17.48801877	0.651413899	6.035125e+00	0.101262442	3.58568943
## BERNARD	1.65019840	2.373652810	7.847747e+00	0.810319793	0.34994507
## YURKOV	0.10878629	1.516564073	2.094806e-01	0.336009790	0.51072064
## ZSIVOCZKY	8.24561722	0.111923276	6.485544e-01	7.664919832	4.32741147
## McMULLEN	0.35788945	3.287016354	1.360753e+00	0.312501167	5.51053518
## MARTINEAU	2.14409841	1.291109482	1.347216e+00	1.398195851	13.54402896
## HERNU	1.95655942	4.604850849	3.705288e+01	0.001071345	10.92781554
## BARRAS	0.08376135	0.670038259	7.380544e+00	12.547331617	10.04537028
## NOOL	2.54127369	4.067669683	2.975270e+00	0.375477289	0.33003418
## BOURGUIGNON	0.06913582	5.144247534	5.032108e+00	7.744571086	0.12223626
## Sebrle	0.07047579	0.001483775	1.481898e-02	20.105546253	1.72063803
## Clay	6.20972751	0.952824148	5.340583e+00	4.703566841	13.52708188
## Karpov	1.11680500	26.720158115	1.888802e+00	1.043988269	1.68193477
## Macey	0.40014909	1.041910483	2.089853e+00	3.798767930	1.60957713
## Warners	3.18673563	1.027384225	1.898339e-01	0.910422384	2.08904756
## Zsivoczky	0.13322327	0.022889042	4.585705e+00	9.617852173	0.72605208
## Hernu	1.13110069	2.821027418	9.687304e-01	0.125399768	1.55234328
## Bernard	1.10655655	1.899449022	6.021268e-04	2.188071254	3.66566729
## Schwarzl	4.87961053	4.598122119	7.477531e+00	0.001957159	3.25357879
## Pogorelov	26.11665608	8.825322559	2.242329e-02	0.477268755	0.04873597
## Schoenbeck	0.26890572	10.566272800	1.036933e+00	8.917302863	3.14020004
## Barras	14.17432302	12.835417603	2.116763e+00	0.292892746	13.34533825


res.ind\$cos2

##	Dim.1	Dim.2	Dim.3	Dim.4	Dim.5
## SEBRLE	0.007530179	0.49747323	8.132523e-02	0.001386688	2.689027e-01
## CLAY	0.048701249	0.45701660	1.436281e-01	0.125791741	5.078506e-02
## BERNARD	0.197199804	0.28996555	4.294015e-03	0.411819183	7.567259e-04
## YURKOV	0.096109800	0.02382571	7.782303e-01	0.061812637	2.022798e-02
## ZSIVOCZKY	0.001574385	0.57641944	2.397542e-01	0.001388216	5.465497e-03
## McMULLEN	0.002175437	0.15219499	1.101379e-01	0.266486530	3.892621e-01
## MARTINEAU	0.404013915	0.11654676	5.694575e-02	0.009826320	3.552552e-01
## HERNU	0.399282749	0.15506199	2.731529e-03	0.088699901	1.793538e-03
## BARRAS	0.616241975	0.03330700	8.478249e-02	0.010239088	1.070152e-02
## NOOL	0.489872515	0.15711146	2.342405e-02	0.153694675	1.288433e-01
## BOURGUIGNON	0.859698130	0.07045912	4.446015e-06	0.019618511	7.753120e-03
## Sebrle	0.675380606	0.08395940	1.596674e-01	0.037079012	3.558507e-05
## Clay	0.687592867	0.16475409	2.391051e-02	0.006274965	2.025440e-02
## Karpov	0.783666922	0.03014772	4.873187e-02	0.004644764	3.007790e-02
## Macey	0.363436037	0.45308203	1.020057e-01	0.036362957	4.952707e-09
## Warners	0.255651956	0.01055582	5.311341e-01	0.138081100	2.182965e-04
## Zsivoczky	0.045053176	0.17401353	6.051030e-01	0.006921739	3.361236e-02
## Hernu	0.024824321	0.44184663	9.459148e-03	0.234196727	1.545686e-01
## Bernard	0.289347476	0.33813318	1.069834e-01	0.085980212	1.144234e-01
## Schwarzl	0.116721435	0.10030142	2.506043e-01	0.198892209	1.929118e-02
## Pogorelov	0.007803472	0.12591966	1.504272e-02	0.312101619	3.848427e-05
## Schoenbeck	0.067070098	0.46204603	2.900467e-03	0.016987442	1.138116e-01
## Barras	0.018972684	0.12765099	1.411800e-01	0.066043061	1.156018e-01
##	Dim.6	Dim.7	Dim.8	Dim.9	Dim.10
## SEBRLE	0.0443241299	8.907507e-03	3.890334e-04	8.954067e-02	0.0002206741
## CLAY	0.1326907339	3.536548e-03	2.972084e-02	2.820119e-04	0.0078471026
## BERNARD	0.0179131165	1.843634e-02	5.529104e-02	3.228572e-03	0.0010956493
## YURKOV	0.0013453555	1.341980e-02	1.681440e-03	1.525225e-03	0.0018217256
## ZSIVOCZKY	0.1129176906	1.096685e-03	5.764478e-03	3.852703e-02	0.0170924251
## McMULLEN	0.0053876990	3.540616e-02	1.329562e-02	1.726733e-03	0.0239268142
## MARTINEAU	0.0147210347	6.342774e-03	6.003515e-03	3.523552e-03	0.0268211980
## HERNU	0.0212478795	3.578167e-02	2.611676e-01	4.270425e-06	0.0342288717
## BARRAS	0.0015944528	9.126203e-03	9.118662e-02	8.766746e-02	0.0551531863
## NOOL	0.0157010551	1.798232e-02	1.193105e-02	8.514912e-04	0.0005881295
## BOURGUIGNON	0.0002967459	1.579887e-02	1.401866e-02	1.220108e-02	0.0001513277
## Sebrle	0.0003886276	5.854423e-06	5.303795e-05	4.069384e-02	0.0027366539
## Clay	0.0377627839	4.145976e-03	2.107924e-02	1.049876e-02	0.0237264222
## Karpov	0.0051379747	8.795817e-02	5.639959e-03	1.762907e-03	0.0022318265
## Macey	0.0041397727	7.712721e-03	1.403282e-02	1.442502e-02	0.0048028954
## Warners	0.0411689767	9.496848e-03	1.591742e-03	4.317040e-03	0.0077841113
## Zsivoczky	0.0026253777	3.227467e-04	5.865332e-02	6.956790e-02	0.0041268259

```
## Hernu      0.0357707217 6.383462e-02 1.988402e-02 1.455601e-03 0.0141595965
## Bernard   0.0166586433 2.046050e-02 5.883405e-06 1.209056e-02 0.0159167991
## Schwarzl  0.1098063093 7.403638e-02 1.092132e-01 1.616543e-05 0.0211173850
## Pogorelov 0.4314162233 1.043115e-01 2.404103e-04 2.893750e-03 0.0002322016
## Schoenbeck 0.0071500829 2.010275e-01 1.789520e-02 8.702893e-02 0.0240826922
## Barras    0.2621297474 1.698426e-01 2.540745e-02 1.988116e-03 0.0711836486
```

El conjunto de datos tiene unas variables categóricas en la columna 13 que se quitó al inicio que corresponde al tipo de competición. Vamos a usar esa variable para agrupar los individuos.

```
groups <- as.factor(decathlon2$Competition[1:23])
fviz_pca_ind(res.pca,
  col.ind = groups, # color by groups
  palette = c("#00AFBB", "#FC4E07"),
  addEllipses = TRUE, # Concentration ellipses
  ellipse.level=0.7,
  legend.title = "Groups",
  repel = TRUE
)
```



Explica las componentes. ¿Cómo podrías llamar a las componentes 1 y 2?

3.6 Ejercicios PCA

Ejercicio 1: Carga la base de datos siguiente y realiza el análisis de componentes principales. Decide y justifica que matriz usaras, la de varianzas y covarianzas o la de correlaciones. ¿Con cuántas componentes te quedarías? ¿por qué? ¿Qué explica cada componente de las que te quedaste? ¿Cuál es la varianza total explicada por esas componentes? ¿Qué tortuga es la más grande? ¿Qué variable tiene la mayor varianza? ¿Las variables están correlacionadas positivamente? ¿Porqué?

Tortugas

```
library(readr)
turtledata <- read_delim("data/turtledata.csv",
  delim = ";", escape_double = FALSE, trim_ws = TRUE)

## Rows: 48 Columns: 4
## -- Column specification -----
## Delimiter: ";"
## dbl (4): length, width, height, female
##
## i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
```

Ejercicio 2: Trabajaremos con la base de datos **Whisky**, disponible en la librería **FactoClass**. Esta base contiene información de 35 marcas de whisky, a cada una de las cuales se le miden las siguientes variables cuantitativas:

- **price:** precio en francos franceses;
- **malt:** proporción de malta añadida;
- **aging:** años de añejamiento;
- **taste:** calificación promedio otorgada por un panel de catadores.

Además, se incluye una variable categórica:

- **type:** clasificación del whisky según su contenido de malta (1 = bajo, 2 = medio, 3 = puro).

```
library(FactoClass)
```

```
## Cargando paquete requerido: ade4

## Cargando paquete requerido: ggrepel

## Cargando paquete requerido: xtable

## Cargando paquete requerido: scatterplot3d
```

```
data(Whisky)
head(Whisky)
```

```
##   price malt type aging taste
## 1    70   20 low   5.0     3
## 2    60   20 low   5.0     2
## 3    65   20 low   7.5     2
## 4    74   25 low  12.0     2
## 5    70   25 low  12.0     3
## 6    73   30 low   5.0     0
```

Utiliza esta base para responder las siguientes preguntas.

- ¿Por qué sería conveniente aplicar PCA a esta base de datos? ¿Es importante estandarizar los datos?
- ¿Cuántas componentes principales serán necesarios para el análisis?
- ¿Cuál es la variable que más contribuye en cada eje? ¿Cuál es la que menos contribuye?
- ¿Qué representa el primer eje? ¿Qué nombre le asignaría? ¿Qué representa el segundo eje?
- ¿Cuál es el individuo mejor representado en el primer plano factorial? ¿Cuál es la peor?
- ¿Cómo podemos representar los niveles en los datos en las dos primeras componentes?

Ejercicio tomado de <https://rpubs.com/JairoAyala/PCA>.

Ejercicio 3: En este ejercicio trabajarás con el conjunto de datos Glass Identification, disponible en datos y descripciones. Este dataset contiene mediciones químicas sobre muestras de vidrio, con el objetivo original de clasificar cada muestra según su tipo (ventanas, recipientes, vidrio flotado, etc.).

El conjunto incluye $n = 214$ observaciones y $p = 9$ variables numéricas asociadas a la composición química del vidrio:

- RI: índice de refracción
- Na: Sodio
- Mg: Magnesio
- Al: Aluminio
- Si: Silicio
- K: Potasio
- Ca: Calcio
- Ba: Bario
- Fe: Hierro

Además, contiene una variable categórica **Type** que identifica el tipo de vidrio (1–7). Este set de datos fue descargado de UCI Machine Learning Repository.

Aplica un análisis de componentes principales (PCA) para:

- a) Explorar la variabilidad del conjunto de datos.
- b) Determina si se deben estandarizar o no los datos.
- c) ¿Qué matriz usarás para el PCA?
- d) Determinar el número adecuado de componentes principales.
- e) Interpretar los componentes obtenidos.
- f) Visualizar la estructura de los datos en el espacio PCA.
- g) Evaluar si existe separación entre los tipos de vidrio mediante PCA.

3.7 Tutoriales de DataCamp sugeridos

- 1) <https://www.datacamp.com/tutorial/principal-component-analysis-in-python>
- 2) <https://www.datacamp.com/tutorial/pca-analysis-r>
- 3) <https://campus.datacamp.com/es/courses/rna-seq-with-bioconductor-in-r/exploratory-data-analysis-2?ex=10>

Chapter 4

Análisis Factorial

El objetivo esencial del análisis de factores es describir las relaciones de covarianza entre muchas variables mediante unas pocas variables latentes no observables, llamadas factores. La idea central es:

- Si un conjunto de variables presenta correlaciones altas entre sí, pero bajas con otras variables, es posible que ese grupo comparta una causa común subyacente.
- Ese patrón puede interpretarse como la presencia de un factor responsable de las correlaciones dentro del grupo.

Las variables consideradas tienen una **escala de medición continua**.

$$X^T = (X_1, \dots, X_p)$$

La correlación r_{ij} entre dos variables X_i y X_j se debe a que ambas tienen una relación con una tercera variable Z_k que se considera **no observable**.

El coeficiente de **correlación parcial** $r_{ij.k}$ mide la asociación que hay entre X_i y X_j **luego de remover** el efecto que tiene Z_k en cada una.

Si $r_{ij.k} \approx 0$, se puede pensar que Z_k ha explicado la correlación existente entre X_i y X_j .

-De manera más general, pueden considerarse varias variables $Z_1, \dots, Z_m$ para explicar la asociación que existe entre X_i y X_j .

La idea en análisis de factores es:

- Explicar las correlaciones contenidas en la matriz

$$R = [r_{ij}]$$

a través de un conjunto de variables **no observables** $f_1, \dots, f_m$, llamadas **factores comunes**.

- Buscar que las correlaciones parciales $r_{ij \cdot f_1, \dots, f_m}$ sean muy pequeñas:
 - Es decir, que las correlaciones entre las variables se deban a esas f_i .
- Además, se desea que el número de factores comunes m sea **pequeño**.

Un ejemplo clásico es el de Spearman, cuyas correlaciones entre calificaciones de materias como latín, francés, inglés, matemáticas y música sugerían un factor de “inteligencia”. Otro grupo de variables, como pruebas físicas, podría reflejar un factor de condición física.

El análisis de factores busca precisamente confirmar este tipo de estructura, en la cual grupos de variables se explican por factores subyacentes.

Otro ejemplo: Las variables en los rectángulos están correlacionadas entre sí, debido a que detrás están las variables latentes (no observables) que aparecen en los óvalos.




Figure 4.1: Variables latentes

Aunque el análisis de factores está relacionado con el análisis de componentes principales (PCA) y ambos intentan aproximar la matriz de covarianzas, el enfoque de factores es más complejo: no solo reduce dimensiones, sino que intenta comprobar si los datos son consistentes con un modelo estructural prescrito.

4.1 Modelo de factores ortogonales con m factores comunes

El vector aleatorio observable X , con p componentes, tiene media μ y matriz de covarianzas Σ . El modelo de factores quiere explicar las relaciones entre las variables manifestas $X = (X_1, \dots, X_p)$ a través de m variables latentes $f_1, \dots, f_m$, llamadas **factores comunes** y p fuentes adicionales de variación $e_1, \dots, e_p$ llamados *errores* o *factores específicos*:

$$X_j = \mu_j + \lambda_{j1}f_1 + \dots + \lambda_{jm}f_m + e_j, \quad j = 1, \dots, p.$$

- μ_j y λ_{ji} son constantes.
- Los λ_{ji} se llaman también las cargas (*loadings*) de la j -ésima variable en el factor i -ésimo.
- e_j y los f_i son variables aleatorias.
- A los e_j se les llama **factores específicos**.
- Se considera que:
 - los e_j no están correlacionados entre sí;
 - los e_j son no correlacionados con los f_i .

En forma matricial, el modelo se escribe como:

$$X = \mu + \Lambda F + e,$$

o, centrando la variable,

$$X - \mu = \Lambda F + e,$$

donde:

- $X = (X_1, \dots, X_p)^\top$,
- $e^\top = (e_1, \dots, e_p)$,
- $F^\top = (f_1, \dots, f_m)$,
- Λ es una matriz de constantes:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_{11} & \cdots & \lambda_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda_{p1} & \cdots & \lambda_{pm} \end{pmatrix}.$$

Se supone que $\mathbb{E}(e) = 0$ y $\mathbb{E}(F) = 0$.

La matriz de varianzas y covarianzas de los factores específicos se denota por:

$$\text{cov}(e) = \Psi.$$

Como los e_j son no correlacionados entre sí, Ψ es **diagonal**:

$$\Psi = \begin{pmatrix} \psi_1^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \psi_2^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \psi_p^2 \end{pmatrix}.$$

Supongamos que la matriz de varianzas y covarianzas de F es Γ . Si Γ no es diagonal (i.e., las entradas son correlacionadas), como es simétrica y semidefinida positiva, puede escribirse como:

$$\Gamma = LL^\top.$$

Sea ahora el vector

$$F^* = L^{-1}F$$

Entonces:

- $E(F^*) = L^{-1}E(F) = 0$,
- $\text{var}(F^*) = L^{-1}\Gamma L^{-1\top} = L^{-1}LL^\top L^{-1\top} = I$.

Es decir, F^* tiene entradas **no correlacionadas**.

Además

- $\text{cov}(e, F) = \mathbb{E}(eF^\top) = 0$.

Si definimos $\Lambda^* = \Lambda L$, se tiene:

$$\Lambda^* F^* = \Lambda L L^{-1} F = \Lambda F.$$

Sustituyendo en el modelo:

$$X = \mu + \Lambda^* F^* + e = \mu + \Lambda^* L L^{-1} F + e = \mu + \Lambda F + e.$$

El modelo con factores no correlacionados F^* es **indistinguible** del modelo original con factores correlacionados F . Por sencillez, se consideran los factores comunes como **no correlacionados**.

Para ver las varianzas de las variables originales, partimos de:

$$X_j = \mu_j + \lambda_{j1}f_1 + \cdots + \lambda_{jm}f_m + e_j.$$

Como factores comunes y específicos son no correlacionados, al calcular la varianza:

$$\text{var}(X_j) = \sum_{k=1}^m \lambda_{jk}^2 + \text{var}(e_j) = \underbrace{\sum_{k=1}^m \lambda_{jk}^2}_{\text{comunalidad}} + \underbrace{\psi_j^2}_{\text{especificidad}}.$$

Las covarianzas entre variables quedan:

$$\text{cov}(X_i, X_j) = \sum_{k=1}^m \lambda_{ik} \lambda_{jk}.$$

En forma matricial, la matriz de varianzas y covarianzas de X se escribe como:

$$\Sigma = \Lambda \Lambda^\top + \Psi.$$

Al calcular la covarianza entre los factores comunes y las variables originales se tiene:

$$\text{cov}(X, F) = E[(\Lambda F + e)F^\top] = \Lambda E(F F^\top) + E(e F^\top) = \Lambda,$$

porque $E(F F^\top) = I$ y $E(e F^\top) = 0$.

Por tanto, las cargas λ_{ij} pueden interpretarse como la **covarianza** entre la variable original X_i y el factor f_j .

Diferencias entre Análisis de Componentes Principales (PCA) y Análisis de Factores (AF)

- El análisis de factores busca explicar las **varianzas y covarianzas** (y correlaciones).

- El análisis de componentes principales se enfoca en buscar **direcciones de máxima varianza**.
- En PCA hay tantas componentes como variables originales.
- En AF se fija de antemano el número de factores comunes m , con $m < p$.
- En AF hay varios métodos para calcular las cargas.
- En PCA las cargas se obtienen a través de eigenvalores y eigenvectores (direcciones de máxima varianza).

En AF, las cargas λ_{ij} se pueden calcular por tres métodos principales:

1. **Extracción inicial de factores:** factores principales.
2. **Factores principales iterados.**
3. **Factores por máxima verosimilitud.**

Ejemplo: Verificar que $\Sigma = \Lambda\Lambda^\top + \Psi$.

Consideremos la matriz de covarianzas

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 19 & 30 & 2 & 12 \\ 30 & 57 & 5 & 23 \\ 2 & 5 & 38 & 47 \\ 12 & 23 & 47 & 68 \end{pmatrix}$$

Queremos verificar que esta matriz puede escribirse como:

$$\Sigma = \Lambda\Lambda^\top + \Psi$$

para un modelo factorial ortogonal con $m = 2$ factores.

Vamos a considerar las siguientes matrices de cargas Λ y de varianzas específicas Ψ :

$$L = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 7 & 2 \\ -1 & 6 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}$$

y

$$\Psi = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$


```

# Definir matrices
Sigma <- matrix(c(19,30,2,12,
                  30,57,5,23,
                  2,5,38,47,
                  12,23,47,68),
                nrow = 4, byrow = TRUE)

# Matriz Lambda
L <- matrix(c(4,1,
              7,2,
              -1,6,
              1,8),
            nrow = 4, byrow = TRUE)

Psi <- diag(c(2,4,1,3)) # matriz diagonal

# Queremos verificar Sigma = L L' + Psi
LLt_plus_Psi <- L %*% t(L) + Psi

Sigma

```

```

##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]   19   30    2   12
## [2,]   30   57    5   23
## [3,]    2    5   38   47
## [4,]   12   23   47   68

```

```
LLt_plus_Psi
```

```

##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]   19   30    2   12
## [2,]   30   57    5   23
## [3,]    2    5   38   47
## [4,]   12   23   47   68

```

```
all.equal(Sigma, LLt_plus_Psi)
```

```
## [1] TRUE
```

Cálculo de la comunalidad de X_1 :

$$h_1^2 = \lambda_{11}^2 + \lambda_{12}^2 = 4^2 + 1^2 = 17$$

En R:

```
h1_sq <- L[1,1]^2 + L[1,2]^2
h1_sq
```

```
## [1] 17
```

Descomposición de la varianza de X_1 :

$$\sigma_{11} = (\lambda_{11}^2 + \lambda_{12}^2) + \psi_1 = h_1^2 + \psi_1$$

$$\underbrace{19}_{\text{varianza}} = \underbrace{4^2 + 1^2}_{\text{comunalidad}} + \underbrace{2}_{\text{varianza específica}} = 17 + 2$$

Este ejemplo muestra que:

$$\Sigma = \Lambda\Lambda^\top + \Psi$$

sí representa un modelo factorial ortogonal con 2 factores, pues toda la matriz Σ puede reconstruirse exactamente usando:

- las cargas factoriales en Λ ,
- las varianzas específicas en Ψ .

4.2 Métodos de estimación

¿Cuándo es útil el Análisis Factorial?

El objetivo del análisis factorial es determinar si un conjunto de p variables puede explicarse adecuadamente mediante unos pocos factores comunes.

Para evaluar esta idea, se compara la matriz de covarianzas muestral con la estructura propuesta por el modelo factorial.

Si las correlaciones entre variables son muy pequeñas, no vale la pena hacer un análisis factorial, porque no existen factores comunes fuertes; dominan los factores específicos.

Si la matriz de covarianzas no parece diagonal, entonces es razonable intentar un modelo factorial.

El paso central es estimar las cargas factoriales λ_{ij} y las varianzas específicas ψ_i .

Los métodos de estimación más usados son:

- Componentes principales / factores principales,
- Máxima verosimilitud (ML).

Una vez obtenidas las cargas, se aplica una rotación (Varimax, Promax, etc.) para mejorar la interpretación.

Es recomendable usar varios métodos y comparar resultados; si el modelo factorial es adecuado, las soluciones serán similares.

La estimación y la rotación requieren algoritmos iterativos, por lo que se utilizan programas especializados.

4.2.1 Factores Método de Componentes Principales y Método de Factores Principales

El punto de partida es la matriz de covarianzas poblacional Σ . Por teoría de álgebra lineal, toda matriz simétrica y semidefinida positiva puede escribirse mediante su descomposición espectral. Existen pares autovalor-autovector (λ_i, e_i) , con $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_p$, que permiten escribir:

$$\Sigma = \lambda_1 e_1 e_1' + \lambda_2 e_2 e_2' + \dots + \lambda_p e_p e_p'.$$

Esta representación puede reescribirse como

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1} e_1 & \sqrt{\lambda_2} e_2 & \dots & \sqrt{\lambda_p} e_p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1} e_1' \\ \sqrt{\lambda_2} e_2' \\ \vdots \\ \sqrt{\lambda_p} e_p' \end{bmatrix} = \Lambda \Lambda^\top,$$

donde Λ es la matriz cuyas columnas son $\sqrt{\lambda_j} e_j$.

Esta expresión coincide exactamente con la estructura del modelo factorial ortogonal

$$\Sigma = \Lambda \Lambda^\top + \Psi,$$

donde en este caso $\Psi = 0$ y el número de factores es $m = p$.

Aunque esta representación es exacta, no es útil para la reducción de dimensión porque emplea tantos factores como variables.

Si los últimos $p - m$ autovalores son pequeños, puede ignorarse su contribución y aproximar:

$$\Sigma \approx \lambda_1 e_1 e_1' + \dots + \lambda_m e_m e_m'.$$

En forma matricial:

$$\Sigma \approx \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1}e_1 & \sqrt{\lambda_2}e_2 & \cdots & \sqrt{\lambda_m}e_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1}e'_1 \\ \sqrt{\lambda_2}e'_2 \\ \vdots \\ \sqrt{\lambda_m}e'_m \end{bmatrix} = \Lambda\Lambda^\top,$$

donde Λ es ahora una matriz $p \times m$.

Esta es la base del método de *factores principales*: aproximar la covariación usando sólo los m factores más importantes.

El modelo factorial considera, además, un término de varianza específica ψ_i para cada variable. Para obtenerlo, se define:

$$\psi_i = \sigma_{ii} - \sum_{j=1}^m \lambda_{ij}^2, \quad i = 1, \dots, p,$$

donde λ_{ij} es la carga factorial correspondiente.

La aproximación factorial completa se escribe entonces como

$$\Sigma \approx \Lambda\Lambda^\top + \Psi,$$

donde Ψ es diagonal con las varianzas específicas.

Dados datos $x_1, x_2, \dots, x_n$, el primer paso es centrar las variables:

$$x_j - \bar{x} = \begin{pmatrix} x_{j1} - \bar{x}_1 \\ x_{j2} - \bar{x}_2 \\ \vdots \\ x_{jp} - \bar{x}_p \end{pmatrix}.$$

La matriz de covarianzas de estas observaciones centradas es la matriz de covarianzas muestral S .

Cuando las variables no están en las mismas unidades, se recomienda estandarizarlas:

$$z_j = \begin{pmatrix} \frac{x_{j1} - \bar{x}_1}{\sqrt{s_{11}}} \\ \frac{x_{j2} - \bar{x}_2}{\sqrt{s_{22}}} \\ \vdots \\ \frac{x_{jp} - \bar{x}_p}{\sqrt{s_{pp}}} \end{pmatrix}.$$

La matriz de covarianzas de los z_j es la matriz de correlaciones muestral R . Estandarizar evita que una variable con varianza anormalmente grande influya de manera indebida en la estimación de las cargas.

Aplicar la aproximación

$$\Sigma \approx \Lambda \Lambda^\top + \Psi$$

a S (o a R si se trabaja con variables estandarizadas), usando los autovalores y autovectores de S o R , produce la llamada **solución de componentes principales** del análisis factorial.

El nombre proviene de que las cargas factoriales λ_{ij} se derivan de los coeficientes de las primeras componentes principales, reescaladas por $\sqrt{\lambda_j}$.

RESUMEN

Solución por Componentes Principales del Modelo Factorial

El análisis factorial por componentes principales de la matriz de covarianzas muestral S se basa en sus pares autovalor–autovector estimados

$$(\hat{\lambda}_1, \hat{e}_1), (\hat{\lambda}_2, \hat{e}_2), \dots, (\hat{\lambda}_p, \hat{e}_p),$$

donde

$$\hat{\lambda}_1 \geq \hat{\lambda}_2 \geq \dots \geq \hat{\lambda}_p.$$

Sea $m < p$ el número de factores comunes elegidos.

La matriz de cargas factoriales $\{\tilde{\lambda}_{i,j}\}$ estimadas está dada por

$$\tilde{\Lambda} = \begin{bmatrix} \sqrt{\hat{\lambda}_1} \hat{e}_1 & \sqrt{\hat{\lambda}_2} \hat{e}_2 & \dots & \sqrt{\hat{\lambda}_m} \hat{e}_m \end{bmatrix}.$$

Las varianzas específicas se obtienen como los elementos diagonales de

$$S - \tilde{\Lambda} \tilde{\Lambda}^\top,$$

es decir,

$$\tilde{\Psi} = \begin{pmatrix} \tilde{\psi}_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \tilde{\psi}_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \tilde{\psi}_p \end{pmatrix}, \quad \text{donde} \quad \tilde{\psi}_i = s_{ii} - \sum_{j=1}^m \tilde{\lambda}_{ij}^2.$$

La comunalidad estimada de la variable i es

$$\tilde{h}_i^2 = \tilde{\lambda}_{i1}^2 + \tilde{\lambda}_{i2}^2 + \cdots + \tilde{\lambda}_{im}^2.$$

La solución por componentes principales del análisis factorial basada en la matriz de correlaciones se obtiene sustituyendo R en lugar de S y aplicando las mismas fórmulas.

4.2.2 Factores principales iterados

4.2.3 Factores por máxima verosimilitud

4.3 Rotación de factores

4.4 Ejemplos

4.5 Ejercicios

Chapter 5

Análisis de Conglomerados

Chapter 6

Análisis de Discriminante

Chapter 7

Apéndices

7.1 Introducción a R

- Tutorial de RMarkdown: [Link](#)
- Tutorial Manejo de Proyectos: [Link](#)

7.2 Git + Github

- Conectar R con Git y Github: [Link](#)


7.3 Correlaciones y distancias

Con los siguientes dos paquetes se pueden realizar los plots de las matrices de correlaciones y distancias.

```
library(ggcorrplot)
library(corrplot)
```

```
cor.mat_all <- cor(data.matrix(iris[,-5]), use="complete.obs")

corplot_all <- corrplot(cor.mat_all, method="shade", tl.col = "black", tl.srt = 45,
                        number.cex = 0.4, addCoef.col = "black", order = "AOE", type = "upper", addS
```



7.4 Plots Multivariados

7.4.1 Caritas de Chernoff


Instala el paquete `aplpack` y carga la base de datos `iris`.

```
install.packages("aplpack")
```

```
library(aplpack)
data(iris)
```

```
faces(iris[c(1,51,101),1:4],
      nrow.plot = 1,
      ncol.plot = 3,
      main = "La primer flor de cada especie", print.info = TRUE)
```

La primer flor de cada especie




```
## effect of variables:
## modified item      Var
## "height of face   " "Sepal.Length"
## "width of face    " "Sepal.Width"
## "structure of face" "Petal.Length"
## "height of mouth  " "Petal.Width"
## "width of mouth   " "Sepal.Length"
## "smiling          " "Sepal.Width"
## "height of eyes   " "Petal.Length"
## "width of eyes    " "Petal.Width"
## "height of hair   " "Sepal.Length"
## "width of hair    " "Sepal.Width"
## "style of hair    " "Petal.Length"
## "height of nose   " "Petal.Width"
## "width of nose    " "Sepal.Length"
## "width of ear     " "Sepal.Width"
## "height of ear    " "Petal.Length"
```

Para los elementos de color de las caras, los colores son encontrados al promediar los conjuntos de variables: (7,8)-eyes:iris, (1,2,3)-lips, (14,15)-ears, (12,13)-nose, (9,10,11)-hair, (1,2)-face (From ?faces).

Grafiquemos las primeras 10 flores de cada especie:

```
faces(iris[c(1:10,51:60,101:110),1:4],
      nrow.plot = 3,
```


```
ncol.plot = 10,
main = "Las primeras 10 flores de cada especie", print.info = FALSE)
```



Ahora grafiquemos las primeras 5:

```
faces(iris[c(1:5,51:55,101:105),1:4],
      nrow.plot = 3,
      ncol.plot = 5,
      main = "Las primeras 5 flores de cada especie", print.info = FALSE)
```

Las primeras 5 flores de cada especie



Aquí podemos notar que la carita 54 es muy diferente a las demás de su especie. La carita 102 se parece más a la de la especie 55 que a las suyas. El pelo de la primera especie es muy diferente a los de las otras especies.

Es muy “fácil” hacer grupos a ojo.

```
apply(iris[,1:4],2,max)
```


```
## Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
##           7.9           4.4           6.9           2.5
```

```
apply(iris[,1:4],2,min)
```

```
## Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
##           4.3           2.0           1.0           0.1
```

```
chico<-c(4,2,1,.05) # Valores más chicos de las 4 variables.
grande<-c(8,5,7,3) # Valores más grandes de las 4 variables.
faces(rbind(iris[c(1:10,51:60,101:110),1:4],chico,grande), nrow.plot=5, ncol.plot=10,main="Primer
```

Primeros 10 de cada especie + chico + grande




```
## effect of variables:
## modified item      Var
## "height of face"   "Sepal.Length"
## "width of face"    "Sepal.Width"
## "structure of face" "Petal.Length"
## "height of mouth"  "Petal.Width"
## "width of mouth"   "Sepal.Length"
## "smiling"          "Sepal.Width"
## "height of eyes"   "Petal.Length"
## "width of eyes"    "Petal.Width"
## "height of hair"   "Sepal.Length"
## "width of hair"    "Sepal.Width"
## "style of hair"    "Petal.Length"
## "height of nose"   "Petal.Width"
## "width of nose"    "Sepal.Length"
## "width of ear"     "Sepal.Width"
## "height of ear"    "Petal.Length"
```

Ejercicio: Explora el siguiente plot, ¿porqué sonrisas?.

```
faces(cbind(iris[1:15,1:4],rep(1:5,rep(3,1)), rep(c(2,4,6),rep(5,3))),
      nrow.plot = 3,
      ncol.plot = 5,
      main = "¿Sonrisas?", print.info = FALSE)
```


¿Sonrisas?



Con las caritas de Chernoff es mejor la representación o visualización si se tienen pocos datos y se pueden representar hasta 15 variables.

7.4.2 Curvas de Andrew

Instala y carga el paquete Andrews.


```
install.packages(andrews)
```

```
library(andrews)
```


```
## See the package vignette with `vignette("andrews")`
```

```
par(mfrow=c(2,2))
andrews(iris, type = 1, clr = 5, ymax = 3, main = "Curva tipo 1")
andrews(iris, type = 2, clr = 5, ymax = 3, main = "Curva tipo 2")
andrews(iris, type = 3, clr = 5, ymax = 3, main = "Curva tipo 3")
andrews(iris, type = 4, clr = 5, ymax = 3, main = "Curva tipo 4")
```


Curva tipo 1




Curva tipo 2



Curva tipo 3



Curva tipo 4



Podemos observar que las especies de color rojo se separan más de las otras dos en casi todos los casos. Hay intersecciones en las curvas.

Ejercicio: Carga las bases de datos `mtcars` y `ChickWeight` y explora sus curvas de Andrews.

7.4.3 Gráficos de Paralelas


```
library(lattice)
```

```
##
## Adjuntando el paquete: 'lattice'
```

```
## The following object is masked from 'package:nFactors':
##
##      parallel
```

```
data(mtcars)
parallelplot(~mtcars|mtcars$cyl, main="Plot de paralelas por Cilindros")
```


Plot de paralelas por Cilindros



En el eje Y podemos ver todas las variables. Los cruces reflejan correlaciones negativas entre las variables.


```
parallelplot(~mtcars[,c(1,6,7,3,4,5)],col=as.numeric(mtcars$cyl)-3,main="Plot de paralelas por Cilindros")
```

Plot de paralelas por Cilindros



En este plot se pueden ver los grupos por colores, los que pesan poco tienen un mayor rendimiento. Cuando no hay cruces reflejan correlación positiva.

```
parallelplot(~mtcars[,c(1,3,4,5)],col=1)
```



Si calculamos la matriz de correlaciones, podemos ver que las variables con correlación negativa se reflejan aquí también.

```
round(cor(mtcars[,c(1,3,4,5)]),2)
```


```
##      mpg  disp   hp  drat
## mpg   1.00 -0.85 -0.78  0.68
## disp -0.85  1.00  0.79 -0.71
## hp    -0.78  0.79  1.00 -0.45
## drat   0.68 -0.71 -0.45  1.00
```

Estos gráficos también dependen del orden de las variables.

Ejercicio: realiza dos plots de paralelas de la base de datos iris, uno dividido por especie y otro donde el color vaya a la variable especie. ¿Qué puedes decir al respecto?


7.4.4 Estrellas

```
palette(rainbow(12, s = 0.6, v = 0.75))
stars(mtcars[, 1:7], len = 0.8, key.loc = c(12, 1.5),
      main = "Motor Trend Cars", draw.segments = TRUE)
```



También se puede realizar un plot de radar.


```
stars(mtcars[, 1:7], locations = c(0, 0), radius = FALSE,
      key.loc = c(0, 0), main = "Motor Trend Cars", lty = 2)
```



Ejercicio: Crea los plots de estrellas de la base de datos iris. ¿Qué puedes inferir de ellos?

7.4.5 Plots 3D

```
attach(iris)
cloud(Sepal.Length~Sepal.Width*Petal.Length|Species,main="3D Scatterplot IRIS por Espe
```

3D Scatterplot IRIS por Especie**7.4.6 Ejercicios**

1. Carga la base de datos de marketing. Explora los plots multivariados y describe tus observaciones sobre las variables.