

Թեմա 16

Գծորեն կապակցված փարածություններ, գծային կապակցվածությունը որպես փոպոլոգիական հատկություն: Կապը կապակցվածություն և գծային կապակցվածություն հասկացությունների միջև: Տոպոլոգիական փարածության գծային կապակցվածության բաղադրիչները:

Նախորդ թեմայում պարզաբանեցինք կապակցված փոպոլոգիական փարածություն և փարածության կապակցվածության բաղադրիչ հասկացությունները: Մասնավորապես փեսանք, որ թվային ուղիղը կապակցված է և ունի կապակցվածության մի բաղադրիչ՝ ինքը \mathbb{R} -ը: Իսկ $\mathbb{R} \setminus 0 = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ փարածությունը (որպես \mathbb{R} -ի ենթափարածություն) կապակցված չէ և ունի կապակցվածության երկու բաղադրիչ՝ $(-\infty, 0)$ և $(0, +\infty)$:

Այս օրինակներում ենթագիտակցաբար (կամ բառացի) կապակցվածությունը կարող է ընկալվել նաև որպես փվյալ փարածության կամայական մի կետից մի այլ կետ ինչ-որ ճանապարհով (ուղիով) անընդհար փեղափոխվելու հնարավորություն: Բնական է համարել, որ \mathbb{R} -ում դա հնարավոր է, իսկ ~~սակայն~~ $\mathbb{R} \setminus 0$ փարածությունում -1 կետից $+1$ կետ որևէ ուղիով անընդհար փեղափոխվել հնարավոր չէ (0 կետի հեռացումը խախտում է \mathbb{R} -ի ամբողջականությունը): Այս ամենի հստակեցումը մեզ բերում է գծորեն կապակցված փարածություն հասկացությանը:

Սահմանում: X փոպոլոգիական փարածությունում ուղի կոչվում է $I = [0; 1]$ հատվածի ամեն մի $f : I \rightarrow X$ անընդհար արտապարկերում: Եթե $f(0) = x_0$, $f(1) = x_1$, ապա x_0 -ն և x_1 -ը կոչվում են f ուղու սկիզբ և վերջ: Եթե $f : I \rightarrow X$ ուղի, ~~և~~ որը միացնում է x_0 կետը x_1 կետին, ապա $\bar{f} : I \rightarrow X$, $\bar{f}(t) = f(1-t)$, $t \in I$ արտապարկերումը նույնպես ուղի է, որը միացնում է x_1 -ը x_0 -ին: Եթե f ուղին այնպիսին է, որ $f(t) = x_0$, $\forall t \in I$, ապա f -ը կոչվում է հաստատուն ուղի x_0 կետում և նշանակվում է ε_{x_0} :

Դիցուք ունենք $f, g : I \rightarrow X$ ուղիներ X -ում, ընդ որում $f(0) = x_0$, $f(1) = x_1$ և $g(0) = x_1$, $g(1) = x_2$: Սահմանենք նոր՝ $h : I \rightarrow X$ արտապարկերում՝


$$h(t) = \begin{cases} f(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ g(2t-1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

բանաձևով: Նկատենք, որ $h(0) = f(0) = x_0$, $h(1) = g(1) = x_2$:

Այս արտապարկերումը կոչվում է f և g ուղիների արտադրյալ և նշանակվում է $f * g$:

Թեորեմ 1: Ուղիղների $f * g$ արտադրյալը ուղի է, որն սկսվում է x_0 կետից և ավարտվում է x_2 կետում:

Օրինակ՝ \mathbb{R}^3 փարածությունում հնարավոր չէ առանց ինքնահապումների $x^2 + y^2 = r^2, z = 0$ շրջանագիծը անընդհար ձևափոխումներով համընկեցնել այսպես կոչված «երեքնուկաձև» օվալի հետ: Մինչդեռ դրանք հոմեոմորֆ են միմյանց:



Իրոք, վերցնելով շրջանագծի վրա x_1, x_2, \dots, x_9 կետերը, իսկ օվալի վրա y_1, y_2, \dots, y_9 կետերը, մենք կարող ենք նախ կառուցել հոմեոմորֆիզմներ այդ պարկերների համապատասխան աղեղների միջև՝ $h_1 : x_1x_2 \rightarrow y_1y_2, h_2 : x_2x_3 \rightarrow y_2y_3, \dots, h_8 : x_8x_9 \rightarrow y_8y_9, h_9 : x_9x_1 \rightarrow y_9y_1$: Այնուհետև հաջորդաբար «սոսնձելով» այդ արտապարկերումներից յուրաքանչյուրն իր հաջորդի հետ (թեմա 12-ի ~~12~~ թեորեմ 3-ի իմաստով), կստանանք որոնվող h հոմեոմորֆիզմ:

Ապացուցելու համար մնում է ցույց տալ $f * g$ արտապարկերման անընդհատությունը: Այն անմիջապես հետևում է թեմա 12-ի թեորեմ 3-ից:

Սահմանում: X փոպոլոգիական փարածությունը կոչվում է **գծորեն կապակցված փարածություն**, եթե նրա ցանկացած x_1 և x_2 կետեր կարող են միացվել որևէ ուղիով X -ում:

Թեորեմ 2: Դիցուք $x_0 \in X$ որևէ սկեռված կետ է: Ապա X -ը գծորեն կապակցված է այն և միայն այն դեպքում, երբ X -ի ցանկացած կետ միացվում է x_0 -ին որևէ ուղիով:

Ապացուցում: Պայմանի անհրաժեշտությունը *հեղինակի* ցույց տանք բավարարությունը: Ըստ պայմանի՝ $\forall x_1, x_2 \in X$ կետերի համար գոյություն ունեն $f, g : I \rightarrow X$ ուղիներ, որ $f(0) = g(0) = x_0$ և $f(1) = x_1, g(1) = x_2$: Ուստի $\bar{f} * g$ ուղին x_1 -ը միացնում է x_2 -ին: ■

Սահմանում: X փարածության Y ենթաբազմությունը կոչվում է X -ի **գծորեն կապակցված ենթաբազմություն**, եթե Y -ը գծորեն կապակցված է որպես X -ի ենթափարածություն: Սա համարժեք է նրան, որ Y -ի կամայական y_1, y_2 կետեր կարող են միացվել որևէ $f : I \rightarrow Y$ ուղիով:

Նկատենք, որ շնորհիվ $I \rightarrow Y \subset X$ համադրության անընդհատության՝ f -ը նաև ուղի է X -ում:

Թեորեմ 3: Դիցուք X փարածությունը ներկայացված է որպես իր որոշ $X_j, j \in J$ գծորեն կապակցված ենթաբազմությունների միավորում՝ եթե $\bigcap_j X_j \neq \emptyset$, ապա X -ը ևս գծորեն կապակցված է:

Ապացուցում: Դիցուք $x_0 \in \bigcap_j X_j$ որևէ սկեռված կետ է, դիտարկենք կամայական $x_1 \in X$ կետ: Գոյություն ունի այնպիսի X_j , որ $x_1 \in X_j$ և այնպիսի $f : I \rightarrow X_j$ ուղի, որ $f(0) = x_0, f(1) = x_1$: Եթե $h_j : X_j \rightarrow X$ արտապարկերումը X_j ենթաբազմության ներդրում է X -ի մեջ (այսինքն $h_j(x) = x, \forall x \in X_j$ կետի դեպքում): Ապա $h_j \circ f$ ուղին միացնում է x_0 կետը x_1 կետին: Ուստի X -ը գծորեն կապակցված է ըստ թեորեմ 2-ի: ■

Թեորեմ 4: \mathbb{R}^n էվկլիդեսյան փարածության ցանկացած ուռուցիկ ենթաբազմություն գծորեն կապակցված է:

Ապացուցում: Եթե $x, y \in \mathbb{R}^n$, ապա $(1-t)x + ty, t \in I$ տեսքի բոլոր կետերի բազմությունը x, y ծայրակետերով $[x, y]$ հատվածն է \mathbb{R}^n -ում (տես թեմա 14-ի վերջում): Ներկաբար, եթե W -ն ուռուցիկ ենթաբազմություն է \mathbb{R}^n -ում և $x, y \in W$, ապա $[x, y]$ հատվածը պարունակվում է W -ում և $f : I \rightarrow W, f(t) = (1-t)x + ty, t \in I$ արտապարկերումը ուղի է W -ում, որը միացնում է x -ը y -ին: ■

Թեորեմ 5: Տարածության գծային կապակցվածությունը փոպոլոգիական հատկություն է:


Ապացուցում: Բավական է ցույց տալ, որ գծորեն կապակցված փարածության կերպարը անընդհատ արտապատկերման դեպքում նույնպես գծորեն կապակցված է: Դիցուք $h : X \rightarrow Y$ անընդհատ է և $h(X) = Y$: Դիտարկենք $\forall y_1, y_2 \in Y$ կետեր: Պայմանից հետևում է, գոյություն ունեն $x_1, x_2 \in X$ կետեր, որ $h(x_1) = y_1, h(x_2) = y_2$, և գոյություն ունի այնպիսի $f : I \rightarrow X$ ուղի, որ $f(0) = x_1, f(1) = x_2$: Ուստի $g = h \circ f$ համադրույթը ուղի է Y -ում և $g(0) = y_1, g(1) = y_2$: ■

Կապը կապակցվածության և գծային կապակցվածության միջև

Թեորեմ 6: Ամեն մի գծորեն կապակցված փարածություն նաև կապակցված փարածություն է:

Ապացուցում: Դիցուք X -ը գծորեն կապակցված է, բայց կապակցված չէ: Նշանակում է գոյություն ունեն X -ի ոչ դափարկ, չհարվող U և V բաց ենթաբազմություններ, որ $X = U \cup V$: Վերցնենք որևէ $x_1 \in U, x_2 \in V$ կետեր: Ապա գոյություն ունի $f : I \rightarrow X$ ուղի, որ $f(0) = x_1, f(1) = x_2$: Ունենք $I = f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V)$, ընդ որում $f^{-1}(U)$ -ն և $f^{-1}(V)$ -ն ոչ դափարկ, չհարվող բաց ենթաբազմություններ են $[0; 1]$ հատվածում, ինչը հակասում է $[0; 1]$ -ի կապակցվածությանը: ■

Կապակցված փարածությունը կարող է գծորեն կապակցված չլինել: Բերենք համապատասխան օրինակ: Ներկայացնելով $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ հարթության (x, y) կետերը նաև որպես $x + iy$ կոմպլեքս թվեր՝ դիտարկենք \mathbb{R}^2 -ի A և B երկու ենթաբազմություններ՝ $A = \{i\}, B = [0; 1] \cup \left\{ \frac{1}{n} + yi; n \in \mathbb{N}, 0 \leq y \leq 1 \right\}$, որտեղ $[0; 1]$ -ը OX առանցքի $\{(x, 0); 0 \leq x \leq 1\}$ ենթաբազմությունն է: Դիտարկենք \mathbb{R}^2 հարթության $C = A \cup B$ ենթաբազմությունը \mathbb{R}^2 -ի սովորական մետրիկայից փոպոլոգիայից մակաձված փոպոլոգիայով:



Թեորեմ 7: C -ն կապակցված, բայց ոչ գծորեն կապակցված փարածություն է:

Ապացույցը ստացվում է հետևյալ երեք պնդումներից:

Պնդում 1. C -ն կապակցված փարածություն է:

Իրոք, քանի որ B -ի յուրաքանչյուր $B_n = [0; 1] \cup \left\{ \frac{1}{n} + yi, 0 \leq y \leq 1 \right\}$ ենթաբազմությունը կապակցված է որպես երկու հապավող հապավածների միավորում (տես նկար ա-ն) և $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n \neq \emptyset$, ուստի C -ի $B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$ ենթաբազմությունը կապակցված է ըստ թեմա 15-ում թերեմ 3-ի:

Մյուս պնդումը ձևակերպելու համար կանգ առնենք i կետի շրջակայքերի մի առանձնահատկության վրա: Դիտարկենք i կետի $U = C \cap \left\{ z \in \mathbb{R}^2; |z - i| < \frac{1}{2} \right\}$ բաց շրջակայքը C փարածությունում (տես նկար բ-ն): Այսպես $\left\{ z \in \mathbb{R}^2; |z - i| < \frac{1}{2} \right\}$ ենթաբազմությունը i կենտրոնով $r = \frac{1}{2}$ շառավղով բաց շրջան է \mathbb{R}^2 -ում: Նկատենք, որ $U \cap B$ ենթաբազմությունը զույգ առ զույգ իրար հետ չհապավող $V_n = U \cap \left\{ \frac{1}{n} + yi; 0 \leq y \leq 1 \right\}, n > 2$ ենթաբազմությունների միավորումն է:

Պնդում 2. Յուրաքանչյուր V_n բաց և փակ ենթաբազմություն է U փարածությունում:

Իրոք, քանի որ ամեն $\left\{ \frac{1}{n} + yi; 0 \leq y \leq 1 \right\}$ ենթաբազմություն փակ է \mathbb{R}^2 -ում (հիմա *compact*), ուստի V_n -ը փակ է U ենթաբազմությունում ըստ մակաձված տոպոլոգիայի սահմանման: Մյուս կողմից V_n -ը կարող է ներկայացվել

$$V_n = U \cap \left\{ (x, y); \frac{1}{n-1} < x < \frac{1}{n+1}, y \in \mathbb{R} \right\}$$

տեսքով, որտեղ $\left\{ (x, y); \frac{1}{n-1} < x < \frac{1}{n+1}, y \in \mathbb{R} \right\}$ ենթաբազմությունը բաց է \mathbb{R}^2 -ում որպես երկու $\left\{ (x, 0); \frac{1}{n-1} < x < \frac{1}{n+1} \right\}$ և $\{(0, y), y \in \mathbb{R}\}$ բաց ենթաբազմությունների ուղիղ արտադրյալ: Ներկայացնելով V_n -ը նաև բաց ենթաբազմություն է U փարածությունում:

Վերջապես ապացուցելու համար, որ C -ն գծորեն կապակցված չէ, բավական է ցույց տալ, որ i կետը հնարավոր չէ C -ում ուղիով միացնել B -ի որևէ կետի հետ: Դրա համար ցույց կրանք, որ եթե $f: I \rightarrow C$ ուղին այնպիսին է, որ $f(0) = i$, ապա f -ը հաստատուն ուղի է, այսինքն՝ $f(t) = i, \forall t \in I$ դեպքում: Նախ ապացուցենք:

Պնդում 3. Ցանկացած $t_0 \in f^{-1}(i)$ կետ ներքին կետ է $f^{-1}(i) \subset I$ ենթաբազմության համար:

Ապացուցում: Դիտարկենք $f(t_0) = i$ կետի վերը բերված U բաց շրջակայքը C -ում: Քանի որ f -ը անընդհատ է t_0 կետում, ուստի գոյություն ունի $\varepsilon > 0$ թիվ, որ $f(t) \in U$, երբ $|t - t_0| < \varepsilon$, այսինքն՝ երբ $t \in [0, 1] \cap (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)$: Ցույց տանք, որ t_0 -ի այդ շրջակայքն ընկած է $f^{-1}(i)$ ենթաբազմությունում: Ենթադրենք հակառակը. դիցուք գոյություն ունի $t_1 \in [0, 1] \cap (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)$ կետ և $f(t_1) \neq i$: Նշանակում է $f(t_1) \in U \cap B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} V_n$, ուստի գոյություն ունի $n_1 > 2$ բնական թիվ, որ $f(t_1) \in V_{n_1}$: Քանի որ $[0, 1] \cap (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)$ ենթաբազմությունը հեղուկ է երեք $(t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)$,

$[0; t_0 + \varepsilon)$ և $(t_0 - \varepsilon, 1]$ ենթաբազմություններից որևէ մեկն է, ուստի այն կապակցված ենթաբազմություն է $[0, 1]$ -ում: Ներկաբար $W = f([0, 1] \cap (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)) \subset U$ ենթաբազմությունը կապակցված է շնորհիվ f -ի անընդհատության: Քանի որ $W \subset U$, իսկ V_{n_1} -ը համաձայն պնդում 2-ի բաց և փակ ենթաբազմություն է U -ում, ուստի $V_{n_1} \cap W$ -ն բաց և փակ է W -ում (ըստ U -ից W -ի վրա մակաձված փոփոխության սահմանման): Բացի այդ $f(t_1) \in V_{n_1} \cap W$ և ուրեմն $V_{n_1} \cap W \neq \emptyset$: Այժմ W -ի կապակցվածությունից հետևում է, որ $W = V_{n_1} \cap W$, ուստի $W \subset V_{n_1}$: Բայց դա անհնարին է, քանի որ մի կողմից $i = f(t_0) \in W \subset V_{n_1}$, իսկ մյուս կողմից $i \notin V_{n_1}$: Ներկաբար $[0, 1] \cap (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon) \subset f^{-1}(i)$, և ուրեմն ցանկացած $t_0 \in f^{-1}(i)$ կետ ներքին կետ է $f^{-1}(i)$ ենթաբազմության համար: ■

Այժմ պարբերաբար ենք ավարտելու թեորեմ 7-ի ապացուցումը:

Նախ, որպես հետևանք պնդում 3-ից ստանում ենք, որ $f^{-1}(i)$ -ն ոչ դատարկ բաց ենթաբազմություն է $[0, 1]$ -ում: Մյուս կողմից, $\{i\}$ -ն փակ ենթաբազմություն է C -ում, ուստի $f^{-1}(i)$ -ն փակ ենթաբազմություն է $[0, 1]$ -ում շնորհիվ f -ի անընդհատության: Ներկաբար $f^{-1}(i) = [0, 1]$ շնորհիվ $[0, 1]$ -ի կապակցվածության: ■

Տոպոլոգիական տարածության գծային կապակցվածության

բաղադրիչները

սահմանվում են կապակցվածության բաղադրիչների նմանությամբ:

Սահմանում: Տոպոլոգիական տարածության գծային կապակցվածության բաղադրիչը կոչվում է նրա ամեն մի գծորեն կապակցված ենթաբազմություն, որը չի պարունակում իրենից փաթեթ որևէ գծորեն կապակցված ենթաբազմությունում:

Մոպոլոգիական տարածության կապակցվածության բաղադրիչների նմանությամբ, գծային կապակցվածության բաղադրիչները կոչվում են հետևյալ հասկացումներով:

- Ն1. Տարածության ամեն մի կետ պարկանում է գծային կապակցվածության որևէ բաղադրիչի,
- Ն2. Գծային կապակցվածության ցանկացած երկու բաղադրիչ կամ չեն հատվում, կամ համընկնում են,
- Ն3. Տարածության գծային կապակցվածության բաղադրիչների քանակը (իզոտրությունը) փոփոխական չէ:

Այդուհանդերձ կապակցված ենթաբազմության և կապակցվածության բաղադրիչների ոչ բոլոր հատկություններն են տարածվում գծորեն կապակցված ենթաբազմության և գծային կապակցվածության բաղադրիչների վրա:

Մասնավորապես գծորեն կապակցված ենթաբազմության փակումը կարող է չլինել գծորեն կապակցված ենթաբազմություն: