

Théorème de Hille-Yosida et applications

Sacha Ben-Arous, Quentin Verrier, Clément Robiez

March 3, 2024

ENS Paris-Saclay

Théorème de Hille-Yosida

Équation de la chaleur

Régularité elliptique

Théorème de Hille-Yosida

On travaille dans un espace de Hilbert H . On considère un opérateur linéaire non borné (i.e non continu) $A : D(A) \rightarrow H$.

- A est monotone si $\forall v \in D(A), \langle Av, v \rangle \geq 0$
- A est maximal si $\forall f \in H, \exists u \in D(A), u + Au = f$

Si A est un opérateur maximal monotone, alors :

- $D(A)$ est dense dans H
- Le graphe de A est fermé
- $\forall \lambda > 0$, $(I + \lambda A)$ est une bijection, et $\|(I + \lambda A)^{-1}\|_{\mathcal{L}(H)} \leq 1$

Soit A est un opérateur maximal monotone, on note pour $\lambda > 0$:

- $J_\lambda := (I + \lambda A)^{-1}$ la résolvante de A
- $A_\lambda := \frac{1}{\lambda}(I - J_\lambda)$ l'approximation de Yosida de A

Rq : A_λ est continue et définie sur H .

Soit A est un opérateur maximal monotone, on note pour $\lambda > 0$:

- $J_\lambda := (I + \lambda A)^{-1}$ la résolvante de A
- $A_\lambda := \frac{1}{\lambda}(I - J_\lambda)$ l'approximation de Yosida de A

Rq : A_λ est continue et définie sur H .

On a les propriétés suivantes :

- $A_\lambda v = A(J_\lambda v)$ et $A_\lambda v = J_\lambda(Av)$
- $\lim_{\lambda \rightarrow 0} J_\lambda v = v$ et $\lim_{\lambda \rightarrow 0} A_\lambda v = Av$
- $\|A_\lambda v\| \leq \frac{1}{\lambda} \|v\|$ et $\|A_\lambda v\| \leq \|Av\|$

Théorème de Hille-Yosida

Théorème (Hille-Yosida) :

Soit A un opérateur maximal monotone.

Alors, $\forall u_0 \in D(A)$, $\exists ! u \in \mathcal{C}^1([0, +\infty[, H) \cap \mathcal{C}([0, +\infty[, D(A))$ tel que :

$$(*) \begin{cases} \frac{du}{dt} + Au = 0 & \text{sur } [0, +\infty[\\ u(0) = u_0 \end{cases}$$

De plus $\forall t \geq 0$, $\|u(t)\| \leq \|u_0\|$ et $\left\| \frac{du}{dt} \right\| \leq \|Au_0\|$

Preuve (1) : Unicité

Soient u_1, u_2 solutions de (*), on a :

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \frac{d}{dt} |u_1 - u_2|^2 &= \left\langle \frac{d}{dt} (u_1 - u_2), (u_1 - u_2) \right\rangle \\ &= - \langle A(u_1 - u_2), (u_1 - u_2) \rangle \leq 0\end{aligned}$$

Or $u_1(0) = u_2(0) = u_0$, donc $\forall t \geq 0, u_1(t) = u_2(t)$

Preuve (2) : Approximations

Soit $\lambda \geq 0$:

$$(**) \begin{cases} \frac{d}{dt}u_\lambda + A_\lambda u_\lambda = 0 \\ u_\lambda(0) = u_0 \end{cases}$$

Il existe u_λ solution \mathcal{C}^∞ de $(**)$ par C-L.

On a $\langle A_\lambda u_\lambda, u_\lambda \rangle \geq 0$ et $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} |u_\lambda|^2 \leq 0$ donc $|u_\lambda| \leq u_0$.

Par le même raisonnement, on obtient la décroissance de toutes les dérivées.

Preuve (3) et (4) : Convergence

Soit $\lambda, \mu \geq 0$, on a de même $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} |u_\lambda - u_\mu|^2 \leq 2(\lambda + \mu) |Au_0|^2$, et en intégrant on obtient :

$$|u_\lambda - u_\mu| \leq 2\sqrt{(\lambda + \mu)t} |Au_0|$$

Donc sur tout segment $[0, T]$ on a une suite de Cauchy, sur lequel la convergence va être uniforme vers $u \in \mathcal{C}([0, +\infty[, H)$.

Si de plus $u_0 \in D(A^2)$, on peut refaire le même raisonnement avec les dérivées pour obtenir $u \in \mathcal{C}^1([0, +\infty[, H)$.

Preuve (5) : Densité

On remarque que $\lim_{\lambda \rightarrow 0} J_\lambda u_\lambda = u$, et de plus $\frac{d}{dt} u_\lambda + A(J_\lambda u_\lambda) = 0$.

Alors, A étant fermé, on en déduit que $\forall t \geq 0, u(t) \in D(A)$, et $u \in \mathcal{C}([0, +\infty[, D(A))$, donc que u est solution de $(*)$.

Preuve (5) : Densité

On remarque que $\lim_{\lambda \rightarrow 0} J_\lambda u_\lambda = u$, et de plus $\frac{d}{dt} u_\lambda + A(J_\lambda u_\lambda) = 0$.

Alors, A étant fermé, on en déduit que $\forall t \geq 0, u(t) \in D(A)$, et $u \in \mathcal{C}([0, +\infty[, D(A))$, donc que u est solution de $(*)$.

Lemme :

Soit $u_0 \in D(A)$, en notant $u'_0 := J_\lambda u_0 \in D(A)$, on a $u'_0 + \lambda A u'_0 = u_0$.

Alors $u'_0 \in D(A^2)$, et $\lim_{\lambda \rightarrow 0} J_\lambda u_0 = u_0$ et $\lim_{\lambda \rightarrow 0} J_\lambda A u_0 = A u_0$, ce qui donne la densité de $D(A^2)$ dans $D(A)$.

Preuve (6) : Densité

Soit $(u_{0,n})_{n \in \mathbb{N}} \in D(A^2)^{\mathbb{N}}$ qui tend vers u_0 pour la norme du graphe. On considère les solutions $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ associées par l'étape (5). Par décroissance, on a

$$\begin{cases} |u_n(t) - u_m(t)| \leq |u_{0,n} - u_{0,m}| \rightarrow 0 \\ \left| \frac{du_n}{dt}(t) - \frac{du_m}{dt}(t) \right| \leq |Au_{0,n} - Au_{0,m}| \rightarrow 0 \end{cases}$$

Alors convergence uniforme sur \mathbb{R}^+ , leur limite vérifie $u \in \mathcal{C}^1([0, +\infty[, H)$

Comme A est fermé, $\forall t \geq 0, u(t) \in D(A)$, et u satisfait le problème initial, ce qui achève la preuve.



Équation de la chaleur

Régularité elliptique
