



دَوْلَةُ لِيْبِيَا

وَزَارَةُ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ

مَرْكَزُ الْمَنَاحِجِ التَّعْلِيمِيَّةِ وَالْبَحْثِ التَّرْبَوِيِّ

الرِّيَاضِيَّات

لِلصَّفِّ التَّاسِعِ مِنْ مَرَحَلَةِ التَّعْلِيمِ الْأَسَاسِيِّ



دَوْلَةُ لِيْبِيَا
وَزَارَةُ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ
مَرْكَزُ الْمَنَاحِجِ التَّعْلِيمِيَّةِ وَالْبَحْثِ التَّرْبَوِيِّ

جميع الحقوق محفوظة: لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه، أو تسجيله، أو تصويره بأية وسيلة دون موافقة خطية من إدارة المناهج بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بليبيا.

العام الدراسي
1446 - 1447 هـ
2025 - 2026 م

تمهيد

تركز سلسلة رياضيات التعليم الأساسي والثانوي على دمج مهارات التفكير، وثقافة المعلومات، والتربية الوطنية ضمن تعليم وتعلم الرياضيات.

وتتكون السلسلة من ثلاثة كتب للشق الثاني من مرحلة التعليم الأساسي، وثلاثة كتب للصفوف الثلاثة من مرحلة التعليم الثانوي. وقد رتبت المادة ترتيباً تربوياً سلبياً يُدعم فيه التفكير المجرد بأمثلة ملموسة. تُعرض على سبيل المثال في الفصل الخاص بالمعادلات الآتية، الحلول البيانية للمعادلات الآتية الخطية مع الحلول الجبرية. وتوفر في ذلك المدخل الحلول البيانية الأمثلة التصويرية الملموسة. فتساعد الطلبة على فهم الحلول التي تم التوصل إليها جبرياً بشكل أفضل.

وقد روعي تقديم المفاهيم الواحد تلو الآخر لكي يستوعبها الطلبة بسهولة. وعُزز فهم المفاهيم بالاستخدام الحكيم للأمثلة المحلولة والتدريبات متدرجة الصعوبة.

تُرَكِّز كتب مرحلة التعليم الأساسي على إتقان وتطبيق المهارات الأساسية بحيث يُكوّن أساس سليم للدراسات التالية. وتتضمن المهارات الأساسية التقدير، والحسابات الذهنية، ومعالجة البيانات.

وتُستخدم في كل جزء من السلسلة أنشطة لإرشاد الطلبة في كيفية استخدام مهارات التفكير مثل الاستقراء ولاكتشاف القوانين والنظريات الرياضية بأنفسهم. وليتعرفوا كذلك على كيفية استخدام برامج الحاسوب في عدد من الأنشطة.

ويتم حث الطلبة من خلال نشاطات وأمثلة محلولة مناسبة على استخدام استراتيجيات حل المشكلات. وتشجيع التعلم الذاتي مثل التقدير وبناء النموذج، وإنشاء الجدول، وإعداد القائمة النظامية، والعمل إلى الخلف، واستخدام المعادلات، وتبسيط المشكلة، وتستخدم حيثما أمكن الأشكال البيانية لتذليل صعوبة المشكلات اللفظية ولجعلها أكثر طواعية للحل.

ولجعل الطلبة بالفون الكتب قبل استخدامها، نورد فيما يلي الملامح المميزة لهذه السلسلة:

- يبدأ كل فصل "بمقدمة" قصيرة عن الموضوع. تليها قائمة بنواتج التعلم يمكن للطلبة استخدامها في تأكيد ما تعلموه بنهاية كل فصل من الكتاب.
- يقدم للطلبة "أمثلة محلولة" لتعزيز فهم المفاهيم ولتعريفهم بأنواع عديدة من المسائل. بما فيها التي تساعد على مراقبة تفكيرهم الذاتي.

* تتضمن "التمرينات متدرجة الصعوبة" أسئلة مناسبة لمدى واسع من القدرات. وصُمِّمَت الأسئلة بشكل يجعل الطلبة يستخدمون التفكير المنطقي الاستدلالي والاستقرائي لحل المشكلات الرياضية. (ويمكن أن يختار المعلمون مسائل مختلفة للطلبة من ذوي القدرات المختلفة).

* إن "الرياضيات الممتعة" أو "استقصاء الرياضيات" والموجودة في نهاية كل فصل من الكتاب (فيما عدا فصول المراجعة) مخصصة لغرس وتنمية مهارات التفكير. وستعرض أيضاً هذه الأنشطة بعض القضايا الوطنية ذات الصلة على الطلبة.

* وتوجد ورقة للمراجعة في نهاية كل فصل من الكتاب (فيما عدا فصول المراجعة) حتى يتمكن الطلبة من قياس مستوى كفايتهم باستمرار. ويجب أن يكون جميع الطلبة قادرين على إجابة الأسئلة في القسم (أ) بينما يستطيع الطلبة متوسطو القدرة من التعامل مع الفقرات في القسم (ب). أما الطلبة ذوي القدرة الأعلى فيوفر لهم القسم (ج) التحدي المطلوب.

وبالإضافة للملاحق الرئيسية لكل فصل. استخدمت امتحانات تقويمية في الكتاب كمادة للمراجعة العامة لتساعد على إعداد الطلبة للامتحانات. وركزت خمسة فصول في كتاب الصف الثاني من مرحلة التعليم الثانوي على المراجعة. بينما يحتوي كتاب الصف الثالث من مرحلة التعليم الثانوي على 15 قسمًا في الفصل الثامن للمراجعة. تتراوح بين الحساب والجبر إلى التحويل وحل المشكلات.

تُعرف في جميع أنحاء هذه السلسلة:

* مهارات وعمليات التفكير

* ثقافة المعلومات

* التربية الوطنية

عن طريق الأيقونات التالية:

لرسائل التربية
الوطنية



لتطبيق ثقافة
المعلومات



لتطبيق مهارات
التفكير



ودُعِّمَت هذه السلسلة من الكتب بمصادر لجميع المعلمين والطلاب. متوافرة ومتاحة لدى الموقع

[<http://www.teol.com.sg>]

وتشير الأيقونة التالية والموجودة في كل جزء من الكتاب إلى وجود مصادر على شبكة الإنترنت لها صلة بالموضوع قيد الدراسة.



مواقع شبكة المعلومات الدولية المتعلقة بالمتن هي أيضاً متوافرة ومتاحة لدى الموقع ويُستدل عليه بالأيقونة التالية



ونأمل أن تساعد المادة المقدمة في السلسلة الطلبة على تقدير أهمية وقدرة الرياضيات في أنشطتهم اليومية. وربما في مهنتهم المستقبلية. وأن يستمتعوا باستخدام سلسلة رياضيات التعليم الأساسي والثانوي.

المحتويات

الرموز الرياضية
بعض جداول التحويل

9	1- إيجاد المفكوك والتحليل الجبري:
10	1-1 إيجاد المفكوك باستخدام قانون التوزيع (مراجعة)
12	1-1-1 إيجاد مفكوك (أ.ب) (ج. د)
15	1-1-2 إيجاد مفكوك المربعات الكاملة
18	2-1 الفرق بين المربعات الكاملة
19	3-1 المكعب وجذره التكعيبي
19	1-3-1 الفرق بين المكعبات الكاملة
20	2-3-1 المجموع بين المكعبات الكاملة
20	4-1 العامل المشترك الأعلى لحدود المقادير الجبرية
22	5-1 التحليل
24	1-5-1 التحليل بالتجميع
25	2-5-1 تحليل المقادير التربيعية الثلاثية
29	3-5-1 تحليل الفرق بين مربعين
31	4-5-1 تحليل الفرق بين المكعبين ومجموع المكعبين
32	ملخص
34	استقصاء الرياضيات
35	ورقة المراجعة (1)
36	2- الكسور والصيغ الجبرية:
36	1-2 الكسور الجبرية
37	2-2 تبسيط الكسور الجبرية البسيطة
38	3-2 تبسيط الكسور الجبرية التي تتضمن عمليات تحليل إضافية
40	4-2 ضرب وقسمة الكسور الجبرية
42	5-2 جمع وطرح الكسور الجبرية ذات المقامات العددية
46	6-2 جمع وطرح الكسور الجبرية ذات المقامات الجبرية
49	7-2 المعادلات التي تتضمن كسوراً جبرية
52	8-2 المعالجة بالصيغ الرياضية
55	ملخص
55	استقصاء الرياضيات
56	ورقة المراجعة (2)
57	3- هندسة الإحداثيات:
58	1-3 استخدام الأعداد الموجهة لوصف موضع نقطة على المستوى الديكارتي

65	2-3- النماذج الخطية ومعادلاتها
74	3-3- العلاقات الخطية الرأسية والأفقية
77	ملخص
78	ورقة المراجعة (3)
79	التقويم (1)
80	4- المعادلات الآتية:
81	1-4- مقدمة
81	2-4- الطريقة الجبرية لحل المعادلتين الآتيتين
82	1-2-4- طريقة معادلة المقادير
83	2-2-4- طريقة التعويض
85	3-2-4- طريقة الحذف
88	3-4- التفسير البياني
89	1-3-4- الحلول البيانية للمعادلتين الآتيتين
91	2-3-4- لا حل والحلول اللانهائية
91	4-4- حل المشكلات باستخدام المعادلات الآتية
94	ملخص
94	رياضيات ممتعة
95	ورقة المراجعة (4)
96	5- مساحات السطوح:
97	1-5- طول القوس
103	2-5- مساحة القطاع الدائري
110	3-5- الأهرامات
110	1-3-5- مساحة سطح الهرم
111	2-3-5- حجم الهرم
114	4-5- المخروط
114	1-4-5- مساحة السطح المنحني للمخروط
117	2-4-5- حجم المخروط
120	5-5- مساحة سطح الكرة
121	6-5- حجم الكرة
125	ملخص
125	استقصاء الرياضيات
126	ورقة المراجعة (5)
128	6- المضلعات:
129	1-6- أنواع المضلعات
129	2-6- مجموع قياسات زوايا المضلع

132	3-6- الزوايا الخارجة للمضلع
134	ملخص
134	رياضيات ممتعة (الفسيفساء)
136	ورقة المراجعة (6)
137	7- التماثل:
138	1-7- التماثل الخطي في الأشكال المستوية
145	2-7- التماثل الدوراني في الأشكال المستوية
150	3-7- تماثل المضلعات
153	ملخص
153	رياضيات ممتعة
154	ورقة المراجعة (7)
156	8- التطابق والتشابه:
157	1-8- التطابق
162	2-8- المثلثات المتطابقة
172	3-8- التشابه
173	4-8- المثلثات المتشابهة
179	5-8- تطبيقات على التشابه
182	6-8- مساحات الشكلين المتشابهين
185	7-8- حجم الشكلين المتشابهين
189	ملخص
190	استقصاء الرياضيات (لعبة البلياردو)
193	ورقة المراجعة (8)
195	9- المتوسطات الإحصائية:
196	1-9- المتوسط
203	2-9- الوسيط
208	3-9- المنوال
211	ملخص
211	رياضيات ممتعة
212	ورقة المراجعة (9)
214	التقويم (2)
217	التقويم (3)
220	الإجابات

الرموز الرياضية

Mathematical Notation

1- رموز المجموعة

W	مجموعة الأعداد الكلية $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$	+	+
Z	مجموعة الأعداد الصحيحة $\{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\}$	+	+
Z ⁺	مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة $\{1, 2, 3, \dots\}$	+	+
R	مجموعة الأعداد الحقيقية	+	+
Q	مجموعة الأعداد النسبية	+	+

2- رموز الربط (المقارنة)

=	تساوي
≠	لا تساوي
≡	تكافئ
≈	تقريباً
∝	يتناسب
>	أقل من
≥	أقل من أو يساوي
<	ليست أكبر من
≤	أكبر من
≥	أكبر من أو يساوي
≠	ليست أقل من
∞	ما لا نهاية

يتم عرض القيم العددية في النظام الدولي للوحدات كما يلي:

1,000	تكتب 1000
12,005	تكتب 12005
1,000,500	تكتب 1000500
0.00394	تكتب 0.00394

3- العمليات

+	أ زائد ب
-	أ ناقص ب
×	أ، ب، أ × ب : تعني مضروب في
÷	أ ÷ ب : أ مقسوم على ب
%	نسبة أ إلى ب
√	الجذر التربيعي الموجب للعدد
	الحقيقي حيث $0 < a$

4- نظام الوحدات العالمية SI Units

يستخدم نظام الوحدات العالمية سبع وحدات أساسية، وتشتق جميع الوحدات الأخرى من هذه الوحدات الأساسية بضرب أو قسمة وحدة في وحدة أخرى.

رمز الوحدة	اسم الوحدة الأساسية	الكمية الفيزيائية
m	متر	طول
kg	كيلو جرام	كتلة
s	الثانية	زمن
A	أمبير	التيار الكهربائي
K	كلفين	درجات حرارة الترمومتر
cd	شمعة	شدة الإضاءة
mol	مول	كمية المادة

نستخدم الوحدات الثلاث الأخيرة أساساً في الأعمال العلمية المتخصصة، أما في الأغراض الشائعة فيتم قياس الحرارة على مقياس سلسيوس (المئوي). وتكون فواصل الحرارة على مقياسي كلفين وسلسيوس متشابهة.

بعض جداول التحويل

Some Conversion Tables

المساحة

1 هكتار (هك) = 10000 م ²
100 هكتار = 1 كم ²

الحجم والسعة

1000 م ³ = 1 لتر (ل)

الزمن

الدقيقة (د) = 60 ثانية (ث)
الساعة (س) = 60 دقيقة
يوم = 24 ساعة
أسبوع = 7 أيام
عام = 365 يوم
سنة كبيسة = 366 يوم

الطول

10 ملليمتر (مم) = 1 سم (س)
10 سنتيمتر = 1 ديسمتر (دس)
10 ديسمتر = 1 متر (م)
10 متر = 1 ديكامتر (دام)
10 ديكامتر = 1 هيكٹومتر (هكم)
10 هيكٹومتر = 1 كيلومتر (كم)

الكتلة

10 ملليجرام (ملجم) = 1 سنتيغرام (س.ج)
10 سنتيغرام = 1 ديسجرام (د.ج)
10 ديسجرام = 1 جرام (جم)
10 جرام = 1 ديكاجرام
10 ديكاجرام = 1 هيكٹو جرام (ه.ج)
10 هيكٹو جرام = 1 كيلو جرام (كجم)
1000 كيلو جرام = 1 طن (ط)

إيجاد المفكوك والتحليل الجبري

Algebraic Expansion and Factorisations

1



رينيه ديكارت فرنسي . ولد عام 1596. كان أول عالم رياضيات يستخدم الحروف $a, b, c, \dots$ للأعداد المعروفة. كما قرر أن الحروف التي في نهاية الأبجدية مثل s, v, x, y, z يجب أن تكون رموزاً للأعداد المجهولة. ويعتبر "ديكارت" أيضاً أول من كتب (s^2) بدلاً من $s \cdot s$, (s^3) لتحل مكان $s \cdot s \cdot s$.

في نهاية هذا الفصل سوف تكون قادراً على:

- إيجاد مفكوك حاصل ضرب مقدارين جبريين، باستخدام قانون التوزيع.
- إيجاد مفكوك المقادير التي على الصورة $(a+b)^2, (a-b)^2, (a+b)(a-b)$ بالتعرف على نماذج تلك النتائج.
- تحليل المقادير الجبرية ذات العوامل المشتركة.
- تحليل المقادير الجبرية على الصورة $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ باستخدام خاصية (التجميع).
- تحليل المقادير التربيعية التي تحتوي على متغير واحد أو متغيرين.
- تحليل المقادير التي هي الفرق بين مربعين.
- تحليل المقادير التي هي الفرق بين المكعبين ومجموع المكعبين.

Expansion Using Distributive Law (مراجعة) قانون التوزيع باستخدام المفكوك (مراجعة) Law (Revision)

1-1

نعلمنا في الكتاب السابق من هذه السلسلة، أن عملية الضرب في الحساب يمكن توزيعها على الجمع والطرح فمثلاً:

$$3 \times 2 + 5 \times 2 = (3+5) \times 2$$

$$16 = 6 + 10 =$$

وبالمثل . في الجبر يمكننا تطبيق قانون التوزيع لفك الأقواس فعلى سبيل المثال

$$(4+3) \times 2 = (4+3)2$$

$$4 \times 2 + 3 \times 2 =$$

$$8 + 6 =$$

نذكر أن القواعد الخاصة بالضرب الجبري تشبه قواعد الضرب الحسابي. فعلى سبيل المثال

$(+) (+) = +$	$(+) (2+) = 6$
$(-) (-) = +$	$(-) (2-) = 6$
$(-) (+) = -$	$(-) (2+) = 6$
$(+) (-) = -$	$(+) (2-) = 6$

مثال 1:

أوجد مفكوك
(أ) $2(س + 1)$

(ب) $4(س - 5)$

الحل

$$2(س + 1) = 2 \times س + 2 \times 1$$

$$2س + 2 =$$

$$4(س - 5) = 4 \times س - 4 \times 5$$

$$4س - 20 =$$

مثال 2:

أوجد مفكوك

(أ) $2(س + 5)$

(ب) $3(2س - 7)$

الحل

$$2(س + 5) = 2 \times س + 2 \times 5$$

$$2س + 10 =$$

$$3(2س - 7) = 3 \times 2س - 3 \times 7$$

$$6س - 21 =$$

ملاحظة

إذا كان العدد المضروب في القوس سالبة فإن إشارات ما بداخل القوس تتغير عند فك الأقواس.

مثال 3:

أوجد مفعوك:

$$\begin{aligned} \text{(أ)} \quad 1(3+1) & \quad \text{(ب)} \quad 1(3-2) \\ \text{(ج)} \quad -4(4+3) & \quad \text{(د)} \quad 5(1+5) \end{aligned}$$

الحل

$$\begin{aligned} 3 \times 1 + 1 \times 1 &= (3+1) \times 1 \quad \text{(أ)} \\ 1 \times 3 + 1 \times 1 &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3-) \times 1 + 1 \times 2 &= (3-2) \times 1 \quad \text{(ب)} \\ 1 \times 3 - 1 \times 2 &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4 \times -3 + -3 \times -4 &= (4+3) \times -3 \quad \text{(ج)} \\ -4 \times -3 - 1 \times -4 &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5 \times 1 + 5 \times 5 &= 5(1+5) \quad \text{(د)} \\ 5 \times 1 + 5 \times 5 &= \end{aligned}$$

مثال 4:

أوجد مفعوك ثم اختصر:

$$\begin{aligned} \text{(أ)} \quad 4(3-2) + 3(1+2) & \quad \text{(ب)} \quad 2(3+1) - 3(1-2) \end{aligned}$$

الحل

$$\begin{aligned} 4(3-2) + 3(1+2) &= (4 \times 3) - (4 \times 2) + (3 \times 1) + (3 \times 2) \\ 12 - 8 + 3 + 6 &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2(3+1) - 3(1-2) &= (2 \times 3) + (2 \times 1) - (3 \times 1) + (3 \times 2) \\ 6 + 2 - 3 + 6 &= \end{aligned}$$

تمرين 1-1

1- أوجد مفعوك:

$$\begin{aligned} \text{(أ)} \quad 4(3+1) & \quad \text{(ب)} \quad 2(3-4) \\ \text{(ج)} \quad 7(4+3) & \quad \text{(د)} \quad 6(7-5) \\ \text{(هـ)} \quad 5(5-2) & \quad \text{(و)} \quad 4(4+3) \\ \text{(ز)} \quad 8(2-1) & \quad \text{(ح)} \quad 5(3-8) \\ \text{(ط)} \quad 7(5-3) & \quad \text{(ي)} \quad 5(2-3) + 3(1+2) \\ \text{(ك)} \quad 8(3-2) & \quad \text{(ل)} \quad 3(2+5) \end{aligned}$$

2- أوجد مفعوك:

$$\begin{aligned} \text{(أ)} \quad 1(7+3) & \quad \text{(ب)} \quad 5(4-3) \\ \text{(ج)} \quad 3(4+5) & \quad \text{(د)} \quad 3(4-5) \\ \text{(هـ)} \quad 2(3+4) & \quad \text{(و)} \quad 4(3+1) \\ \text{(ز)} \quad 4(3-5) & \quad \text{(ح)} \quad 4(3+1) \\ \text{(ط)} \quad 5(6-5) & \quad \text{(ي)} \quad 5(6-5) \end{aligned}$$

3- أوجد مفكوك ثم اختصر:

(أ) $5(س + 4) + 2(س + 7)$

(ب) $3(ت - 5) + 8(ت - 1)$

(ج) $4(ر + 4) + 5(ر + 3)$

(د) $5(ص - 2) + 8(ص - 3)$

(هـ) $11(ب + 1) - 2(ب + 5)$

(و) $6(ب - 5) - 3(ب - 2)$

(ز) $3(د - 5) - 7(د - 3)$

(ح) $3(أ - 4) - 2(أ - 5)$

(ط) $3(ت - 2) - 3(ت - 4)$

4- أوجد مفكوك ثم اختصر:

(أ) $س(س + 1) + 2(س + 1)$

(ب) $ص(ص - 4) + 3(ص - 4)$

(ج) $أ(أ - 3) - (أ + 3)$

(د) $ر(ر + 4) - 4(ر + 4)$

(هـ) $ب(ب + 7) - 7(ب + 7)$

(و) $ك(ك + 5) + 5(ك + 5)$

(ز) $أ(أ - 4) - 4(أ - 4)$

(ح) $ح(ح - 5) - 5(ح - 5)$


Expansion of $(a + b)(c + d)$

1-1-1 إيجاد مفكوك $(أ + ب)(س + ح)$

أنشطة



1- أطوال أضلاع المستطيل مبينة في الرسم التالي.



ملحوظة

حل هذا المثال
(أ) يتضمن استخدام الرسم
البياني
(ب) يستخدم لتبسيط
المشكلة للنشاط رقم 2
في الصفحة التالية

- (أ) احسب مساحة (i) المستطيل د ط ي (ii) المستطيل ط ر ذ ت.
(ب) اجمع مساحة المستطيلين السابقين للحصول على مساحة المستطيل د ر ذ ي.

- (ج) أوجد طول د ر.
(د) استخدم الطول د ر لحساب مساحة المستطيل د ر ذ ي.
(هـ) اكتب استنتاجاتك من النتائج (ب)، (د).

2- أطوال أضلاع المستطيل مبينة كما هو موضح في الرسم التالي.



ملحوظة

حل هذه المسألة يتضمن
استخدام نموذج أو رسم

- (أ) انقل الشكل السابق ثم أكمل مساحة كل مستطيل.
(ب) اجمع كل المساحات للحصول على مساحة المستطيل ن س ح ع.
(ج) اكتب فيما يلي أطوال (i) ن س (ii) س ح وعندئذ احسب مساحة المستطيل ن س ح ع.
(د) من (ب)، (ج) اكتب استنتاجاتك

سوف ننتقل الآن إلى استخدام الطريقة الجبرية لإيجاد مفكوك $(أ + ب)(ح + د)$.

نفرض $ح + د = س$ ك

$$\begin{aligned} \therefore (أ + ب)(س) &= (أ + ب)(ح + د) \\ &= أ(س) + ب(س) \\ &= أ(ح + د) + ب(ح + د) \\ &= أ(ح) + أ(د) + ب(ح) + ب(د) \end{aligned}$$

أو بالغك المباشر

$$(أ + ب)(س) = (أ + ب)(ح + د) = أ(ح) + أ(د) + ب(ح) + ب(د)$$

لإيجاد مفكوك مقدار في صورة $(أ + ب)(ح + د)$ ، فإن كل حد في القوس الأول يجب ضربه في كل حد في القوس الثاني

$$(أ + ب)(س) = (أ + ب)(ح + د) = أ(ح) + أ(د) + ب(ح) + ب(د)$$

مثال 5:

أوجد مفكوك:

$$\begin{aligned} \text{(أ)} \quad (س + 2)(س + 5) &= (س + 2)(س + 5) \\ \text{(ب)} \quad (س - 3)(س + 3) &= (س - 3)(س + 3) \\ \text{(ج)} \quad (س - 2)(س + 3) &= (س - 2)(س + 3) \\ \text{(د)} \quad (س - 4)(س - 6) &= (س - 4)(س - 6) \end{aligned}$$

الحل

$$\begin{aligned} \text{(أ)} \quad (س + 2)(س + 5) &= س^2 + 5س + 2س + 10 \\ &= س^2 + 7س + 10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(ب)} \quad (س + 3)(س - 5) &= س^2 - 5س + 3س - 15 \\ &= س^2 - 2س - 15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(ج)} \quad (س - 2)(س + 3) &= س^2 + 3س - 2س - 6 \\ &= س^2 + س - 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(د)} \quad (س - 4)(س - 6) &= س^2 - 6س - 4س + 24 \\ &= س^2 - 10س + 24 \end{aligned}$$

مثال 6:

أوجد مفكوك:

$$(3 - ب) (2 + ب3) (ب)$$

$$(4 + أ) (3 + أ2) (أ)$$

$$(4 - د3) (2 - د) (د)$$

$$(5 + ح4) (3 - ح2) (ج)$$

الحل

$$(4 + أ)3 + (4 + أ)أ2 = (4 + أ) (3 + أ2) \quad (أ)$$

$$12 + أ3 + أ8 + أ2 =$$

$$12 + أ11 + أ2 =$$

$$(3 - ب)2 + (3 - ب)ب3 = (3 - ب) (2 + ب3) \quad (ب)$$

$$6 - ب2 + ب9 - ب2 =$$

$$6 - ب7 - ب2 =$$

$$(5 + ح4)3 - (5 + ح4)ح2 = (5 + ح4) (3 - ح2) \quad (ج)$$

$$15 - ح12 - ح10 + ح8 =$$

$$15 - ح2 - ح8 =$$

$$(4 - د3)2 - (4 - د3)د = (4 - د3) (2 - د) \quad (د)$$

$$8 + د6 - د4 - د3 =$$

$$8 + د10 - د3 =$$

تمرين 1- ب

1- أوجد مفكوك مايلي:

$$(أ) (3 + أ) (2 + أ)$$

$$(ب) (5 + ب) (4 + ب)$$

$$(ج) (أ + 2) (أ + 9)$$

$$(د) (د + 3) (د + 7)$$

$$(هـ) (أ + 3) (أ + 5)$$

$$(و) (أ + 3) (أ + 7)$$

$$(ز) (أ + 8) (أ + 4)$$

$$(ح) (أ + 4) (أ + 7)$$

$$(ط) (أ + 5) (أ + 3)$$

$$(ي) (أ + 5) (أ + 11)$$

$$(ك) (أ + 3) (أ + 3)$$

$$(ل) (أ + 2) (أ + 2)$$

$$(م) (أ + 2) (أ + 2)$$

2- أوجد مفكوك:

$$(أ) (4 + أ) (2 + أ3)$$

$$(ب) (أ + 1) (أ + 5)$$

$$(ج) (أ + 5) (أ + 3)$$

$$(د) (أ + 5) (أ + 3)$$

$$(هـ) (أ + 5) (أ + 3)$$

$$(و) (أ + 4) (أ + 1)$$

3- أوجد مفكوك:

$$(أ) (أ + ب) (2 + ح)$$

$$(ب) (أ + ب) (3 + ب)$$

$$(ج) (أ + 2) (أ + 2)$$

$$(د) (أ + 2) (أ + 2)$$

$$(هـ) (أ + ب) (أ + ح)$$

$$(و) (أ + 2) (أ + 2)$$

$$(ز) (أ + 2) (أ + 2)$$

$$(ح) (أ + 3) (أ + 2)$$

Expansion of Perfect Squares

2-1-1 إيجاد مفعوك المربعات الكاملة

نماتاً كما أن $4 = 2^2$, $9 = 3^2$, $س = س^2$ س × س مربعات كاملة.
فإن $(ا + ب)^2 = (ا + ب)(ا + ب)$ أيضاً مربع كامل.

ملحوظة

المربع الكامل هو المقدار
الناج من حاصل ضرب أي
مقدار في نفسه.

مثال 7:

أوجد مفعوك:

$$(ب) (س - 3)^2$$

$$(ا) (س + 4)^2$$

الحل

$$(ا) (س + 4)^2 = (س + 4)(س + 4)$$

$$= س(س + 4) + 4(س + 4)$$

$$= س^2 + 4س + 4س + 16$$

$$= س^2 + 8س + 16$$

$$(ب) (س - 3)^2 = (س - 3)(س - 3)$$

$$= س(س - 3) - 3(س - 3)$$

$$= س^2 - 3س - 3س + 9$$

$$= س^2 - 6س + 9$$

$$\text{عموماً } (ا + ب)^2 = (ا + ب)(ا + ب)$$

$$= (ا + ب)ا + (ا + ب)ب$$

$$= ا^2 + اب + اب + ب^2$$

$$= ا^2 + 2اب + ب^2$$

إن

$$(ا + ب)^2 = ا^2 + 2اب + ب^2 \text{ مربع كامل}$$


الهدف:

يهدف هذا النشاط إلى اكتشاف العلاقة $(ا + ب)^2 = ا^2 + 2اب + ب^2$ بطريقة هندسية.

نشاط



خطوات العمل:



1 - ارسم مربعاً طول ضلعه $(ا + ب)$ كما مبين في الشكل.

2 - قسمه إلى أشكال كما هو مبين في الشكل وأحسب مساحة كل شكل على حدة.

الإستنتاج:

من الشكل السابق نلاحظ أن:

$$\boxed{b^2} + \boxed{b^2} + \boxed{b^2} + \boxed{p^2} = \boxed{(b+p)^2}$$

$$b^2 + b^2 + b^2 + p^2 = (b+p)^2 \therefore$$

$$b^2 + b^2 + 2p^2 =$$

$$\begin{aligned} \text{بالمثل } (b-1)(b-1) &= (b-1)^2 \\ (b-1)b - (b-1)1 &= \\ b^2 + b - b - 1 &= \\ b^2 + b - 1 &= \end{aligned}$$

إن


$$(b-1)^2 = b^2 + b - 1$$

الهدف:

نشاط



يهدف هذا النشاط إلى اكتشاف العلاقة $(b-1)^2 = b^2 + b - 1$ بطريقة هندسية.



خطوات العمل:

1 - ارسم مربعاً كما مبين في الشكل طول ضلعه b .

2 - قسمه إلى مساحات كما هو مبين في الشكل وأحسب مساحة كل منها.

الإستنتاج:

من الشكل السابق نلاحظ أن:

$$\left(\boxed{b^2} + \boxed{b^2} + \boxed{b^2} \right) - \boxed{p^2} = \boxed{(b-p)^2}$$

$$(b^2 + b^2 - b^2 + b^2 - p^2) - p^2 = (b-p)^2 \therefore$$

$$(b^2 + b^2 - 2p^2) - p^2 =$$

$$(b^2 - p^2) - p^2 =$$

$$b^2 + b^2 - 2p^2 =$$

مثال 8:

أوجد مفعوك:

$$\begin{array}{ll} \text{(أ)} \quad 2(4 + 3) & \text{(ب)} \quad 2(2 - 3) \\ \text{(ج)} \quad 4(س + ص) & \text{(د)} \quad 2(3 - ٢) \end{array}$$

الحل

سوف نستخدم

$$2(ا + ب) = 2ا + 2ب$$

$$\text{كذلك } 2(ا - ب) = 2ا - 2ب$$

لإيجاد مفعوك المربعات الكاملة في المثال أعلاه.

$$\begin{array}{l} \text{(أ)} \quad 2(4 + 3) = 2(4) + 2(3) \\ 9 = 8 + 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2(ا + ب) = 2ا + 2ب \\ 2(4 + 3) = 2(4) + 2(3) \\ \text{حل 3 محل ا، 4 محل ب} \end{array}$$

بمعنى آخر

$$\begin{array}{l} \text{(ب)} \quad 2(3 - 2) = 2(3) - 2(2) \\ 4 = 6 - 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2(ا - ب) = 2ا - 2ب \\ 2(3 - 2) = 2(3) - 2(2) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{(ج)} \quad 4(س + ص) = 4(س) + 4(ص) \\ 16 = 8س + 8ص \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{(د)} \quad 2(3 - ٢) = 2(3) - 2(٢) \\ 9 = 6 - ٢ \end{array}$$

ملحوظة

$$\begin{array}{l} 2(3) \neq 3^2 \\ 2(3) = 3 \times 2 = 6 \\ 3^2 = 9 \end{array}$$

تمرين 1- ج

أوجد مفعوك كل ما يأتي.

$$\begin{array}{llll} -4(س - 3) & -3(س + 8) & -2(س + 5) & -1(س + 1) \\ -8(د - ت) & -7(٢ + ٣) & -6(س + ص) & -5(س - 5) \\ -11(5 - 2) & -10(2 + 3) & -9(2س + 1) & \end{array}$$

2-1

الفرق بين المربعات الكاملة Difference of Perfect Squares

مثال 9:

أولاد مفكوك

(i) $(x+4)(x-4)$ (b) $(x-3)(x+3)$

الحل

$$(4 - \text{سین}) 4 + (4 - \text{سین}) \text{سین} = (4 - \text{سین}) (4 + \text{سین}) \quad (i)$$

$$16 = 4^2 = 4 + 4 + 4 + 4$$

$16 - 2_{\text{W}} =$

(ب) $(3 - \sqrt{3})(3 + \sqrt{3}) = (3 + \sqrt{3})3 - (3 + \sqrt{3})\sqrt{3}$

$$9 - \sqrt{3} - \sqrt{3} + \sqrt{3} =$$

9 - 11 =

$(b-1)b + (b-1)1 = (b-1)(b+1)$ عموماً

$$^2u = u + u = ^2a$$

1

2

$$w^2 - 1 = (w - 1)(w + 1)$$

الذي هو الفرق بين المربعين الكاملين a^2 ، b^2

في المثال التالي سوف نستخدم هذه المتطابقة.

مثال 10:

أوجد مفكوك

$$(3 + \sqrt{2})(3 - \sqrt{2})(-)$$

الحل

$$6^2 - 5^2 = (6 - 5)(6 + 5) \quad (i)$$

36-2 =

$$^23 - ^2(\mathcal{C}2) = (3 + \mathcal{C}2)(3 - \mathcal{C}2) \quad (\text{—})$$

9-244

2000

$$b^2 - 21 = (b-1)(b+1)$$

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

$$6^2 - 2^2 = (6 - 2)(6 + 2)$$

إنها (ك) وليمن ك²

تمرین 1 د

أوجد مفكوك:

$$-1 \quad (1 + \text{س}) (1 - \text{س}) \quad -2 \quad (2 + \text{ص}) (2 - \text{ص}) \quad 5 \quad (5 + \text{ب}) (5 - \text{ب}) \quad -6 \quad (6 + \text{ط}) (6 - \text{ط})$$

$$(4 - i)(4 + i) = 8 \quad (1 + 2i)(1 - 2i) = 7 \quad (5 - i)(5 + i) = 4 \quad (10 - i)(10 + i) = 3$$

المكعب وجذره التكعيبي Full Cube and Cubic Root

3-1

بالنظر إلى: $27 = 3 \times 3 \times 3 = 3^3$ ، $8 = 2 \times 2 \times 2 = 2^3$
 $س^3 = س \times س \times س$ ، $ع^3 = ع \times ع \times ع$ مكعبات كاملة
 فإن: $3^3 = 3 \times 3 \times 3$ ، $2^3 = 2 \times 2 \times 2$
 $س^3 = س \times س \times س$ ، $ع^3 = ع \times ع \times ع$ مكعب كامل.
 $27 = 3 \times 3 \times 3$ ، $8 = 2 \times 2 \times 2$
 $س^3 = س \times س \times س$ ، $ع^3 = ع \times ع \times ع$ مكعب كامل.

المكعب الكامل: هو المقدار الناتج من حاصل ضرب أي عدد في نفسه مرتين.

الجذر التكعيبي لمقدار:

$$س = \sqrt[3]{س^3} \quad \text{لأن } س^3 = س \times س \times س$$

$$2 = \sqrt[3]{8} \quad \text{لأن } 2^3 = 2 \times 2 \times 2$$

$$س = \sqrt[3]{س^3} \quad \text{لأن } س^3 = س \times س \times س$$

$$2 = \sqrt[3]{8} \quad \text{لأن } 2^3 = 2 \times 2 \times 2$$

الجذر التكعيبي لأي
رمز جبري مرفوع إلى
أية قوة هو نفس
الرمز الجبري مرفوعاً
إلى ثلث القوة الأولى.

Difference of Perfect Cube

1-3-1 الفرق بين المكعبات الكاملة

مثال 11:

أوجد مفكوك:
 (أ) $(س - 2) (س^2 + 2س + 4)$
 (ب) $(م - ل) (م^2 + لم + ل^2)$

الحل

$$(أ) (س - 2) (س^2 + 2س + 4) = س^3 + 2س^2 + 4س - 2س^2 - 4س - 8 = س^3 - 8$$

$$(ب) (م - ل) (م^2 + لم + ل^2) = م^3 + لم^2 + ل^2م - لم^2 - ل^2م - ل^3 = م^3 - ل^3$$

عموماً $(س - ل) (س^2 + لس + ل^2) = س^3 - ل^3$

(أ) لاحظ أن
 $س^3 = س \times س \times س$
 $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$
 ∴ ينتج عن إيجاد المفكوك
 الفرق بين المكعبين
 الكاملين $س^3$ ، 8
 (ب) ينتج عن إيجاد
 المفكوك الفرق بين
 المكعبين الكاملين $س^3$ ، $ل^3$

Total of Perfect Cube المجموع المكعبات الكاملة

مثال 12:

أوجد مفكوك:

(أ) $(\lambda + 3)(\lambda^2 + \lambda - 9)$ (ب) $(2\lambda + \lambda^2 - 9)(\lambda^2 + \lambda - 9)$

الحل

$$^3\sqrt{u} + ^2\sqrt{u^3} - \sqrt{u^9} + ^2\sqrt{u^3} + \sqrt{u^9} - 27 = (^2\sqrt{u} + \sqrt{u^3} - 9)(\sqrt{u} + 3) \quad (1)$$

$$^3\text{N} + 27 =$$

(ب) $(2ص + 3ع) (4ص^2 - 6صع + 9ع^2)$

$$^3\text{ع} 27 + ^2\text{ص} 18 - \text{ع}^2 12 - ^2\text{ص} 18 + \text{ع}^2 12 + ^3\text{ص} 8 =$$

$${}^3\text{ع}27 + {}^3\text{ص}8 =$$

(أ) ينتج عن إيجاد المفكوك
المجموع بين المعكبين الكاملين
27، 3^3

(ب) ينتج عن إيجاد
المفكوك المجموع بين
المعكبين الكاملين 8^3 ص 3،
27 ع 3

عموماً ${}^3\text{P} + {}^3\text{P} = ({}^2\text{P} + {}^1\text{P} - {}^2\text{P}) ({}^1\text{P} + {}^1\text{P})$

تمرین 1 هـ

أوجد مفكوك:

$$(1 + b^2 + 4b)(1 - 2b) - 3$$

$$({}^2\nu_4 + \nu_6 + {}^2\mu_9)(\nu_2 - \mu_3) - 4$$

$$(4 + 12 - 21)(2 + 1) - 1$$

$$(m^2 + m - 16)(m + 4) - 2$$

Highest Common Factor of Terms of Algebraic Expressions

4-1 العامل المشترك الأعلى لحدود المقادير الجبرية

درسنا في كتاب الصف السابع العوامل المشتركة والعامل المشترك الأعلى (ع.م.أ) بين عددين أو أكثر. على سبيل المثال،

عوامل العدد 30 هي 1، 2، 3، 5، 6، 10، 15، 30

عوامل العدد 40 هي 1، 2، 4، 5، 8، 10، 20، 40

سوف تلاحظ أن العوامل 1، 2، 5، 10 عوامل مشتركة بين 30، 40. ولهذا نقول إن 1، 2، 5، 10 تسمى العوامل المشتركة بين 30، 40. أكبر تلك العوامل المشتركة هو 10 ويسمى العامل المشترك الأعلى (ع. ش. أ.) بين 30، 40.

نستخدم عمومًا التحليل إلى العوامل الأولية لإيجاد العامل المشترك الأعلى

ضع دائرة حول العوامل المشتركة الأولية المتناظرة.

$$\begin{array}{l} 30 = 5 \times 3 \times 2 \\ 40 = 5 \times 2 \times 2 \times 2 \end{array}$$

∴ العامل المشترك الأعلى بين 30، $5 \times 2 = 40$ ← اضرب العوامل المشتركة الأولية في بعض.

$10 =$

وبالمثل يمكن استخدام التحليل إلى العوامل الأولية لإيجاد العامل المشترك الأعلى للمقادير الجبرية.

مثال 13:

أوجد العامل المشترك الأعلى بين كل من :

- (أ) 3، 3 (ب) 5، 10 (ج) 6، 6 (د) 4، 6 (هـ) 3، 3

الحل

$$(أ) 3 = 1 \times 3$$

$$3 = 3 \times 1$$

∴ العامل المشترك الأعلى بين 3، 3 = 3

$$(ب) 5 = 1 \times 5$$

$$10 = 5 \times 2$$

∴ العامل المشترك الأعلى بين 5، 10 = 5

$$(ج) 6 = 2 \times 3$$

$$6 = 3 \times 2$$

∴ العامل المشترك الأعلى بين 6، 6 = 6

$$(د) 4 = 2 \times 2$$

$$6 = 2 \times 3$$

∴ العامل المشترك الأعلى بين 4، 6 = 2

$$2 =$$

$$(هـ) 3 = 1 \times 3$$

$$3 = 3 \times 1$$

∴ العامل المشترك الأعلى بين 3، 3 = 3

تمرين 1-9

- 1- أي من الأعداد الآتية أعداد أولية؟
3, 6, 7, 10, 11, 21, 29, 43, 56, 1.
- 2- عبر عن كل ما يأتي بدلالة عوامله الأولية.
(أ) 21 (ب) 46 (ج) 74
(د) 124 (هـ) 1440 (و) 360
- 3- أوجد العامل المشترك الأعلى بين كل من :
(أ) 20, 25 (ب) 49, 98
(ج) 24, 84 (د) 36, 72
(هـ) 45, 63 (و) 72, 108
- 4- أوجد العامل المشترك الأعلى بين كل من :
(أ) 2س, 3س (ب) 12, 6
(ج) 24, 12 (د) 14, 7
(هـ) 21, 9 (و) 1, 1
(ز) 3س, 3س (ح) 2س, 2س
(ط) 12س, 6س (ي) 3س, 3س
(ك) 3س, 3س (ل) 3س, 3س
(م) 4س, 6س

Factorisation

التحليل

5-1

رأينا في الجزء 1-2 أنه باستخدام قانون التوزيع $(ب + ح) = أ + ب + ح$ الإجراء العكسي $أ + ب + ح = أ + (ب + ح)$ يسمى "إخراج العامل المشترك".
اعتبر المقدار $3س + 6$ ، عوامل 3س هي 3، س وعوامل 6 هي 3، 2 لذلك 3 هو العامل المشترك الأعلى بين 3س، 6.

	$3س + 6 = 3س + 3 \times 2$
لكن	$3(س + 2) = 3س + 3 \times 2$
	$3س + 6 = 3(س + 2)$
	$3 = 3(س + 2)$

(قانون التوزيع)

رأينا من المثال السابق أن العامل المشترك (الأعلى) استخرج ووضع قبل القوس المقدار داخل القوس ثم الحصول عليه عن طريق قسمة كل حد على العامل المشترك الأعلى.

كتابة المقادير الجبرية كحاصل ضرب لعواملها تسمى عملية تحليل المقدار المحلل هو أبسط صورة لذلك المقدار.

مثال 14:

حلل كلاً ما يأتي بإخراج العامل المشترك الأعلى

- (أ) $4س + 8$ (ب) $س^2 - س$
(ج) $6 + 9$ (د) $3م - 12$
(هـ) $2 + 4 - 8$ (و) $9س^2 + 24س - 12$
(ز) $س(س + 2) + 3(س + 2)$ (ح) $ك(ك - 3) + (ك - 3)$

الحل

$$(أ) \quad 4س + 8 = 2 \times 4 + 4س \\ 4(س + 2) =$$

$$(ب) \quad س^2 - س = س \times س - س \times 1 \\ س(س - 1) =$$

$$(ج) \quad 3 \times 3 + 2 \times 3 = 9 + 6 \\ 3(3 + 2) =$$

$$(د) \quad 3 - 12 = 3 - (4 \times 3) \\ 3 - 12 = 3 - 12 \\ 3 - 12 =$$

$$(هـ) \quad 4 + 2 = 8 - 2 \times 2 + 1 \times 2 \\ 2(4 + 2) =$$

$$(و) \quad 9س^2 + 24س + 12 = 3س \times 3س + 8س \times 3س + 4س \times 3س \\ 3س(3س + 8س + 4س) =$$

$$(ز) \quad (س + 2) \text{ تعتبر عاملاً مشتركاً بين } س(س + 2), 3(س + 2) \text{ فيمكن استخراجها} \\ \therefore س(س + 2) + 3(س + 2) = (س + 2)(س + 3)$$

$$(ح) \quad (3 - 2ك) \text{ عامل مشترك بين } ك(3 - 2ك), (3 - 2ك) \\ \therefore ك(3 - 2ك) + (3 - 2ك) = (3 - 2ك)(ك + 1) \\ (3 - 2ك)(ك + 1) =$$

ملحوظة

(ز) لاحظ أن الإجابة يمكن مراجعتها باستخدام قانون التوزيع
(ح) لاحظ أن $(3 - 2ك)$ يمكن كتابتها $3 - 2ك$.

تمرين 1-ز

1- حلل كلاً مما يلي بإخراج العامل المشترك الأعلى.

$$(أ) \quad 3س + 12 \quad (ب) \quad 5س + 15 \\ (ج) \quad 7س + 49 \quad (د) \quad 3س + 24 \\ (هـ) \quad 7س + 56 \quad (و) \quad 49س + 98س \\ (ز) \quad 4س - 16 \quad (ح) \quad 9س - 36$$

2- حلل كلاً مما يلي بإخراج العامل المشترك الأعلى.

$$(أ) \quad 6س + 21 \quad (ب) \quad 4س^2 + 6 \\ (ج) \quad 8س^2 + 12 \quad (د) \quad 10س + 25 \\ (هـ) \quad 18س - 27$$

3- حلل كلاً مما يلي بإخراج العامل المشترك الأعلى.

$$(أ) \quad س^2 + 4س \quad (ب) \quad 8س^2 - 4س \\ (ج) \quad 5س^2 - 7س \quad (د) \quad 4س^2 - 3س \\ (هـ) \quad 2س^2 + 6س \quad (و) \quad 5س^2 - 15س \\ (ز) \quad 15س + 10س^2$$

4- حلل كلاً مما يلي بإخراج العامل المشترك الأعلى (السالبة).

$$(أ) \quad 3 - 6 \quad (ب) \quad 8 - 48 \\ (ج) \quad 12 - 24 \quad (د) \quad 13س + 26 \\ (هـ) \quad 6س + 8 \quad (و) \quad 3س^2 - 3س \\ (ز) \quad 4س - 2س^2 \quad (ح) \quad 3س^2 - 3س$$

5- حلل كلاً مما يأتي:

$$(أ) \quad س(س + 1) + 2(س + 1) \\ (ب) \quad 2(2 - ت) + 2(2 - ت) \\ (ج) \quad 3(3 - ل) - 3(3 - ل) \\ (د) \quad 6(6 - ز) - 6(6 - ز) \\ (هـ) \quad 3(3 - 4ب) - 3(3 - 4ب) \\ (و) \quad 4(4 - ص) - 4(4 - ص) \\ (ز) \quad 3(3 - 1س) + 2(3 - 1س) \\ (ح) \quad 1(1 + ص) + 1(1 + ص) \\ (ط) \quad 3(3 + ت) + 3(3 + ت)$$

6- حلل كلاً مما يلي:

$$(أ) \quad 1 + 4أ + 4أ^2 \\ (ب) \quad 3ص + 3صغ + 3ص \\ (ج) \quad 7د + 7دط + 7د \\ (د) \quad 4ز + 4ز + 4ز \\ (هـ) \quad 2أ + 2أ + 2أ \\ (و) \quad 3س + 3س + 3س \\ (ز) \quad 4أ + 4أ + 4أ$$

Factorisation by Grouping

1-5-1 التحليل بالتجميع

إذا حللنا المقدار $أ + ح + س + ب + ح + س$ سوف نلاحظ عدم وجود عامل مشترك بين الحدود الأربعة. ولكن يمكن تحليلها عن طريق تجميع الحدود مع عامل مشترك كما يلي:

$$\begin{aligned} (أ + ح + س + ب + ح + س) &= \underbrace{أ + ح + س}_{\text{حدود بينها عامل مشترك}} + \underbrace{ب + ح + س}_{\text{حدود بينها عامل مشترك}} \\ &= (أ + ح + س)(ب + ح + س) \end{aligned}$$

سوف نلاحظ أن التحليل أعلاه هو الإجراء المعاكس لإيجاد المفكوك.

$$\begin{aligned} (أ + ح + س)(ب + ح + س) &= أ + ح + س + ب + ح + س + ب + ح + س \\ &= أ + ح + س + ب + ح + س \end{aligned}$$

ملاحظة

(أ + ح + س) مشترك بين الحدين

ملاحظة

ارجع إلى القسم 2 - 1 - 1

مثال 15:

حل:

- (أ) $أ + ح + س + ب + ح + س + ب + ح + س$
 (ب) $3ز - 6ص + 2س - 2س + 3ز - 6ص$
 (ج) $أ + ح + س + ب + ح + س + ب + ح + س$
 (د) $أ + ح + س + ب + ح + س + ب + ح + س$

الحل

- (أ) $أ + ح + س + ب + ح + س + ب + ح + س = (أ + ح + س)(ب + ح + س)$
 (ب) $3ز - 6ص + 2س - 2س + 3ز - 6ص = (3ز - 6ص)(2س - 2س)$
 (ج) $أ + ح + س + ب + ح + س + ب + ح + س = (أ + ح + س)(ب + ح + س)$
 (د) $أ + ح + س + ب + ح + س + ب + ح + س = (أ + ح + س)(ب + ح + س)$

ملاحظة

رتب الحدود التي لها عوامل مشتركة معاً

لاحظ أن

$$2(أ + ح + س) - 6(ب + ح + س) = 2(أ + ح + س) - 6(ب + ح + س)$$

$$ك(أ - ب) = ك(أ - ب) = ك(أ - ب)$$

تمرين 1-ح

1- حلل كل ما يلي:

- (أ) $أ + ح + س + ب + ح + س + ب + ح + س$
 (ب) $3ز - 6ص + 2س - 2س + 3ز - 6ص$
 (ج) $أ + ح + س + ب + ح + س + ب + ح + س$
 (د) $أ + ح + س + ب + ح + س + ب + ح + س$

- (أ) $أ + ح + س + ب + ح + س + ب + ح + س$
 (ب) $3ز - 6ص + 2س - 2س + 3ز - 6ص$
 (ج) $أ + ح + س + ب + ح + س + ب + ح + س$
 (د) $أ + ح + س + ب + ح + س + ب + ح + س$

2- حلل كلًا مما يلي.

(i) $ك^2 + د^2 - ب - د - ب - ط$

(ب) $2أص + 2أع - ب ص - ب ع$

(ج) $حس + ح د + س^2 + س$

(د) $3ح^2 + ح س + 3ح ز + زس$

(هـ) $ف ي + ف ت + ق ي + ق ت$

(و) $4هـ ذ - 2هـ ر - 2ك ذ + ك ر$

(ز) $ك د + ك ط - د - ط$

(ح) $2ب ص + 2ب ع - ص - ع$

3- حلل $3ي ز + 12ي + ز + 4$

2-5-1 تحليل المقادير التربيعية الثلاثية Factorisation of Quadratic Expressions

المقدار الذي على الصورة $أس^2 + ب س + ج$ (حيث $أ, ب, ج$ ثوابت وحيث $أ \neq 0$) يسمى مقداراً تربيعياً ثلاثياً. أحد طرق تحليل المقدار التربيعي هو استخدام عكس قانون التوزيع. على سبيل المثال.

$$\begin{aligned} س^2 + 7س + 12 &= س^2 + 4س + 3س + 12 \\ &= س(س + 4) + 3(س + 4) \\ &= (س + 4)(س + 3) \end{aligned}$$

(باستخدام التجميع)

سوف نلاحظ أن $7س$ قد قسمت إلى $4س + 3س$ ويجب التأكد من أن في الإجابة النهائية تاج العددين داخل القوس هو الحد الثابت للمقدار التربيعي. وفي هذه الحالة $12 = 3 \times 4$ ولعمل ذلك بطريقة منهجية سوف ندرس "طريقة التبادل" أو طريقة المقص.

مثال 16

حلل $س^2 + 7س + 3$

الحل

الخطوة الأولى

حدد العوامل الممكنة للحدود في $س^2$ وكذلك للحد الثابت.

$$\begin{array}{ccc} س^2 + 7س + 3 & & \\ \uparrow & & \uparrow \\ س \times 2 & & (1+) \times (3+) \end{array}$$

الخطوة 2

اكتب العوامل رأسياً كما هو موضح.

1+	س
3+	2س

الخطوة 3

استخدم الضرب التبادلي للعوامل واكتب ناتج العملية في العمود الأخير.

$$\begin{array}{r|l} 2س & 1+ \\ 3س & 3+ \end{array}$$

الخطوة 4

اجمع العمود الأخير. ولا تقبل العملية إن لم يكن المجموع مساوٍ للحد في س في المقدار المعطى.

$$\begin{array}{r|l} 2س & 1+ \\ 3س & 3+ \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{اجمع} \\ \{ 2س \\ 3س \} \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 5س & 4+ \\ 7س & 3+ \end{array}$$

∴ مرفوض

الخطوة 5

بادل أماكن 3، 1 واستخدم الضرب التبادلي ثم اجمع العمود الأخير مرة أخرى.

$$\begin{array}{r|l} 6س & 3+ \\ 1س & 1+ \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 7س & 4+ \end{array}$$

مقبول

الخطوة 6

بما أن الخطوة (5) قبلت، فإن عوامل المقدار التربيعي هي تلك الموضوعه في .

$$\begin{array}{r|l} 6س & 3+ \\ 1س & 1+ \end{array}$$

$$\therefore 2س^2 + 7س + 3 = (3 + س)(1 + 2س)$$

في المثال 16، فصدنا كتابة الخطوات بطريقة مطولة حتى يمكنك تتبعها. مع التدريب الكافي يمكن تبثيل معظم الخطوات ذهنيًا كما هو موضح في الأمثلة التالية.

مثال 17: حلل $30 + 11 + 1$

الحل

$$30 + 11 + 1 \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$$

$$6 \times 5 \text{ أو } 15 \times 2 \text{ أو } 30 \times 1 \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$$

$$1 \times 1$$

محاولة 3	محاولة 2	محاولة 1
$\begin{array}{c c} 15 & 5 \\ \hline 6 & 6 \\ \hline 11 & \end{array}$	$\begin{array}{c c} 12 & 2 \\ \hline 15 & 15 \\ \hline 11 & 17 \end{array}$	$\begin{array}{c c} 1 & 1 \\ \hline 30 & 30 \\ \hline 11 & 31 \end{array}$

$$(6 + 1)(5 + 1) = 30 + 11 + 1 \therefore$$

مثال 18: حلل $12 + 8 - 2$

الحل

$$12 + 8 - 2 \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$$

$$\text{ص} \times \text{ص} \quad \text{ص} \times \text{ص} \quad \text{ص} \times \text{ص}$$

$$6 \times 2 \text{ أو } (6-) \times (2-) \text{ إلخ}$$

محاولة 2	محاولة 1
$\begin{array}{c c} 2- & 2- \\ \hline 6- & 6- \\ \hline 8- & \end{array}$	$\begin{array}{c c} 2 & 2 \\ \hline 6 & 6 \\ \hline 8 & 8 \end{array}$

$$(6 - 2)(2 - 2) = 12 + 8 - 2 \therefore$$

لاحظ أن الحد $(8-)$ يشير إلى أن عاملي الحد الثابت الموجب (12) سالبان، ولذا يجب التعبير عن العدد (12) كما يلي $(3-) \times (4-)$ أو $(2-) \times (6-)$ بدلاً من 4×3 أو 6×2 .

مثال 19: حلل $3 - 2 + 2$

الحل

$$3 - 2 + 2 \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$$

$$3 \times (1-) \text{ أو } (3-) \times 1 \quad \uparrow \quad \uparrow$$

$$2 \times 2$$

محاولة 2	محاولة 1
$\begin{array}{r l} 2- & 1- \\ 3+ & 3- \\ \hline & 2- \end{array}$	$\begin{array}{r l} 2- & 1- \\ 3- & 3- \\ \hline & 2- \end{array}$

$$\therefore 2^2 - 2 + 3 = 3 - 2 + (1 - 2)(3 + 2)$$

في المثال التالي، سوف نتخطى العمليات المرفوضة، وبالتدريب الكافي سوف نستطيعه أنت كذلك.

مثال 20:

حلل

$$\begin{aligned} \text{(أ)} \quad & 10 + 7س + 2س^2 \\ \text{(ب)} \quad & 6 + 8ص + 2ص^2 \\ \text{(ج)} \quad & 3 - 2ر - 2ر^2 \\ \text{(د)} \quad & 2د^2 + 3د + 2 \end{aligned}$$

الحل

$$\text{(أ)} \quad 10 + 7س + 2س^2 = (س + 2)(س + 5)$$

لاحظ أن الحدود الثلاثة $2ص^2$ ، $8ص$ ، 6 لها نفس العامل المشترك 2. دائماً استخرج أولاً العامل المشترك الأعلى.

$$\text{(ب)} \quad 2ص^2 + 8ص + 6 = 2(ص^2 + 4ص + 3)$$

$$2(ص + 1)(ص + 3)$$

$$\text{(ج)} \quad 3 - 2ر - 2ر^2 = (2ر + 3)(1 - ر)$$

لاحظ أن بإمكانك مراجعة إجابتك باستخدام قانون التوزيع لفك إجابتك والتأكد من الحصول على المقدار الأصلي.

$$\text{(د)} \quad 2د^2 + 3د + 2 = (د + 2)(د + 1)$$

ملحوظة

$$\text{(أ)} \quad \begin{array}{r|l} 2س & 2س^2 \\ 5س & 7س \\ \hline & 10 \end{array}$$

$$\text{(ب)} \quad \begin{array}{r|l} 2ص & 2ص^2 \\ 3ص & 8ص \\ \hline & 6 \end{array}$$

$$\text{(ج)} \quad \begin{array}{r|l} 2ر & 2ر^2 \\ 3 & 3 - 2ر \\ \hline & 2ر + 3 \end{array}$$

$$\text{(د)} \quad \begin{array}{r|l} 2د & 2د^2 \\ 3د & 3د \\ \hline & 2 \end{array}$$

تمرين 1-ط

1- حلل كلًا مما يأتي

$$\text{(أ)} \quad 2 + 3ع + ع^2$$

$$\text{(ب)} \quad 6 + 7س + 2س^2$$

$$\text{(ج)} \quad 36 + 12ز + 2ز^2$$

$$\text{(د)} \quad 21 + 10ذ + 2ذ^2$$

$$\text{(هـ)} \quad 36 + 12د + 2د^2$$

$$\text{(و)} \quad 12 + 7ر + 2ر^2$$

$$\text{(ز)} \quad 12 - ه + ه^2$$

$$\text{(ح)} \quad 6 - 5و + 3و^2$$

$$\text{(ط)} \quad 12 - 4ف + 2ف^2$$

$$\text{(ي)} \quad 6 - ح + 2ح^2$$

$$\text{(ك)} \quad 24 - 5س + 2س^2$$

$$\text{(ل)} \quad 12 - 4ح + 2ح^2$$

$$\text{(م)} \quad 12 - 1 - 2ر^2$$

2- حلل كلًا مما يأتي:

(أ) $2^2 + 15 + 2$

(ب) $3^2 + 10 + 3$

(ج) $12^2 + 17 + 6$

(د) $12^2 + 6 - 6$

(هـ) $6^2 + 5 - 6$

(و) $3^2 - 4 + 1$

(ز) $4^2 - 17 + 4$

3- حلل:

(أ) $9^2 + 2 + 20$

(ب) $7^2 + 10 + 2$

(ج) $48^2 + 8 + 2$

(د) $48^2 + 2 + 2$

(هـ) $4^2 - 4 + 4$

(و) $6^2 - 6 + 9$

(ز) $5^2 - 8 + 4$

(ح) $6^2 - 6 + 12$

3-5-1 تحليل الفرق بين مربعين Factorisation of a Difference of Two Squares

رأينا في الفصل 2-1 أنه باستخدام قانون التوزيع $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$

يمكن استخدام الإجراء العكسي $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ لتحليل المقادير

التي هي الفرق بين المربعين.

الجذر التربيعي لمقدار:

$$p^2 = p \times p \quad \text{لأن } p^2 = p \times p$$

$$4p^2 = p^2 \times 4 \quad \text{لأن } 4p^2 = p^2 \times 4$$

$$\frac{1}{9}p^2 = \frac{1}{3}p \times \frac{1}{3}p \quad \text{لأن } \frac{1}{9}p^2 = \frac{1}{3}p \times \frac{1}{3}p$$

الجذر التربيعي لأي رمز جبري مرفوع إلى أية قوة هو نفس الرمز الجبري مرفوعاً إلى نصف القوة الأولى.

الهدف:

يهدف هذا النشاط إلى اكتشاف العلاقة $p^2 - b^2 = (p-b)(p+b)$ بطريقة هندسية.

خطوات العمل:

1 - ارسم مربعاً طول ضلعه p .

2 - قسم هذا المربع إلى مساحات كما موضح في الشكل وأحسب مساحة كل منها.

الإستنتاج:


من الشكل السابق نلاحظ أن:

$$\frac{(p-b)(p+b)}{2} + \frac{(p-b)(p+b)}{2} = \boxed{b^2} - \boxed{p^2}$$

$$\therefore \frac{(p-b)(p+b)}{2} + \frac{(p-b)(p+b)}{2} = p^2 - b^2$$

$$\frac{(p-b)(p+b)}{2} \times 2 =$$

$$(p-b)(p+b) =$$



ملحوظة

الفرق بين مربعين كاملين

ملحوظة

استخرج دائماً أي عامل مشترك كخطوة أولى.

مثال 21

حلل

$$(أ) \text{ س}^2 - 4 \quad (ب) \text{ س}^2 - 64 \quad (ج) \text{ س}^2 - 25 \quad (د) \text{ س}^2 - 18$$

الحل

$$\begin{aligned} (أ) \text{ س}^2 - 4 &= (\text{س} - 2)(\text{س} + 2) \\ (ب) \text{ س}^2 - 64 &= (\text{س} - 8)(\text{س} + 8) \\ (ج) \text{ س}^2 - 25 &= (\text{س} - 5)(\text{س} + 5) \\ (د) \text{ س}^2 - 18 &= (\text{س} - \sqrt{18})(\text{س} + \sqrt{18}) \end{aligned}$$

مثال 22

حلل

$$\begin{aligned} (أ) \text{ س}^2 - 9 &= (\text{س} - 3)(\text{س} + 3) \\ (ب) \text{ س}^2 - 4 &= (\text{س} - 2)(\text{س} + 2) \\ (ج) \text{ س}^2 - 16 &= (\text{س} - 4)(\text{س} + 4) \end{aligned}$$

الحل

$$\begin{aligned} (أ) \text{ س}^2 - 9 &= (\text{س} - 3)(\text{س} + 3) \\ (ب) \text{ س}^2 - 4 &= (\text{س} - 2)(\text{س} + 2) \\ (ج) \text{ س}^2 - 16 &= (\text{س} - 4)(\text{س} + 4) \end{aligned}$$

مثال 23

من دون استخدام الآلة الحاسبة أوجد قيمة:

$$(أ) \text{ س}^2 - 6.4 \quad (ب) \text{ س}^2 - 27$$

الحل

$$\begin{aligned} (أ) \text{ س}^2 - 6.4 &= (\text{س} - 2.5)(\text{س} + 2.5) \\ (ب) \text{ س}^2 - 27 &= (\text{س} - 5.2)(\text{س} + 5.2) \end{aligned}$$

تمرين 1-ي

1- حلل كلًا ما يأتي:

- (أ) $49 - 2^2$ (ب) $25 - 2^2$ (ج) $16 - 2^2$ (د) $144 - 2^2$ (هـ) $81 - 2^2$ (و) $25 - 2^2$ (ز) $100 - 2^2$ (ح) $25 - 2^2$ (ط) $1 - 2^2$ (ك) $500 - 2^2$ (م) $108 - 3^2$

2- حلل:

- (أ) $2^2 - 2^2$ (ب) $2^2 - 2^2$ (ج) $4 - 2^2$ (د) $16 - 2^2$ (هـ) $49 - 2^2$ (و) $4 - (1 + 2^2)$ (ز) $100 - (2 - 2^2)$ (ح) $25 - (4 - 2^2)$ (ط) $(3 + 2^2) - 144$ (ك) $2^2 - 2^2$

3- من دون استعمال الآلة الحاسبة أوجد قيمة:

- (أ) $2^2 12 - 2^2 88$ (ب) $2^2 23 - 2^2 77$ (ج) $2^2 0.2 - 2^2 9.8$ (د) $2^2 1.3 - 2^2 8.7$ (هـ) $2^2 3.46 - 2^2 6.54$ (و) $2^2 4.57 - 2^2 5.43$ (ز) $2^2 (\frac{1}{4}) - 2^2 (\frac{3}{4})$ (ح) $2^2 (\frac{3}{8}) - 2^2 (\frac{5}{8})$ (ط) $\frac{2^2 44 - 2^2 69}{2^2 3 + 2^2 4}$ (ي) $\frac{2^2 22 - 2^2 78}{2^2 6 + 2^2 8}$

4- حلل:

- (أ) $25 - 2^2$ (ب) $36 + 2^2 13 - 4$

5- حلل:

- (أ) $1 - 2^2 9$ (ب) $1 - 2^2 9$ (ج) $25 + 10 - 2^2$

4-5-1 تحليل الفرق بين المكعبين ومجموع المكعبين

Factorisation of a Difference of Two Cubes and Total Cubes

رأينا في البند 3-1 أنه باستخدام القانون:

$$a^3 \mp b^3 = (a + b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

مثال 24:

حلل:

- (أ) $27 - 3^3$ (ب) $125 + 3^3$ (ج) $16 - 2^3$ (د) $3^3 - \frac{1}{64}$

الحل

$$\begin{aligned} \text{(أ)} \quad 27 - 3^3 &= 3^3 - 3^3 \\ &= (3 - 3)(3^2 + 3 \cdot 3 + 3^2) \\ &= 0 \\ \text{(ب)} \quad 125 + 3^3 &= 5^3 + 3^3 \\ &= (5 + 3)(5^2 - 5 \cdot 3 + 3^2) \\ &= (8 - 3^2)2 = 16 - 2^3 \\ \text{(ج)} \quad 16 - 2^3 &= 2^4 - 2^3 \\ &= 2(2^3 - 2^2) = 2(2 - 2^2) = 2(4 + 2^2) \\ \text{(د)} \quad 3^3 - \frac{1}{64} &= 3^3 - \frac{1}{4^3} \\ &= (\frac{3}{4} + \frac{1}{4})(\frac{3}{4} - \frac{1}{4} + \frac{1}{16}) = \end{aligned}$$

إستخرج دائماً أى عامل مشترك كخطوة أولى.

مثال 25:

حلل:

$$(أ) م^3 - ن^3 \quad (ب) 8ب^3 + ب^3 \quad (ج) \frac{1}{27}س^3 - 27ص^3$$

الحل

$$(أ) م^3 - ن^3 = (م - ن)(م^2 + م ن + ن^2)$$

$$(ب) 8ب^3 + ب^3 = ب^3(8 + 1) = ب^3(2^3 + 1^3) = ب^3(2 + 1)(2^2 - 2 + 1 + 2 + 1 + 1) = ب^3(3)(4 - 2 + 1 + 2 + 1 + 1) = ب^3(3)(9)$$

$$(ج) \frac{1}{27}س^3 - 27ص^3 = \left(\frac{1}{3}س - 3ص\right)\left(\frac{1}{9}س^2 + 3صس + 9ص^2\right)$$

تمرين 1-ك

1- حلل كلاً مما يأتي:

$$(أ) ص^3 + 27$$

$$(ب) 64 - ع^3$$

$$(ج) 2ز^3 - 16$$

$$(د) م^3 + \frac{1}{125}$$

$$(هـ) \frac{8}{27}س^3 - \frac{27}{8}$$

$$(و) ى^3 - ل^3$$

2- حلل:

$$(أ) (س + ص)^3 - ص^3$$

$$(ب) 125 - 4ب^3$$

$$(ج) 216 + (ك - 2)^3$$

$$(د) 729م^3 - 1$$

3- حلل:

$$(أ) س^6 - ص^6$$

$$(ب) م^3ن^3 - ك^3$$

4- من دون استعمال الآلة الحاسبة أوجد قيمة:

$$(أ) \left(\frac{1}{3}\right)^3 - \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

$$(ب) (2.31)^3 - (1.01)^3$$

ملخص

1- إيجاد مفكوك المقادير الجبرية باستخدام قانون التوزيع:

$$ا(ب + ح) = اب + اح$$

$$(ا + ب)(س + ح) = ا(س + ح) + ب(س + ح)$$

$$= اس + اح + بس + بح$$

2- خمس صور مفيدة لإيجاد المفكوك:

$$2ب^2 + 2بب + 2ب^2 = 2(ب + ب)^2$$

$$2ب^2 - 2بب + 2ب^2 = 2(ب - ب)^2$$

$$b^2 - p^2 = (b + p)(b - p)$$

$$b^3 - p^3 = (b^2 + bp + p^2)(b - p)$$

$$b^3 + p^3 = (b^2 + bp - p^2)(b + p)$$

3- التحليل عكس عملية إيجاد المفكوك.

4- التحليل باستخدام العامل المشترك الأعلى:

$$\text{مثال: } 4s + 8 = 4(s + 2)$$

5- التحليل باستخدام التجميع:

$$\text{مثال: } a + s + b + c + s + a = s + b + c + a + s + b + c + a = (s + a)(b + c) =$$

$$(d + c)(b + a) =$$

6- تحليل المقادير التربيعية:

$$\text{مثال: } 2s^2 + 7s + 3 = (s + 3)(2s + 1)$$

6s	3	s
s	1	2s
7s		

7- تحليل الفرق بين المربعين:

$$\text{مثال: } s^2 - 4 = (s - 2)(s + 2)$$

$$(2 + s)(2 - s) =$$

8- تحليل الفرق بين المكعبين ومجموع المكعبين:

$$\text{مثال: } s^3 - 27 = (s - 3)(s^2 + 3s + 9)$$

$$(3 - s)(s^2 + 3s + 9) =$$

9- استخراج دائماً العامل المشترك الأعلى في بدء عملية التحليل:

$$\text{مثال: } 2v^2 + 8v + 6 = 2(v^2 + 4v + 3)$$

$$2(v + 1)(v + 3) =$$

استقصاء الرياضيات

التربيع الذهني

عرض سعيد على محمد كيفية تربيع الأعداد المختلفة ذهنيًا وقد استخدم المثال التالي ليعين ذلك.



(جـ)	(ب)	(أ)
$^{2}45$	$^{2}35$	$^{2}25$
16	9	4
$\frac{4}{20} +$	$\frac{3}{12} +$	$\frac{2}{6} +$
$2025 = ^{2}45$	$1225 = ^{2}35$	$625 = ^{2}25 \therefore$

هل يمكنك إيجاد كيفية الحصول على:

$$^{2}55 \text{ (i)} \quad ^{2}65 \text{ (ii)} \quad ^{2}15 \text{ (iii)} ?$$

لاحظ محمد أن جميع الأعداد المطلوب تربيعها كان رقم الأحاد بها (5)، فحاول نفس الطريقة مع الأعداد حيث رقم الأحاد مختلفًا.

(ب)	(أ)
$^{2}16$	$^{2}24$
1	4
$\frac{1}{2} +$	$\frac{2}{6} +$
$236 \neq 256 = ^{2}16$	$616 \neq 576 = ^{2}24$

أمعن محمد التفكير في سبب نجاح الطريقة السابقة فقط مع الأعداد التي رقم أحادها (5)، استطاع في النهاية باستخدام الجبر أن يفهم لماذا لا تصلح تلك الطريقة إلا مع الأعداد التي رقم أحادها (5)، فهل تستطيع أنت ذلك؟

ورقة المراجعة 1

القسم (أ)

1- أوجد مفكوك:

(أ) $(\dot{a}+2)3$

(ب) $(2-\dot{b})4$

(جـ) $5-(3+\dot{s})$

(د) $6-(5\dot{v}-4)$

2- حلل:

(أ) $15+\dot{c}20$

(ب) $12-6\dot{d}$

(جـ) $12-\dot{s}8$

(د) $21-\dot{v}6$

3- أوجد مفكوك:

(أ) $3(\dot{a}-2\dot{b})$

(ب) $4\dot{c}-(2+3\dot{d})$

(جـ) $5\dot{s}-(\dot{s}+\dot{v})$

(د) $2\dot{v}-(3\dot{v}-1)$

4- حلل:

(أ) $6\dot{s}-9\dot{v}$

(ب) $\dot{a}^2+\dot{b}^2$

(جـ) $3\dot{s}^2-6\dot{s}$

(د) $\dot{v}-\dot{v}^2$

القسم (ب)

5- أوجد مفكوك:

(أ) $(4+\dot{m})2(3+\dot{m})$

(ب) $(5+\dot{n}2)(3-\dot{n})$

(جـ) $(7-\dot{d})(3-\dot{d})$

6- حلل:

(أ) $2+\dot{d}3+\dot{d}^2$

(ب) $6-\dot{k}5+\dot{k}^2$

(جـ) $6-\dot{r}^2$

7- أوجد مفكوك:

(أ) $2(5+\dot{a})$

(ب) $(\dot{s}-4)(\dot{s}+4)$

(جـ) $2(4-3\dot{v})$

8- حلل:

(أ) $36-\dot{c}4$

(ب) $1+\dot{s}4-\dot{s}^2$

(جـ) $2\dot{v}+2\dot{v}^2+4\dot{v}$

(د) $5\dot{v}^2-\dot{v}^5$

القسم (جـ)

9- (أ) حلل $\dot{a}^2-\dot{b}^2$

(ب) من دون استخدام الآلة الحاسبة.

ثم أوجد قيمة

(i) $4.99-\dot{a}^2-1.01\dot{b}^2$

(ii) $\sqrt{26-\dot{a}^2}-\sqrt{24-\dot{b}^2}$

10- (أ) حلل:

(i) $10\dot{s}-90$

(ii) $5\dot{a}-\dot{a}\dot{b}+10-2\dot{b}$

(ب) إذا كان $\dot{s}^2+\dot{v}^2=25$, $\dot{s}\dot{v}=12$, أوجد قيمة

(i) $(\dot{s}+\dot{v})^2$

(ii) $(\dot{s}-\dot{v})^2$

(iii) $\dot{s}^2-\dot{v}^2$

(iv) $(\dot{s}+\dot{v})^3$

(v) $\dot{s}^3+\dot{v}^3$

(vi) $\dot{s}^3-\dot{v}^3$

الكسور والصيغ الجبرية

Algebraic Fractions and Formulae



الخوارزمي

علمنا في مقدمة الجزء الأول من الصف الثامن، أن "ديوفانتوس" يعتبر مؤسس علم الجبر (اللقب الذي يتقاسمه مع العالم العربي محمد بن موسى الخوارزمي) الذي ولد في خوارزم، وأقام في بغداد في عصر المأمون، وأشهر كتبه كتاب "الجبر والمقابلة"، وقد تُرجم إلى اللغة اللاتينية في سنة 1135 م. وقد دخلت على إثر ذلك كلمات مثل الجبر Algebra

والصفر Zero إلى اللغات اللاتينية وفي كتابه "حساب الجبر والمقابلة" حل منهجي للمعادلات الخطية والتربيعية: كان لإسهاماته تأثير كبير على اللغة الإنجليزية ككلمة Algorithm نظام القَدَّ العربي، وكلمة Algorithm خوارزمية، تبعان من Algorithm، الشكل اللاتيني لاسمه، وأسمه أصل الكلمة في اللغة الأسبانية "Guarismo"، البرتغالية "Algarisma" وهما الاثنان بمعنى "رقم".

في نهاية هذا الفصل سوف تكون قادرًا على:

- تبسيط الكسور الجبرية البسيطة.
- تبسيط الكسور الجبرية التي تتضمن ضربات إضافية.
- إجراء عمليات الضرب والقسمة على الكسور الجبرية.
- إجراء عمليات الجمع والطرح على الكسور الجبرية ذات المقامات العددية.
- إجراء عمليات الجمع والطرح على الكسور الجبرية ذات المقامات الجبرية الخطية.
- حل المعادلات التي تتضمن كسورًا جبرية.
- التعبير عن الصيغة الجبرية بمتغير تابع مختلف.

Algebraic Fractions

الكسور الجبرية

1-2

لقد عرفنا الكسور العددية مثل، $\frac{1}{2}$ ، $\frac{3}{4}$ ، $\frac{5}{10}$ ، وبالمثل يمكن أيضًا مقارنة الكسور الجبرية والتي على صورة

$$\frac{x^2 + 2}{x^2 + 1} \cdot \frac{1}{x+1} \cdot \frac{x-1}{2} \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{3}$$

والتي تكتب أيضًا بصورة $\frac{p}{q}$ حيث p تسمى بسطًا وحيث q ، (ص $\neq$ صفر) تسمى مقامًا.

تبسيط الكسور الجبرية البسيطة

Simplification of Simple Algebraic Fractions

لتبسيط الكسور الجبرية، نتبع نفس الطريقة التي نتبعها في تبسيط الكسور العددية بحذف (أي قسمة) العوامل المشتركة في كل من البسط والمقام.

الكسر الجبري	الكسر العددي
$\frac{15}{2} = \frac{3 \times 5}{2 \times 1} = \frac{15}{2}$	$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{8}{12}$

يمكن تبسيط الكسور الجبرية عن طريق "حذف" العوامل المشتركة في كل من البسط والمقام. مع ذكر شرط الاختصار إن لزم الأمر. والأمثلة توضح ذلك.

مثال 1:

اختصر الكسور الجبرية الآتية مع ذكر شرط الاختصار:

$$(أ) \frac{18}{6} \quad (ب) \frac{14}{3} \quad (ج) \frac{21}{17} \quad (د) \frac{6}{9}$$

الحل

$$(أ) \frac{18}{6} = \frac{2 \times 3 \times 3}{2 \times 3} = 3 \quad (ب) \frac{14}{3} = \frac{2 \times 7}{3} = \frac{14}{3} \quad (ج) \frac{21}{17} = \frac{3 \times 7}{17} = \frac{21}{17} \quad (د) \frac{6}{9} = \frac{2 \times 3}{3 \times 3} = \frac{2}{3}$$

$$(أ) \frac{18}{6} = \frac{2 \times 3 \times 3}{2 \times 3} = 3 \quad (ب) \frac{14}{3} = \frac{2 \times 7}{3} = \frac{14}{3} \quad (ج) \frac{21}{17} = \frac{3 \times 7}{17} = \frac{21}{17} \quad (د) \frac{6}{9} = \frac{2 \times 3}{3 \times 3} = \frac{2}{3}$$

مثال 2:

اختصر الكسور الجبرية الآتية مع ذكر شرط الاختصار:

$$(أ) \frac{b-1}{b(b-1)} \quad (ب) \frac{(b-1)(b+1)}{(b+1)} \quad (ج) \frac{ص+ع}{ص(ص+ع)} \quad (د) \frac{(ص+ع)(2-ص)}{(ص-2)^2}$$

الحل

$$(أ) \frac{b-1}{b(b-1)} = \frac{1}{b} \quad (ب) \frac{(b-1)(b+1)}{(b+1)} = b-1 \quad (ج) \frac{ص+ع}{ص(ص+ع)} = \frac{1}{ص} \quad (د) \frac{(ص+ع)(2-ص)}{(ص-2)^2} = \frac{1}{ص-2}$$

$$(أ) \frac{b-1}{b(b-1)} = \frac{1}{b} \quad (ب) \frac{(b-1)(b+1)}{(b+1)} = b-1 \quad (ج) \frac{ص+ع}{ص(ص+ع)} = \frac{1}{ص} \quad (د) \frac{(ص+ع)(2-ص)}{(ص-2)^2} = \frac{1}{ص-2}$$

$$(د) \frac{(ص+ع)(2-ص)}{(ص-2)^2} = \frac{1}{ص-2}$$

ملحوظة

القسمة على الصفر غير مسموح بها تعطي كمية غير معروفة.

تمرين 2

1- اختصر مع ذكر شرط الاختصار إن لزم الأمر:

$$\begin{array}{lll} \text{(أ)} \frac{9}{12} & \text{(ب)} \frac{20}{15} & \text{(ج)} \frac{45}{27} \\ \text{(د)} \frac{8}{12} & \text{(هـ)} \frac{27}{36} & \text{(و)} \frac{72}{64} \\ \text{(ز)} \frac{2}{3} & \text{(ح)} \frac{7}{8} & \text{(ط)} \frac{6}{2} \end{array}$$

2- اختصر كل كسر في أبسط صورة

مع ذكر شرط الاختصار:

$$\begin{array}{ll} \text{(أ)} \frac{8}{18} & \text{(ب)} \frac{12}{6} \\ \text{(ج)} \frac{14}{21} & \text{(د)} \frac{18}{9} \\ \text{(هـ)} \frac{6}{2} & \text{(و)} \frac{18}{27} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{(ز)} \frac{2}{2} & \text{(ح)} \frac{3}{4} \\ \text{(ط)} \frac{5}{10} & \end{array}$$

3- اختصر ما يأتي مع ذكر شرط الاختصار:

$$\begin{array}{ll} \text{(أ)} \frac{(a-b)}{(a-b)} & \text{(ب)} \frac{(a+b)}{(a+b)} \\ \text{(ج)} \frac{(a-b)}{(a-b)} & \text{(د)} \frac{(a+b)}{(a+b)} \\ \text{(هـ)} \frac{(a-b)}{(a-b)} & \text{(و)} \frac{(a+b)}{(a+b)} \\ \text{(ز)} \frac{(a-b)}{(a-b)} & \text{(ح)} \frac{(a+b)}{(a+b)} \\ \text{(ط)} \frac{(a-b)}{(a-b)} & \text{(ي)} \frac{(a+b)}{(a+b)} \end{array}$$

3-2 تبسيط الكسور الجبرية التي تتضمن عمليات تحليل إضافية

Simplification of Algebraic Fractions Involving Further Factorisation

الخطوة الأولى في تحليل المقادير الجبرية هي إخراج العوامل المشتركة لجميع حدود المقدار. على سبيل المثال،

$$\begin{aligned} 2s^2 + 14s + 24 &= 2(s^2 + 7s + 12) \\ &= 2(s+3)(s+4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a^2 + 2ab + b^2 &= (a+b)^2 \\ a^2 - 2ab + b^2 &= (a-b)^2 \\ a^2 - b^2 &= (a-b)(a+b) \end{aligned}$$

سوف نوضح الأمثلة التالية تطبيق التحليل في تبسيط الكسور الجبرية.

مثال 3:

اختصر الآتي مع ذكر شرط الاختصار:

$$\begin{array}{ll} \text{(أ)} \frac{a^2}{a} & \text{(ب)} \frac{a^2}{a} \\ \text{(ج)} \frac{3s+6}{9} & \text{(د)} \frac{2s^2+2s}{2s} \end{array}$$

الحل

$$(أ) \frac{1}{x} = \frac{x^2}{x^3} \quad (ب) \frac{1}{x} = \frac{x^2}{x^3} \quad (ج) \frac{1}{x} = \frac{x^2}{x^3} \quad (د) \frac{1}{x} = \frac{x^2}{x^3}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{x^2}{x^3} \quad 0 \neq x, 0 \neq x^2$$

$$0 \neq x, 0 \neq x^2$$

$$(أ) \frac{1}{x} = \frac{x^2}{x^3} \quad (ب) \frac{1}{x} = \frac{x^2}{x^3} \quad (ج) \frac{1}{x} = \frac{x^2}{x^3} \quad (د) \frac{1}{x} = \frac{x^2}{x^3}$$

$$2 \neq x, 1 \neq x^2$$

$$\frac{3}{2} \neq x, \frac{2}{3} \neq x^2$$

مثال 4:

اختصر.

$$(أ) \frac{4-x^2}{x-2} \quad (ب) \frac{1+x^2}{1+x} \quad (ج) \frac{x^2-3x}{x^2-3x} \quad (د) \frac{4-x^2}{x-2}$$

الحل

$$(أ) \frac{4-x^2}{x-2} = \frac{(2-x)(2+x)}{x-2} = \frac{(2-x)(2+x)}{-(2-x)} = -(2+x)$$

$$\frac{2}{3-x}$$

$$(ب) \frac{1+x^2}{1+x} = \frac{1+x^2}{1+x}$$

$$1 \neq x, 1 \neq x^2, 1 \neq x^2+1$$

$$(ج) \frac{x^2-3x}{x^2-3x} = \frac{x(x-3)}{x(x-3)} = 1$$

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

$$(د) \frac{4-x^2}{x-2} = \frac{(2-x)(2+x)}{x-2} = -(2+x)$$

$$2 \neq x, 2 \neq x^2, (2-x)(2+x) \neq 0$$

ملحوظة

تصور ذهنيًا:

$$x^2 - 2x + 3 = (x-1)^2 + 2$$

$$x^2 - 2x + 3 = (x-1)^2 + 2$$

$$x^2 - 2x + 3 = (x-1)^2 + 2$$

$$(x-1)^2 + 2 = (x-1)^2 + 2$$

$$(x-1)^2 + 2 = (x-1)^2 + 2$$

$$(x-1)^2 + 2 = (x-1)^2 + 2$$

تمرين 2ب

1- حل ما يلي:

$$(أ) \frac{1}{x} = \frac{x^2}{x^3} \quad (ب) \frac{1}{x} = \frac{x^2}{x^3} \quad (ج) \frac{1}{x} = \frac{x^2}{x^3} \quad (د) \frac{1}{x} = \frac{x^2}{x^3}$$

2- اختصر ما يلي في أبسط صورة مع ذكر شرط الاختصار:

$$(أ) \frac{1}{x} = \frac{x^2}{x^3} \quad (ب) \frac{1}{x} = \frac{x^2}{x^3}$$

3- اختصر ما يأتي مع ذكر شرط الاختصار:

$$\begin{array}{ll} \text{(ج)} \frac{25 - 10\sqrt{5} + 5}{5 - \sqrt{5}} & \text{(ز)} \frac{16 - 4\sqrt{4}}{4 - \sqrt{4}} \\ \text{(ي)} \frac{9\sqrt{3} - 3\sqrt{3}}{3 - \sqrt{3}} & \text{(ط)} \frac{4\sqrt{2} - 2\sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} \\ \text{(ل)} \frac{4 - 3\sqrt{6}}{6 - 3\sqrt{6}} & \text{(ك)} \frac{12 - 2\sqrt{3} - 2\sqrt{3}}{3 - \sqrt{3}} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{(أ)} \frac{2 + 3\sqrt{3} - \sqrt{3}}{6 - 3\sqrt{3}} & \text{(ب)} \frac{2 + 13\sqrt{2} + 1}{4 + 12} \\ \text{(د)} \frac{9 - \sqrt{3}}{3 - \sqrt{3}} & \text{(جأ)} \frac{4 - \sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}} \\ \text{(و)} \frac{9 + 6\sqrt{3} - 3\sqrt{3}}{9 - 3\sqrt{3}} & \text{(هأ)} \frac{4 + 2\sqrt{4} + 2\sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}} \end{array}$$

4-2 ضرب وقسمة الكسور الجبرية Multiplication and Division of Algebraic Fractions

لاحظ حاصل الضرب التالي:

$$\frac{8}{21} = \frac{8 \times 1}{7 \times 3} = \frac{8}{49} \times \frac{1}{15}$$

في المثال السابق، لاحظ أنه عند ضرب الكسور في الحساب،

- تُحذف العوامل المشتركة في البسط والمقام.
 - تُضرب العوامل المتبقية في كل من البسط والمقام في بعضها.
- وبالمثل يمكننا استخدام نفس القواعد لضرب الكسور الجبرية.

$$\text{على سبيل المثال: } \frac{3}{2} = \frac{3 \times 1}{2} = \frac{3}{2} \times \frac{1}{1} = \frac{3}{2} \times \frac{1}{8}$$

ولقسمة كسر جبري على آخر استبدل العلامة (+) إلى (-) وأقلب المقسوم عليه ثم استأنف الضرب.

$$\frac{5}{2} = \frac{5}{2} \times \frac{1}{1} = \frac{5}{2} \times \frac{1}{8} = \frac{5}{16} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{32}$$

مثال 5:

اختصر ما يلي:

$$\text{(ب)} \frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$$

$$\text{(أ)} \frac{4}{1} \times \frac{5}{12}$$

الحل

$$\text{(ب)} \frac{3}{4} \times \frac{8}{9} = \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\text{(أ)} \frac{4}{1} \times \frac{5}{12} = \frac{4}{1} \times \frac{5}{3} = \frac{20}{3}$$

مثال 6:

اختصر:

$$\text{(ب)} \frac{16}{15} + \frac{4}{7}$$

$$\text{(أ)} \frac{2}{14} + \frac{6}{7}$$

الحل

$$\begin{aligned} \text{(ب)} \frac{16}{15} + \frac{4}{7} &= \frac{16}{15} + \frac{4}{7} \\ &= \frac{16}{15} + \frac{1}{7} \times \frac{4}{7} \\ &= \frac{16}{15} + \frac{4}{49} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(أ)} \frac{2}{14} + \frac{6}{7} &= \frac{2}{14} + \frac{6}{7} \\ &= \frac{2}{14} + \frac{1}{7} \times \frac{6}{7} \\ &= \frac{2}{14} + \frac{6}{49} \end{aligned}$$

مثال 7:

اختصر:

$$(i) \frac{m^2 + n^2}{n} \cdot \frac{m^2 - n^2}{m^2 - 3n^2} \quad (ii) \frac{1}{1 - 2m} \cdot \frac{2m^2 - 5m + 2}{1 - m}$$

الحل

$$(i) \frac{m^2 + n^2}{n} \cdot \frac{(m - n)(m + n)}{m^2 - 3n^2} = \frac{m^2 + n^2}{n} \cdot \frac{(m - n)(m + n)}{(m - \sqrt{3}n)(m + \sqrt{3}n)}$$

$$\frac{m^2 + n^2}{n} \cdot \frac{(m - n)(m + n)}{(m - \sqrt{3}n)(m + \sqrt{3}n)} = \frac{m^2 + n^2}{n} \cdot \frac{(m - n)(m + n)}{(m - \sqrt{3}n)(m + \sqrt{3}n)}$$

$$(ii) \frac{1}{1 - 2m} \cdot \frac{(2m - 1)(m - 2)}{1 - m} = \frac{1}{1 - 2m} \cdot \frac{(2m - 1)(m - 2)}{1 - m}$$

$$\frac{1}{1 - 2m} \cdot \frac{(2m - 1)(m - 2)}{1 - m} = \frac{1}{1 - 2m} \cdot \frac{(2m - 1)(m - 2)}{1 - m}$$

مثال 8:

اختصر:

$$(i) \frac{b^2 - 1}{b} \div \frac{b - 1}{1} \quad (ii) \frac{b^2 - 1}{b} \div \frac{b - 1}{1}$$

الحل

$$(i) \frac{b^2 - 1}{b} \div \frac{b - 1}{1} = \frac{b^2 - 1}{b} \cdot \frac{1}{b - 1} = \frac{(b - 1)(b + 1)}{b(b - 1)} = \frac{b + 1}{b}$$

$$(ii) \frac{b^2 - 1}{b} \div \frac{b - 1}{1} = \frac{b^2 - 1}{b} \cdot \frac{1}{b - 1} = \frac{(b - 1)(b + 1)}{b(b - 1)} = \frac{b + 1}{b}$$

$$\frac{b^2 - 1}{b} \div \frac{b - 1}{1} = \frac{b^2 - 1}{b} \cdot \frac{1}{b - 1} = \frac{(b - 1)(b + 1)}{b(b - 1)} = \frac{b + 1}{b}$$

$$(ii) \frac{1}{2 - m} \cdot \frac{m^2 - 5m + 6}{3 + m} = \frac{1}{2 - m} \cdot \frac{(m - 2)(m - 3)}{3 + m}$$

$$\frac{1}{2 - m} \cdot \frac{(m - 2)(m - 3)}{3 + m} = \frac{1}{2 - m} \cdot \frac{(m - 2)(m - 3)}{3 + m}$$

$$\frac{1}{2 - m} \cdot \frac{(m - 2)(m - 3)}{3 + m} = \frac{1}{2 - m} \cdot \frac{(m - 2)(m - 3)}{3 + m}$$

ملحوظة

$$\frac{2 - m}{1} = \frac{2 - m}{1}$$

تمرين 2 ج

1- اختصر ما يأتي مع ذكر شرط الاختصار:

$$(i) \frac{22}{h} \cdot \frac{3}{11} \quad (ii) \frac{28}{d} \cdot \frac{6}{7}$$

$$(iii) \frac{3}{14} \cdot \frac{7}{t} \quad (iv) \frac{5}{24} \cdot \frac{3}{t}$$

$$(v) \frac{7}{15} \cdot \frac{3}{2} \quad (vi) \frac{21}{4s} \cdot \frac{8}{7s}$$

2- اختصر ما يأتي مع ذكر شرط الاختصار:

$$(i) \frac{1}{3} \div \frac{2}{3} \quad (ii) \frac{5}{6} \div \frac{2}{12}$$

$$(iii) \frac{1}{4} \div \frac{1}{36} \quad (iv) \frac{5}{3} \div \frac{5}{3}$$

$$(v) \frac{3}{4} \div \frac{9}{m} \quad (vi) \frac{6}{7} \div \frac{9}{8}$$

$$(vii) \frac{2}{3} \div \frac{8}{9} \quad (viii) \frac{8}{9} \div \frac{4}{5}$$

$$(ix) \frac{6}{4} \div \frac{1}{4}$$

3- اختصر ما يأتي:

$$(i) \frac{14}{3-1} + \frac{3-2}{2}$$

$$(ب) \frac{2}{3-1} + \frac{2}{3-1}$$

$$(ج) \frac{2}{3-1} + \frac{2}{3-1}$$

$$(د) \frac{2}{3-1} + \frac{2}{3-1}$$

$$(هـ) \frac{2}{3-1} + \frac{2}{3-1}$$

$$(و) \frac{2}{3-1} + \frac{2}{3-1}$$

$$(ز) \frac{2}{3-1} + \frac{2}{3-1}$$

$$(ح) \frac{2}{3-1} + \frac{2}{3-1}$$

$$(ط) \frac{2}{3-1} + \frac{2}{3-1}$$

$$(ي) \frac{2}{3-1} + \frac{2}{3-1}$$

جمع وطرح الكسور الجبرية ذات المقامات العددية

Addition and Subtraction of Algebraic Fractions with Numerical Denominators

5-2

نعلم أنه ينبغي قبل جمع أو طرح الكسور العددية توحيد مقاماتها أولاً.

$$\frac{3 \times 2}{3 \times 5} + \frac{5 \times 1}{5 \times 3} = \frac{2}{5} + \frac{1}{3}$$

$$\frac{6}{15} + \frac{5}{15} =$$

$$\frac{11}{15} = \frac{6+5}{15} =$$

بالمثل نعتبر عن الكسور الجبرية بتوحيد مقاماتها قبل جمعها أو طرحها.

$$\frac{3 \times 2}{3 \times 5} + \frac{5 \times 1}{5 \times 3} = \frac{2}{5} + \frac{1}{3}$$

$$\frac{6}{15} + \frac{5}{15} =$$

$$\frac{11}{15} = \frac{6+5}{15} =$$

لجمع أو طرح الكسور الجبرية:

1- أوجد المضاعف المشترك الأدنى للمقامات.

2- أعد كتابة الكسور الجبرية بعد توحيد مقاماتها باستخدام المضاعف المشترك الأدنى الذي حصلت عليه.

3- بعد ذلك اجمع أو اطرح البسوط كما هو مطلوب.

مثال 9

اختصر ما يلي

$$(أ) \frac{1}{9} + \frac{15}{9}$$

$$(ب) \frac{4}{5} + \frac{7}{10}$$

$$(ج) \frac{2}{5} + \frac{1}{6}$$

$$(د) \frac{3}{16} + \frac{5}{12} + \frac{7}{3}$$

الحل

$$(أ) \frac{1}{9} + \frac{15}{9} = \frac{1}{9} + \frac{15}{9}$$

$$\frac{16}{9} = \frac{16}{9}$$

$$(ب) \frac{6 \times \frac{4}{5} + 7 \times \frac{7}{10}}{6 \times 5 + 7 \times 5} = \frac{6 \times 4 + 7 \times 7}{6 \times 5 + 7 \times 5}$$

$$\frac{24 + 49}{30 + 35} = \frac{73}{65}$$

$$\frac{17}{30} = \frac{17 \times 2}{30 \times 2} = \frac{34}{60}$$

$$(ج) \frac{2 \times \frac{4}{5} + \frac{7}{10}}{2 \times 5 + \frac{7}{10}} = \frac{2 \times 4 + \frac{7}{10}}{2 \times 5 + \frac{7}{10}}$$

$$\frac{8 + \frac{7}{10}}{10 + \frac{7}{10}} = \frac{80 + 7}{100 + 7} = \frac{87}{107}$$

$$\frac{9}{10} = \frac{9 \times 8}{10 \times 8} = \frac{72}{80}$$

$$(د) \frac{3 \times \frac{3}{16} + \frac{4}{5} \times \frac{5}{12} + \frac{16}{3} \times \frac{7}{3}}{3 \times 16 + \frac{4}{5} \times 12 + \frac{16}{3} \times 3} = \frac{3 \times 3 + \frac{4}{5} \times 5 + \frac{16}{3} \times 7}{3 \times 16 + \frac{4}{5} \times 12 + \frac{16}{3} \times 3}$$

$$\frac{9 + 4 + \frac{112}{3}}{48 + 8 + 16} = \frac{9 + 4 + \frac{112}{3}}{72}$$

$$\frac{9 \times 3 + 4 \times 3 + 112}{72 \times 3} = \frac{27 + 12 + 112}{216} = \frac{151}{216}$$

$$\frac{15}{16} = \frac{15 \times 3}{16 \times 3} = \frac{45}{48}$$

مثال 10

اختصر

$$(أ) \frac{4}{10} - \frac{9}{10}$$

$$(ب) \frac{3}{16} - \frac{5}{12}$$

$$(ج) \frac{1}{3} - \frac{2}{5}$$

$$(د) \frac{1}{10} - \frac{5}{12} - \frac{13}{15}$$

الحل

$$(أ) \frac{4}{10} - \frac{9}{10} = \frac{4}{10} - \frac{9}{10}$$

$$\frac{4}{10} - \frac{9}{10} = \frac{4 - 9}{10} = \frac{-5}{10} = -\frac{1}{2}$$

ملحوظة

الكسوران لهما نفس المقام

المضاعف المشترك الأدنى

لـ 5، 6 هو

$$30 = 6 \times 5 =$$

$$\begin{array}{r} 5 \mid 5 \quad 10 \\ \hline 1 \quad 2 \end{array}$$

المضاعف المشترك الأدنى

لـ 5، 10 هو

$$10 = 2 \times 5 =$$

$$\begin{array}{r} 3 \quad 5 \quad 12 \quad 16 \\ 4 \quad 1 \quad 4 \quad 16 \\ \hline 1 \quad 1 \quad 4 \end{array}$$

المضاعف المشترك

لـ 3، 12، 16

$$48 = 4 \times 4 \times 3 =$$

ملحوظة

الكسوران لهما نفس المقام

ملحوظة

المضاعف المشترك الأدنى

لـ 3, 5 هو

$$3 \times 5 =$$

$$15 =$$

$$\begin{array}{r|rr} 4 & 12 & 16 \\ \hline & 3 & 4 \end{array}$$

المضاعف المشترك الأدنى

لـ 16, 12 هو

$$48 = 4 \times 3 \times 4 =$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 2 & 10 & 12 & 15 \\ \hline 3 & 5 & 6 & 15 \\ 5 & 5 & 2 & 5 \\ \hline 1 & 2 & 1 & \end{array}$$

المضاعف المشترك الأدنى

لـ 15, 12, 10 هو

$$60 = 2 \times 5 \times 3 \times 2 =$$

$$\frac{5 \times \text{ب}}{5 \times 3} - \frac{3 \times \text{ب} - 2}{3 \times 5} = \frac{\text{ب}}{3} - \frac{\text{ب} - 2}{5} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{\text{ب} - 5}{15} - \frac{\text{ب} - 6}{15} =$$

$$\frac{\text{ب}}{15} = \frac{\text{ب} - 5 - \text{ب} + 6}{15} =$$

$$\frac{3 \times \text{ج} - 3}{3 \times 16} - \frac{4 \times \text{ج} - 5}{4 \times 12} = \frac{\text{ج} - 3}{16} - \frac{\text{ج} - 5}{12} \quad (\text{ج})$$

$$\frac{\text{ج} - 9}{48} - \frac{\text{ج} - 20}{48} =$$

$$\frac{\text{ج} - 11}{48} = \frac{\text{ج} - 9 - \text{ج} + 20}{48} =$$

$$\frac{6 \times \text{ك}}{6 \times 10} - \frac{5 \times \text{ك} - 5}{5 \times 12} - \frac{4 \times \text{ك} - 13}{4 \times 15} = \frac{\text{ك}}{10} - \frac{\text{ك} - 5}{12} - \frac{\text{ك} - 13}{15} \quad (\text{د})$$

$$\frac{\text{ك} - 6}{60} - \frac{\text{ك} - 25}{60} - \frac{\text{ك} - 52}{60} =$$

$$\frac{\text{ك} - 6 - \text{ك} + 25 - \text{ك} + 52}{60} =$$

$$\frac{\text{ك} - 7}{20} = \frac{\text{ك} - 21}{60} =$$

تمرين 2د

1- اختصر

$$\frac{18}{15} + \frac{14}{15} \quad (\text{أ})$$

$$\frac{7}{6} + \frac{5}{6} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{8}{21} + \frac{7}{9} \quad (\text{ج})$$

2- اختصر

$$\frac{4}{9} - \frac{7}{9} \quad (\text{أ})$$

$$\frac{3}{8} - \frac{5}{12} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{11}{16} - \frac{11}{24} \quad (\text{ج})$$

$$\frac{7}{6} + \frac{4}{4} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{7}{15} + \frac{12}{9} \quad (\text{د})$$

$$\frac{4}{5} - \frac{2}{5} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{7}{16} - \frac{7}{12} \quad (\text{د})$$

$$\frac{9}{10} - \frac{4}{15} \quad (\text{و})$$

3- اختصر ما يأتي

$$\frac{15}{8} + \frac{13}{4} + \frac{1}{2} \quad (\text{أ})$$

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{5}{6} - \frac{3}{4} - \frac{1}{2} \quad (\text{ج})$$

$$\frac{4}{5} + \frac{2}{3} + \text{ب} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{7}{10} - \frac{7}{12} - \frac{14}{15} \quad (\text{د})$$

مثال 11:

اختصر:

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \quad (\text{أ})$$

$$\frac{7}{4} - \frac{1}{3} + \frac{7}{3} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{2 - \text{ب}}{5} + \frac{4 + \text{ب}}{3} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{3 + \text{ك}}{9} - \frac{5 + \text{ك} - 2}{3} \quad (\text{د})$$

الحل

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2} + \frac{2 + 1}{3} \quad (\text{أ})$$

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{3} =$$

$$\frac{1}{2} + 1 =$$

$$\frac{1 + 2}{2} =$$

ملحوظة

المضاعف المشترك الأدنى لـ

2, 3 هو 6. كل بسط

(أ + 2) يجب ضربه في 2.

$$\frac{(2-b)3}{15} = \frac{(4+b)5}{15} = \frac{2-b}{5} + \frac{4+b}{3} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{(2-b)3 + (4+b)5}{15} =$$

$$\frac{6-b3+20+b5}{15} =$$

$$\frac{(4+7)2}{15} = \frac{(8+14)}{15} =$$

$$\frac{3a}{12} - \frac{(1+a)4}{12} = \frac{a}{4} - \frac{1+a}{3} \quad (\text{ج})$$

$$\frac{3a - (1+a)4}{12} =$$

$$\frac{3a - 4 + a4}{12} =$$

$$\frac{4+a}{12} =$$

$$\frac{(3+k)3}{9} - \frac{(5+k)2}{9} = \frac{3+k}{3} - \frac{5+k2}{3} \quad (\text{د})$$

$$\frac{(3+k)3 - (5+k)2}{9} =$$

$$\frac{3-k-15+k6}{9} =$$

$$\frac{12+k5}{9} =$$

ملاحظة

البيسط كاملاً (ك + 3)

يجب أن يكون في

أقواس.

تمرين 2 هـ

4- اختصر

$$\frac{3}{5} - \frac{2b-5}{2} \quad (\text{ب}) \quad \frac{a}{7} - \frac{5+a}{3} \quad (\text{د})$$

$$\frac{z-3}{4} - \frac{z+4}{3} \quad (\text{ج}) \quad \frac{2-ط}{6} - \frac{4ط}{7} \quad (\text{هـ})$$

$$\frac{z-3}{3} - \frac{3-z}{2} \quad (\text{و})$$

5- اختصر

$$\frac{3+a}{10} - \frac{1+4a}{5} \quad (\text{ب}) \quad \frac{2+y}{8} - \frac{3+y}{4} \quad (\text{د})$$

$$\frac{5+h}{10} - \frac{3-2h}{15} \quad (\text{ج}) \quad \frac{2+س}{12} - \frac{5-س}{3} \quad (\text{هـ})$$

$$\frac{3-2}{8} - \frac{2+2}{6} \quad (\text{و}) \quad \frac{3-ك}{12} - \frac{7+ك2}{8} \quad (\text{ز})$$

$$\frac{7+6}{16} - \frac{5-4}{12} \quad (\text{ح})$$

1- اختصر ما يلي:

$$\frac{b}{5} + \frac{8+b}{3} \quad (\text{ب}) \quad \frac{1}{4} + \frac{2+1}{3} \quad (\text{د})$$

$$\frac{z}{5} + \frac{4-z}{4} \quad (\text{ج}) \quad \frac{z}{8} + \frac{1-z}{3} \quad (\text{هـ})$$

$$\frac{1}{2} + \frac{4}{5} \quad (\text{و}) \quad \frac{1-ع}{4} + \frac{ع}{3} \quad (\text{ز})$$

2- اختصر ما يلي:

$$\frac{2-ك}{5} + \frac{4+ك}{3} \quad (\text{ب}) \quad \frac{2+ه}{3} - \frac{1+ه}{2} \quad (\text{د})$$

$$\frac{1-ب2}{3} + \frac{3-ب}{5} \quad (\text{ج}) \quad \frac{3-2}{4} + \frac{1+2}{3} \quad (\text{هـ})$$

$$\frac{1-ز}{5} + \frac{2-ز}{10} \quad (\text{و}) \quad \frac{2-ز}{3} + \frac{3-ز}{9} \quad (\text{ز})$$

$$\frac{2-ع}{12} + \frac{ع-2}{8} \quad (\text{ح}) \quad \frac{2-س}{10} + \frac{س-2}{6} \quad (\text{ز})$$

3- اختصر:

$$\frac{b}{7} - \frac{5+b}{7} \quad (\text{ب}) \quad \frac{1}{3} - \frac{3+1}{3} \quad (\text{د})$$

$$\frac{3+ع}{7} - \frac{ع}{7} \quad (\text{ج}) \quad \frac{z}{8} - \frac{3-z}{8} \quad (\text{هـ})$$

$$\frac{2-1}{9} - \frac{7}{9} \quad (\text{و}) \quad \frac{5-ف}{10} - \frac{ف}{10} \quad (\text{ز})$$

$$\frac{5-ه}{3} + \frac{ه}{3} \quad (\text{ح})$$

6-2

جمع وطرح الكسور الجبرية ذات المقامات الجبرية

Addition and Subtraction of Algebraic Fractions with Algebraic Denominators

الكسور المنصصة في الجمع والطرح في التدرسين الأخيرين لها مقامات عددية مثل 4 في $\frac{1}{4}$ أو 3 في $\frac{2}{3}$. نفس القاعدة يتم تطبيقها عند جمع وطرح الكسور ذات المقامات الجبرية مثل 4 في $\frac{4}{x}$ أو $2 + 1$ في الكسر $\frac{2}{2+1}$.

يجب أن يكون للكسور الجبرية نفس المقام قبل جمعها أو طرحها.

$$\frac{3+4}{1} = \frac{3}{1} + \frac{4}{1}$$

$$\frac{7}{1} =$$

طريقة إيجاد المضاعف المشترك الأدنى في المقامات الجبرية هي نفس الطريقة كما في حالة المقامات العددية.

$$\frac{3 \times 2}{3 \times 5} + \frac{5 \times 1}{5 \times 3} = \frac{2}{5} + \frac{1}{3}$$

$$\frac{6}{15} + \frac{5}{15} =$$

$$\frac{6+5}{15} =$$

$$\frac{11}{15} =$$

مثال 12:

بسط واختصر كل ما يلي إلى كسر وحيد:

$$\frac{3}{x^2} + \frac{5}{x} \quad (\text{ب}) \quad \frac{2}{1} - \frac{7}{1} \quad (\text{أ})$$

$$\frac{3}{2} - \frac{3}{x} \quad (\text{د}) \quad \frac{8}{x} + \frac{8}{x} \quad (\text{ج})$$

الحل

$$\frac{3}{x^2} + \frac{2 \times 5}{2 \times x} = \frac{3}{x^2} + \frac{5}{x} \quad (\text{ب}) \quad \frac{2-7}{1} = \frac{2}{1} - \frac{7}{1} \quad (\text{أ})$$

$$\frac{3}{x^2} + \frac{10}{x^2} =$$

$$\frac{13}{x^2} =$$

$$\frac{5}{1} =$$

$$\frac{8}{x} + \frac{8}{x} = \frac{8}{x} + \frac{8}{x} \quad (\text{ج})$$

$$\frac{8}{x} + \frac{8}{x} =$$

$$\frac{8}{x} + \frac{8}{x} =$$

$$\frac{8+8}{x} =$$

$$\frac{3}{2} - \frac{3}{x} = \frac{2 \times 3}{2 \times x} - \frac{3}{x} \quad (\text{د})$$

$$\frac{3}{2} - \frac{6}{2x} =$$

$$\frac{3}{2} - \frac{6}{2x} =$$

ملحوظة

$$\begin{array}{r} 15 \div 3 \\ 5 \end{array}$$

المضاعف المشترك
الأدنى لـ 3 و 5
هو 15
 $5 \times 3 = 15$

ملحوظة

$$\begin{array}{r} 2 \times 2 \\ 4 \end{array}$$

المضاعف المشترك الأدنى
لـ 2 و 2
هو 2
 $2 \times 1 = 2$

المضاعف المشترك الأدنى
لـ 1 و 1
هو 1

المضاعف المشترك الأدنى
لـ 2 و 2
هو 2
 $2 \times 1 = 2$

مثال 13:

عبر عن كل ما يلي ككسر وحيد في أبسط صورة:

$$\begin{aligned} \text{(أ)} \quad \frac{1}{2x} + \frac{2}{x^2} & \quad \text{(ب)} \quad \frac{3}{4x} - \frac{1}{2x} \\ \text{(ج)} \quad \frac{3}{2y} - \frac{4}{y^2} & \quad \text{(د)} \quad \frac{5}{y} + \frac{5}{y^2} \end{aligned}$$

الحل

$$\begin{aligned} \text{(أ)} \quad \frac{1}{2x} + \frac{2}{x^2} &= \frac{1 \times x}{2x \times x} + \frac{2 \times 2}{x^2 \times 2} = \frac{1}{2x^2} + \frac{2}{x^2} \\ &= \frac{1}{2x^2} + \frac{4}{2x^2} = \frac{1+4}{2x^2} = \frac{5}{2x^2} \\ \text{(ب)} \quad \frac{3}{4x} - \frac{1}{2x} &= \frac{3 \times 1}{4x \times 1} - \frac{1 \times 2}{2x \times 2} = \frac{3}{4x} - \frac{2}{4x} \\ &= \frac{3-2}{4x} = \frac{1}{4x} \\ \text{(ج)} \quad \frac{3}{2y} - \frac{4}{y^2} &= \frac{3 \times y}{2y \times y} - \frac{4 \times 2}{y^2 \times 2} = \frac{3y}{2y^2} - \frac{8}{2y^2} \\ &= \frac{3y-8}{2y^2} \\ \text{(د)} \quad \frac{5}{y} + \frac{5}{y^2} &= \frac{5 \times y}{y \times y} + \frac{5 \times 1}{y^2 \times 1} = \frac{5y}{y^2} + \frac{5}{y^2} \\ &= \frac{5y+5}{y^2} \end{aligned}$$

مثال 14:

عبر عن كل ما يلي ككسر وحيد في أبسط صورة:

$$\begin{aligned} \text{(أ)} \quad \frac{2}{(2+x)(1+x)} + \frac{3}{2+x} & \quad \text{(ب)} \quad \frac{1}{2+x} - \frac{1}{1-x} \end{aligned}$$

الحل

$$\begin{aligned} \text{(أ)} \quad \frac{2}{(2+x)(1+x)} + \frac{3}{2+x} &= \frac{2}{(2+x)(1+x)} + \frac{3(1+x)}{(2+x)(1+x)} \\ &= \frac{2 + 3(1+x)}{(2+x)(1+x)} = \frac{2 + 3 + 3x}{(2+x)(1+x)} = \frac{5+3x}{(2+x)(1+x)} \\ \text{(ب)} \quad \frac{1}{2+x} - \frac{1}{1-x} &= \frac{1 \times (1-x)}{(2+x)(1-x)} - \frac{1 \times (2+x)}{(1-x)(2+x)} \\ &= \frac{1-x}{(2+x)(1-x)} - \frac{2+x}{(2+x)(1-x)} = \frac{1-x-2-x}{(2+x)(1-x)} \\ &= \frac{-1-2x}{(2+x)(1-x)} = \frac{-(1+2x)}{(2+x)(1-x)} \end{aligned}$$

ملحوظة

$$\begin{aligned} \text{(أ)} \quad \frac{1}{2x} + \frac{2}{x^2} &= \frac{1 \times x}{2x \times x} + \frac{2 \times 2}{x^2 \times 2} \\ &= \frac{1}{2x^2} + \frac{4}{2x^2} = \frac{5}{2x^2} \end{aligned}$$

ملحوظة

$$\begin{aligned} \text{(ب)} \quad \frac{3}{4x} - \frac{1}{2x} &= \frac{3 \times 1}{4x \times 1} - \frac{1 \times 2}{2x \times 2} = \frac{3}{4x} - \frac{2}{4x} \\ &= \frac{3-2}{4x} = \frac{1}{4x} \\ \text{(ج)} \quad \frac{3}{2y} - \frac{4}{y^2} &= \frac{3 \times y}{2y \times y} - \frac{4 \times 2}{y^2 \times 2} = \frac{3y}{2y^2} - \frac{8}{2y^2} \\ &= \frac{3y-8}{2y^2} \\ \text{(د)} \quad \frac{5}{y} + \frac{5}{y^2} &= \frac{5 \times y}{y \times y} + \frac{5 \times 1}{y^2 \times 1} = \frac{5y}{y^2} + \frac{5}{y^2} \\ &= \frac{5y+5}{y^2} \end{aligned}$$

ملحوظة

$$\begin{aligned} \text{المضاعف المشترك الأدنى} \\ \text{لكل من (أ)، (ب)، (ج)، (د)} \\ = (2+x)(1-x) \end{aligned}$$

ملحوظة

$$\begin{aligned} \text{المضاعف المشترك الأدنى} \\ \text{لكل من (أ)، (ب)، (ج)، (د)} \\ = (2+x)(1+x) \end{aligned}$$

مثال 15:

عبر عن كلٍّ مما يأتي ككسر وحيد في أبسط صورة:

$$(أ) \frac{4}{3+3} - \frac{5}{2+2} \quad (ب) \frac{1}{3+3} + \frac{4}{3+3}$$

الحل

$$(أ) \frac{1}{3+3} + \frac{4}{3+3} = \frac{1}{3+3} + \frac{4}{3+3} = \frac{1+4}{3+3} = \frac{5}{6}$$

$$(ب) \frac{4}{3+3} - \frac{5}{2+2} = \frac{4}{3+3} - \frac{5}{2+2} = \frac{4}{6} - \frac{5}{4} = \frac{2 \times 4}{2 \times 6} - \frac{3 \times 5}{3 \times 4} = \frac{8}{12} - \frac{15}{12} = \frac{8-15}{12} = \frac{-7}{12} = -\frac{7}{12}$$

ملحوظة

$$\frac{3+3}{3+3} = 1$$

$$\frac{3+3}{3+3} = 1 \times \frac{3+3}{3+3} = \frac{3+3}{3+3} = 1$$

حل المسائل

$$\frac{3}{2} + \frac{2}{3} = \frac{3 \times 3 + 2 \times 2}{2 \times 3} = \frac{9+4}{6} = \frac{13}{6}$$

$$\frac{3}{2} + \frac{2}{3} = \frac{3 \times 3 + 2 \times 2}{2 \times 3} = \frac{9+4}{6} = \frac{13}{6}$$

تمرين 2 و

1- اختصر كلًّا مما يأتي ككسر وحيد في أبسط صورة:

$$(أ) \frac{8}{15} + \frac{4}{15} \quad (ب) \frac{2}{9} - \frac{3}{9}$$

$$(ج) \frac{3}{4} - \frac{2}{4} \quad (د) \frac{3}{4} + \frac{3}{4}$$

$$(هـ) \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \quad (و) \frac{3}{4} - \frac{2}{4}$$

$$(ز) \frac{1}{2} - \frac{4}{3} \quad (ح) \frac{1}{4} - \frac{1}{4}$$

2- عبر عن كلٍّ مما يأتي ككسر وحيد في أبسط صورة:

$$(أ) \frac{2}{2+3} + \frac{1}{1+1}$$

$$(ب) \frac{2}{3+3} + \frac{3}{2+2}$$

$$(ج) \frac{1}{4+3} - \frac{4}{3+3}$$

$$(د) \frac{1}{5+3} - \frac{2}{4+3}$$

$$(هـ) \frac{1}{6+3} - \frac{3}{5+3}$$

$$(و) \frac{1}{7+3} - \frac{4}{6+3}$$

$$(ز) \frac{4}{(5+3)(4+3)} - \frac{2}{4+3}$$

$$(ح) \frac{2}{12+3} + \frac{3}{14+3}$$

3- اختصر في أبسط صورة:

$$(أ) \frac{1}{2+3} + \frac{3}{2+3}$$

$$(ب) \frac{1}{3+3} - \frac{3}{3+3}$$

$$(ج) \frac{3}{4+3} - \frac{4}{3+3}$$

$$(د) \frac{2}{9+3} + \frac{5}{6+3}$$

المعادلات التي تتضمن كسوراً جبرية Equations Involving Algebraic Fractions

نأخذ المعادلة $\frac{1+s}{3} = \frac{s}{2}$ والتي تتضمن الكسور الجبرية. حل هذه المعادلة يجب إيجاد قيمة s والتي خلف المعادلة.

ملحوظة

اضرب كلا الطرفين $\times 3$
للتخلص من المقام 3
اضرب كلا الطرفين $\times 2$
للتخلص من المقام 2
احذف الأقواس.

$$\left. \begin{aligned} \frac{s}{2} &= \frac{1+s}{3} \quad \text{لدينا} \\ 3 \times \frac{s}{2} &= 3 \times \frac{1+s}{3} \\ \frac{3s}{2} &= 1+s \\ \frac{3s}{2} \times 2 &= (1+s)2 \\ 3s &= (1+s)2 \\ 3s &= 2+s \\ 3s-2 &= 2+s-2 \\ 3s &= 2 \\ s &= \frac{2}{3} \end{aligned} \right\} (*)$$

الخطوات المشار إليها بالعلامة * يمكن أن نحل محلها الخطوة التالية الأقصر حسابياً والتي تسمى الضرب التبادلي كما يلي:

$$\left. \begin{aligned} \frac{s}{2} &= \frac{1+s}{3} \\ 3s &= (1+s)2 \\ 3s &= 2+s \\ 3s-2 &= 2+s-2 \\ 3s &= 2 \end{aligned} \right\} (**)$$

الأسهم $\times$ هي إرشادات فقط. بعد إجراء بعض التمارين سوف تستطيع تجاهل هذه الأسهم.

مثال 16

حل المعادلات الآتية:

$$(أ) \quad \frac{3}{4} = \frac{s}{2}$$

$$(ب) \quad \frac{2}{3-s} = \frac{5}{s}$$

$$(ج) \quad \frac{1}{3-s} = \frac{2}{4+s}$$

الحل

الطريقة الأولى

$$(أ) \quad \frac{3}{4} = \frac{s}{2}$$

$$3 \times 2 = s \times 4$$

$$6 = 4s$$

$$\frac{6}{4} = \frac{4s}{4} \Rightarrow s = \frac{6}{4}$$

$$s = \frac{3}{2}$$

(ب)

$$\frac{2}{3-s} = \frac{5}{s}$$

$$5(3-s) = 2s$$

$$15-5s = 2s$$

$$15 = 7s$$

$$s = \frac{15}{7}$$

الطريقة الثانية

$$\frac{3}{4} = \frac{s}{2}$$

$$2 \times \frac{3}{4} = \frac{s}{2} \times 2$$

$$\frac{3}{2} = s$$

$$s = \frac{3}{2}$$

(ج)

$$\frac{1}{3-s} = \frac{2}{4+s}$$

$$(4+s)1 = (3-s)2$$

$$4+s = 6-2s$$

$$6-4 = 3s$$

$$2 = 3s$$

استخدم الضرب التبادلي لحل المعادلات من (أ) إلى (ج).

لاحظ أن استخدام الضرب التبادلي ليس دائماً أقصر الطرق أو أبسطها كما هو موضح في المثال (16).

ملحوظة

(ب) خذ الطرف الأيمن

$$1 = \frac{5}{s} = \frac{5}{s} \times \frac{s}{s}$$

الطرف الأيسر

$$\frac{2}{3-s} = \frac{2}{3-s} \times \frac{s}{s}$$

$$1 = \frac{2s}{3-s}$$

$\therefore$ الطرف الأيمن = الطرف الأيسر.

مثال 17:

$$\text{حل المعادلة } 1 = \frac{3-t}{4} - \frac{2-t}{3}$$

الحل

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{3-t}{4} - \frac{2-t}{3} \\ 1 &= \frac{(3-t)3}{12} - \frac{(2-t)4}{12} \\ 12 &= 9 + 3t - 8 - 4t \\ 12 &= 1 + t \\ 11 &= 1 - 12 = t \end{aligned}$$

مثال 18:

$$\text{حل المعادلة } 4 = 3 + \frac{1-s}{2}$$

الحل

$$\begin{aligned} 4 &= 3 + \frac{1-s}{2} \\ 4 &= \frac{6+1-s}{2} \\ 4 &= \frac{7-s}{2} \\ 8 &= 7-s \\ 8 &= 5 \\ 7 &= 5 \\ \frac{5}{7} &= s \end{aligned}$$

أو

$$\begin{aligned} 4 &= 3 + \frac{1-s}{2} \\ 8 &= 6 + 1 - s \\ 8 &= 7 - s \\ 7 &= 5 \\ \frac{5}{7} &= s \end{aligned}$$

مثال 19:

استغرقت سيارة ساعتين لتقطع مسافة س كم، استغرقت سيارة نقل 3 ساعات في قطع نفس المسافة. فإذا كانت سرعة السيارة 10 كم/ ساعة أكثر من سرعة السيارة النقل، احسب قيمة س.

الحل

$$\begin{aligned} \text{سرعة السيارة} &= \frac{10}{2} \text{ كم/ ساعة} \\ \text{سرعة السيارة النقل} &= \frac{10}{3} \text{ كم/ ساعة} \\ 10 &= \frac{10}{2} - \frac{10}{3} \\ 10 &= \frac{30-20}{6} \\ 10 &= \frac{10}{6} \\ \therefore 60 &= 10 \times 6 \end{aligned}$$

ملحوظة

المضاعف المشترك الأدنى لكل من 3، 4 هو 12. اضرب تبادلياً.

ملحوظة

اضرب في 2 على الحوالم.

ملحوظة

السرعة = $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$

مثال 20:

إذا خفض البسيط بمقدار عدد وزيد المقام بمقدار نفس العدد في الكسر $\frac{13}{17}$ ، أصبح الناتج $\frac{1}{2}$ أوجد هذا العدد.

الحل

نفرض العدد المطلوب هو س

$$\begin{array}{l} \text{الكسر الجديد يصبح} \\ \frac{13}{17} \text{ س} \rightarrow \text{البسيط خفض بمقدار س} \\ \frac{1}{2} \text{ س} \rightarrow \text{المقام زيد بمقدار س} \end{array}$$

$$\frac{13}{17} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{13}{17} = \frac{1}{2}$$

$$26 - 17 = 2 - 1 \Rightarrow 9 = 17 - 2$$

$$9 = 17 - 2$$

$$9 = 17 - 2$$

∴ العدد المطلوب هو 3

ملحوظة

اضرب بطريقة تبديلية.

تمرين 2 ز

1- حل المعادلات الآتية:

$$(أ) \frac{4}{5} = \frac{1}{3}$$

$$(ب) \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$$

$$(ج) 2 = 3 - \frac{3}{x}$$

$$(د) 4 = \frac{1}{3} - \frac{1}{2}$$

$$(هـ) 1 \frac{1}{2} = \frac{1}{3} + \frac{4}{3}$$

$$(و) 1 = \frac{2}{3} + \frac{4}{3}$$

2- حل المعادلات الآتية:

$$(أ) \frac{2}{3} = \frac{1}{5} + \frac{2}{5}$$

$$(ب) \frac{4}{3} = \frac{3}{4} + \frac{3}{4}$$

$$(ج) \frac{5}{2} = \frac{7}{2} - \frac{1}{2}$$

$$(د) 5 = 4 + \frac{2}{3}$$

$$(هـ) \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 4 + \frac{1}{3}$$

$$(و) 2 = 1 - \frac{1}{3}$$

$$(ز) \frac{2}{3} + \frac{13}{3} = 8 - \frac{1}{3}$$

3- حل المعادلات الآتية:

$$(أ) \frac{1}{2} = \frac{4}{5} - \frac{3}{4}$$

$$(ب) 1 = \frac{4}{8} - \frac{3}{6} + \frac{3}{6}$$

$$(ج) 1 \frac{1}{2} = \frac{5}{8} - \frac{3}{8} = \frac{1}{2}$$

$$(د) 5 = \frac{3}{4} - \frac{3}{2}$$

$$(هـ) 4 = \frac{1}{4} + \frac{3}{8}$$

$$(و) 7 = \frac{3}{7} - \frac{2}{3}$$

4- تسافر سيارة بسرعة س كم/ ساعة لمسافة 10 كم فإذا زادت من سرعتها بمقدار 2 كم/ ساعة، نستطيع أن نكمل 15 كم في نفس الزمن المستغرق احسب قيمة س.

5- قطعت سيارة مسافة س كم بسرعة 80 كم/ ساعة وقطعت حافلة نفس المسافة س كم بسرعة 60 كم/ ساعة، فإذا كان الفرق في الزمن المستغرق ساعتين، احسب قيمة س.

6- إذا زيد بسط الكسر $\frac{5}{19}$ بمقدار س وخفض مقامه بمقدار س على التوالي كان الناتج $\frac{3}{5}$ ،
(أ) عبر عن الكسر الجديد بدلالة س.
(ب) أوجد قيمة س.

7- إذا طرح عدد س من كل من بسط ومقام الكسر $\frac{13}{23}$ كان الناتج يساوي $\frac{1}{3}$ احسب قيمة س.

8- إذا كان مقام الكسر يزيد بمقدار 6 عن بسطه، فإذا كان البسط س.

(أ) عبر عن الكسر بدلالة س.

(ب) إذا زيد كل من البسط والمقام بمقدار 4 فإن الكسر الناتج يصبح $\frac{5}{7}$ ، أوجد قيمة س.

Manipulation with Formulae

المعالجة بالصيغ الرياضية

8-2

المعادلة $\pi 2 = \text{ح}$ تعطي القاعدة العامة لإيجاد المحيط ح للدائرة التي طول نصف قطرها π .

المعادلة التي تعطي قاعدة عامة لنوع معين من المشكلات تسمى صيغة رياضية.

عادة ما يكون من المناسب تحويل الصيغ بالتعبير عنها بمتغيرات مختلفة.

نأمل المعادلة $\pi 2 = \text{ح}$ ، المتغير التابع هو ح ، ولكن إذا قسمنا الطرفين على $\pi 2$

$$\frac{\pi 2}{\pi 2} = \frac{\text{ح}}{\pi 2}$$

$$\therefore \frac{\text{ح}}{\pi 2} = 1$$

(الآن أصبح π هو المتغير التابع، أو الهدف، أو موضوع الصيغة الرياضية).

وبالنسبة لقمةنا بنحويل الصيغة الرياضية بجعل π المتغير التابع ولنحويل الصيغ الرياضية استخدم نفس القواعد التي تعلمتها في الفصل الثالث والخاصة بحل المعادلات الجبرية.

وسوف نستخدم المعادلات الآتية لتلخيص تلك القواعد:

- (1) $7 - \text{س} = 3 - \text{ز}$
 (2) $8 + \text{ص} = 6 + \text{ز}$
 (3) $5 + \text{ر} = \frac{\text{س}}{2}$
 (4) $9 - \text{ص} = 3\text{ز}$

في المعادلة 1

$$3 + 7 - \text{س} = 3 + 3 - \text{ز}$$

$$4 - \text{س} = \text{ز}$$

في المعادلة 2

$$6 - 8 + \text{ص} = 6 - 6 + \text{ز}$$

$$2 + \text{ص} = \text{ز}$$

في المعادلة 3

$$2 \times (5 + \text{ر}) = 2 \times \frac{\text{س}}{2}$$

$$\text{س} = 2(5 + \text{ر})$$

في المعادلة 4

$$\frac{9 - \text{ص}}{3} = \frac{3\text{ز}}{3}$$

$$\frac{9 - \text{ص}}{3} = \text{ز}$$

ملاحظة

1- حذف حد سالب من طرف، اجمع
 نظيره الموجب إلى الطرفين.

2- حذف حد موجب من طرف، اجمع
 نظيره السالب إلى الطرفين.

3- حذف مقام من طرف، اضرب
 الطرفين بالمقام.

4- حذف معامل من طرف، اقسم
 الطرفين بالمعامل.

مثال 21:

بإدخال ترتيب الصيغ التالية إلى المتغير المحدد:

اجعل $م$ المتغير التابع

$$(i) م - ي = ا ب$$

اجعل $ل$ المتغير التابع

$$(ب) ت = د + ل$$

اجعل $أ$ المتغير التابع

$$(ج) ف = أ م$$

اجعل $ك$ المتغير التابع

$$(د) د = \frac{ك}{م}$$

اجعل $ت$ المتغير التابع

$$(هـ) ز = \frac{ف}{ت}$$

اجعل $أ$ المتغير التابع

$$(و) ح = \frac{1}{2} (أ + ب) هـ$$

الحل

(i) اجمع $ي$ إلى الطرفين.

(ب) اطرح $د$ من الطرفين.

(ج) اقسم الطرفين على $م$.

(د) اضرب الطرفين في $م$.

(هـ) اضرب الطرفين في $ت$.
ثم قسم على $ف$.

(و) اضرب الطرفين في 2. اقسم
الطرفين على $هـ$. اطرح $ب$ من
الطرفين.

(ب)

$$ت = د + ل$$

$$ت - د = د + ل - د$$

$$ت - د = ل$$

$$\therefore ل = ت - د$$

(د)

$$د = \frac{ك}{م}$$

$$د \times م = \frac{ك}{م} \times م$$

$$د م = ك$$

$$\therefore ك = د م$$

(و)

$$ح = \frac{1}{2} (أ + ب) هـ$$

$$ح \times 2 = \frac{1}{2} (أ + ب) هـ \times 2$$

$$2 ح = (أ + ب) هـ$$

$$\frac{2 ح}{هـ} = \frac{(أ + ب) هـ}{هـ}$$

$$2 ح = أ + ب$$

$$2 ح - أ = أ + ب - أ$$

$$2 ح - أ = ب$$

$$\therefore أ = 2 ح - ب$$

(i)

$$م - ي = ا ب$$

$$م - ي + ي = ا ب + ي$$

$$م = ا ب + ي$$

$$(ج) ف = أ م$$

$$\frac{ف}{م} = \frac{أ م}{م}$$

$$\frac{ف}{م} = أ$$

$$\therefore أ = \frac{ف}{م}$$

(هـ)

$$ز = \frac{ف}{ت}$$

$$ز \times ت = \frac{ف}{ت} \times ت$$

$$ز ت = ف$$

$$\frac{ز}{ز} = \frac{ز ت}{ز}$$

$$1 = ت$$

مثال 22:

- إذا فرضنا أن الصيغة $ز = ي + ا$ ت
(أ) اجعل $ا$ المتغير التابع للصيغة.
(ب) أوجد قيمة $ا$ عندما $ز = 50$, $ي = 20$, $ت = 2$

الحل

- (ب) عندما يكون $ز = 50$, $ي = 20$, $ت = 2$
$$\frac{20 - 50}{2} = ا$$
$$\frac{30}{2} = ا$$
$$15 = ا$$
- (أ) $ز = ي + ا$
 $ز - ي = ا$
 $ا = \frac{ز - ي}{ت}$
 $ا = \frac{ز - ي}{ت}$

تمرين 2 ح

- 1- بادل ترتيب كل من المعادلات التالية كما هو محدد:
- (أ) $س = ز + ح$, $ح = ؟$
(ب) $د = ق - ح$, $ح = ؟$
(ج) $ل = \frac{ك}{2}$, $ك = ؟$
(د) $ا = ل ب$, $ب = ؟$
(هـ) $ز = \pi = ي^2 هـ$, $هـ = ؟$
(و) $ز = \frac{ح ت}{2}$, $ت = ؟$
(ز) $ز = ي + ا$, $ا = ؟$
(ح) $ز^2 = ي^2 + 2$, $ا = ؟$
(ط) $ا = \frac{1}{2} (ا + ب)$, $هـ = ؟$
(ي) $\frac{1}{ز} + \frac{1}{ي} = \frac{1}{ف}$, $ف = ؟$
- 2- إذا كان $ا = س + ب = ح$,
- (أ) بادل ترتيب المعادلة بجعل $س$ المتغير التابع لها.
(ب) أوجد قيمة $س$ عندما
(i) $ا = 2$, $ب = 5$, $ح = 9$
(ii) $ا = 6$, $ب = 9$, $ح = -3$
- 3- إذا كان $ا = 5$ (س - 3) $ب = 2$
(أ) بادل ترتيب المعادلة بجعل $س$ المتغير التابع لها.
(ب) أوجد قيمة $س$ عندما
(i) $ا = 1$, $ب = 10$
(ii) $ا = 0.1$, $ب = 2$
- 4- إذا كانت $ا = \frac{1}{2} ب$, $هـ$, أوجد قيمة $الأنبي$
(أ) $ا$ عندما $ب = 6$, $هـ = 5$
(ب) $ب$ عندما $ا = 10$, $هـ = 4$
(ج) $هـ$ عندما $ا = 15$, $ب = 6$
- 5- إذا كانت $ز = \pi = ي^2 هـ$ (استخدم $\pi = \frac{22}{7}$). أوجد قيمة
(أ) $ز$ عندما $ي = 2$, $هـ = 14$
(ب) $هـ$ عندما $ز = 11$, $ي = 5$
- 6- إذا كانت $ر = (1 + \frac{س}{100})$
(أ) اجعل $س$ المتغير التابع لها.
(ب) أوجد قيمة $س$ عندما $ر = 54$, $س = 50$

ملخص

- 1- عند ضرب الكسور الجبرية.
 - (أ) احذف العامل المشترك في كلٍّ من البسط والمقام.
 - (ب) العوامل المتبقية في البسط تضرب في بعضها والعوامل المتبقية في المقام تضرب أيضًا في بعضها.
- 2- عند قسمة كسر جبري بأخر استبدل العلامة (+) إلى (-) واقلب المقسوم عليه ثم استأنف كما في الضرب.
- 3- جمع أو طرح الكسور الجبرية:
 - (أ) أوجد المضاعف المشترك الأدنى للمقامات.
 - (ب) عبر عن كل كسر جبري بمقام موحد باستخدام المضاعف المشترك الأدنى الذي أوجدته.
 - (ج) عند ذلك اجمع أو اطرح البسط كما هو مطلوب.
- 4- عند حل المعادلات التي تتضمن كسورًا جبرية:
 - (أ) عبر عن الكسور الجبرية بنفس المقام باستخدام المضاعف المشترك الأدنى.
 - (ب) أوجد مفعوك البسط والمقام.
 - (ج) أجر عملية الضرب التبادلي وحل المعادلة الناتجة.
- 5- مثال لصيغة رياضية: $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} (a + b)$ حيث a هي المتغير التابع.
- 6- قواعد حل المعادلات وتحويل الصيغة الرياضية هي كما يلي:
 - لحذف الحد السالب من أحد الطرفين. أضف المكافئ الموجب لكلا الطرفين.
 - لحذف الحد الموجب من أحد الطرفين. أضف المكافئ السالب لكلا الطرفين.
 - لحذف المقام من أحد الطرفين اضرب كلا الطرفين في المقام.
 - لحذف العامل من أحد الطرفين. قسم كلا الطرفين على العامل.

استقصاء الرياضيات

تأمل زوج الأعداد 6, 3

مجموع العددين: $9 = 6 + 3$ حاصل ضرب العددين: $18 = 6 \times 3$

(*) بالنسبة لهذا الزوج من الأعداد (6, 3) فإن حاصل ضربهما مضاعف ل مجموعهما.

أوجد زوجين آخرين من الأعداد الطبيعية تنطبق عليهما القاعدة (*).

لاشتقاق صورة عامة للعلاقة (*) دعنا نحدد زوجًا ثابتًا من الأعداد وليكن أ، ب بحيث $أ + ب = ح$ (أ + ب) حيث ح عدد مجهول من أ = (أ + ب) ح هل يمكنك إظهار أن

$$\frac{1}{ح} = \frac{1}{أ} + \frac{1}{ب}$$

نصادف أحيانًا هذه الصورة من المعادلة الجبرية في الفيزياء على سبيل المثال، في مجال الكهرباء، الصيغة $\frac{1}{ر} = \frac{1}{ر_1} + \frac{1}{ر_2}$ تستخدم لحساب المقاومة المجمعة (ن) لمقاومتين ر₁، ر₂ متصلتين في دائرة كهربائية على التوازي. ومثال آخر هو معادلة العدسة: $\frac{1}{و} = \frac{1}{ز} + \frac{1}{ف}$ حيث
و : بعد الصورة
ز : بعد الجسم
ف : البعد البؤري للعدسة.

ورقة المراجعة 2

القسم أ

1- اختصر:

$$(i) \frac{24أ}{16ب} \quad (ب) \frac{12+س}{12+س} \quad (ج) \frac{2س}{أ} + \frac{3}{ب} \quad (د) \frac{16}{7} + \frac{3}{4}$$

2- (i) إذا كانت د = س ر فأجعل س المتغير التابع.

(ب) إذا كان 3 د = $\frac{2}{س}$ فأجعل س المتغير التابع.

3- حل المعادلات الآتية:

$$(i) \frac{4}{9} = \frac{هـ}{3} \quad (ب) \frac{3}{6} = \frac{3}{2}$$

4- حل المعادلات الآتية:

$$(i) \frac{2}{2-س} = \frac{4}{س} \quad (ب) \frac{3}{8+5} = \frac{1}{2+س}$$

القسم ب

5- اختصر:

$$(i) \frac{4}{9} + \frac{2}{9} \quad (ب) \frac{5}{8} - \frac{5}{8} \quad (ج) \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$

6- إذا كانت س = $\frac{1}{3}$ هـ

(i) اجعل هـ المتغير التابع.

(ب) أوجد قيمة هـ عندما س = 264، س = 6.

(استخدم $\pi = \frac{22}{7}$)

7- إذا كان $\frac{1}{أ} + \frac{1}{ب} = \frac{1}{ح}$

(i) اجعل ح المتغير التابع.

(ب) أوجد ح عندما أ = 2، ب = 3.

8- حل المعادلات الآتية:

$$(i) \frac{3}{4} - \frac{1-س}{2} = \frac{س}{3}$$

$$(ب) \frac{س}{س+1} = \frac{2+س}{س}$$

$$(ج) \frac{س}{2} - (س - 12) = \frac{5}{2}$$

القسم ج

9- (i) عبر عن كل ما يأتي في صورة كسر وحيد في أبسط صورة.

$$(i) \frac{3}{(س+1)(س-2)} - \frac{5}{س+1}$$

$$(ii) \frac{1}{4+س} - \frac{1}{6+س}$$

(ب) عادة ما يفود محمد سيارته صباحًا بدءًا من منزله بسرعة 75 كم / ساعة لمسافة س كم ليصل إلى مكتبه في الوقت المحدد. وفي أحد الأيام المطيرة قطع مسافة س كم بسرعة قدرها 60 كم / ساعة. فإذا وصل مكتبه متأخرًا 10 دقائق احسب قيمة س.

10- (i) إذا كان س = س + ح،

(i) اجعل س المتغير التابع

(ii) أوجد قيمة س عندما س = 6، س = 2

ح = 4

(ب) إذا كان س² - س = 2 أ ب.

(i) اجعل س المتغير التابع


(ii) أوجد قيمة أ عندما س = 5، س + س = 10.

س - س = 2

هندسة الإحداثيات

Coordinate Geometry

عاش "رينيه ديكارت" عالِم رياضيات في فرنسا خلال القرن السابع عشر. بينما كان مستلقيًا على فراشه في يوم بارد، نظر إلى أعلى فرأى ذبابة تسير ببساطة على السقف كما هو موضح في الشكل (أ). وأراد تحديد طريقة ليصف مكان الذبابة.



وقرر أن أسهل طريقة تكون بتخيل السقف وكأنه مغطى بشبكة من الخطوط يبعد كل منها عن الآخر مسافة متر، عندئذ يمكنه تحديد موضع الذبابة بعدد المربعات التي تبعد عنها عن كل حائط. وعليه إذا بدأ بالركن في (ب) يمكنه القول بأن الذبابة على بعد مربع واحد أفقيًا ومربعين رأسيًا.

وبالتساوي كان يمكنه البدء من أي الأركان الثلاثة الأخرى. بالبدء من الركن الأعلى في اليسار في (ج) يمكنه القول بأن الذبابة على بعد مربع أفقيًا وأربعة مربعات لأسفل من الركن الأعلى في اليمين، كانت الذبابة على بعد 4 مربعات أفقيًا و4 مربعات لأسفل. ومن الركن الأسفل في اليمين، كانت الذبابة على بعد 4 مربعات أفقيًا ومربعين لأعلى.

ولذا كان على ديكارت إرساء قاعدته حول المكان الذي يبدأ العد منه، وقرر البدء دائماً من الركن الأسفل في اليسار كنقطة انطلاق وأن يتقدم دائماً في الاتجاه الأفقي ثم الرأسى.


- في نهاية هذا الفصل سوف تكون قادراً على:
- استخدام الزوج المرتب لكتابة الإحداثيات لنقطة معينة على المستوى الإحداثى.
- تحديد موقع النقطة بالإحداثيات المعطاة.
- تحديد ما إذا كانت نقطة معطاة تقع على الشكل البياني.
- رسم شكل بياني لمعادلة خطية.
- تمييز الخط المستقيم على الصورة $y = mx + c$ أو $x = ay + b$ حيث c ثابت.
- رسم شكل بياني لمعادلة غير خطية.
- حل الرسوم البيانية في المواقف العملية.

استخدام الأعداد الموجهة لوصف موضع نقطة على المستوى الديكارتي

1-3


Using Directed Numbers to Describe a Position on a Cartesian Plane

يحاول عالم الرياضيات دائماً التعبير عن الأشياء بأبسط الطرق. لذا عندما يصف موضع نقطة فإنه قد يستخدم نظام الأعداد الموجهة لأن العدد الموجه يدل على المسافة والاتجاه من نقطة معينة. تذكر أنه على خط الأعداد (انظر الكتاب الأول) كما هو مبين أدناه يقع العدد الموجب (+) على يمين الصفر والعدد السالب (-) على يساره.



وكما أن اليمين واليسار عكس بعضهما كذلك أعلى (↑) وأسفل (↓). ولهذا يمكننا استخدام فكرة الأعداد الموجبة والسالبة بالنسبة للأعلى والأسفل على التوالي. ومن ثم نحصل على خطى أعداد بينهما زاوية قائمة يتقاطعان عند نقطتي الأصفر أو "نقطة الأصل" كما هو موضح بالصفحة التالية.


استخدام الأعداد الموجهة لوصف موضع نقطة على المستوى الديكارتي



يمكن وصف موضع نقطة على سطح مستو بتعيين مقياسين للنقطة يتم تحديدهما من محوري الاتجاه. هذان المحوران متعامدان بصفة عامة ويتقاطعان في نقطة تسمى "نقطة الأصل" ويشار إليها بالرمز (و).


نأمل النقطة أ الموضحة في الشكل على

اليسار.



النقطة أ على بعد خطوتين ناحية اليمين (2+) وخطوة إلى أعلى (1+) من نقطة الأصل ومن ثم فإن موضع النقطة يكون (2+, 1+) موضع النقطة يُعطي كزوج مرتب من الأعداد المطردة و"مرتب" هنا يعني أن إشارات اتجاه اليمين/ اليسار تكتب دائماً أولاً ثم تكتب إشارات أعلى/أسفل ثانياً.

ولهذا، نحدد المسافة الرأسية والأفقية (1، 2، 3،) والاتجاه (+ ، -) من نقطة الأصل لتحديد موضع نقطة في مستوى الإحداثيات. بمعنى كم تبعد إلى يمين أو يسار نقطة الأصل وكم ترتفع أو تنخفض عن نقطة الأصل. هذه الطريقة لوصف وضع النقطة في مستوى الإحداثيات هي التي استخدمها "ديكارت" وعلى شرفه تم تسمية المستوى الذي يرسم عليه المحاور (أو خطوط الأعداد) باسم "المستوى الديكارتي". المحور الأفقي يسمى محور السينات بينما المحور الرأسي يسمى محور الصادات. انظر (الشكل 5-1). هذا النظام للأزواج المرتبة من الأعداد الموجهة يعتبر أبسط طريقة لتفسير موضع نقطة في المستوى.



شكل (5-1)

- ولتلخيص ما سبق (أرجع إلى المستوى الديكارتي المعطى في شكل 5-1).
- 1- محور السينات هو خط أعداد أفقي ومحور الصادات هو خط أعداد رأسي.
 - 2- يتقاطع محورا الإحداثيات السيني والصادي في نقطة تسمى نقطة الأصل (يشار إليها بالرمز "و" وتتطابق مع العدد صفر على خطي الأعداد الأفقي والرأسي) ونقطة الأصل هي النقطة المرجعية لوصف موضع أي نقطة في المستوى.
 - 3- على محور السينات، أي نقطة تكون على يمين نقطة الأصل تعتبر موجبة (+) الاتجاه بينما أي نقطة على يسار نقطة الأصل تكون سالبة الاتجاه (-).
 - 4- بالنسبة لمحور الصادات، أي نقطة تقع فوق نقطة الأصل يكون اتجاهها موجباً وتأخذ العلامة (+) وأي نقطة تقع أسفل نقطة الأصل يكون اتجاهها سالباً وتأخذ العلامة (-).
 - 5- يمتد كلا المحورين السيني والصادي إلى ما لا نهاية على كل من جانبي نقطة الأصل. وعادة ما نضع علامات الأسهم فقط على الأطراف الموجب، بمعنى "الأيمن" و "الأعلى".


6- موضع نقطة في مستوى الإحداثيات يُعطى بدلالة المسافات الأفقية والرأسية وإجاءتها من نقطة الأصل. ويمكن وصفها عن طريق مقياسين متطريدين يُعطيان في صورة زوج مرتب. كما هو موضح بالنقطة (د) في الشكل (5-1).

- ارجع إلى الزوج المرتب $(2+, 3+)$ الذي يمثل موضع النقطة (د) في الشكل (5-1).
 - العدد الأول من الزوج المرتب $2+$ يسمى الإحداثي السيني ويعطي قياساً للمسافة الأفقية وإجاء النقطة من نقطة الأصل.
 - العدد الثاني من الزوج المرتب $3+$ يسمى الإحداثي الصادي ويعطي قياساً للمسافة الرأسية وإجاء النقطة بالنسبة لنقطة الأصل.
- يوضح الشكلان (5-2) (أ) ، (ب) الخطوات المطلوبة للوصول إلى النقطة د $(2+, 3+)$.

أولاً حرك وحدتين ناحية اليمين من نقطة الأصل حتى تصل إلى النقطة ط

الإحداثي السيني يكون $2+$.


شكل (5-2-أ)



بعد ذلك من النقطة ط حرك 3 وحدات لأعلى. فيكون الموضع النهائي للنقطة د هو المحد بالزوج المرتب $(2+, 3+)$.

الإحداثي الصادي يكون $3+$.

شكل (5-2-ب)




تري من الشكل (5-2-ب) أن النقطة د هي وحدتين يمين نقطة الأصل، 3 وحدات أعلى نقطة الأصل. وبدلاً من قول أن النقطة (د) موضعها $(2+, 3+)$. يمكن ببساطة القول إن إحداثيي النقطة د هما $(2, 3)$.

يمكن التعبير عن إحداثي أي نقطة في المستوى الديكارتي كزوج مرتب من الأعداد الموجبة التي تحدد موضع النقطة في المستوى. إحداثيا نقطة الأصل هما $(0, 0)$.

مثال 1:

أعط إحداثيات النقط المشار إليها في المستوى الديكارتي أدناه.



الحل

بالنسبة للنقطة أ :

الإحداثي السيني 1 بمعنى وحدة واحدة على يمين نقطة الأصل.

الإحداثي الصادي 2 بمعنى وحدتين أعلى نقطة الأصل.

∴ إحداثيا النقطة أ هما $(1, 2)$.

بالنسبة للنقطة ب :

الإحداثي السيني هو -2 بمعنى وحدتين على يسار نقطة الأصل.

الإحداثي الصادي هو 1 بمعنى وحدة واحدة أعلى نقطة الأصل.

∴ إحداثيا النقطة ب هما $(-2, 1)$.

بالنسبة للنقطة ج :

الإحداثي السيني هو 2 بمعنى وحدتين على يمين نقطة الأصل.

الإحداثي الصادي هو -3 بمعنى ثلاث وحدات أسفل نقطة الأصل.

∴ إحداثيا النقطة ج هما $(2, -3)$.

بالنسبة للنقطة د

الإحداثي السيني هو 3 بمعنى ثلاثة وحدات على يمين نقطة الأصل.

الإحداثي الصادي هو 0 بمعنى أن النقطة تقع على محور السيني.

∴ إحداثيا النقطة د هما (3, 0).

بالنسبة للنقطة هـ


الإحداثي السيني هو 0 بمعنى أن النقطة لا على يمين ولا على يسار نقطة الأصل.

الإحداثي الصادي هو -2 بمعنى وحدتين أسفل نقطة الأصل.


∴ إحداثيا النقطة هـ هما (0, -2).

تمرين 13


1- حدد إحداثيات النقاط المرسومة من أ حتى ل على المستوى الديكارتي:



2- حدد إحداثيات النقاط المرسومة من أ حتى ل على المستوى الديكارتي.



5- يرسم المحاور السيني والصادي يتم تقسيم المستوى إلى أربعة أرباع كما هو موضح بالشكل.



مستخدمًا الشكل أعلاه، انقل وأكمل الجدول التالي:

3- ارسم على قطعة من ورق الرسم البياني مجموعة

من محاور الإحداثيات بحيث يكون المحور السيني والمحور الصادي كل منهما مرقمًا من -5 إلى 5، ثم

حدد النقاط التالية:

- | | |
|--------------|-------------|
| (أ) (1, 3) | (ب) (5, 4) |
| (جـ) (0, 2) | (د) (0, 0) |
| (هـ) (2, -4) | (و) (0, -2) |
| (ز) (5, -2) | (ح) (4, 0) |
| (ط) (2, -3) | |

4- ارسم على ورقة رسم بياني مجموعة من محاور

الإحداثيات بحيث يكون كل من المحور السيني والمحور الصادي مرقمًا من (-5) إلى (5) ثم حدد النقاط

التالية:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| (أ) $(5, 3\frac{1}{2})$ | (ب) $(-4\frac{1}{2}, 3)$ |
| (جـ) $(-3, 1\frac{1}{2})$ | (د) $(-3, -4\frac{1}{2})$ |
| (هـ) $(0, 2\frac{1}{2})$ | (و) $(4\frac{1}{2}, 0)$ |
| (ز) $(-2\frac{1}{2}, 1\frac{1}{2})$ | (ح) $(-3\frac{1}{2}, -1\frac{1}{2})$ |

(ب) صل النقاط المعطاة في (أ) مجموعة من الخطوط المستقيمة بمعنى آخر، أ مع ب، ب مع ح، ح مع د. وهكذا في باقي النقاط حتى ي مع أ.
(ج) صف الشكل الذي حصلت عليه.

7- (أ) صل النقاط المعطاة في (أ) بسلسلة من القطع المستقيمة (بمعنى) ارسم $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$. وهكذا حتى تنتهي بالنقطة ق مع ر.
(ب) صف الشكل الذي حصلت عليه.

8- (أ) على كل من المحورين السيني والصادي حدد النقاط التالية:

- (i) أ (6, 3) (ii) ب (-2, 4)
(iii) د (0, 0) (iv) هـ (2, 1)
(v) و (4, 2)

(ب) ارسم القطع المستقيمة $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$. ثم و ح.

(ج) صف النموذج الذي حصلت عليه.

النقطة	الإحداثي السيني (موجب أو سالب)	الإحداثي الصادي (موجب أو سالب)	الربع الذي تقع فيه النقطة
أ (2, 3)	موجب	موجب	الأول
ب (-4, 1)	سالب	موجب	الثاني
ح (3, -2)			
د (-1, -4)			
هـ (5, -2)			
و (1, 3)			
ز (2, 5)			
ح (-3, 8)			
ط (4, -2)			
ي (5, 1)			
ك (1, -4)			

6- (أ) ارسم المستوى الديكارتي على ورقة رسم بياني ثم حدد النقاط التالية:


- (i) أ (4, 0) (ii) ب (1, 2)
(iii) ح (1, 5) (iv) د (-3, 1)
(v) هـ (5, 4) (vi) و (-3, 0)
(vii) ز (-4, -5) (viii) ح (-3, 2)

Linear Patterns and Their Equations

النماذج الخطية ومعادلاتها

2-3

تضمنت الأسئلة الثلاثة الأخيرة في التمرين (5) تعيين نقط في المستوى الديكارتي ثم ملاحظة النموذج الناتج من توصيل النقاط ببعضها البعض وبصفة خاصة فإن السؤال الأخير قدم النموذج الخطي بمعنى: تقع جميع النقاط المحددة على نفس الخط المستقيم. وسوف ندرس في هذا الفصل تلك النماذج الخطية.



في الشكل المرسوم بأعلى، ويرسم وتوصيل النقط (ب) حتى (ف) نحصل على خط مستقيم.

لاحظ أن الإحداثي الصادي لكل نقطة يساوي ضعف قيمة الإحداثي السيني لنفس النقطة بمعنى:

$$\text{عندما } س = 2 \text{ فإن } ص = 2 \times (2) = 4$$

$$\text{عندما } س = 1 \text{ فإن } ص = 2 \times (1) = 2 \text{ وهكذا.}$$

يمكن كتابة العلاقة اللفظية السابقة كتعبير رياضي:

$$ص = 2س$$

مثل هذا التعبير الرياضي يسمى معادلة. والمستقيم الذي يمر بتلك الأزواج المرتبة، يسمى التمثيل البياني للمعادلة.

$$ص = 2س$$

كل نقطة تقع على هذا المستقيم تحقق المعادلة $ص = 2س$ ، على سبيل المثال، لتكن النقطة د (0.5, 1) التي تقع على هذا المستقيم. هنا $س = 0.5$ ، $ص = 2 \times (0.5) = 1$ وبناءً عليه فإن إحداثيات النقطة (د) تحقق المعادلة $ص = 2س$.

مثال 2:

ارسم الشكل البياني $ص = 3س$ لجميع قيم س المحصورة من 3 إلى -3.

الحل

الفرض من حصر قيم على محور السينات ($3 \geq س \geq -3$) ليدلنا فقط على الجزء من الخط $ص = 3س$ المطلوب.

ولرسم الخط المستقيم سوف نحتاج فقط إلى إيجاد ورسم الإحداثيات لبعض النقط التي تنتمي إلى العلاقة المعطاة ثم رسم المستقيم المار بهذه النقط. وبما أن العلاقة تحدد أننا نريد قيم س التي تقع على المستقيم بين $3 \geq س \geq -3$ فيكون من المناسب إيجاد تلك النقط ذات الإحداثي السيني -3، -2، -1، 0، 1، 2، 3 بمعنى آخر نريد إكمال الجدول التالي من القيم مستخدمين القاعدة المعطاة $ص = 3س$

س	3-	2-	1-	0	1	2	3
ص							
ص							
(س، ص)							

ولإكمال الجدول السابق نعوض فقط عن كل قيمة س في المعادلة $ص = 3س$.

$$\text{عندما } س = 3- \text{ فإن } ص = 3 \times 3-$$

$$9- = (3-) \times 3 =$$

$$\therefore \text{ نحصل على النقطة } (3-، 9-)$$

$$\text{وبالمثل عندما } س = 2- \text{ فإن } ص = 3 \times 2-$$

$$6- = (2-) \times 3 =$$

$$\therefore \text{ نحصل على النقطة } (2-، 6-)$$

$$\text{وأيضاً عندما } س = 1- \text{ فإن } ص = 3 \times (1-) = 3- \therefore \text{ النقطة هي } (1-، 3-).$$


بالاستمرار بهذه الطريقة لقيم $s = 0, 1, 2, 3$ نحصل على النقاط $(0,0)$, $(1,3)$, $(2,6)$, $(3,9)$ ويصبح الجدول بعد التكملة كما يلي:

س	3-	2-	1-	0	1	2	3
س=3س	9-	6-	3-	0	3	6	9
(س، س)	(9-, 3-)	(6-, 2-)	(3-, 1-)	(0, 0)	(3, 1)	(6, 2)	(9, 3)

ولرسم الشكل البياني للمعادلة $s = 3س$ سوف نستخدم المقاييس التالي:

- 1سم لكل وحدة على محور السينات.
- 1سم لكل وحدتين على محور الصادات.

يتم اختيار مقاييس مختلفة بالنسبة لمحور السينات ومحور الصادات لأن مدى القيم للمتغير s أكبر من مدى القيم للمتغير $س$. يتم عمل هذا لإعطاء الرسم البياني فضاءً كافياً. وسبب آخر مهم هو أن الرسم البياني يجب أن يكون كبيراً بدرجة كافية. من الأفضل أن تغطي المسافة الأفقية والرأسية بين النقطة الأولى والأخيرة 8سم من الفراغ أو أكثر.



ملحوظة

نحيط في هذا الفصل نشاطاً أكثر ما ينبغي للرسم البياني الخطي والتدريب سوف نحتاج لخطوط نقاط أقل.

ملحوظة

لنحيط رسم بياني اختر مقاييس مناسبة لمحور السينات ومحور الصادات.


مثال 3:

ارسم الشكل البياني للمعادلة $x = -2$ حيث $-3 \leq x \leq 3$ باستخدام مقياس رسم 1 سم لتمثل وحدة واحدة على كل من المحورين.

الحل

جدول قيم المعادلة $x = -2$ هي:

3	2	1	0	-1	-2	-3	س
-6	-4	-2	0	2	4	6	ص
(-6, 3)	(-4, 2)	(-2, 1)	(0, 0)	(2, -1)	(4, -2)	(6, -3)	(س, ص)




مثال 4:

ارسم الشكل البياني للمعادلة $x + 3 = 0$ حيث $-3 \leq x \leq 3$ باستخدام مقياس رسم 1 سم لتمثل وحدة واحدة على محوري الإحداثيات.

الحل

يبين الجدول التالي قيم $x + 3 = 0$

3	2	1	0	-1	-2	-3	س
6	5	4	3	2	1	0	ص
(6, 3)	(5, 2)	(4, 1)	(3, 0)	(2, -1)	(1, -2)	(0, -3)	(س, ص)




مثال 5:

ارسم الشكل البياني للعلاقة $ص = س - 2$ حيث $3 \geq س$ باستخدام مقياس رسم 1 سم ليمثل كل وحدة على محوري الإحداثيات.

الحل

جدول قيم المعادلة $ص = س - 2$

س	3-	2-	1-	0	1	2	3
ص	5-	4-	3-	2-	1-	0	1
(س، ص)	(5-, 3-)	(4-, 2-)	(3-, 1-)	(2-, 0)	(1-, 1)	(0, 2)	(1, 3)



تمرين 3 ب

1 - انقل وأكمل كل جدول من الجداول الآتية للمعادلات المعطاة:

(i) $ص = 5 س$

س	2-	1-	0	1	2
ص					
ص	10-		5		
(س، ص)			(5, 1)		

(ب) $ص - س = 3$

س	3-	2-	1-	0	1	2	3
ص						2	
ص							
(س، ص)							

(ج) $ص - 3 س$

س	2-	1-	0	1	2
ص					
ص	6				
(س، ص)					

(د) $ص = 5 + س$

س	3-	2-	1-	0	1
ص					
ص					
(س، ص)					

(هـ) $ص = س - 3$

س	1-	0	1	2	3
ص					
ص					
(س، ص)					

2 - مستخدمًا إجابتك على السؤال (1) ارسم الشكل البياني لكل من:

(i) $ص = 5 س$ حيث $2 \geq س \geq 2$ (ب) $ص - س = 3$ حيث $3 \geq س \geq 3$ (ج) $ص = س + 5$ حيث $3 \geq س \geq 3$ (د) $ص = س - 3$ حيث $1 \geq س \geq 3$

3 - ارسم الشكل البياني لكل من المعادلات الآتية:

(i) $ص = س$ حيث $3 \geq س \geq 3$ (ب) $ص = 6 س$ حيث $2 \geq س \geq 2$ (ج) $ص = 4 س$ حيث $2 \geq س \geq 2$ (د) $ص = س + 4$ حيث $5 \geq س \geq 1$ (هـ) $ص = س - 5$ حيث $1 \geq س \geq 5$

مثال 6:

ارسم الشكل البياني للعلاقة $ص = س - 3$ حيث $3 \geq س \geq 3$ مستخدمًا

مقياس رسم 1 سم لكل وحدة من المحورين السيني والصادي.

الحل

جدول قيم المعادلة $ص = س - 3$


س	3-	2-	1-	0	1	2	3
ص							
ص	3-	2-	1-	0	1	2	3-
3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+
ص	6	5	4	3	2	1	0
(س، ص)	(6, 3-)	(5, 2-)	(4, 1-)	(3, 0)	(2, 1)	(1, 2)	(0, 3)

يساعدنا الجدول السابق في استخراج قيم ص بطريقة مرتبة بدلًا من تنابع

العمل من النوع التالي:

عندما $ص = 3 -$ ، $ص = - (3 -) + 3 = 6$

والذي يجب عمله بالنسبة لكل قيمة من قيم س.



ملاحظة

تتراوح قيمة ص بين 0 و 6

يُحذف في الأمثلة التالية الصف الأخير (س، ص). تلاحظ الآن من الجدول أن الإحداثيات للنقاط التي سوف يتم رسمها (س، ص) يمكن قراءتها من صفوف القيم س، ص.

مثال 7،


ارسم الشكل البياني للعلاقة $ص = 2س - 1$ حيث $2 \leq س \leq 2$. استخدم مقياس رسم 1 سم لتتضمن وحدة واحدة على كلا المحورين.

جدول قيم المعادلة $ص = 2س - 1$:

س	2 -	1 -	0	1	2
ص 2	4 -	2 -	0	2	4
1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -
ص	5 -	3 -	1 -	1	3

اجمع {

الحل



مثال 8:


ارسم الشكل البياني للعلاقة $ص = 2(س + 1)$ حيث $-2 \leq س \leq 2$. استخدم مقياس رسم 1 سم ليمثل وحدة واحدة على كلا المحورين السيني والصادي.

الحل

جدول قيم العلاقة $ص = 2(س + 1)$:

س	-2	-1	0	1	2
ص	-2	0	2	4	6

نظرة سريعة
على
الرسم $ص = 2(س + 1)$



مثال 9:

ارسم الشكل البياني للعلاقة $ص + 2 = 2$ حيث $-2 \leq س \leq 2$. استخدم 1 سم ليمثل وحدة واحدة على كلا المحورين السيني والصادي.


الحل

س + ص = 2 يمكن كتابته $ص = 2 - س$

جدول قيم العلاقة $s = -2 + 2$

س	2-	1-	0	1	2
س	2	1	0	1	2
س	2+	2+	2+	2+	2+
س	4	3	2	1	0

الجمع {



ملاحظة

عنون هذا الخط بمعادلته
الأصلية $s = -2 + 2$

تمرين 3 ج

3- احسب قيمة أ، ب في الجدول التالي باستخدام المعادلة $s = 3 - 4$

س	2-	1-	0	1	2
س	10-	أ	4-	ب	2

استخدم مقياس رسم 2 سم ليمثل وحدة من محور السينات و 1 سم لكل وحدة من محور الصادات لرسم المعادلة $s = 3 - 4$ حيث $2 \geq s \geq 2$

4- لكل من المعادلات الآتية كون جدولاً وارسم الشكل البياني عندما $3 \geq s \geq 3$ إرشاد: اجعل s متغير المعادلة التابع.

- (أ) $4 \text{ س} + 2 \text{ ص} = 5$ (ب) $3 \text{ س} + 2 \text{ ص} = 6$
(ج) $2 \text{ س} - 2 \text{ ص} = 4$ (د) $2 \text{ س} + \text{ص} - 1 = 0$

1- كون جدولاً وارسم الشكل البياني لكل من المعادلات التالية حيث $3 \geq s \geq 3$

- (أ) $\text{ص} = 3 - 2 \text{ س}$ (ب) $\text{ص} = 2 + 3 \text{ س}$
(ج) $\text{ص} = -1 + \text{س}$ (د) $\text{ص} = -\text{س} - 3$
(هـ) $\text{ص} = -2 \text{ س} - 5$ (و) $\text{ص} = -3 \text{ س} + 7$
(ز) $\text{ص} = 3 (2 - \text{س})$ (ح) $\text{ص} = 2 (3 + \text{س})$
(ط) $\text{ص} = -4 (1 + \text{س})$ (ي) $\text{ص} = -3 (1 - \text{س})$
(ك) $\text{س} + \text{ص} = 1$ (ل) $\text{س} + \text{ص} = 3$

2- اكمل الجدول التالي للمعادلة $\text{ص} = 4 + 5 \text{ س}$

س	2-	1-	0	1	2
س		1		9	

استخدم مقياس رسم 2 سم ليثل وحدة من محور السينات و 1 سم لكل وحدتين من محور الصادات. ارسم الشكل البياني للمعادلة $\text{ص} = 4 + 5 \text{ س}$ عندما $2 \geq s \geq 2$

3-3


العلاقات الخطية الرأسية والأفقية

Horizontal and Vertical Linear Relationships

نأمل مجموعات النقاط التالية:

مجموعة I	(3, 3-)	(1, 3-)	(2, 2-)	(3, 2-)	(3, 1-)	(3, 0)
مجموعة II	(2, 1)	(3, 1)	(0, 2)	(3, 2)	(2, 3)	(4, 3)

أي من النقاط السابقة تطابق القاعدة $x = 3$ ؟ لاحظ أن القاعدة لا تحصر القيم للمتغير y . مع ذلك فإن قيمة x يجب أن تكون 3
وجدنا في المجموعة (I)، النقاط (3, 3-)، (3, 2-)، (3, 1-)، (3, 0) جميعها تحقق القاعدة $x = 3$ بينما النقاط (1, 3-)، (2, 2-) لا تحقق. في المجموعة (II) فقط النقاط (3, 1)، (3, 2) تحقق القاعدة $x = 3$. وعن طريق رسم النقاط التي تحقق القاعدة $x = 3$ نحصل على:




تقع هذه النقاط جميعاً على نفس الخط المستقيم الأفقي. يمثل هذا الخط الأفقي بيانياً العلاقة $x = 3$.

المعادلة التي على الصورة $x = c$ حيث c عدد ثابت تمثل بيانياً بخط مستقيم أفقي.

نأمل مجموعات النقاط التالية:

مجموعة I	(3-, 1)	(3-, 3-)	(1, 2)	(2, 1)	(1, 3)	(3, 1)
مجموعة II	(1, 0)	(1, 2)	(2, 1)	(2, 0)	(1, 1)	(0, 1)

أي من النقاط السابقة تحقق القاعدة $y = 1$ ؟ لاحظ أن القاعدة لا تحصر القيم للمتغير x ومع ذلك فإن قيمة y يجب أن تظل دائماً كما هي $y = 1$
من المجموعة (I) نجد أن النقاط (3-, 1)، (1, 2)، (2, 1)، (1, 3)، (3, 1) جميعها تحقق القاعدة $y = 1$ بينما النقاط (3-, 3-)، (1, 0) لا تحقق. في المجموعة (II) نجد أن النقطتين (2, 1)، (3, 1) كلاهما يحقق القاعدة المعطاة.
وبرسم النقاط التي تحقق القاعدة $y = 1$ نحصل على:



تقع جميع هذه النقاط على نفس الخط المستقيم الرأسى. يمثل هذا الخط الرأسى بياناً للمعادلة $x = 1$

المعادلة التي على الصورة $x = c$, حيث c عدد ثابت تمثل بياناً بخط مستقيم رأسى.

تمرين 3 د

(ب) ارسم بياناً وعلى ورق رسم مستقل النقاط المعطاة في (أ) والتي تحقق القاعدة (i) و (ii).

2 - (أ) أي من النقاط المعطاة تحقق القاعدة


(i) $x = 1$, (ii) $x = 1$ ؟

(1-, 3-)	(2-, 3-)	(3-, 3-)
(2, 3-)	(1, 3-)	(0, 3-)
(2-, 2-)	(3-, 2-)	(3, 3-)
(1, 2-)	(0, 2-)	(1-, 2-)
(3-, 1-)	(3, 2-)	(2, 2-)
(0, 1-)	(1-, 1-)	(2-, 1-)
(3, 1-)	(2, 1-)	(1, 1-)
(1-, 0)	(2-, 0)	(3-, 0)
(2, 0)	(1, 0)	(0, 0)
(2-, 1)	(3-, 1)	(3, 0)
(1, 1)	(0, 1)	(1-, 1)
(3-, 2)	(3, 1)	(2, 1)
(0, 2)	(1-, 2)	(2-, 2)

1 - (أ) أي من النقاط المعطاة تحقق القاعدة:

(i) $x = 2$, (ii) $x = 3$ ؟


(1-, 3-)	(2-, 3-)	(3, 3-)
(2, 3-)	(1, 3-)	(0, 3-)
(2-, 2-)	(3-, 2-)	(3, 3-)
(1, 2-)	(0, 2-)	(1-, 2-)
(3-, 1-)	(3, 2-)	(2, 2-)
(0, 1-)	(1-, 1-)	(2-, 1-)
(3, 1-)	(2, 1-)	(1, 1-)
(1-, 0)	(2-, 0)	(3-, 0)
(2, 0)	(1, 0)	(0, 0)
(2-, 1)	(3-, 1)	(3, 0)
(1, 1)	(0, 1)	(1-, 1)
(3-, 2)	(3, 1)	(2, 1)
(0, 2)	(1-, 2)	(2-, 2)
(3, 2)	(2, 2)	(1, 2)
(1-, 3)	(2-, 3)	(3-, 3)
(2, 3)	(1, 3)	(0, 3)
		(3, 3)



(د)

(3, 2)	(2, 2)	(1, 2)
(1, -3)	(2, -3)	(3, -3)
(2, 3)	(1, 3)	(0, 3)
		(3, 3)

(ب) ارسم بيانياً على ورق رسم مسنقل النقاط المعطاة في (أ) والتي تحقق القاعدة (i) ، (ii).



(هـ)

3- ارسم الخطوط التالية على نفس المستوى الديكارتي

حيث $3 \geq x \geq 3$

(i) $x = 2$ (ب) $x = 5$


(ب) $x = 3$ (د) $x = 5$

4- ارسم الخطوط المستقيمة التالية على نفس

المستوى الديكارتي حيث $3 \geq x \geq 3$

(i) $x = 3$ (ب) $x = 4$


(ب) $x = 2$ (د) $x = 7$




(و)

5- حدد المعادلة لكل من الخطوط المستقيمة التالية.



(i)




(ب)



(جـ)



(ز)



(ح)


6- حدد معادلة كل من:

(ب) محور الصادات

(أ) محور السينات

1- ملخص وصفي للمستوى الديكارتي والنظام الإحداثي:


الإحداثيات الديكارتية للنقطة د

2- معادلة محور السينات هي $V = 0$ ، معادلة محور الصادات هي $S = 0$.

3- إذا كانت إحداثيات نقطة تحقق معادلة الرسم البياني فإن النقطة تقع على الرسم البياني.

4- إذا كانت إحداثيات نقطة لا تحقق معادلة الرسم البياني فإن النقطة لا تقع على الرسم البياني.


5- بعض الرسوم البيانية الأساسية ومعادلاتها:



ورقة المراجعة 3

قسم أ

1- اكتب إحداثيات النقط أ ب ج د.



2- حدد النقط أ ب ج د ، ط (1, 0) س (-2, 4) في ورقة رسم بياني. صل النقطه أ مع ط، ط مع ب، ب مع ج، ج مع د، د مع س مع أ ما نوع المثلث المكون؟

3- ارسم النقط ح (1, 5)، ف (4, 1) في (0, 2). فإذا كانت تلك النقاط ثلاثة أركان من مربع. حدد الركن الرابع ثم اكتب إحداثيه.

4- الحرف T تم رسمه بتوصيل النقط (-1, 1) إلى (1, 1)، (1, 1) إلى (3, 1)، (3, 1) إلى (1, 3) وبمد خط واحد ليتمس الخط الآخر. عن طريق رسم النقط ككون الحرف T المطلوب. وحدد إحداثيي النقطه حيث الخط الأول يمس الخط الثاني.

قسم ب




5- امل وأكمل الجدول التالي للمعادلة $ص = 2س - 4$:

س	-2	0	2
2س			
-4			
ص = 2س - 4			

حدد إحداثيات النقط حيث يقطع الرسم البياني محور الصادات.

6- مائل الرسوم البيانية أدناه مع المعادلات الخاصة بها من القائمة التالية:

ص = س ، ص = - س ،
ص = 3 ، ص = س - 1 ،
ص = 3



4- (i) عبر عَمَّا يأتي في صورة كسر وحيد

$$(i) \frac{5}{8} + \frac{3}{5}$$

$$(ii) \frac{8}{25} + \frac{5}{23}$$

$$(ب) حل: 5 = \frac{5}{8} - \frac{5}{3}$$

5- أوجد مفكوك:

$$(i) (4 + 1)(2 + 1)$$

$$(ب) (5 - 4)(3 + 2)$$

$$(جـ) (6 - 5)(4 - 3)$$

$$(د) (3 - 2)(1 + 2)$$

6- حل

$$(i) 3س^2 - 4س + 6س - 8ص$$

$$(ب) 3هـ - 4س - 6هـ + 8كص$$

$$(جـ) 8س^2 - 10س + 3ص^2$$

$$(i) \frac{3+4+1}{3+1}$$

$$(ب) حلل 3ص^2 - 25 + 28$$

$$(جـ) إذا كان $\frac{3}{2} = 2$. اجعل ح المتغير التابع$$

8- (i) حلل $أ^2 - ب^2$

ثم أوجد قيمة $(6.4) - (3.6)$ من دون استخدام

الألة الحاسبة.

(ب) أنقل وأكمل الفراغات الآتية:

$$^2(4) - ^2(6) = ^4(4) - ^4(6)$$

$$(\square + ^2(6)) (^4 - \square) =$$

$$(\square + 36) (16 - \square) =$$

$$\square \times \square =$$

$$1040 =$$

9- (أ) حلل: $8 - 3$

(ب) أنقل وأكمل الفراغات الآتية:

$$^2(2) - ^2(3) = ^62 - ^63$$

$$(\square + ^3(3)) (^2 - \square) =$$

$$(4 + \square - 9) (2 + 3) (\square + 6 + \square) (2 - \square) =$$

$$665 = \square \times \square \times \square \times \square =$$

7- أوجد مفكوك:

$$(i) (3 + 5)^7$$

$$(ii) 6 | (ب - 8 جـ)$$

(ب) حلل (i) $2م - 4ن$

(ii) $س^2ص + س$

8- أوجد مفكوك:

$$(i) 5س(س + 3)$$

$$(ب) (س - 5)(س + 10)$$

$$(جـ) (3 - 2س)(3 + 2س)$$

$$(د) (3 + 2س)^2$$

$$(هـ) (3 - 2س)^2$$

9- حلل:

$$(i) س^2 - 3س$$

$$(ب) ص^2 + 5ص - 6$$

$$(جـ) 9 + 6 + 1$$

$$(د) 9ب - 6 + 1$$

$$(هـ) 4 > 2 - 49$$

10- (i) عبر عَمَّا يأتي في صورة كسر وحيد

$$(i) \frac{2}{3} - \frac{2}{5}$$

$$(ii) \frac{3}{2} - \frac{2}{3}$$

$$(ب) حل: 1 = \frac{1-2}{3} - \frac{8-13}{5}$$

11- (i) إذا كان $ر = أ$ ، اجعل المتغير التابع (هدفًا)

(ب) إذا كان $ز = \frac{1}{2}ت$

(i) اجعل المتغير التابع (هدفًا).

(ii) أوجد قيمة (ق) عندما $ز = 45$ ، $ت = 3$.

التقويم 1

1- ارسم النقط أ (2، 2)، ب (3، 1)، فإذا كان أ، ب

ركنين متقابلين من المستطيل الذي جوانبه توازي

محوري السينات والصادات. حدد إحداثيي الركنين

الأخرين.

2- أوجد مفكوك:

$$(i) 5(4 - 3) (ب) 4(3 + 2) >$$

$$(جـ) 3س(2 - ص) (د) 2س(3س + 5)$$

3- حلل

$$(i) 5 + 3 + 2 (ب) 4 + 2 >$$


$$(جـ) 3س - 12س ص (د) 27س^2 - 12$$

المعادلات الآنية

Simultaneous Equations

لقد واجهت أثناء دراستك في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي مسائل مثل تلك المعروضة فيما يلي.

ثمن 3 دجاجات، 4 ديكه 99 دينارًا
ثمن 2 دجاجة، 3 ديكه 71 دينارًا
أوجد سعر شراء الديك.



تكون غالبًا قد استخدمت النماذج لحل تلك المسألة.

النموذج 1: $99 =$

النموذج 2: $71 =$

بطرح النموذج 2 من النموذج 1 نحصل على

$$28 = 71 - 99 = \begin{array}{|c|} \hline \text{د} \\ \hline \text{س} \\ \hline \end{array}$$

النموذج 3: $56 = 28 \times 2 =$

وبطرح النموذج 3 من النموذج 2 نحصل على

$$56 - 71 = \begin{array}{|c|} \hline \text{س} \\ \hline \end{array}$$

$$15 =$$

∴ سعر شراء الديك 15 دينارًا.

ونتعلم في الشق الثاني من مرحلة التعليم الأساسي حل المسائل من هذا النوع جبريًا باستخدام المعادلات الآنية.

- في نهاية هذا الفصل سوف تكون قادرًا على
- حل المعادلتين الآتيتين الخطيتين من متغيرين بالطرق الآتية:
 - (أ) معادلة المقادير
 - (ب) التعويض
 - (ج) الجمع والطرح والحذف.
 - حل المعادلتين الآتيتين الخطيتين بيانيًا.
 - حل المسائل اللفظية التي تتضمن تكوين معادلتين آتيتين خطيتين من مجهولين (متغيرين).

Introduction

مقدمة

1-4

نأمل المعادلة الخطية $s + v = 6$ والتي تحتوي على مجهولين. يوجد العديد من أزواج القيم لكل من s ، v والتي تحقق هذه المعادلة. على سبيل المثال.

$$\begin{array}{lll} \text{إذا كان } s + v = 6 \text{ فإن } s = 5, & v = 1 & \text{تعطي } 6 = 1 + 5 \\ s = 4, & v = 2 & \text{تعطي } 6 = 2 + 4 \\ s = -3, & v = 9 & \text{تعطي } 6 = 9 + (-3) \\ s = 1\frac{1}{2}, & v = 4\frac{1}{2} & \text{تعطي } 6 = 4\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2} \end{array}$$

الآن نأمل المعادلة الخطية $s - v = 4$ والتي تتضمن أيضًا مجهولين. مرة أخرى يوجد العديد من الأزواج المرتبة من القيم لكل من s ، v والتي تحقق هذه المعادلة. على سبيل المثال.

$$\begin{array}{lll} \text{إذا كان } s - v = 4 \text{ فإن } s = 5, & v = 1 & \text{تعطي } 4 = 5 - 1 \\ s = 6, & v = 2 & \text{تعطي } 4 = 6 - 2 \\ s = -3, & v = 7 & \text{تعطي } 4 = (-3) - 7 \\ s = -\frac{1}{2}, & v = 4\frac{1}{2} & \text{تعطي } 4 = (-\frac{1}{2}) - 4\frac{1}{2} \end{array}$$

يكون أحيانًا من الضروري إيجاد زوج القيم لكل من s ، v والذي يحقق المعادلتين معًا. ونسمى ذلك حل المعادلتين آتياً. ففي الأمثلة السابقة فقط $s = 5$ ، $v = 1$ يحقق كلا المعادلتين.

Algebraic Method of Solving Simultaneous Equations

الطريقة الجبرية لحل المعادلتين الآتيتين

2-4

سوف نقدم في هذا الفصل الطرق الجبرية الأساسية الثلاث لحل المعادلتين الآتيتين.

Equating Expressions Method

1-2-4 طريقة معادلة المقدّير

مثال 1:

حل زوج المعادلات الآتية التالي:

ص 3 = 5 - ص

ص 2 = 3 + ص

الحل

(1) ص 3 = 5 - ص

(2) ص 2 = 3 + ص

بما أنه يفترض أن للمعادلتين نفس قيمة ص كحل، فيمكن معادلة الطرفين الأيسر للمعادلتين.

∴ ص 3 = 5 - ص 2 = 3 + ص

ص 3 - ص 2 = 5 + 3

∴ ص = 8

بالتعويض عن قيمة ص = 8 في المعادلة (1) نجد أن:

ص 3 = 5 - 8 × 3

ص 3 = 5 - 24 = 19

للتأكد من قيم ص = 8، ص = 19،

نستخدم المعادلة (2).

∴ الحل هو ص = 8، ص = 19

مثال 2:

حل المعادلتين الآتيتين:

ص 2 = 5 - ص

ص 2 = 3 + ص 1

الحل

(1) ص 2 = 5 - ص 1

(2) ص 2 = 3 + ص 1

من المعادلة (1) نجد أن ص 2 = 5 - ص 1

عادل (2)، (3) نجد أن الطرف الأيمن في كل منهما متساوٍ، وعلى هذا فالطرف الأيسر في كل منهما يكون متساوياً أيضاً.

ص 5 - ص 1 = 3 + ص 1

ص 5 - ص 3 = 1 + 1

ص 2 = 2

∴ ص = 1

بالتعويض عن قيمة ص = 1 في المعادلة (2) نجد أن:

ص 2 = 3 + (1) 4 = 2

∴ ص = 2

∴ الحل هو ص = 2، ص = 1

ملحوظة

عوض عن ص بـ 8

للتأكد:

نعوض بقيمة ص = 8، ص = 19 في المعادلة (2).

ص 3 = 5 - 8 × 2

19 =

∴ الطرف الأيمن = الطرف الأيسر.

للتأكد:

بالتعويض في المعادلة (1)

ص = 2، ص = 1 نجد أن

ص 2 = 5 - (2) × 2 = 1

1 = 5 - 4 =

∴ الطرف الأيمن = الطرف الأيسر

تمرين 4 أ

استخدم طريقة معادلة المقادير لحل المعادلات الآتية:	5 - 3س = 4 ص = 2	6 - 5 ص = 3 س = 2
1 - ص = 2 س + 1	3 س = 7 ص - 1	5 ص = 8 س - 3
ص = س - 1	س = 2 ص + 1	3 س = 7 - 5 ص = 3 س
3 - 2 س = 3 ص + 4	4 - 3 ص = 2 س + 1	5 ص = 7 + 7 = 17 س
2 س = 5 ص + 8	3 ص = 3 س + 4	3 - 3 ص = 2 س = 1

Substitution Method

2-2-4 طريقة التعويض

هذه الطريقة مفضلة في حل المعادلتين الآتيتين إذا أعطينا إحدى المعادلتين (بدلالة س، ص) ، على صورة "س = " أو "ص = "

مثال 3:

حل زوج المعادلات الآتية التالي

$$2س + 3ص = 4$$

$$ص = 3س + 5$$

الحل

(1) $2س + 3ص = 4$

(2) $ص = 3س + 5$

بالتعويض من (2) في (1)

$$\therefore 2س + 3(3س + 5) = 4$$

$$2س + 9س + 15 = 4$$

$$11س = 4 - 15$$

$$11س = -11$$

$$\therefore س = -1$$

بالتعويض عن قيمة س = -1 في (2)

$$ص = 3(-1) + 5$$

$$= -3 + 5$$

$$= 2$$

$$\therefore \text{الحل هو } س = -1, ص = 2$$

للتأكد:

بالتعويض عن قيمة س = -1 في المعادلة (1)

$$2س + 3(3س + 5) = 4$$

$$= 2(-1) + 3(3(-1) + 5)$$

$$= -2 + 3(-3 + 5)$$

$$= -2 + 3(2)$$

$\therefore$ الطرف الأيمن = الطرف الأيسر

مثال 4:

حل زوج المعادلات الآتية التالي :

$$س + 2 = 4$$

$$2س + 3 = 7$$

الحل

$$(1) \quad س + 2 = 4$$

$$(2) \quad 2س + 3 = 7$$

$$(3) \quad \text{من (1) نجد أن } س = 4 - 2$$

بالتعويض من (3) في المعادلة (2) نجد أن :

$$7 = 2(4 - 2) + 3$$

$$7 = 8 - 4 + 3$$

$$-1 = 8 - 7$$

$$-1 = 1$$

بالتعويض عن قيمة س = 1 في المعادلة (3)

$$2س = 2 - 4 = -2$$

$$\therefore \text{الحل هو } س = -1$$

للتأكد:

نعوض عن قيمة س = 2, في

المعادلة (2)

$$7 = 1 \times 3 + 2 \times 2$$

الطرف الأيمن = الطرف الأيسر

ليس ضرورياً التأكد من (1) حيث

(3) هي نفس المعادلة.

تمرين 4 ب

حل كل زوج من المعادلات الآتية التالية بطريقة التعويض.

$$6 - 4س + س = 15$$

$$7س - 3 = 50$$

$$7 - س - 10 = 23$$

$$3س - 5 = 19$$

$$11 - 3س + س = 11$$

$$س - 1 = 1$$

$$9 - 2س + س = 5$$

$$5س - 9 = 9$$

$$10 - س - 2 = 3$$

$$س + 3 = 3$$

$$11 - 3س + 4س = 11$$

$$س = 9 - 2$$

$$-2 = 4 - 3س$$

$$6س - 5 = 2$$

$$-3 = 5س + 2س = 1$$

$$س - 3 = 7$$

$$-4 = 3س + 7س = 4$$

$$2س + س = 1$$

$$-5 = س + س = 1$$

$$3س - 4 = 4$$

Elimination Method

طريقة الحذف 3-2-4

يكون من المناسب في كثير من الأحيان استخدام طريقة الحذف عن طريق جمع أو طرح المعادلات.

مثال 5:

حل زوج المعادلات الآتية التالي:

$$2س + ص = 5$$

$$5س - ص = 9$$

الحل

$$(1) \quad 2س + ص = 5$$

$$(2) \quad 5س - ص = 9$$

بجمع المعادلتين (1)، (2) ينتج (2س + ص) + (5س - ص) = 5 + 9

$$7س = 14$$

$$\therefore س = 2$$

بالتعويض عن قيمة س في المعادلة (1) :

$$2 \times 2 + ص = 5$$

$$ص = 5 - 4 = 1$$

$$\therefore ص = 1$$

$$\therefore \text{الحل هو } س = 2, ص = 1$$

مثال 6:

حل زوج المعادلات الآتية التالي:

$$س + ص = 3$$

$$س - 2ص = -3$$

الحل

$$(1) \quad س + ص = 3$$

$$(2) \quad س - 2ص = -3$$

نطرح المعادلتين (1) - (2) ينتج (س + ص) - (س - 2ص) = 3 - (-3)

$$س + ص - س + 2ص = 3 + 3$$

$$3ص = 6$$

$$ص = 2$$

بالتعويض عن قيمة ص = 2 في المعادلة (1) :

$$س + 2 = 3$$

$$\therefore س = 1$$

$$\therefore \text{الحل هو } س = 1, ص = 2$$

ملحوظة

بجمع الطرف الأيسر 2، 1 سوف نحذف حدود ص من الطرفين ونصبح المعادلة في مجهول واحد هو س.

للتأكد:

نعوض بقيم س = 2، ص = 1 في المعادلة 2
 $9 = 1 - (2) 5$
 الطرف الأيمن = الطرف الأيسر

ملحوظة

نحذف س عن طريق طرح طرفي المعادلة (2) من طرفي المعادلة (1) على التوالي.

للتأكد:

نعوض بقيم س = 1، ص = 2 في المعادلة (2)
 $3 = 4 - 1$
 الطرف الأيمن = الطرف الأيسر

مثال 7:

حل زوج المعادلات الآتية التالي :

$$2 \text{ س} + \text{ص} = 1 -$$

$$3 \text{ س} - 4 \text{ ص} = 4$$

الحل

$$(1) \quad 2 \text{ س} + \text{ص} = 1 -$$

$$(2) \quad 3 \text{ س} - 4 \text{ ص} = 4$$

بضرب المعادلة (1) $\times$ (4) نحصل على

$$(3) \quad 8 \text{ س} + 4 \text{ ص} = 4 -$$

بجمع المعادلة (2) + (3) نعطي (3 س - 4 ص) + (8 س + 4 ص) = (4 -) + 4 =

$$11 \text{ س} = \text{صفر}$$

$$\therefore \text{س} = \text{صفر}$$

بالتعويض عن قيمة س = صفر في المعادلة (1)

$$2 \times \text{صفر} + \text{ص} = 1 -$$

$$\text{صفر} + \text{ص} = 1 -$$

$$\therefore \text{ص} = 1 -$$

$\therefore$ الحل هو س = صفر , ص = 1 -

مثال 8:

حل زوج المعادلات الآتية التالي :

$$5 \text{ س} - 4 \text{ ص} = 2$$

$$2 \text{ س} + 3 \text{ ص} = 10$$

الحل

$$(1) \quad 5 \text{ س} - 4 \text{ ص} = 2$$

$$(2) \quad 2 \text{ س} + 3 \text{ ص} = 10$$

$$(3) \quad 15 \text{ س} - 12 \text{ ص} = 6 \quad \text{بضرب المعادلة (1) } \times (3) \text{ ينتج}$$

$$(4) \quad 8 \text{ س} + 12 \text{ ص} = 40 \quad \text{بضرب المعادلة (2) } \times (4) \text{ ينتج}$$

بجمع (3) + (4) ينتج (15 س - 12 ص) + (8 س + 12 ص) = 6 + 40 =

$$23 \text{ س} = 46$$

$$\therefore \text{س} = 2$$

بالتعويض عن قيمة س = 2 في المعادلة (2) :

$$2 \times 2 + 3 \text{ ص} = 10$$

$$6 = 3 \text{ ص}$$

$$\therefore \text{ص} = \frac{6}{3} = 2$$

$\therefore$ الحل هو س = 2 , ص = 2

ملحوظة

احذف مجهول. يجب أن يكون له نفس المعامل في المعادلتين.

للتأكد:

نعوض بقيمة س = صفر , ص = 1 - في المعادلة (2)
 $3 \text{ س} - 4 \text{ ص} = 4$ $3(0) - 4(1) = 4 -$
 $-4 = 4$
 $\therefore$ الطرف الأيمن = الطرف الأيسر.

ملحوظة

جامل العلامة واجعل 12 المعامل لـ ص في المعادلتين.

للتأكد:

نعوض عن قيمة س = 2 , ص = 2 في المعادلة (1)
 $5 \text{ س} - 4 \text{ ص} = 2$ $5(2) - 4(2) = 2$
 $10 - 8 = 2$
 $2 = 2$
 $\therefore$ الطرف الأيمن = الطرف الأيسر.

في المثال السابق قد تفضل حذف س بدلاً من ص. عليك في هذه الحالة أن تساوي معامل س في المعادلتين عن طريق ضرب المعادلة (1) $\times$ 2 والمعادلة (2) $\times$ 5. أيهما أسهل في الحذف س أم ص؟

تمرين 4 ج

حل الأزواج التالية من المعادلات الآتية بطريقة الحذف:

$2 - 4 - 8 = ط$	$26 = 7 + 2 = د$	$2 = س + ص$	$3 = س + ص$
$7 - 2 = ط$	$3 = د + ر$	$4 = س - ص$	$1 = س - ص$
$11 = 3 - 2 = س$	$3 = 2 - 3 = ك$	$24 = 2 + 4 = ط$	$8 = 2 + ب$
$29 = 7 - س$	$23 = 3 + ك$	$1 = د - 2 = ط$	$17 = 3 - ب$
$4 = 4 + 3 = د$	$0 = 3 + 4 = ب$	$1 = س + ص$	$9 = 3 + ب$
$3 = 2 - 9 = د$	$29 = 2 - ب$	$5 = س - ص$	$0 = 3 - ب$

تمرين 4 د

استخدم طريقة ملائمة لحل كل زوج من المعادلات الآتية:


$30 = 5 + 3 = س$	$14 = 5 - 4 = س$	$\frac{1}{2} = د + س$	$6 = 3 - ب$
$1 = 3 - س$	$1 = 7 + س$	$\frac{1}{4} = د - س$	$8 = 4 - ب$
$5 = 2 + 3 = س$	$25 = 2 - 3 = س$	$8 = 4 + س$	$9 = 4 - ف$
$12 = 3 - س$	$4 = 5 + 2 = س$	$23 = 2 - س$	$5 = 2 - ف$
$22 = 7 + 3 = د$	$0 = 2 - س$	$2 = 3 - س$	$11 = 2 + س$
$0 = 3 - 5 = د$	$13 = 3 + س$	$17 = 2 + س$	$13 = 2 + س$

Graphical Interpretation

التفسير البياني

3-4

وأينا كيفية استخدام الطرق الجبرية الأساسية الثلاث لحل المعادلتين الآتيتين. فما أهمية حل زوج من المعادلات الآتية؟ للمعرفة، دعنا نرسم بيانيًا المعادلتين في مثال (7) على نفس المستوى الديكارتي.



لاحظ تقاطع الخطتين في النقطة (1, 0)، الحل الذي توصلنا إليه هو $س = 0$ ، $ص = 1$

وعليه فإن حل زوج المعادلات الآتية يعطي الإحداثي السيني والإحداثي الصادي لنقطة التقاطع لرسميهما البيانيين.


دعنا نحل المعادلتين الآتيتين في المثال 8 لنبين مرة أخرى الحقيقة السابقة.

ملحوظة

زوج المعادلات الآتية
في المثال 7،
 $2س + ص = 1$
 $3س - 4ص = 4$
الحل:
 $س = 0$
 $ص = 1$

ملحوظة

الحل
 $س = 0$
 $ص = 1$
مثل في النقطة
(0, 1)
التي تقع على الخطتين
 $2س + ص = 1$
 $3س - 4ص = 4$



ملحوظة

المعادلتان الآتيتان في المثال 8 ،

$$5س - 4ص = 2$$

$$2س + 3ص = 10$$

الحل:

$$س = 2$$

$$ص = 2$$

نرى مرة أخرى أن الحل الذي حصلنا عليه سابقاً، بمعنى $س = 2$ ، $ص = 2$ ، يعطي إحداثيات نقطة التقاطع للرسمين. هذه طريقة مقبولة لحل المعادلتين الآتيتين ولكنها تتطلب عملاً أكثر حيث نستخدم رسم الشكل البياني للمعادلتين بطريقة صحيحة.

1-3-4 الحلول البيانية للمعادلتين الآتيتين

Graphical Solutions of Simultaneous Equations

مثال 9:

حل الزوج التالي من المعادلات الآتية باستخدام طريقة الرسم البياني:

$$ص = س + 1$$

$$2س + ص = -2$$

الحل

س	2 -	0	2
ص	1 -	1	3

جدول العلاقة $ص = س + 1$:

ملحوظة


يكفي رسم نقطتين لرسم خط بياني مستقيم، إلا أننا نستخدم نقطة ثالثة للتأكد من عدم وجود خطأ.

من المعادلة $2س + ص = 2$ غير عن قيم $ص$ بدلالة $س$ وذلك لعمل جدول لقيم $س$. $ص$ وعليه يمكنك كتابة المعادلة $2س + ص = 2$ كما يلي: $ص = 2 - 2س$
الجدول التالي لقيم $ص = 2 - 2س$:

ص	$2 - 2س$	0	2
ص	2	$2 - 2س$	$6 - 2س$

ثم حدد النقاط وارسم الخطوط على ورقة الرسم البياني

من الرسم البياني فإن
إحداثيي نقطة التقاطع
هما $(0, 1)$ أي أن الحل هو
 $ص = 1$, $س = 0$



تمرين 4

- (أ) $ص = 4 - 2س$ (ب) $ص = 2س - 2$
 $ص = 3س + 6$ $ص = 3س + 6$
 (ج) $ص = 2س + 2$ (د) $ص = 4س + 4$
 $ص = 2س - 5$ $ص = 4س - 1$
 (هـ) $ص = 3$ (و) $ص = 5$
 $ص = 3س - 5$ $ص = 3س + 4$
 (ز) $ص = 2س - 3$ (ح) $ص = 2س - 1$
 $ص = 2س + 1$ $ص = 2س - 2$

1- حل الأزواج التالية من المعادلات الأنية بيانياً:

- (أ) $ص = 2س - 2$ (ب) $ص = 3س - 1$
 $ص = 2س + 4$ $ص = 2س + 1$
 (ج) $ص = 3س$ (د) $ص = 2س - 5$
 $ص = 6س - 6$ $ص = 5س + 5$

2- أوجد حلول الأزواج التالية من المعادلات الأنية برسمها بيانياً:

2-3-4 لا حل والحلول اللانهائية No Solution and Infinitely Many Solutions

أنشطة



1- حاول حل الزوج التالي من المعادلات الآتية:

$$س + ص = 3$$

$$س + ص = 6$$

ماذا تلاحظ ؟

ارسم بعد ذلك الشكل البياني لكل معادلة من المعادلتين على نفس المستوى الديكارتي. هل يتقاطع الخطان كل منهما مع الآخر؟
سوف نلاحظ أن بعض المعادلات الخطية الآتية ليس لها حل يمكن عرضه بيانيًا، لأنه لا يوجد نقطة تقاطع للخطين.

2- هل النقط (0, 2)، (1, 4)، (2, 6) تحقق زوج المعادلات الآتية؟

$$س - 2 = ص$$

$$ص = \frac{1}{2} س - 1$$

هل يمكن أن نجد نقطًا أخرى تحقق المعادلتين الآتيتين السابقتين؟

حاول أن تحل زوج المعادلات الآتية جبريًا. ماذا تلاحظ؟

ارسم بعد ذلك الخطين في نفس المستوى الديكارتي. عند كم نقطة يتقاطع الخطان معًا؟

سوف نلاحظ أن بعض المعادلات الخطية الآتية لها حلول لا حصر لها. [نقول أن هناك عددًا لا نهائيًا من الحلول]. يمكن بيانيًا عرض الطباق الخطين فوق بعضهما البعض تمامًا.

ملحوظة

لاحظ أن المستقيمين متوازيان

ملحوظة

لاحظ أن المستقيمين متطابقان

حل المشكلات باستخدام المعادلات الآتية

Solving Problems Using Simultaneous Equations

العديد من المشكلات التي نواجهها في حياتنا اليومية تتضمن العديد من الكميات المجهولة. ويمكن في كثير من الأحيان استخدام المعادلات الآتية لإيجاد القيم المطلوبة لهذه الكميات. وفي هذا الجزء سوف يتم مناقشة المشكلات التي تتضمن مجهولين.

أولًا: يجب إعطاء الكميات المجهولة حروفًا مناسبة لتمثل المتغيرات. عندئذ يتم ترجمة المعلومات المعطاة إلى معادلات. فإذا كان لدينا مجهولان ينبغي أن يكون لدينا معلومتان على الأقل تؤديان إلى معادلتين للتمسك من حل المشكلة.

وبما أن المسألة لفظية أصلًا، فيجب ترجمة الحل الجبري إلى كلمات مرة أخرى للحصول على الحل النهائي.

4-4

ارجع إلى
الأسطوانة
الدمجية



ملحوظة

المتغيرات هي كميات مجهولة يمكن أن تأخذ أي قيمة.

مثال 10:

مجموع عددين يساوي 20 والفرق بينهما 2 أوجد هذين العددين.

الحل

نفرض أن العدد الأكبر هو s والأصغر هو $ص$.

مجموع العددين $s, ص = 20$

$$(1) \quad s + ص = 20$$

الفرق بين العددين $s, ص = 2$

$$(2) \quad s - ص = 2$$

نحذف $ص$ بجمع المعادلتين.

$$2s = 22$$

$$\therefore s = 11$$

بالتعويض في المعادلة (1) عن قيمة $s = 11$.

$$20 = 11 + ص$$

$$ص = 20 - 11$$

$$\therefore ص = 9$$

$\therefore$ العددين هما 11, 9.



مثال 11:

إجمالي ثمن شراء تذاكر مسرحية لـ 2 من الشباب و 3 من الأطفال هو 16 دينارًا بينما ثمن الشراء لـ 3 شباب وطفلين 19 دينارًا. أوجد ثمن شراء تذكرة كل من الشباب والأطفال.

الحل

نفترض أن ثمن شراء تذكرة الشباب $أ$ دينار، ثمن شراء تذكرة الأطفال $ح$ دينار.

$$(1) \quad 2أ + 3ح = 16$$

$$(2) \quad 3أ + 2ح = 19$$

نحذف $ح$

$$(3) \quad 2أ + 3ح = 16 \quad \text{بضرب (1) } \times 2 \quad 4أ + 6ح = 32$$

$$(4) \quad 3أ + 2ح = 19 \quad \text{بضرب (2) } \times 3 \quad 9أ + 6ح = 57$$

$$\text{بجمع (3) + (4)} \quad 13أ = 89$$

$$أ = 5$$

بالتعويض عن قيمة $أ = 5$ في المعادلة (1).

$$16 = 2 \times 5 + 3ح$$

$$6 = 3ح$$

$$\therefore ح = 2$$

$\therefore$ ثمن تذكرة الشباب 5 دنانير، الأطفال ديناران.

مثال 12:

كان عُمر محمد قبل خمس سنوات مضت ثلاثة أمثال عُمر ابنه عادل، وبعد خمس سنوات من الآن سيصبح عُمر محمد ضعف عُمر ابنه. أوجد عمريهما الآن.

الحل

نفرض عُمر محمد = س ، نفرض عُمر عادل = ص

قبل 5 سنوات :

كان عُمر محمد = س - 5

عمر عادل = ص - 5

∴ س - 5 = 3 (ص - 5)

3 ص = 15

(1) س = 3 ص - 10

بعد خمس سنوات من الآن:

يصبح عُمر محمد س + 5

عُمر عادل ص + 5

∴ س + 5 = 2 (ص + 5)

2 ص = 10

(2) س = 2 ص + 5

بمعادلة الطرفين

3 ص - 10 = 2 ص + 5

3 ص - 2 ص = 10 + 5

∴ ص = 15

بالتعويض عن قيمة ص = 15 في المعادلة (2).

س = 2 (15) + 5

س = 35

∴ عُمر محمد 35 سنة، عُمر ابنه عادل 15 سنة.

تمرين 4و

- 1- مجموع عددين 15 والفرق بينهما 1. أوجد العددين.
- 2- مجموع عددين 8 والفرق بينهما 12. أوجد العددين.
- 3- مجموع عددين 7 والفرق بين ضعف أكبر العددين وأصغرهما يساوي 5. أوجد العددين.
- 4- أوجد العددين اللذين ضعف أكبرهما مضافاً إلى أصغرهما يساوي صفراً، و 3 أمثال أكبرهما ناقص أصغرهما يساوي 5
- 5- يزيد طول بطاقة مستطيلة بمقدار 2 سم عن عرضه، فإذا كان محيط المستطيل = 68 سم. أوجد الطول والعرض.
- 6- درجة العلوم تقل 15 درجة عن درجة الرياضيات لأحد الطلاب. فإذا كان مجموع الدرجتين 145 درجة، أوجد درجة كل مادة.
- 7- أوجد العددين اللذين ضعف أولهما وثلاثة أمثالهما ناتجهما 19 وثلاثة أمثالهما ناقص الثاني يساوي واحد.
- 8 - أوجد عددين بحيث يكون مجموع ثلاثة أمثالهما الأول وضعف الثاني يساوي 12 بينما ضعف الأول ناقص الثاني يساوي واحد.

11- عُمر السيد عمر قبل خمس سنوات مضت كان أربعة أمثال عُمر حفيدته ماجدة وبعد خمس سنوات من الآن سوف يكون عُمر السيد عمر ثلاثة أمثال عُمر ماجدة، أوجد عمريهما الآن.

12- أ ب ح مثلث متساوي الأضلاع.
(أ) أوجد قيمة س، ص.
(ب) أوجد المحيط.



9- ثلاثة كتب باللغة الإنجليزية، وأربعة كتب للرياضيات سعرها 78 ديناراً بينما كتابان باللغة الإنجليزية وثلاثة كتب للرياضيات سعرها 56 ديناراً أوجد سعر كتاب الإنجليزي وكتاب الرياضيات.

10- كان عمر ماجدة قبل أربع سنوات مضت ثلاثة أمثال عمر فاطمة وبعد 4 سنوات من الآن سوف يكون عمر ماجدة ضعف عمر فاطمة، أوجد عمريهما الآن.

ملخص

1- العددان اللذان يحققان زوجاً من المعادلات الآتية يسمى حل المعادلتين.

2- الطرق الجبرية الثلاث الأكثر استخداماً لحل المعادلتين الآتيتين هي:

(أ) طريقة معادلة المقادير.

(ب) طريقة التعويض.

(ج) طريقة الحذف.

3- الحل البياني:

نقطة تقاطع الخطين هي حل زوج المعادلات الآتية.

رياضيات ممتعة

سئل ولد عن عدد أخوته فقال إذا لم احسب نفسي فإن عدد البنات يساوي عدد البنين، وسئلت اخته فقالت إذا لم احسب نفسي فعدد البنين ضعف عدد البنات فكم عدد كل من البنين والبنات؟



ورقة المراجعة 4

قسم أ

1- حل الزوج التالي من المعادلات الآتية:

$$5 \text{ ص} = 3 \text{ س} + 4$$

$$5 \text{ ص} = 4 \text{ س} - 3$$

2- حل الزوج التالي من المعادلات الآتية:

$$3 \text{ س} + 4 \text{ ص} = 5$$

$$\text{ص} = 4 - \text{س}$$

3- حل الزوج التالي من المعادلات الآتية:

$$\text{س} + \text{ص} = 4$$

$$\text{س} - \text{ص} = 2$$

4- حل الزوج التالي من المعادلات الآتية:

$$3 \text{ س} + \text{ص} = 22$$

$$2 \text{ س} + \text{ص} = 17$$

قسم ب

5- مجموع عددين هو 30 والفرق بينهما هو 4، كون زوجًا من المعادلات الآتية وأوجد العددين.

6- حل الزوج التالي من المعادلات الآتية:

$$3 \text{ س} + 2 \text{ ص} = 6$$


$$\text{ص} - 2 \text{ س} = 10$$

7- حل الزوج التالي من المعادلات الآتية:

$$4 \text{ س} + 3 \text{ ص} = 2$$

$$2 \text{ س} + \text{ص} = 2$$

8- أ ب ح د مستطيل.



(أ) أوجد قيمتي س، ص.

(ب) ثم أوجد مساحة المستطيل.

قسم ج

9- عمر إبراهيم قبل عامين كان ثلاثة أمثال عمر علي وبعد 3 أعوام من الآن سوف يكون عمر إبراهيم فقط ضعف عمر علي. كون زوجًا من المعادلات الآتية وأوجد عمريهما الآن.

10- انقل وأكمل الجداول الآتية للعلاقة $\text{ص} = 4 \text{ س} - 3$, $\text{ص} = -2 \text{ س} + 3$

جدول العلاقة

$$\text{ص} = -2 \text{ س} + 3$$

س	0	2	4
ص	-1		

جدول العلاقة

$$\text{ص} = 4 \text{ س} - 3$$

س	0	2	4
ص	-3		

مستخدمًا كل 2 كم لتمثل وحدة واحدة من محور السينات، 1 كم لتمثل وحدة واحدة من محور الصادات ارسم بيانيًا العلاقة.

$$\text{ص} = 4 \text{ س} - 3$$

$$\text{ص} = -2 \text{ س} + 3 \text{ حيث صفر } \geq \text{س} \geq 4$$

من الرسم حل زوج المعادلات الآتية:

$$\text{ص} = 4 \text{ س} - 3$$

$$\text{ص} = -2 \text{ س} + 3$$


اشتهر أرشميدس بصيحته "وجدتها!" وجريه عارياً عبر شوارع مدينة سيراكيوز في صقلية عندما توصل إلى طريقة لمعرفة كمية الفضة التي استخدمها الصانع في التاج لغش الملك.



كان أرشميدس عالماً رياضيات إغريقي عاش في القرن الثالث قبل الميلاد.


توصل أرشميدس أيضاً إلى طريقة حساب حجم الكرة. وقد أثبت أن حجم الكرة يساوي ثلثي حجم الأسطوانة التي لها نفس نصف قطر الكرة وارتفاع مساوٍ لقطرها. لن ندرس الإثبات في هذا الكتاب.

وقد طلب نقش الكرة والأسطوانة المرسومة في الشكل المقابل على قبره بعد وفاته. ولقد توفي عام 212 قبل الميلاد.



- في نهاية هذا الفصل سوف تكون قادراً على
- إيجاد طول القوس، أو الزاوية المركزية التي تقابله، أو طول نصف قطره بمعلومية أي معلومتين.
 - إيجاد مساحة القطاع الدائري، أو الزاوية المركزية، أو طول نصف قطره بمعلومية أي معلومتين.
 - إيجاد مساحة القطاع الدائري، أو طول قوسه، أو طول نصف قطره بمعلومية أي معلومتين.
 - إيجاد المساحة السطحية، والحجم، ومساحة القاعدة، والطول، والعرض، والارتفاع للهرم.
 - إيجاد مساحة السطح المنحني للمخروط، وحجمه، ومساحة قاعدته، وارتفاعه الجانبي، وطول نصف قطره قاعدته.
 - إيجاد المساحة السطحية للكرة، وحجمها، وطول نصف قطرها.

Arc Length



طول القوس

1-5

القوس جزء من محيط الدائرة يقابل على سبيل المثال القوس $\widehat{AB}$ الزاوية 70° عند مركز الدائرة (O). القوس $\widehat{AB}$ المبين يسمى القوس الأصغر بينما القوس $\widehat{A'B'}$ يسمى القوس الأكبر.



يقابل القوس θ الزاوية θ عند مركز الدائرة (O).

نذكر أننا تعلمنا في الكتاب السابق أن محيط الدائرة التي طول نصف قطرها r تعطي بالعلاقة $C = 2\pi r$. وبما أن π عدد ليس له قيمة دقيقة، فإننا نقرب π إلى $\frac{22}{7}$ أو 3.14 لتبسيط الحساب.

أنشطة



لدراسة العلاقة بين النسب الآتية

(ب) $\frac{\text{طول القوس}}{\text{محيط الدائرة}}$

(أ) $\frac{\theta}{360}$

(أ) باستخدام برنامج الرسم الهندسي.

خطوات النشاط

- 1- للوصول إلى البرنامج انقر مرتين على أيقونة (GSP) من على الديسك توب (سطح المكتب).
- 2- استخدم Compass tool . وارسم دائرة مركزها أ وطول نصف قطرها 3 سم.
- 3- استخدم Straightedge tool لرسم نصف قطر الدائرة من المركز (أ) إلى نقطة ب على محيط الدائرة . ارسم نصف قطر آخر من المركز أ إلى النقطة ج على محيط الدائرة.

ملحوظة

يمكن عمل هذا النشاط باستخدام برنامج هندسي أو بالبحث عن نموذج باستخدام جدول الطريقتان مشروحتان.

برنامج الرسم الهندسي

النحيطي GSP

هو أداة قوية من أدوات تكنولوجيا

المعلومات للإنشاء الهندسي.

فيما يلي بيان سريع بالأدوات

الرئيسية في البرنامج.

Selection Arrow Tool
لاختيار نقطة أو خط

Point Tool
لرسم نقطة

Compass Tool
لرسم دائرة

Straightedge Tool
لرسم خط مستقيم

Text Tool
لعنونة نقطة، خط، إلخ.

4- استخدم Text Tool لتحديد مركز الدائرة أ النقطة ب، ج على الدائرة.

5- اضغط مفتاح Shift إلى أسفل واستخدم Selection Arrow Tool للنقر على النقطة ب، أ، ج على التوالي.

6- اضغط Measure من Menu Bar واختار زاوية. (الزاوية ب أ ج سوف تعرض كما يلي $\angle B A C = \dots$).

7- ضاعط مفتاح Shift إلى أسفل استخدم Selection Arrow Tool للنقر على النقطة ب، ج والقوس ب ج على التوالي.

8- انقر Measure من Menu Bar واختار طول القوس Arc Length (طول القوس ب ج سوف يرسم كطول $\widehat{BC}$ على $\odot A = \dots$)

9- استخدم Selection Arrow Tool وانقر محيط الدائرة وعندئذ انقر Measure من Menu Bar واختار محيط الدائرة (تعرض محيط الدائرة $\odot A = \dots$)

10- انقر Measure من Menu Bar واختار آلة حاسبة. (سوف تظهر آلة حاسبة على الشاشة).

11- انقر على

• العبارة "طول القوس $\widehat{BC}$ على $\odot A = \dots$ " (على الشاشة).

• عندها "/" علامة القسمة من الآلة الحاسبة.

• العبارة "محيط الدائرة $\odot A = \dots$ و.

• في النهاية "Ok" على الآلة الحاسبة.

(النسبة " $\frac{\text{طول القوس } \widehat{BC} \text{ على } \odot A}{\text{محيط الدائرة } \odot A} = \dots$ جدها على الشاشة)

12- كرر الخطوة رقم 10 وانقر على العبارة "الزاوية م $\angle B A C = \dots$ " ثم اتبعها "/" على الآلة الحاسبة و360 (أيضاً على الآلة الحاسبة).

الخطوة التالية انقر Unit button على الآلة الحاسبة واختار Degrees.



(النسبة " $\frac{\angle B A C}{360} = \dots$ سوف تظهر)

13- قارن النسب التي حصلت عليها من الخطوتين 11، 12. هل هي متساوية؟

14- استخدم Selection Arrow tool وانقر على النقطة ج لتغيير الزاوية ب أ ج (لاحظ أن طول نصف قطر الدائرة ثابت). أي قيمة تتغير وأي قيمة لا تتغير؟ هل النسب في الخطوتين 11، 12 متساوية؟

15- استخدم Selection Arrow Tool ثم انقر على النقطة ب وغير طول نصف القطر (ليس من الضروري المحافظة الزاوية ب أ ح ثابتة لأنه من الصعب التحكم فيها).
هل النسب متساوية في الخطوتين 11، 12؟

(ب) البحث عن نموذج يعمل قائمة للقيم المختلفة للنسبتين

طول القوس محيط الدائرة	$\frac{\theta}{360}$	θ	
		180°	
		90°	
		45°	


استخرج النسب في العمودين الأخيرين.

بدل العمودان الأخيران على أن النسب متطابقة ولهذا نحصل على

$$\frac{\theta}{360} = \frac{\text{طول القوس}}{\text{محيط الدائرة}}$$

يمكن تعميم نتائج النشاط السابق بالاستقراء..

$$\frac{\theta}{360} = \frac{\text{طول القوس } s}{\pi \cdot 2}$$




النتيجة
بالاستقراء



مثال 1:

أوجد طول القوس s باعتبار $\pi = \frac{22}{7}$ وبقابل زاوية مركزية مقدارها 45°




الحل

$$\begin{aligned} \frac{45}{360} &= \frac{\text{طول القوس } s}{\pi \cdot 2} \\ \therefore \text{طول القوس } s &= \frac{45}{360} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 7 \\ &= 5.5 \text{ كم} \end{aligned}$$

مثال 2:

أوجد الزاوية المركزية في دائرة طول نصف قطرها 9 كم تقابل قوساً طوله 11 كم. (اعتبر $\pi = \frac{22}{7}$)




الحل

$$\begin{aligned} \frac{\text{طول القوس}}{\pi \cdot 2} &= \frac{\theta}{360} \\ \text{الزاوية المقابلة للقوس } (\theta) &= \frac{360 \times 11}{9 \times \frac{22}{7} \times 2} \\ &= 360 \times \frac{7}{22} \times \frac{11}{9 \times 2} \\ &= 70 \end{aligned}$$

مثال 3:

أرادت سلوى عمل مروحة ورقية جميلة على شكل قوس طوله 44 سم، تقابله زاوية مركزية 140°، فما طول نصف قطر المروحة؟ (اعتبر $\pi = \frac{22}{7}$)




الحل


$$\begin{aligned} \frac{\text{طول القوس}}{2\pi r} &= \frac{\theta}{360} \\ \frac{44}{2\pi r} &= \frac{140}{360} \\ \frac{44}{2\pi r} &= \frac{7}{18} \\ 44 \times \frac{360}{140} &= 2\pi r \\ \frac{1}{2} \times \frac{7}{22} \times 44 \times \frac{360}{140} &= r \\ r &= 18 \text{ سم} \end{aligned}$$

تمرين 5 أ


1- معتبراً $\pi = \frac{22}{7}$ ، احسب طول القوس د ط في كل من أجزاء الدائرة التي مركزها و.




2- أوجد طول القوس $أ ب$ في كل من الدوائر الأتية التي مركزها $و$. (اعتبر $\pi = 3.14$) ثم أعط إجابتك مقربة إلى ثلاثة أرقام معنوية.




(i)




(ب)



(جأ)




(د)




(هأ)


(و)



(ز)



(ح)




3- دائرة طول نصف قطرها 9 كم، أوجد الزاوية المركزية التي تقابل الأقواس التي أطوالها معطاة فيما يلي (اعتبر $\pi = \frac{22}{7}$).


- | | |
|--------------|-------------|
| (أ) 11 كم | (ب) 27.5 كم |
| (جأ) 38.5 كم | (د) 44 كم |
| (هأ) 49.5 كم | (و) 5.5 كم |

4- معتبراً $(\pi = \frac{22}{7})$ ، أوجد طول نصف قطر كل من الدوائر التي قوسها $أ ب$ يقابل الزاوية المركزية المبينة في كل حالة الدائرة مركزها $و$.


(i)



(ب)




7- (i) معطياً $\left(\frac{22}{7} = \pi\right)$ ، أوجد طول القوس هـ ك المصين في الشكل.




(ب) أوجد محيط الشكل.

8- سلك دائري طول نصف قطره (ن) كم حول إلى قوس طول نصف قطره (ن3) كم، ما الزاوية المركزية التي تقابل هذا القوس ؟




9- عقرب دقيقة ساعة اليد طوله 21 كم، فما المسافة التي يتحركها طرف العقرب في 20 دقيقة؟ (اعتبر $\pi = \frac{22}{7}$)

(ج)



(د)




5- (i) أوجد طول الجانب المنحني للمنقلة النصف دائرية التي طول قطرها 10.5 كم (اعتبر $\pi = \frac{22}{7}$)
(ب) ثم أوجد محيط المنقلة.

6- (i) أوجد طول قوس ربع دائرة طول نصف قطرها 12.6 كم (اعتبر $\pi = \frac{22}{7}$).
(ب) ثم أوجد محيط ربع الدائرة.

Area of a Sector

مساحة القطاع الدائري

2-5



القطاع الدائري جزء من سطح دائرة محصور بين أي نصفي قطري دائرة. القطاع المظلل في الشكل أ و ب يسمى القطاع الأصغر بينما الجزء غير المظلل د أ و ب يسمى القطاع الأكبر.



دعنا ندرس النسب التالية:

$$\frac{\theta}{360} \quad (i)$$


$$\frac{\text{مساحة القطاع}}{\text{مساحة الدائرة}} \quad (ب)$$

ملاحظة

نذكر أننا تعلمنا في الكتاب السابق مساحة الدائرة التي طول نصف قطرها r ونعطى بالعلاقة المساحة πr^2


مساحة القطاع مساحة الدائرة	$\frac{\theta}{360}$	θ	
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} = \frac{180}{360}$	180°	نصف دائرة 
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} = \frac{90}{360}$	90°	ربع دائرة 
$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} = \frac{60}{360}$	60°	قطاع دائري 
$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8} = \frac{45}{360}$	45°	قطاع دائري 

ومن ثم يمكن التعميم بالاستقراء:



$$\frac{\theta}{360} = \frac{\text{مساحة القطاع الدائري د و ط}}{\pi r^2}$$

حيث r : طول نصف قطر الدائرة التي مركزها O .



مثال 4:

أوجد مساحة القطاع الدائري $د و ط$ ،
معطياً $\pi = \frac{22}{7}$

التعميم
بالاستقراء



الحل

$$\frac{\text{مساحة القطاع الدائري } \theta}{\pi \text{ سم}^2} = \frac{45}{360}$$

$$\therefore \text{مساحة القطاع الدائري } \theta = 5 = 7 \times 7 \times \frac{22}{7} \times \frac{45}{360}$$

$$19.25 = \frac{77}{4} \text{ سم}^2$$

مثال 5:

إذا كان قطاع في دائرة طول نصف قطرها 9 كم مساحته 99 كم²، أوجد الزاوية المقابلة عند مركز الدائرة. (اعتبر $\pi = \frac{22}{7}$).

الحل

$$\frac{\text{مساحة القطاع الدائري } \theta}{\pi \text{ سم}^2} = \frac{\theta}{360}$$

$$\frac{99}{9 \times 9 \times \frac{22}{7}} = \frac{\theta}{360}$$


$$360 \times \frac{7}{22} = \frac{99}{9 \times 9} = \theta$$

$$\therefore \text{الزاوية المقابلة } \theta = 140^\circ$$

مثال 6:

المسححة على الزجاج الأمامي لسيارة لعبة كهربية تمسح بزاوية 140° مكونة قطاعاً دائرياً مساحته 396 كم². معتبراً $\pi = \frac{22}{7}$ احسب طول نصف قطر القطاع.

الحل



$$\frac{\text{مساحة القطاع الدائري } \theta}{\pi \text{ سم}^2} = \frac{\theta}{360}$$

$$\frac{140}{360} = \frac{396}{\pi \text{ سم}^2}$$

$$\frac{360}{140} = \frac{\pi \text{ سم}^2}{396}$$

$$396 = \frac{360}{140} \times \frac{22}{7}$$

$$324 = \pi \text{ سم}^2$$

$$324 = \pi \text{ سم}^2$$

$$18 \text{ سم}^2$$

مثال 7:

مساحة قطاع طول نصف قطره 18 كم هي 198 كم²، احسب طول القوس في القطاع.

(1) $\frac{\theta}{360} = \frac{\text{طول القوس}}{\pi \times 2}$

(2) $\frac{\theta}{360} = \frac{\text{مساحة القطاع الدائري}}{\pi \times 2^2}$

من (1)، (2) نجد أن

(3) $\frac{\text{طول القوس}}{\pi \times 2} = \frac{\text{مساحة القطاع الدائري}}{\pi \times 2^2}$

المعادلة (3) مفيدة عندما يكون طول القوس مطلوب وتُعطى المساحة للقطاع والعكس صحيح. طول نصف قطر الدائرة π يجب بالطبع أن يُعطى أيضاً.

الحل

$$\begin{aligned} \frac{\text{مساحة القطاع الدائري}}{\pi \times 2^2} &= \frac{\text{طول القوس}}{\pi \times 2} \\ \frac{198}{18 \times 18 \times \pi} &= \frac{\text{طول القوس}}{18 \times \pi \times 2} \\ 18 \times \pi \times 2 \times \frac{198}{18 \times 18 \times \pi} &= \text{طول القوس} \\ &= 22 \text{ كم} \end{aligned}$$

مثال 8:

قطاع دائري طول نصف قطره 8 كم، طول قوسه 22 كم، احسب مساحة القطاع الدائري.

الحل


$$\begin{aligned} \frac{\text{طول القوس}}{\pi \times 2} &= \frac{\text{مساحة القطاع الدائري}}{\pi \times 2^2} \\ \frac{22}{8 \times \pi \times 2} &= \frac{\text{مساحة القطاع الدائري}}{8 \times 8 \times \pi} \\ 8 \times 8 \times \pi \times \frac{22}{8 \times \pi \times 2} &= \text{مساحة القطاع} \\ &= 88 \text{ كم}^2 \end{aligned}$$

مثال 9:

يعرض الشكل ربعين متساويين من دائرة طول نصف قطرها 7 سم تراكبا في المنطقة المظللة. (معتبراً $\pi = \frac{22}{7}$)، أوجد مساحة المنطقة المظللة.

الحل

استراتيجية الحل: جُلّ جزءاً من المشكلة عن طريق تبسيطها. حل لربع وحيد كما هو مبين.



حل المشكلات




نصف مساحة المنطقة المظللة في ربع واحد
= مساحة الربع - مساحة المثلث

$$7 \times 7 \times \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \times 7 \times \frac{22}{7} \times \frac{1}{4} =$$


$$24.5 - \frac{1}{2} \times 22 = 24.5 - 11 = 13.5$$

$$\therefore \text{المساحة المطلوبة} = 13.5 \times 2 = 27 \text{ سم}^2$$



تمرين 5ب


- (د) 1- معتبراً $\pi = \frac{22}{7}$ ، احسب مساحة القطاع الدائري
د و ط في كل ما يأتي:




(أ)

- 2- أوجد مساحة المنطقة المظللة في كل ما يأتي، معتبراً
 $\pi = 3.14$ ، وأعط إجابتك لأقرب ثلاثة أرقام معنوية.


(أ)




(ب)




(ب)




(ج)







(أ)



(ب)




(ج)




(د)

5- في كل من القطاعات الدائرية من (أ) إلى (و) اعتبر طول نصف القطر = 1 ثم احسب القيم المفقودة.


رقم	نصف القطر	مساحة القطاع	طول القوس
أ	14 سم	280 سم²	
ب	12 سم	96 سم²	
ج	11 سم		24 سم
د	9 سم		40 سم
هـ		108 سم²	36 سم
و		10 سم²	5 سم




(أ)



(ب)



(ج)



(د)


3- طول نصف قطر كل من القطاعات الدائرية الآتية والمعطاة مساحتها هو 12 سم. أوجد الزاوية المركزية التي تقابل قوس القطاع في كل حالة (اعتبر $\pi = \frac{22}{7}$)

- (أ) 44 سم² (ب) 132 سم² (ج) 308 سم² (د) 352 سم²


4- معطياً $\pi = \frac{22}{7}$ ، أوجد طول نصف قطر كل من القطاعات الدائرية المعطاة مساحتها.

- أ ب وتر في دائرة مركزها و ، نصف قطرها 6 كم. فإذا كانت $\angle أ و ب = 40^\circ$ ومعتبراً $(\pi = 3.14)$ احسب لأقرب ثلاثة أرقام معنوية.
(أ) طول القوس أ ب.
(ب) مساحة القطاع الدائري و أ ب.

- 11- في الشكل المرسوم أربعة أنصاف دوائر متطابقة، طول قطر كل منها 14 كم، تراكبت داخل المربع كما هو مبين، معتبراً $(\pi = \frac{22}{7})$ ، أوجد مساحة المنطقة المظلمة.



- 12- أربع دوائر متساوية طول نصف قطر كل منها 7 كم، تراكبت بحيث تقابلت محيطاتها عند نقطة واحدة كما هو مبين، احسب مساحة المنطقة المظلمة. $(\pi = \frac{22}{7})$





- 6- معتبراً $(\pi = \frac{22}{7})$ ، أوجد مساحة نصف الدائرة التي نصف قطرها 4.2 كم.


- 7- معتبراً $(\pi = 3.14)$ أوجد مساحة ربع الدائرة التي طول نصف قطرها 47 كم. مفرناً إجابتك لأقرب ثلاثة أرقام معنوية.

- 8- أوجد المساحة التي يغطيها عقرب الدقائق في ساعة يد خلال 40 دقيقة إذا كان طول العقرب 6.3 كم (اعتبر $\pi = \frac{22}{7}$).

- 9- احسب مساحة المنطقة المظلمة في كل من الأشكال التالية (اعتبر $\pi = \frac{22}{7}$).



-10




Pyramids

الأهرامات

3-5

الشكل المرسوم إلى اليمين هو هرم قاعدته مستطيلة الشكل أ ب ح د، كل ركن من أركان القاعدة موصول بخط يعرف بالحرف الجانبي إلى نقطة مشتركة فوق القاعدة تسمى رأس الهرم (ر). الهرم القائم هو الذي يقع ارتفاعه العمودي من الرأس عند مركز القاعدة. ليس من الضروري أن تكون قاعدة الهرم مستطيلة، فيمكن أن تكون أي مضلع ويسمى الهرم طبقاً لشكل قاعدته وعدد أضلاعها كما هو مبين بالرسم.

هرم
ثلاثيهرم
رباعيهرم
خماسيهرم
سداسي


لاحظ أن الأوجه الجانبية للهرم دائماً مثلثة الشكل.

Surface Area of a Pyramid


مساحة سطح الهرم 1-3-5

مثال 10:

ر أ ب ح د هرم رباعي قاعدته على شكل مربع طول ضلعه 12 سم، فإذا كان الارتفاع الجانبي للوجه المثلث هو 10 سم، أوجد إجمالي المساحة السطحية لهذا الهرم.



الحل



شبكة الهرم الرباعي
هي مربع وأربعة مثلثات
متساوية الساقين.
المساحة السطحية للهرم

$$\begin{aligned}
 &= \text{مساحة القاعدة} + \text{مساحة المثلثات الأربعة} \\
 &= (10 \times 12 \times \frac{1}{2}) \times 4 + 12 \times 12 = \\
 &240 + 144 = \\
 &384 \text{ سم}^2
 \end{aligned}$$

ملحوظة

الارتفاع الجانبي هو ارتفاع الوجه الجانبي

Volume of a Pyramid


2-3-5 حجم الهرم

يوضح الشكل المرسوم أن المكعب مكون من ثلاثة أهرامات متساوية ومشاركة في الرأس Q . قواعده هذه الأهرامات هي $ABCD$, $ADCE$, $ABCE$ في A وارتفاعاتها المتناظرة هي (AQ) , (HQ) , (FQ) ولهذا نحصل على

$$\begin{aligned} \text{حجم الأهرامات الثلاثة} &= \text{حجم المكعب} \\ 3 \times \text{حجم الهرم} &= C^2 \times E \\ \text{حجم الهرم} &= \frac{1}{3} C^2 E \\ \text{حيث } C^2 &= \text{مساحة مقطع المكعب (مساحة القاعدة) وحيث } E = \text{الارتفاع} \end{aligned}$$

ومن خلال التجارب يمكن أيضاً بيان أن حجم الهرم يساوي $\frac{1}{3}$ حجم المنشور المشترك معه في القاعدة، وارتفاعه يساوي ارتفاع الهرم.


افترض أننا أردنا ملء الخزان مستطيل الشكل (أدناه) بالماء، ستجد أنه علينا ملء وعاء الماء ثلاث مرات. الوعاء على شكل هرم مستطيل، وقاعدته، وارتفاعه نفس قاعدة، وارتفاع الخزان المكعب الشكل بالتالي فإن الوعاء حجمه $= \frac{1}{3}$ حجم الخزان.



يمكن تكرار ذلك بالنسبة للهرم بقواعده المختلفة، ولكن يبقى حجمه دائماً $\frac{1}{3}$ حجم المنشور الذي له نفس قاعدة ونفس ارتفاع الهرم.

ولهذا فإن

$$\begin{aligned} \text{حجم الهرم} &= \frac{1}{3} C^2 E \\ \text{حيث } C^2 &= \text{مساحة قاعدة الهرم وحيث } E = \text{ارتفاع الهرم} \end{aligned}$$



ملحوظة


المنشور هو شكل ثلاثي الأبعاد له مقاطع متطابقة ويمكن تقطيع الشكل إلى مستويات متوازية بحيث نحصل على أوجه متطابقة في الشكل والحجم.

مستطيل المستطيلات هو منشور مستطيل الشكل.



مثال 11:

أوجد حجم الهرم المستطيل إذا كانت قاعدته $6 \text{ م} \times 8 \text{ م}$ وارتفاعه 10 م .




الحل

$$\begin{aligned} \text{حجم الهرم} &= \frac{1}{3} \times \text{ع} \\ &= \frac{1}{3} \times (8 \times 6) \times 10 \\ &= 160 \text{ م}^3 \end{aligned}$$

مثال 12:

أوجد ارتفاع الهرم المثلث (ويعرف أيضًا باسم الهرم الرباعي السطوح المثلثية) إذا كان حجمه 80 م^3 ومساحة قاعدته 24 م^2 .




الحل

$$\begin{aligned} \text{حجم الهرم المثلث} &= 80 \text{ م}^3 \\ 80 &= \frac{1}{3} \times \text{ع} \\ 80 &= \frac{1}{3} \times 24 \times \text{ع} \\ \therefore \text{ع} &= \frac{3 \times 80}{24} = 10 \text{ م} \end{aligned}$$

مثال 13:

هرم مربع ارتفاعه 9 م وحجمه 108 م^3 ، احسب
(أ) مساحة قاعدته.
(ب) طول كل جانب من جوانب القاعدة

الحل



$$\begin{aligned} \text{(أ) حجم الهرم} &= 108 \text{ م}^3 \\ 108 &= \frac{1}{3} \times \text{ع} \\ 108 &= \frac{1}{3} \times 9 \times \text{ع} \\ \therefore \text{مساحة القاعدة (ع)} &= \frac{3 \times 108}{9} \\ &= 36 \text{ م}^2 \end{aligned}$$

(ب) بما أن القاعدة مربعة


$$36 = \text{ل}^2$$

$\therefore$ طول الضلع (ل) = $\sqrt{36}$


$$= 6 \text{ م}$$

تمرين 5


1- بالنسبة للأهرامات المصمتة الآتية ارسم الشبكة
ثم احسب المساحة السطحية الكلية.




(i)



(ب)



(جـ)



(د)

2- أوجد حجم الأجسام المصمتة في السؤال الأول.

- 3- أوجد ارتفاع كل من الأهرامات التالية:
- (i) الحجم 72 م^3 ، مساحة القاعدة 36 م^2
- (ب) الحجم 168 م^3 ، مساحة القاعدة 63 م^2
- (جـ) الحجم 396 م^3 ، مساحة القاعدة 99 م^2

4- بالنسبة للأهرامات المربعة التالية :

- (i) احسب مساحة القاعدة.
- (ii) ثم أوجد طول ضلع القاعدة.
- (i) الحجم 98 م^3 ، الارتفاع 6 م .
- (ب) الحجم 216 م^3 ، الارتفاع 8 م .
- (جـ) الحجم 676 م^3 ، الارتفاع 12 م .


5- احسب القيم الناقصة في الجدول التالي للأهرامات
من (أ) إلى (ح) والتي لها طول (ل) العرض (العمق)
(ض) مساحة القاعدة (ر)، الارتفاع (ع) الحجم (ح).

ح	ع	ر	ل	ض	
	7 م		6 م	5 م	أ
	4 م		3 م	1.2 م	ب
144 م^3			9 م	8 م	جـ
34 م^3			5 م	3.4 م	د
112 م^3	8 م			6 م	هـ
67 م^3	6 م			5 م	و
168 م^3	9 م		8 م		ز
52 م^3	5 م			4 م	ح

4-5

المخروط


Cone



ارسم دائرة طول نصف قطرها (ل) على أي ورقة رسم. قص منها قطاعًا دائريًا بأي زاوية θ لها لسان عند أحد أطرافها المستقيمة. بعد ذلك اثن القطع والصق الحرفين الجانبيين معًا باستخدام اللسان. الشكل المكون يسمى **مخروطًا** حيث (ل) يعرف باسم **الارتفاع الجانبي المائل**.

1-4-5 مساحة السطح المنحني للمخروط Area of the Curved Surface of a cone

لاحظت من النشاط السابق أن السطح المنحني للمخروط الذي رأسه (ل) هو في الحقيقة قطاع دائري طول نصف قطره (ل).



فإذا كانت القاعدة الدائرية للمخروط طول نصف قطرها $\frac{1}{2}l$ ، فإن محيط الدائرة $= \pi \times \frac{1}{2}l$ ، وهو طول قوس القطاع الدائري. من الملاحظة الموجودة في مثال 7، نحصل على:

$$\frac{\text{مساحة القطاع الذي طول نصف قطره } l}{\text{مساحة الدائرة التي طول نصف قطرها } l} = \frac{\text{طول قوس القطاع الدائري الذي طول نصف قطره } l}{\text{محيط الدائرة التي طول نصف قطرها } l}$$

$$\frac{\frac{1}{2}\pi l^2}{\pi l^2} = \frac{\text{مساحة القطاع الدائري}}{\pi l^2}$$

$$\frac{1}{2}\pi l^2 = \text{مساحة القطاع الدائري} \times \pi l^2$$

$$= \pi l^2$$

بما أن مساحة القطاع الدائري هي نفسها مساحة السطح المنحني للمخروط
فإننا نحصل على:




مساحة السطح المنحني للمخروط $\pi r l$
حيث r طول نصف قطر القاعدة، l : راسم المخروط.

مثال 14:

أوجد مساحة السطح الكلية لمخروط مصمت طول نصف قطره 7 سم،
راسمه 25 سم (اعتبر $\pi = \frac{22}{7}$)

الحل




المساحة السطحية للمخروط
= مساحة السطح المنحني + مساحة القاعدة.
 $\pi r l + \pi r^2$
 $\pi (r + l) r$
 $(7 + 25) \times 7 \times \frac{22}{7}$
 $32 \times 7 \times \frac{22}{7}$
 $= 704 \text{ سم}^2$

مثال 15:

أوجد طول الراسم لمخروط مساحة سطحه المنحني 19.14 سم²
وطول نصف قطره 2.1 سم ($\pi = \frac{22}{7}$)


الحل



مساحة السطح المنحني = 19.14 سم²
 $\pi r l = 19.14$
 $19.14 = l \times 2.1 \times \frac{22}{7}$
 $\therefore$ طول الراسم (l) = $\frac{1}{2.1} \times \frac{7}{22} \times 19.14$
 $= 2.9 \text{ سم}$

مثال 16:

أوجد مساحة قاعدة مخروط مساحة سطحه المنحني 40.7 كم^2 وراسمه 3.7 كم . (اعتبر $\pi = \frac{22}{7}$)




الحل

$$\begin{aligned}
 \text{مساحة السطح المنحني للمخروط} &= 40.7 \text{ كم}^2 \\
 \pi r \times \text{ل} &= 40.7 \text{ كم}^2 \\
 40.7 \text{ كم}^2 &= 3.7 \times r \times \frac{22}{7} \\
 \therefore \frac{1}{3.7} \times \frac{7}{22} \times 40.7 &= r \\
 r &= 3.5 \\
 \therefore \text{مساحة قاعدة المخروط} &= \pi r^2 \\
 38.5 \text{ كم}^2 &= 3.5 \times 3.5 \times \frac{22}{7} =
 \end{aligned}$$

مثال 17:

الشكل الموضح لربع دائرة نصف قطرها 28 كم . فما طول نصف قطر قاعدة المخروط الذي يمكن تكوينه من القوس أ ب ؟



الحل

إستراتيجية الحل هي إيجاد علاقة بين محيط قاعدة المخروط وبين طول القوس أ ب. بما أن المحيط يتكون من القوس. محيط القاعدة الدائرية للمخروط = طول القوس أ ب.

$$\begin{aligned}
 (28) \times \pi \times 2 \times \frac{1}{4} &= \pi r^2 \\
 \frac{(28) \times \pi \times 2 \times \frac{1}{4}}{\pi^2} &= r \\
 28 \times \frac{1}{4} &= r \\
 r &= 7
 \end{aligned}$$

ملاحظة


لا نعوض عن قيمة π حيث يتم اختزالها فيما بعد.

تمرين 5

4- معتمراً $\pi = \frac{22}{7}$ ، احسب القيم الناقصة في الجدول التالي بالنسبة لكل من المخروطات من (أ) وحتى (ح) التي لها الراسم ل، طول نصف قطر القاعدة م.

	ل	م	مساحة القاعدة	مساحة السطح المنحني
أ	7 م	4.2 م		
ب	11.2 م	10.5 م		
ج		7 م		550 م ²
د		35 م		4070 م ²
هـ	29 م			1914 م ²
و	3.5 م			30.8 م ²
ز	14.8 م		616 م ²	
ح	12.5 م		38.5 م ²	

5- الشكل الموضح لثلاثة أرباع دائرة نصف قطرها 8 م، فما طول نصف قطر قاعدة المخروط عندما ينطبق > و، < و؟



1- معتمراً $\pi = \frac{22}{7}$ ، أوجد مساحة السطح المنحني لكل من المخروطات التالية إذا كان:

(أ) طول نصف القطر = 7 م

الراسم = 7.4 م

(ب) طول القطر = 8.4 م

الراسم = 5.8 م

(ج) طول نصف القطر = 7 م

الراسم = 25 م

2- معتمراً $\pi = 3.14$ ، أوجد مساحة السطح الكلية للمخروطات المصنعة التالية موضحاً إجابتك مقربة إلى ثلاثة أرقام معنوية.

(أ) نصف القطر = 4 م

الراسم = 5 م

(ب) القطر = 10 م

الراسم = 13 م

(ج) نصف القطر = 4 م


الراسم = 4.1 م

3- معتمراً $\pi = \frac{22}{7}$ ، أوجد مساحة السطح المنحني لمخروط مثلح الذي طول قطره 3.5 م وارتفاعه الجانبي 10 م.


Volume of a Cone

حجم المخروط 2-4-5

يمكن اعتبار الدائرة نتيجة لتتابع مضلعات منتظمة تتزايد عدد أضلاعها.



وبالمثل يمكن اعتبار المخروط نتيجة لتتابع أهرامات تتزايد عدد أوجهها .




ومن ثم يمكن اعتبار المخروط حالة خاصة من الهرم ولكن بقاعدة دائرية. أي أنه يمكن تطبيق نفس الصيغة الرياضية لحجم الهرم على المخروط.

$$\text{حجم المخروط} = \frac{1}{3} \times \text{مساحة القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

باعتبار أن القاعدة هي دائرة فإن مساحة القاعدة الدائرية $= \pi r^2$

ولهذا فإن




$$\text{حجم المخروط} = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

حيث r : نصف قطر قاعدة المخروط. h : ارتفاع المخروط.

$$\begin{aligned} \text{والآن فإن حجم الأسطوانة} &= \pi r^2 h \\ \text{حجم المخروط} &= \frac{1}{3} \pi r^2 h \\ \text{حجم الأسطوانة} &= \frac{1}{3} \times \text{حجم المخروط} \times 3 \\ \therefore \text{حجم المخروط} &= \text{حجم الأسطوانة} \end{aligned}$$

وبالمثل يمكن ببيان بطريقة تجريبية أن الماء الذي يملأ خزاناً أسطوانياً سوف يملأ 3 خزانات مخروطية مستطابقة طول نصف قطر كل منها يساوي طول نصف قطر الأسطوانة وارتفاع كل منها يساوي ارتفاع الخزان الأسطواني. ومن ثم يمكن القول بأن حجم المخروط $= \frac{1}{3}$ حجم الأسطوانة التي تشترك معه في طول نصف القطر وفي الارتفاع.



مثال 18:

أوجد حجم مخروط مصمت طول نصف قطر قاعدته 7 م، وارتفاعه 24 م.
(اعتبر $\pi = \frac{22}{7}$)



الحل

$$\begin{aligned} \text{حجم المخروط} &= \frac{1}{3} \pi r^2 h \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 24 \\ &= 1232 \text{ م}^3 \end{aligned}$$

مثال 19:

أوجد ارتفاع المخروط الذي طول نصف قطر قاعدته 21 م، وحجمه $\pi 8820 \text{ م}^3$.

الحل

$$\begin{aligned} \text{حجم المخروط} &= \pi 8820 \\ \pi 8820 &= \frac{1}{3} \pi r^2 h \\ \pi 8820 &= \frac{1}{3} \pi \times 21 \times 21 \times h \\ \therefore \text{ارتفاع المخروط، } h &= \frac{1}{\pi} \times \frac{1}{21} \times \frac{1}{21} \times \frac{3}{1} \times \pi 8820 = 60 \text{ م} \end{aligned}$$

مثال 20:

أوجد طول نصف قطر قاعدة مخروط ارتفاعه 3 م، وحجمه 12.56 م³. اعتبر $\pi = 3.14$

الحل

$$\begin{aligned} \text{حجم المخروط} &= 12.56 \text{ م}^3 \\ \therefore 12.56 &= \frac{1}{3} \pi r^2 h \\ 12.56 &= \frac{1}{3} \times 3.14 \times r^2 \times 3 \\ r^2 &= \frac{1}{3} \times \frac{3}{3.14} \times \frac{12.56}{1} = 4 \\ \therefore \text{طول نصف قطر قاعدة المخروط} &= \sqrt{4} = 2 \text{ م} \end{aligned}$$

تمرين 5

1- معطياً $\pi = \frac{22}{7}$ احسب حجم المخاريط المصنعة الآتية:

(أ) $r = 12 \text{ م}$ ، $h = 35 \text{ م}$

(ب) $r = 4 \text{ م}$ ، $h = 4.2 \text{ م}$

(ج) طول القطر = 7 م، $h = 1.2 \text{ م}$

2- أوجد ارتفاع كل من المخاريط التالية:

(أ) $r = 7 \text{ م}$

حجمه $\pi 392 \text{ م}^3$

(ب) $r = 4.2 \text{ م}$

حجمه $\pi 23.52 \text{ م}^3$

(ج) طول القطر = 4 م

حجمه $\pi 2.8 \text{ م}^3$

6- في هذا السؤال اعتبر $\pi = \frac{22}{7}$. مخروط دائري قائم قاعدته دائرة نصف قطرها 7 سم، وارتفاعه الرأسى 24 سم.



احسب:

(أ) مساحة قاعدته

(ب) حجم المخروط.

(ج) المخروط الذى طول نصف قطره قاعدته 10 سم، وارتفاعه 3 سم هو $\frac{1}{3} \pi$ م³ ع).

3- معبئاً $\pi = 3.14$ احسب ارتفاع كل من المخروطات التالية:

(أ) نصف قطره = 4 سم، حجمه = 50.24 سم³

(ب) نصف قطره = 2.5 م، حجمه = 78.5 م³

(ج) قطره = 10 سم، حجمه = 314 سم³

4- أوجد مساحة قاعدة كل من المخروطات الآتية:

(أ) الحجم = 100 سم³ ، الارتفاع = 10 سم

(ب) الحجم = 12.3 سم³ ، الارتفاع = 3 سم

(ج) الحجم = 45.6 م³ ، الارتفاع = 1.2 م

5- اعتبر $\pi = \frac{22}{7}$ ثم أوجد طول نصف قطر كل من المخاريط التالية:

(أ) الحجم = 10.78 سم³ ، الارتفاع = 21 سم

(ب) الحجم = 528 م³ ، الارتفاع = 14 م


(ج) الحجم = 6.6 سم³ ، الارتفاع = 0.7 سم

Surface Area of a Sphere

مساحة سطح الكرة

5-5

بعض أمثلة الكرات هي الأنواع المختلفة منها المستخدمة في رياضات مثل كرة تنس الطاولة، وكرة التنس، وكرة الأسكواش، وكرة القدم، وبما أن جميع هذه الكرات مفرغة (جوفاء) فإن مساحات أسطحها مهمة، حيث تشير إلى كمية المادة المطلوبة لصنعها.



يمكن إثبات عملياً أن قطعة من الخيط الرفيق ملفوفة حول كرة نصف قطرها r ، سوف تلتف أيضاً بالضبط حول السطح المنحنى لأسطوانة لها نفس طول نصف القطر r وارتفاعها $2r$ ولهذا:

مساحة سطح الكرة = مساحة السطح المنحنى للأسطوانة.

$$= 2\pi r \text{ ع [حيث ع الارتفاع].}$$

$$= 2\pi r (2r)$$

$$= 4\pi r^2$$

ومن ثم نحصل على :


مساحة سطح الكرة = $4\pi r^2$ حيث r طول نصف قطر الكرة.

6-5

حجم الكرة

Volume of a Sphere

مثال للكرة المصمتة هو كرة الأحمال. لحجم الكرة في هذه الحالة أهمية حيث يحدد كمية الفولاذ المطلوبة في صناعة كرات الأحمال.



وضعت في الشكل (أ) الكرة التي طول نصف قطرها r في أسطوانة لها نفس طول نصف القطر r وارتفاعها $2r$. وملأت الأسطوانة بالماء حتى حافتها. عند إزالة الكرة من الأسطوانة في الشكل (ب) فإن حجم الماء يحتل تمامًا $\frac{2}{3}$ الأسطوانة. يشير ذلك إلى أن الكرة احتلت $\frac{2}{3}$ حجم الأسطوانة. ولهذا فإن:

$$\begin{aligned} \text{حجم الكرة} &= \frac{2}{3} \times \text{حجم الأسطوانة.} \\ &= \frac{2}{3} \times \pi r^2 \times 2r \quad [\text{حيث } r \text{ ارتفاع الأسطوانة.}] \\ &= \frac{2}{3} \times \pi r^2 \times 2r \\ &= \frac{4}{3} \pi r^3 \end{aligned}$$

ومن ثم فإن

حجم الكرة = $\frac{4}{3} \pi r^3$ حيث r نصف القطر.

مثال 21:

معتبراً $(\pi = 3.14)$ ، احسب لأقرب ثلاثة أرقام معنوية.

(أ) مساحة السطح

(ب) الحجم

لكرة نصف قطرها 1.5 سم.

الحل

(أ) مساحة سطح الكرة $= 4\pi r^2$

$$= 4 \times 3.14 \times 1.5 \times 1.5$$

$$= 28.26$$

$= 28.3$ سم² (مقرّباً لأقرب 3 أرقام معنوية)

(ب) حجم الكرة $= \frac{4}{3}\pi r^3$

$$= \frac{4}{3} \times 3.14 \times 1.5 \times 1.5 \times 1.5$$

$$= 14.13$$

$= 14.1$ سم³ (مقرّباً لأقرب 3 أرقام معنوية)

ملاحظة

حل لأقرب أربعة أرقام معنوية
حين يكون الجواب مطلوب
تقريبه ثلاثة أرقام

مثال 22:

نصف كرة مجوف ذو سمك يمكن إهماله. حجمه 144π سم³. احسب:

(أ) طول نصف قطره

(ب) مساحة سطحه الخارجي (اكتب إجابتك بدلالة π).

الحل



(أ) حجم نصف الكرة $= \frac{2}{3}\pi r^3$

$$\therefore \frac{2}{3}\pi r^3 = 144\pi$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{2}{1} \times \pi r^3 = 144\pi$$

$$= 216$$

$\therefore$ طول نصف قطره $r = \sqrt[3]{216} = 6$ سم.

(ب) المساحة السطحية لنصف الكرة $= \frac{1}{2} \times 4\pi r^2$

$$= \frac{1}{2} \times 4 \times \pi \times 6 \times 6$$

$$= 72\pi$$

مثال 20:

مساحة سطح كرة يساوي 1386 سم². معتمراً $\pi = \frac{22}{7}$ ، احسب:
(أ) طول نصف قطرها. (ب) حجمها.

الحل

(أ) مساحة سطح الكرة = 1386 سم²

$$1386 = 4\pi r^2$$

$$1386 = 4 \times \frac{22}{7} \times r^2$$

$$\frac{7}{22} \times \frac{1}{4} \times 1386 = r^2$$

$$110.25 = r^2$$

$$r = \sqrt{110.25}$$

$$r = 10.5 \text{ سم}$$

(ب) حجم الكرة = $\frac{4}{3}\pi r^3$

$$10.5 \times 10.5 \times 10.5 \times \frac{22}{7} \times \frac{4}{3} =$$

$$4851 \text{ سم}^3$$

تمرين 5

1- معتمراً $\pi = 3.14$ احسب مقرباً لأقرب ثلاثة أرقام

معنوية ما يأتي:

(i) المساحة السطحية.

(ii) الحجم.

لكل من الكرات الآتية:

(أ) $r = 1$ سم.

(ب) $r = 14$ سم.

(ج) القطر = 14 سم.

(د) القطر = 2.5 سم.

2- في كل من الكرات الآتية والمعطى حجمها

(أ) الحجم = 288π سم³

(ب) الحجم = 36π سم³

أوجد

(i) نصف القطر

(ii) المساحة السطحية بدلالة π .

3- في كل من الكرات الآتية والمعطى مساحتها السطحية

(أ) المساحة السطحية = 616 سم²

(ب) المساحة السطحية = 154 سم²

اعتبر $\pi = \frac{22}{7}$ وأوجد مقرباً لأقرب وحدة:

(i) طول نصف القطر

(ii) الحجم

4- كرة من الرصاص طول نصف قطرها 6 سم صهرت

وحولت إلى قذيفة كروية متساوية.

(أ) احسب حجم كرة الرصاص بدلالة π .

(ب) أوجد طول نصف قطر القذيفة الكروية.

5- قبة على شكل نصف كرة طول قطرها 21 متراً. معتمراً

$\pi = \frac{22}{7}$ احسب مساحة الزجاج الملون المطلوب

لتغطيتها.

6- احسب لأقرب ثلاثة أرقام معنوية حجم الماء في عدد 3

طاسات نصف كروية إذا كان طول القطر الداخلي لكل

منها 10 سم إذا ملئت حتى حافتها.

(اعتبر $\pi = 3.14$).


7- معطياً $\pi = 3.14$ ، احسب لأقرب ثلاثة أرقام معنوية.

(i) مساحة السطح الكلية.


(ii) الحجم.

لكل من الأجسام المصنعة الآتية:


(i)



(ب)




(ج)



8- (i) استغرت أسطوانة دائرية مفرغة على قاعدة

دائرية أفقية طول نصف قطرها 10 سم.

وحتوى ماء لعمق 12 سم. أوجد حجم الماء.



(ب) كرة مصممة نصف قطرها 5 سم. أوجد حجم الكرة.

(ج) حجم كرة نصف قطرها $\frac{4}{3}\pi$ م³.

(جـ) إذا وضعت الكرة داخل الأسطوانة التي بها


ماء. أوجد مقدار الزيادة في عمق الماء.

(في هذا السؤال اعتبر $\pi = 3.14$).

9- أوجد النسبة بين المساحة السطحية لكرة ومساحة

السطح الكلية للأسطوانة المحيطة بهذه الكرة. كما

هو موضح بالشكل.




10- يبين الشكل كرة محاطة بمخروط دائري قائم

متساوي الأضلاع. أوجد النسب الآتية.

(i) $\frac{\text{مساحة سطح الكرة}}{\text{مساحة السطح الكلية للمخروط}}$

(ب) $\frac{\text{حجم الكرة}}{\text{حجم المخروط}}$





1- بالنسبة للقطاع الدائري د و ط،

$$(أ) \frac{\theta}{360} = \frac{\text{طول القوس د}}{2\pi r}$$

$$(ب) \frac{\theta}{360} = \frac{\text{مساحة القطاع د و ط}}{\pi r^2}$$

$$(ج) \frac{\text{مساحة القطاع د و ط}}{\pi r^2} = \frac{\text{طول القوس د}}{2\pi r}$$

(د) مساحة القطاع = $\frac{1}{2} \pi r^2$
بدلالة نصف القطر والطول

2- بالنسبة للهرم

مساحة سطحه = مجموع مساحة أوجهه + مساحة القاعدة
حجم الهرم = $\frac{1}{3} \times \text{ع} \times \text{م}$ (حيث م مساحة القاعدة)



3- بالنسبة للمخروط

مساحة السطح المنحني = $\pi r l$

مساحة سطحه الكلية = $\pi r^2 + \pi r l$

حجم المخروط = $\frac{1}{3} \pi r^2 \times \text{ع}$




4- بالنسبة للكرة

مساحة سطح الكرة = $4\pi r^2$


حجم الكرة = $\frac{4}{3} \pi r^3$

استقصاء الرياضيات

نذكر شبكة المكعب. إنها تتكون من ستة أوجه وإذا طوينا بطول الخطوط الداخلية للشبكة وزاوجنا النقطات الحروف المتطابقة يمكننا تكوين مكعب.



الشكل الثاني هو أيضاً شبكة لمكعب حيث يمكن طيها بطول الخطوط داخل الشبكة لتكون المكعب.



يوجد 11 شبكة مختلفة للمكعب. أوجد التسع شبكات الأخرى للمكعب. حاول استخدام مدخل منهجي لإيجاد الشبكات. يمكن استخدام مقص، ورقة مربعة، لاصق شفاف لتسهيل استقصاءك.

ورقة المراجعة 5

القسم أ

3- احسب القيمة الناقصة في الجدول التالي لكل من 3 أهرامات.

	(أ)	(ب)	(ج)
الطول	5 سم	6 م	8 سم
العرض	4 سم	6 م	
الارتفاع	3 سم		21 سم
الحجم		72 م^3	728 سم^3

4- معطياً $\frac{22}{7} = \pi$ احسب:

- (أ) مساحة سطح الكرة التي طول نصف قطرها 7 سم.
- (ب) حجم الكرة التي طول نصف قطرها $\frac{1}{2} 10$ سم.

القسم ب

غير مسموح باستخدام الآلة الحاسبة.


5- معطياً $\frac{22}{7} = \pi$ أوجد الزاوية التي تقابل قوس القطاع الدائري الذي مساحته 66 سم^2 . ونصف قطره 6 سم.

غير مسموح باستخدام الآلة الحاسبة.

1- معطياً $\frac{22}{7} = \pi$ احسب:

(أ) طول القوس د ط.

(ب) مساحة القطاع الدائري د و ط.



2- أبعاد 3 مخروطات هي كما يوضحها الجدول التالي. أوجد القيم الناقصة في الجدول.

الحجم	الارتفاع	مساحة القاعدة
	10 سم	30 سم^2
200 سم^3		40 سم^2
3 م^3	5 م	

(أ)

(ب)

(ج)

(ب) حجم هرم رباعي 196 سم³. فإذا كان ارتفاعه

12 سم، احسب:

(i) مساحة قاعدته.

(ii) طول أحد أحرف القاعدة.

القسم جـ

9- قوس من دائرة طوله 7 π سم ونصف قطره 18 سم.

(i) أوجد الزاوية المركزية التي تقابل القوس.

(ب) احسب مساحة القطاع الدائري معبراً عن

إجابتك بدلالة π .


10- (i) معبراً $\pi = 3.14$ ، احسب حجم المخروط الذي

طول نصف قطره 2.1 سم وارتفاعه 3.4 سم


معطياً إجابتك لأقرب رقم عشري واحد.

(ب) احسب مساحة السطح الكلية للهرم

المصمت المرسوم.




6- معبراً $\pi = \frac{22}{7}$ أوجد طول نصف قطر القطاع الدائري
أ و ب.




7- معبراً $\pi = \frac{22}{7}$ احسب مساحة المنطقة المظللة في

كل من الأشكال التالية، الأطوال المعطاة بالسم.



(i)



(ب)

8- (i) مساحة السطح المنحني لمخروط تساوي

220 سم² وطول نصف قطره 7 سم.

معبراً $\pi = \frac{22}{7}$ ، احسب الارتفاع.

المضلعات Polygons

6



مسطاط مئمن

فن "الغنجشوي" أو فن التنبؤ بالأشكال فن صيني معروف منذ أكثر من 3000 سنة. وهو يبرز أهمية الأشكال في تخطيط المباني. فيفصل الشكل المئمن الأضلاع فقط للمباني الضخمة أو المهمة مثل المعبد السماوي في مدينة بكين. وتفضل في هذا الفن الغرف المربعة أو المستطيلة عن الغرف الخماسية أو الرباعية شبه المنحرفة. وينتشر في الحدائق الصينية الفسطاط المسدس والمئمن الأضلاع.

لقد شيدت المباني في الصورة إلى اليمين وفقاً لأفكار فن "الغنجشوي" فهل تستطيع ملاحظة الأشكال متعددة الأضلاع في الصورة؟ تشبه العمارات شكل اليد اليسرى للإنسان حيث مبنى المعارض والمؤتمرات هو المعصم والأبراج الخمسة تمثل الأصابع. والنافورة في مهد الكف. هل يمكنك ذكر بعض أسماء المباني الموجودة في طرابلس والتي لها أشكال متعددة الأضلاع؟



في نهاية هذا الفصل سوف تكون قادراً على:


- تسمية أنواع المضلعات.
- حساب مجموع الزوايا الداخلة للمضلع.
- حساب الزوايا الخارجة للمضلع المنتظم.

Types of Polygon


أنواع المضلعات

1-6

المضلع شكل هندسي مغلق مستو يتكون من ثلاثة أو أكثر من القطع أو الجوانب. وللمضلعات أسماء مختلفة وفقاً لعدد أركانها (أو جوانبها).




تسمى المضلعات الباقية طبقاً لعدد أركانها (أو أضلاعها) كما يلي:



المضلع الذي تتساوى جميع أضلاعه في الطول وجميع قياسات زواياه يسمى **المضلع المنتظم**.

جميع المضلعات الأخرى تعتبر غير منتظمة.

القطر هو القطعة المستقيمة داخل المضلع والتي تصل بين رأسين غير متتاليين.




Sum of the Angles of a Polygon

مجموع قياسات زوايا المضلع

2-6

نعلم أن مجموع قياسات زوايا المثلث تساوي 180°. نذكر [من دراستك السابقة] أن الشكل الرباعي يمكن أن ينقسم إلى مثلثين. اعتبر المضلع أ ب ح د في الصفحة التالية.

إذا تم رسم القطر $أح$ فإن الشكل الرباعي ينقسم إلى مثلثين.



في $\Delta أ ب ح$ $^{\circ}180 = \hat{أ} + \hat{ب} + \hat{ح}$

في $\Delta أ ج د$ $^{\circ}180 = \hat{أ} + \hat{ج} + \hat{د}$

∴ مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي.


$$\hat{أ} + \hat{ب} + \hat{ح} + \hat{أ} + \hat{ج} + \hat{د} =$$

$$^{\circ}180 + ^{\circ}180 =$$

$$^{\circ}360 = ^{\circ}180 \times 2 =$$

لندرس الآن الشكل الخماسي.

قسم القطران $أ د$ ، $أ ح$ الشكل الخماسي إلى ثلاثة مثلثات.



في $\Delta أ ب ح$ $^{\circ}180 = \hat{أ} + \hat{ب} + \hat{ح}$

في $\Delta أ ج د$ $^{\circ}180 = \hat{أ} + \hat{ج} + \hat{د}$

في $\Delta أ هـ د$ $^{\circ}180 = \hat{أ} + \hat{هـ} + \hat{د}$

مجموع قياسات زوايا الشكل الخماسي:

$$= \hat{أ} + \hat{ب} + \hat{ح} + \hat{أ} + \hat{ج} + \hat{د} + \hat{أ} + \hat{هـ} + \hat{د} =$$

$$^{\circ}540 = 3 \times ^{\circ}180 = ^{\circ}180 + ^{\circ}180 + ^{\circ}180$$

بالمثل. يمكن إيجاد مجموع قياسات زوايا أي شكل مضلع عن طريق تفسيمة إلى

عدد من المثلثات.

عدد الأضلاع	الشكل المضلع	عدد المثلثات	مجموع قياسات الزوايا
3		1	$^{\circ}180$
4		2	$^{\circ}360 = ^{\circ}180 \times 2$
5		3	$^{\circ}540 = ^{\circ}180 \times 3$
6		4	$^{\circ}720 = ^{\circ}180 \times 4$
7		5	$^{\circ}900 = ^{\circ}180 \times 5$
n		n - 2	$^{\circ}180 \times (n - 2)$

1- مجموع قياسات الزوايا الداخلة لأي مضلع = $(2 - n) \times 180^\circ$ حيث n = عدد الأضلاع.

2- المضلع الذي جميع أضلاعه متساوية في الطول وجميع قياسات زواياه متساوية يسمى مضلعًا منتظمًا.
جميع المضلعات الأخرى تعتبر مضلعات غير منتظمة.

مثال 1:

أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلة للشكل الثماني الأضلاع.

الحل

مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمضلع = $(2 - n) \times 180^\circ$

∴ مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمثمن = $(2 - 8) \times 180^\circ$

$$= 1080^\circ = 180 \times 6$$

مثال 2:

أوجد قياس كل زاوية من الزوايا الداخلة للشكل التساعي المنتظم.

الحل

مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمضلع = $(2 - n) \times 180^\circ$

∴ مجموع قياسات التسع زوايا الداخلة للتساعي = $(2 - 9) \times 180^\circ$

$$= 180 \times 7$$

$$\therefore \text{قيمة كل زاوية من الزوايا الداخلة} = \frac{180 \times 7}{9} = 140^\circ$$

مثال 3:

مجموع قياسات الزوايا الداخلة للشكل المضلع هو 1440° كم يكون عدد أضلاع المضلع؟

الحل

افترض أن عدد أضلاع المضلع = n .

مجموع الزوايا الداخلة للشكل المضلع = 1440°

$$1440^\circ = (2 - n) \times 180^\circ$$

$$8 = \frac{1440}{180} = 2 - n$$

$$\therefore n = 2 + 8 = 10$$

المضلع له 10 أضلاع

مثال 4:

قياس كل من خمس زوايا داخلية في شكل سداسي (غير منتظم) 110°
احسب قياس الزاوية السادسة.

الحل

افترض أن قياس الزاوية السادسة = س

$$\text{مجموع قياسات زوايا الشكل الداخلة} = (2 - 6) \times 180^\circ$$

$$5 \times 110^\circ + \text{س} = (2 - 6) \times 180^\circ$$

$$550^\circ + \text{س} = (2 - 6) \times 180^\circ$$


$$550^\circ + \text{س} = 720^\circ$$

$$\text{س} = 720^\circ - 550^\circ = 170^\circ$$

Exterior Angles of a Polygon

الزوايا الخارجة للمضلع

3-6



في الشكل الخماسي المرسوم على اليسار
 $\angle ط, \angle ز, \angle ح, \angle ت, \angle د$ ، زوايا داخلة
 بينما $\angle ح, \angle ز, \angle ح, \angle ت, \angle د$ هي
 الزوايا الخارجة للمضلع

إذا فصلنا الزوايا الخارجة ولصقناها بجوار
 بعضها كما هو موضح في الشكل إلى
 اليمين فإنها ستكون زاوية مثل زاوية
 الدائرة الكاملة والتي قياسها 360° .

وعليه فإن مجموع قياسات الزوايا الخارجة للمضلع تساوي 360° .

كرر هذا الإجراء مع شكل سداسي وآخر سباعي ما مجموع قياسات الزوايا الخارجة لأي مضلع؟

مجموع قياسات الزوايا الخارجة لأي مضلع هو 360°

مثال 5:

أوجد قياس الزاوية الخارجة للشكل العشري المنتظم.

الحل

مجموع قياسات الزوايا الخارجة للشكل العشري المنتظم $= 360^\circ$

∴ مجموع قياسات 10 زوايا خارجة $= 360^\circ$

∴ قياس كل زاوية خارجة $= \frac{360}{10} = 36^\circ$

مثال 6:

أوجد عدد أضلاع مضلع منتظم إذا كان قياس كل زاوية من زواياه الداخلة تساوي 135° .

الحل

قياس كل زاوية داخلة $= 135^\circ$

∴ قياس كل زاوية خارجة $= 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$ (زوايا متجاورة على مستقيمين)

مجموع قياسات الزوايا الخارجة $= 360^\circ$

∴ عدد الأضلاع $= \frac{360}{45} = 8$



تمرين 16



1- اذكر اسم جميع الأشكال المختلفة التي تجدها في الشكل المستوي المعطى.

2- أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلة لكل من المضلعات الآتية:

(أ) الشكل السداسي (ب) الشكل التساعي.

3- أوجد قياس كل زاوية من الزوايا الداخلة:

(أ) للشكل الخماسي المنتظم.

(ب) الشكل الثماني المنتظم.

4- كم عدد الأضلاع الموجودة في مضلع إذا كان مجموع قياسات زواياه الداخلة

(أ) 900° (ب) 360° ؟

5- أربع من الزوايا الداخلة لشكل خماسي قياس كل منها 110° . أوجد قياس الزاوية الخامسة.

6- أ ب ح د هـ ف شكل سداسي. الزوايا أ، ب، ح، د، هـ، ف هي على الترتيب س $^\circ$ 2، س $^\circ$ 3، س $^\circ$ 4، س $^\circ$ 5، س $^\circ$ 120. أوجد قيمة س.



7- أوجد قياس الزاوية الخارجة في

(أ) الشكل المنتظم ذي (12) ضلعاً.

(ب) مثلث منتظم.

8- كم عدد الأضلاع في مضلع منتظم إذا كان قياس كل زاوية من الزوايا الداخلة هي:

(أ) 150° (ب) 144° ؟

9- إذا كان قياس الزاوية الداخلة 8 أمثال قياس الزاوية الخارجة في مضلع منتظم. أوجد.

(أ) قياس الزاوية الخارجة.

(ب) عدد أضلاع المضلع المنتظم.

10- إذا كانت الزوايا الخارجة للشكل الخماسي هي على الترتيب 2س $^\circ$ ، 3س $^\circ$ ، 3س $^\circ$ ، 3س $^\circ$ ، 4س $^\circ$. احسب قيمة س.


11- أنشئ شكلاً مسدساً منتظماً طول ضلعه 4 سم.

12- كل زاوية من الزوايا الداخلة في مضلع منتظم تساوي 156° . كم عدد أضلاع هذا المضلع ؟

13- خمس من الزوايا الداخلة لمسدس قياسها على الترتيب 100° ، 110° ، 125° ، 134° ، 140° . احسب قياس الزاوية الداخلة المتبقية.

14- إذا كان مجموع قياسات الزوايا الداخلة لمضلع يساوي 12 زاوية قائمة، أوجد عدد أضلاع هذا المضلع.

15-



(أ) يبين الشكل المرسوم ثلاثة أشكال خماسية منتظمة. أوجد قياس كل من

(i) $\hat{A}$

(ii) $\hat{D}$

(ب) أضيفت أشكال خماسية أخرى إلى هذه الأشكال الخماسية الثلاثة لتكوّن طوقاً مغلقاً من الأشكال الخماسية المنتظمة. خيط مضلع، كم يكون العدد الكلي للأشكال الخماسية التي تكوّن هذا الطوق ؟

ملخص

1- المضلع

- (أ) الحد الأدنى لعدد أضلاع أي مضلع هو ثلاثة أضلاع.
 (ب) مجموع قياسات الزوايا الداخلة لأي مضلع $= (n - 2) \times 180^\circ$ حيث $n =$ عدد الأضلاع.
 (ج) مجموع قياسات الزوايا الخارجة لأي مضلع $= 360^\circ$
 (د) المضلع المنتظم هو الذي تتساوى فيه أطوال أضلاعه وقياسات زواياه.


رياضيات ممتعة

الفسيقياء [التزيين برسم المربعات]

الفسيقياء هو نموذج الترصيع بالبلاط، بمعنى أنه عند تكرار شكل واحد أو مجموعة أشكال يتم ملء مساحة معطاة وفيما يلي بعض الأمثلة.



(ب)



ترصيع بفسيقياء المستطيلات حيث
طول المستطيل $= 2 \times$ العرض

(أ)



ترصيع بفسيقياء المثلثات المتساوية

1- استشف كلاً من الأشكال الآتية على قطع من الورق الملون، ثم انسخ عدة نسخ من كل شكل وضع النسخ الخاصة بكل شكل جنباً إلى جنب لتعرف أي الأشكال يمكن استخدامها في الترصيع بالفسيقياء.

(د)



(ج)



(ب)




(أ)



2- طريقة سهلة لرسم بعض أنماط الفسيقياء أو نماذج التخليط هي استخدام ورق المربعات أو ورق الرسم البياني. يمكن البدء بشكل أساسي يمكن استخدامه في الترصيع بالفسيقياء:




ثم اقطع نصف دائرة من أحد الجوانب وحولها إلى الجانب الآخر بحيث تحصل على شكل يمكن استخدامه في الترصيع بالفسيقياء:



انقل النموذج
الآتي وأكمل
التصميم.


3- أثبت الإغريق أن هناك ثلاثة مضلعات منتظمة فقط يمكن استخدامها في الترصيع بالفسيفساء: المثلث المتساوي الأضلاع، والمربع، والمسدس. استخدام المثلث المتساوي الأضلاع في الترصيع بالفسيفساء.

لاحظ أن ستة مثلثات متساوية الأضلاع تنطبق تمامًا حول النقطة (ف) ما هو القياس الذي ينبغي أن تكون عليه كل زاوية من الزوايا حول النقطة (ف)؟



استخدام المربعات في الترصيع بالفسيفساء

كم عدد المربعات التي تنطبق تمامًا حول النقطة (ف)؟ ماذا يجب أن يكون قياس كل زاوية حول النقطة (ف)؟



استخدام المسدس المنتظم في الترصيع بالفسيفساء

كم عدد المسدسات المنتظمة التي تنطبق تمامًا حول النقطة (ف)؟ وماذا يجب أن يكون عليه قياس كل زاوية حول النقطة (ف)؟



ماذا يمكن استنتاجه مما سبق؟

إذا تم استخدام مضلع منتظم في الترصيع بالفسيفساء، فإن عددًا تأمًا من الزوايا يجب أن ينطبق تمامًا حول الرأس (ف). لذا فإن قياس كل من الزوايا الداخلية يجب أن يكون عامل من 360°، وبما أن المثلث المتساوي الأضلاع له أقل عدد من الأضلاع فإن الزوايا يجب أن تكون 60° أو أكبر مثل 72°، 90°، 120°.

(أ) أي المضلعات المنتظمة لها زوايا داخلية تساوي 72°، 90°، 120°؟

(ب) أي المضلعات الثلاثة المنتظمة في (أ) لا يمكن استخدامها في الترصيع بالفسيفساء؟

ورقة المراجعة 6

- 1 - (i) احسب مجموع قياسات الزوايا الداخلة للشكل العشري.
- (ب) احسب قياس كل من الزوايا الداخلة للشكل العشري المنتظم.

3 - د ط ر ذ ت ي شكل سداسي قياسات زواياه الداخلة د. ط. ر. ذ. ت. ي هي على الترتيب س. س. س. س. س. س. 3 س. 5 س. 120°.

- (i) احسب قياس أكبر الزوايا الخارجة.
- (ب) احسب قياس أكبر الزوايا الداخلة.

- 2 - (i) كم عدد أضلاع مضلع منتظم إذا كان قياس كل من زواياه الخارجة = 45° ؟
- (ب) كم عدد أضلاع مضلع إذا كان مجموع قياسات زواياه الداخلة 1800° ؟



يبين الشكل المرسوم أعلاه كلمة صينية وتعني (هناءً مضاعفًا) وهي متماثلة [بمعنى أن نصفها الأيمن يعتبر صورة طبق الأصل من نصفها الأيسر] نجد العديد من المباني، والأشكال الفنية، والأجسام الطبيعية متماثلة.

في نهاية هذا الفصل سوف تكون قادرًا على:


- التحقق من الأشكال المستوية التي لها خط تماثل، وتعيين موضع خطوط التماثل.
- التحقق من الأشكال المستوية التي تعرض التماثل الدوراني، وتعيين موضع مركز التماثل الدوراني.
- تحديد رتبة التماثل الدوراني للشكل المستوي.
- تحديد خواص تماثل المضلعات.
- التحقق من المجسمات المصمتة التي تعرض التماثل المستوي، وتعيين موضع مستويات التماثل.
- التحقق من المجسمات المصمتة التي تعرض التماثل الدوراني، وتعيين موضع محاور التماثل الدوراني.
- تحديد رتبة التماثل الدوراني لمجسم مصمت حول محور معطى.
- تحديد خواص التماثل للمنشور، والهرم، والأسطوانة، والجروط.

Line Symmetry of Plane Figures التماثل الخطي في الأشكال المستوية

1-7

عندما ننظر حولنا نرى العديد من الأشكال التي تبدو متزنة من حيث أن لها نصفين كل منهما يشبه الآخر. لننظر إلى سعاد. إذا رسمنا خطًا يمر بمنتصف جسدها سوف نرى أنها تملك العديد من (الأعضاء) التي تتشابه مع بعضها على جانبي الخط. تماثل على سبيل المثال قدمها اليمنى قدمها اليسرى. يدها اليمنى تتوافق مع يدها اليسرى. انظر إلى وجه سعاد سوف ترى عينيها وأذنيها أيضًا في اتزان على جانبي الخط. لاحظ أيضًا أن الخط يقسم أنفها وفمها إلى نصفين متزيين على جانبيه. يوجد اسم خاص يعطي لهذه الخاصية، إنها تسمى تماثلًا وحيث أن التماثل يتضمن جزأين متزيين حول خط، فإن هذا الخط يسمى خط التماثل.

خط التماثل



مثال 1:

حدد خطوط التماثل للأشكال المرسومة أدناه:

(ب)

(أ)




الحل

(أ) يقسم الخط المنقط الورقة إلى جزأين متزيين.




(ب) هذا الحرف له خط تماثل. خط تماثل رأسي وخط تماثل أفقي.



ملحوظة

أسهل طريقة للحصول على خط التماثل هو تحويل الموضع الذي يمكنك عنده طي الورقة إلى جزأين بحيث يتطابق كل جزء تمامًا على الجزء الآخر.


يمكن تكوين الأشكال التماثلية عن طريق طي وتقطيع الورقة، وفيما يلي مثال لذلك.



سوف تلاحظ أن النقطة أ تنزح مع النقطة أ' وأن النقطتين تبعدان بمسافة متساوية عن خط التماثل وبالمثل فإن النقط ب، ب' أيضاً تبعدان بمسافة متساوية عن خط التماثل وكذلك النقط ج، ج'. ولهذا فإن خط التماثل هو العمود المنصف للقطعة المستقيمة أ أ'، ب ب'، ج ج'.

مثال 2:

انقل وأكمل الصورة الآتية بحيث تتماثل حول الخط المنقط.




الحل


مثال 3،

اكتب معادلة خط التماثل للشكل البياني المعطى

$$ص = س^2 - 4س$$



الحل



معادلة خط التماثل هي $س = 2$

تمرين 17

1- انقل الصور الآتية ثم حدد خطًا واحدًا للتمائل في كل

منها.



(i)



(ب)



(ج)



(د)



(هـ)



(و)



(ز)



(ح)

2- انقل الحروف الآتية ثم حدد خطًا واحدًا للتمائل لكل

منها.



(i)



(ب)



(ج)



(د)



(هـ)



(و)



(ز)



(ح)



(ط)



(ي)

3- انقل الأشكال الآتية ثم حدد خطين للتماثل في كل

منها.

(i)



(ب)



(جـ)



(د)



(هـ)



(و)



(ز)



(ح)



4- كم عدد خطوط التماثل الموجودة في كل شكل من الأشكال التالية؟

(i)



(ب)



(جـ)



(د)




(هـ)



(و)



(ز)




(ح)



(ط)







(هـ)

5- انقل كلًا من الأشكال الآتية على ورقة رسم بياني
مستخدماً الخط المنقط أ ب كخط تماثل. ارسم
النصف الآخر من الشكل.


(i)




(و)




(ب)




(ج)




(د)




(ز)




(ح)





(ط)




(ي)

6- أي الأشكال البيانية لها خط تماثل واحد فقط؟


للشكل الذي له خط تماثل واحد فقط اكتب معادلة

خط التماثل.


(i)




(ب)




(ج)




(د)



(هـ)




(و)



التمائل الدوراني في الأشكال المستوية

Rotational Symmetry of Plane figures

اصنع نسخة للشكل أدناه من الورق المقوى. ضع دبوس رسم خلال النقطة (و) في الورق المقوى ليتمر عبر قطعة ورق موضوعة على لوح لين.





ثم استنشف الخط المحيط بالشكل على قطعة الورق. وعنون النقاط تماماً مثل التي على الورق المقوى.

أدر الشكل المقوى 180° . سوف نلاحظ تطابق الشكل المقوى تماماً على الشكل المستنشف. والنقاط د, هـ, ر على الشكل المقوى أصبحت فوق النقاط أ, ب, ج بالشكل المستنشف على التوالي.



أدر الشكل المقوى 180° أخرى. في هذه المرة سوف ينطبق الشكل المقوى على المستنشف ولكن تصبح النقاط أ, ب, ج بالورق المقوى فوق النقاط د, هـ, ر بالشكل المستنشف على التوالي. بمعنى آخر يمكن القول بأن الشكل المقوى عاد إلى موضعه الأصلي.

ولذا فإن الشكل المقوى ينطبق تماماً على الشكل المستنشف مرتين أثناء عملية دورانه إلى موضعه الأصلي. أي أن هذا الشكل له تماثل دوراني من الرتبة 2 حول النقطة (و) والتي نعرف بمركز التماثل الدوراني. الأشكال التالية لها تماثل دوراني من رتب أخرى:



الصورة المرسومة لتفاحة إلى اليمين. عند إدارتها حول النقطة (و)، فإنها تنطبق على نفسها فقط عند رجوعها إلى نفس موضعها الأصلي بمعنى بعد استكمالها دورة كاملة. نقول ليس لها تماثل دوراني، حيث أنها تنطبق على محيطها بطريقة واحدة فقط، بمعنى أنها يجب أن تكمل دورة واحدة كاملة قبل أن تنطبق على محيطها، ويمكن أيضاً القول بأن رتبة هذا التماثل الدوراني 1.



ملحوظة

يقال إن الشكل يمتلك تماثلاً دورانياً إذا كان له تماثل دوراني من الرتبة 2 أو أكثر.


يقال إن الشكل له تماثل دوراني حول نقطة (و) إذا كان بدورانه حول النقطة و ينطبق على الخط المحيط به على الأقل مرة واحدة قبل استكمالها دورة كاملة.

مثال 4،

لكل من الأشكال التالية، حدد

(i) عدد خطوط التماثل

(ii) رتبة التماثل الدوراني



الحل

(أ) (i) عدد خطوط التماثل = 2

(ii) رتبة التماثل الدوراني = 2

(ب) (i) عدد خطوط التماثل = 3

(ii) رتبة التماثل الدوراني = 3

(ج) (i) عدد خطوط التماثل = 4

(ii) رتبة التماثل الدوراني = 4

ملحوظة

(أ) (ii) عندما يدور الشكل 180° فإنه ينطبق على محيطه الأصلي وعندما يدور 180° مرة أخرى ينطبق مرة ثانية على محيطه. ولهذا فإنه في الدورة الكاملة (360°) يكون قد انطبق على محيطه الأصلي مرتين ولهذا فإن التماثل الدوراني في هذه الحالة يكون من الرتبة 2.



(د) (i) عدد خطوط التماثل = 1

(ii) رتبة التماثل الدوراني = 1


مثال 5:

لكل من الأشكال التالية،

(i) انقل الرسم .

(ii) حدد مركز التماثل الدوراني بالعلامة (x).

(iii) حدد رتبة التماثل الدوراني.



تماثل دوراني من
الرتبة الثالثة

تماثل دوراني من
الرتبة الثانية

تماثل دوراني من
الرتبة الرابعة

مثال 6:

انقل الأشكال التالية على ورق رسم بياني. (و) هي مركز التماثل الدوراني. أكمل كل شكل بحيث تكون رتبة تماثله الدوراني كما هو محدد.




تماثل دوراني من
الرتبة الرابعة


تماثل دوراني من
الرتبة الثالثة

الحل

(أ)



(ب)



تمرين 7ب

1- لكل من الأشكال التالية حدد

(i) عدد خطوط التماثل.

(ii) رتبة التماثل الدوراني.


(أ)



(ب)



(ج)



(د)



(هـ)



(و)



(ز)



(ح)



(ط)



(ي)




2- لكل من الأشكال التالية:

(i) انقل الشكل المرسوم.


(ii) حدد مركز التماثل الدوراني بالعلامة (x).

(iii) حدد رتبة التماثل الدوراني.




الرتبة 4

(ب)



الرتبة 4

(جـ)



الرتبة 6

(د)

4- اكتب قائمة بالحروف الأجنبية الكبيرة بدءاً من A

إلى Z، التي لها تماثل دوراني من

(أ) الرتبة 2.


(ب) الرتبة 3.

(جـ) الرتبة 4.

(د) رتبة لا نهائية (لا يمكن عدّها).



(أ)



(ب)



(جـ)



(د)


3- انقل الأشكال التالية في ورق رسم بياني. مستخدم

النقطة (و) كمركز للتماثل الدوراني أكمل كل شكل

بحيث تكون رتبة التماثل الدوراني الخاصة به كما هو

محدد بالشكل.

(أ)



الرتبة 2

Symmetry of Polygons

تماثل المضلعات

3-7


سوف تدرس في النشاطات التالية خطوط التماثل وخواص التماثل الدوراني للمضلعات المختلفة والتي تتضمن أنواعًا مختلفة من المثلثات والأشكال رباعية الأضلاع.

نشاطات



1- لكل من المثلثات الآتية.

- انقل الرسم.
- ارسم خطوط التماثل بالنقط إن وجد.
- حدد مركز التماثل الدوراني إن وجد بالعلامة (X).





2- مستخدمًا نتائج النشاط السابق 1، انقل وأكمل الجدول التالي:

نوع المثلث	عدد خطوط التماثل	رتبة التماثل الدوراني
متساوي الساقين		
متساوي الأضلاع		
مختلف الأضلاع		

3- لكل من الأشكال الرباعية.

- انقل الرسم.
- ارسم خطوط التماثل (بالنقط) إن وجدت.
- حدد مركز التماثل الدوراني إن وجد بالعلامة (X).





4- مستخدماً نتائج النشاط 3، انقل وأكمل الجدول التالي.

نوع الشكل الرباعي	عدد خطوط التماثل	رتبة التماثل الدوراني
أ مربع		
ب مستطيل		
ج شبه منحرف		
د معين		
هـ متوازي أضلاع		
و طائرة ورقية		


5- بالنسبة لشبه المنحرف متساوي الساقين المبين.

- انقل الشكل.
- ارسم خطوط التماثل بالنقط إن وجدت.
- حدد مركز التماثل الدوراني إن وجد بالعلامة (x).
- حدد رتبة التماثل الدوراني.



6- لكل من المضلعات المنتظمة.

- (i) انقل الرسم
(ii) ارسم خطوط التماثل إن وجدت بالنقط.
(iii) حدد مركز التماثل الدوراني إن وجد بالعلامة (X).



7- مستخدمًا النتائج التي حصلت عليها من النشاطات 1, 3, 6 انقل وأكمل الجدول التالي لهذه المضلعات المنتظمة.

رتبة التماثل الدوراني	عدد خطوط التماثل	نوع المضلع
		أ مثلث متساوي الأضلاع
		ب مربع
		ج خماسي منتظم
		د سداسي منتظم
		هـ سباعي منتظم
		و ثمانى منتظم
		ز تساعي منتظم
		ح عشارى منتظم

8- مستخدمًا نتائج النشاط 7، استنتج.

- (i) عدد خطوط التماثل.
(ii) رتبة التماثل الدوراني.
بالنسبة للمضلع المنتظم الذي له:
(أ) 100 ضلع
(ب) (ن) من الأضلاع.

التعميم
بالاستقراء




1- الخط الذي يقسم الشكل المستوي إلى نصفين متساويين بحيث تناظر أي نقطة في الجانب الأيمن نقطة أخرى في الجانب الأيسر يعرف بخط التماثل.

في الشكلين التاليين:

الشكل (أ) ليس له خط تماثل.

الشكل (ب) له خطا تماثل.



2- يقال إن الشكل المستوي له تماثل دوراني حول نقطة (و) إذا كان بدورانه حول نقطة (و) ينتطبق مع محيطه المرسوم على الأقل مرة واحدة قبل أن يتم دورة كاملة.

في الشكلين التاليين:

الشكل (أ) له تماثل دوراني من الرتبة 1 (أي ليس له تماثل دوراني).

الشكل (ب) له تماثل دوراني من الرتبة 3 حيث مركز الدوران هو (و).

(ب)

(أ)



3- المضلعات المنتظمة التي لها عدد أضلاع (ن) لها (ن) من خطوط التماثل وتماثل دوراني من الرتبة (ن).

4- مستوى التماثل يقسم الجسم إلى قطعتين متطابقتين.

5- في الجسومات التالية:

الشكل (أ) ليس له مستوى تماثل.

(أ)

حجر غير منتظم



رياضيات ممتعة


في كل ما يأتي، كل سطح من السطوح الخارجية تم طلاؤه باللون الرصاصي.

(i) كم عدد وجوه المكعب التي تم طلاؤها؟

(ii) كم عدد المكعبات التي لها 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 وجوه مطلية؟

(ب)

(i)



ورقة المراجعة 7

القسم (i)

1- ارسم جميع خطوط التماثل الممكنة في كل من الأشكال التالية:

(ب)

(i)




(جأ)




2- أكمل كلاً من الأشكال التالية ليتماثل حول الخط المنقط أ ب.


(i)



(ب)



(جأ)



3- اكتب جميع حروف اللغة الإنجليزية في قائمة من A وحتى Z ثم حدد أي منها ليس له خط تماثل.

4- حدد

(i) عدد خطوط التماثل.

(ii) رتبة التماثل الدوراني لكل من



(ب) مثلث متساوي الساقين



(ل) مستطيل

القسم (ب)

5- حدد رتبة التماثل الدوراني لكل من :

(i) المربع

(ب) متوازي الأضلاع.

(جأ) المثلث المتساوي الأضلاع

(د) الطائرة الورقية.

(هـ) الخماسي المنتظم



6- الشكلان الآتيان لعيّن وسداسي منتظم على التوالي.



(i) كم عدد خطوط التماثل الموجودة في كل شكل؟

(ب) ما هي رتبة التماثل الدوراني في كل حالة؟


7- استخدم النقطة (و) كمركز للتمائل الدوراني وأكمل كل شكل بحيث يكون له تماثل دوراني من:
(i) الرتبة 2




(ب) الرتبة 4

8- حدد معادلة محور التماثل بالنسبة لكل شكل من الأشكال التالية.


(i) القطعة المستقيمة د ط




(ب) القطعة المستقيمة ر ذ




(جـ) المنحنى ص = س² - 4



(د) القطعة المستقيمة ت ي




(هـ) المنحنى ص = -س(س - 4)



التطابق والتشابه

Congruency and Similarity



تقدير الارتفاع لشجرة عالية أو مبنى عالٍ واحدة من المهارات الأساسية التي يتعلمها الكشاف. ولفعل ذلك عليه تطبيق مفهوم المثلثات المتشابهة.

وفي نهاية هذا الفصل سوف تكون قادراً على:

- التحقق من تطابق الأشكال متعددة الأضلاع وربط رؤوسها المتناظرة.
- إثبات تطابق المثلثين باستخدام الأضلاع الثلاثة (ضضض)، وضلعين وزاوية محصورة بينهما (ض ز ض)، وزاويتين وضلع (ز ض ز)، والمثلثين قائمي الزاوية معلومية وتر وضلع (و ض ق).
- التحقق من تشابه الأشكال متعددة الأضلاع والربط بين رؤوسها المتناظرة.
- إثبات تشابه المثلثين واستخدام خواص التشابه في المثلثين لإيجاد القيم المجهولة.
- تطبيق الصيغ الرياضية للأشكال المتشابهة.


$$\left(\frac{a}{b} \right) = \frac{1}{1}$$

$$\left(\frac{a}{b} \right) = \frac{c}{c}$$



انظر إلى الصور المبينة بأعلى نريد مقارنة الأحجام والأشكال من السهل رؤية تطابق الأشكال (أ)، (ب)، (ج) في الشكل والحجم ولكن الشكل (د) أصغر. وللمقارنة بين (أ)، و(ج) قد يكون قص شكل ووضع فوق الآخر سهلاً، وعند فعل ذلك سوف تجد أن الشكلين (أ)، (ج) لهما نفس الشكل والحجم، ولهذا نقول: أن الشكلين متطابقان.

جد أحياناً أنه من الأسير والأسهل مقارنة الأشكال عن طريق القياس، فإذا ما قسنا كل الأضلاع لكل من الأشكال التالية، سوف تجد أن:



إذا قارنا أطوال الأضلاع في المثلث الأول مع المثلث الثاني سوف تجد:


$$ا ح = ح ف, ب ح = د ف, ولكن ا ب \neq د ح$$

وعند مقارنة أطوال أضلاع المثلث الأول مع المثلث الثالث تجد أن:

$$ا ب = ق ل, ب ح = ق هـ, ا ح = هـ ل$$

وهذا يعني أن كل ضلع في المثلث الأول يناظر ضلعاً يتساوى معه في الطول في المثلث الثالث، وهنا نقول أن المثلثين متطابقان.

الأشكال المتطابقة لها نفس الشكل والحجم بحيث يمكن لكل شكل تغطية الشكل الآخر تمامًا، ويمكن مراجعته عن طريق القياس.



الشكلان الرباعيان المرسومان إلى أعلى متطابقان لأن
(أ) الأضلاع المتناظرة متساوية في الطول
(ب) الزوايا المتناظرة متساوية في القياس


أنشطة




1- استشف شكلًا من كل زوج، وضعه فوق الآخر لترى ما إذا كانا يغطيان بعضهما تمامًا. ومن ثم حدد أي زوج من هذه الأشكال متطابق وأيها غير متطابق.




2- من دون قياس حدد أي زوج من الأشكال الآتية متطابق.







3- بالنسبة لكل زوج من المثلثات الآتية استشف واحدًا منها على ورقة شفافة وضعه فوق الآخر لتقرر تطابقهما من عدمه.








4- قس أطوال أضلاع كل مجموعة من الأشكال الآتية واستنتج أي الأشكال متطابقة في كل مجموعة.





5- كل مما يلي زوج من الأشكال المتطابقة. أوجد الضلع الذي يتناظر الضلع أ ب، و الزاوية التي تتناظر $\angle$ أ.






(جـ)



(د)



(هـ)



(و)

Congruent Triangles

المثلثات المتطابقة


2-8

تبدو أحيانًا المثلثات متطابقة في حين أنها ليست كذلك، كما أننا لا نعطي دائمًا أطوال كل الأضلاع أو قياسات كل الزوايا. ومن المهم معرفة أي المعلومات نحتاجها لتكون قادرين على استنتاج تطابق المثلثين.

دعنا نعتبر الحالة التي رسم فيها المثلثان أ ب ح ، د ط م بحيث:

$$\begin{aligned} \angle 1 &= \angle د = 70^\circ \\ \angle ب &= \angle ط = 30^\circ \\ \angle ح &= \angle م = 80^\circ \\ ا ب &= د ط = 4 \text{ سم} \end{aligned}$$

هل المثلثان متطابقان؟




بالنظر إلى المثلثين أ ب ح ، د ط م يمكن القول بتطابقهما ، معلومية تساوي قياسات الزوايا المتناظرة ووجود ضلع يساوي نظيره في المثلث الآخر. لا نقول في هذه الحالة أن المثلثين لهما نفس الشكل فقط بل أن لهما نفس الحجم أيضاً. لاحظ هنا ضرورة معرفة قياس زاويتين فقط من الثلاث وليس قياس كل الزوايا في المثلثين. فالزاوية الثالثة يمكن الحصول عليها عن طريق استخدام قاعدة (مجموع قياسات زوايا المثلث = 180°). ولهذا فإن المثلثين يتطابقان إذا تساوى في أحدهما قياس زاويتين وطول ضلع مع زاويتين وضلع متناظر في المثلث الآخر. وهذه الحالة يطلق عليها (زاوية - ضلع - زاوية) أو (ز ض ز) كشرط لتطابق المثلثين.

ليكن لدينا الحالة التي رسم فيها المثلثان أ ب ح ، د ط م بحيث:


$$\begin{aligned} ا ب &= د ط = 5 \text{ سم} \\ ب ح &= ط م = 4 \text{ سم} \\ ا ح &= د م = 2 \text{ سم} \end{aligned}$$

هل المثلثان متطابقان؟




نلاحظ أن أي مثلث له هذه القياسات سيكون له نفس الشكل ، ولهذا فإن المثلثين متطابقان. ومن هنا فإن المثلثين يتطابقان إذا تساوت فيهما أطوال الأضلاع المتناظرة. ونسمى هذه الحالة أحياناً (ضلع - ضلع - ضلع) أو (ض ض ض) كشرط لتطابق المثلثين.

دعنا ننأمل حالة أخرى حيث نرسم المثلثان أ ب ح، د ط ر بحيث:



$$\begin{aligned} \angle ب &= \angle ط = 30^\circ \\ \angle ا &= \angle د = 3^\circ \\ \angle ح &= \angle ر = 2^\circ \end{aligned}$$

هل المثلثان متطابقان؟





نرى أن المثلثين المرسومين بالقياسات والزوايا المعطاة ليس لهما نفس الشكل ولا نفس المساحة. إذا عُلِمَ طولاً ضلعين فإن الزوايا بينهما (بمعنى أن $\angle ا, \angle د$) يجب أن تكون معلومة وتسمى الزوايا المحصورة. وفي الحالة أعلاه الزوايا المحصورة بين الضلعين غير متساوية في القياس بمعنى أن (قياس $\angle ا$ $\neq$ قياس $\angle د$) ومن ثم فإن المثلثين غير متطابقين. إلا أنهما يتطابقان إذا تساوى الضلعان وقياس الزاوية المحصورة بينهما. وتسمى هذه الحالة أحياناً (ضلع - زاوية - ضلع) أو (ض ز ض) كشرط لتطابق المثلثين.

ملحوظة

المثلثان أ ب ح، س ص ض متطابقان السبب ض ز ض.



وأخيراً بالنسبة للحالة الخاصة بالمثلثين قائمي الزاوية. نرى تطابقهما إذا تساوى الوتر وضلع في أحد المثلثين نظائرهما في المثلث الآخر، وتسمى أحياناً هذه الحالة (وتر - ضلع - القائمة) أو (و ض ق) كشرط لتطابق المثلثين.



على سبيل المثال، المثلثان أ ب ح، د ط ر متطابقان لأن:

$$\begin{aligned} \angle ب &= \angle ط = 90^\circ \text{ (زاوية قائمة)} \\ \angle ا &= \angle د = 5^\circ \text{ (الوتر)} \\ \angle ح &= \angle ر = 4^\circ \text{ (الضلع)} \end{aligned}$$

يمكن كتابة ذلك رمزياً $\triangle ا ب ح = \triangle د ط ر$ حيث " $=$ " تعني "يطابق" والرموز المتناظرة يجب أن تتراوح بشكل صحيح.

ينطبق المثلثان إذا حقق أي شرط من الشروط الآتية:

1- الأضلاع المتناظرة متساوية في الطول (ض ض ض):



2- تساوى ضلعان وقباس الزاوية المحصورة بينهما (ض ز ض):



3- تساوى قباس زاويتين وضلع متناظر (ز ض ز):




4- بالنسبة للمثلث قائم الزاوية: تساوى الوتر وضلع متناظر (و ض ق):



مثال 1:

حدد أيًا مما يأتي زوج من المثلثات المتطابقة موضحًا أسباب إجابتك.



الحل

$$وط = س ع$$

$$ط م = ع ص$$

$$م د = س ص$$


$$\therefore \Delta د ط م \cong \Delta س ع ص \text{ (ض ض ض)}$$

ملحوظة

يجب أن تتراوح رؤوس الزوايا المتناظرة بشكل صحيح

مثال 2:

حدد أيًا مما يأتي زوج من المثلثات المتطابقة موضحًا أسباب إجابتك.



الحل

$$أ ب = د هـ$$


$$ب ج = د هـ$$

$$أ ح = د ح$$

$$\therefore \Delta أ ب ح = \Delta د هـ ح \text{ (م. م. م.)}$$

مثال 3:

أوجد $\Delta ب$. ثم حدد أيًا مما يأتي زوج من المثلثات المتطابقة موضحًا سبب إجابتك.



الحل

$$\text{قياس } \Delta ب = 180 - 60 - 70 =$$

$$50 =$$

$$\text{قياس } \Delta ج = 180 - 60 - 50 =$$

$$70 =$$

$$\therefore \text{قياس } \Delta ب = \text{قياس } \Delta ج$$


$$ب ج = ج ح$$

$$\text{قياس } \Delta ب = \text{قياس } \Delta ج$$

$$\therefore \Delta أ ب ح = \Delta ج ح ز \text{ (م. م. ز.)}$$

مثال 4:

حدد أيًا مما يأتي زوج من المثلثات المتطابقة موضحًا سبب إجابتك.



الحل

$$\text{قياس } \Delta ب = \text{قياس } \Delta ج = 90 =$$

$$د ح = ج ح$$

$$ب ج = ج ح$$

$$\therefore \Delta ب د هـ = \Delta ج ح ز \text{ (م. م. ز.)}$$

ملحوظة

المثلثان أ ب ح، د هـ ح ليسا متطابقين وعلينا من تساوي ضلع واحد وزاويتين من المثلثين فالأضلاع المتساوية ليست متناظرة.

مثال 5:

بالنسبة للشكل المعطى درت، دمرط مستقيمان. أثبت أن المثلثين دطرط و دطر د ت دمر متطابقان.



الحل

$ط د = ط د$ (معطى)
 $د د = د د$ (معطى)
 $\angle د ط د = \angle د ت د$ (زوايا رؤوس متقابلة)
 $\therefore \Delta د ط د = \Delta د ت د$ (ض ر ض)

مثال 6:

بالنسبة للمثلثين المتطابقين الآتيين، أوجد قياسات الزوايا المجهولة المشار إليها.



الحل

$$\text{قياس } \angle ب = 180^\circ - 20^\circ - 60^\circ = 100^\circ$$


$$\Delta أ ب ح = \Delta د ع ف \text{ (ض ض ض)}$$

$$\therefore \text{قياس } \angle أ = \text{قياس } \angle د, \text{ قياس } \angle ب = \text{قياس } \angle ع, \text{ قياس } \angle ج = \text{قياس } \angle ف$$

$$\therefore \text{قياس } \angle أ = 100^\circ, \text{ قياس } \angle ب = 20^\circ, \text{ قياس } \angle ج = 60^\circ$$

مثال 7:

بالنسبة للمثلثين المتطابقين، أوجد أطوال الأضلاع المجهولة المشار إليها.



الحل



$$\Delta أ ب ح = \Delta د ع ف$$

$$\therefore ب ح = ع ف, د ح = د أ$$

$$أ = 4.2, ب = 5.16$$

$$ب ح = 4.2 \text{ سم}, أ ح = 5.16 \text{ سم}$$

مثال 8:

أوجد الزاوية المجهولة المشار إليها في Δ د ط ر.

الحل


 Δ د ط ر = Δ ع ص س (ض ض ض)قياس $\angle$ د = قياس $\angle$ ع

$$\angle د = 180^\circ - 110^\circ - 40^\circ$$

$$= 30^\circ$$

مثال 9:

أوجد قياس الزوايا المجهولة المشار إليها في الشكل المرسوم.



الحل

$$\angle د = 180^\circ - 20^\circ - 30^\circ$$


$$= 130^\circ$$

 Δ ا ب ح = Δ ا د ح (ض ض ض) $\therefore$ قياس $\angle$ ا = 30° قياس $\angle$ ب = 130° قياس $\angle$ ح = 20°

ملحوظة

ا ح مشترك في كل
من المثلثين

مثال 10:

أوجد الضلع المجهول والزاوية المجهولة المشار إليهما في الشكل المرسوم إذا كان
ب ح د، ا ح ح مستقيمين


الحل

 Δ ا ب ح = Δ ا د ح (ض ض ض)قياس $\angle$ ا = قياس $\angle$ ح أي قياس $\angle$ ا = 25°



ح د = ا ب أي ح د = 2 سم

1- حدد زوجي المثلثات المتطابقة في كل مجموعة من المجموعات الآتية. ثم وضح سبب إجابتك. كل الزوايا مقاسة بالدرجات وكل الأطوال مقاسة بالسنتيمترات (المثلثات رسمت لتبدو متطابقة حتى وإن كانت الحقيقة غير ذلك).


(أ)





(ب)





(ج)








(د)



(هـ)



(و)



د ح =
 ح ف =
 د ف = (ضلع مشترك)
 Δ د ح ف = (السبب)

(ج) ت ي س، ذ ي م - مستقيمان متقاطعان






ذ ي =
 قياس $\angle$ ذ ي ت = (السبب)
 ت ي =
 Δ ذ ي ت = (السبب)




(د)

قياس $\angle$ د م ط = (السبب)
 د ط =
 م ط ضلع
 Δ م د ط = (السبب)


3- أوجد جميع الأضلاع والزوايا المجهولة المشار إليها بالحروف في كل زوج من المثلثات المتطابقة التالية. كل الأضلاع مقاسة بالسنتيمترات



2- انقل وأكمل كلًا مما يأتي



قياس $\angle$ =
 ب ح =
 قياس $\angle$ ح =
 Δ أ ب ح = (السبب)










أ) > خط مستقيم.



ب) > خط مستقيم.



3-8 التشابه

Similarity



عندما يقوم المهندس المعماري بعمل تصميم هندسي لبنى فإنه لا يرسمه بنفس الحجم، وإنما يستخدم مقياس رسم مناسب لتصغيره ثم يقوم بإنتاج تصميم مشابه لما سيتم بناؤه.

وعندما يقوم المهندس الميكانيكي بإنشاء نموذج لسفينة أو طائرة، فإنه يحافظ على شكل السفينة، أما الحجم فإنه يصغره بمقياس رسم مناسب، ونقول أن هذا النموذج يشابه الجسم الأصلي.

الأشكال المتشابهة لها نفس الشكل ولكن ليس بالضرورة نفس المساحة.

في الشكلين المتشابهين يجب أن يتحقق ما يلي:

- تساوى الزوايا المتناظرة في القياس.
- تناسب الأضلاع المتناظرة في الطول.



بالإشارة إلى المضلعين أ ب ح د، د ط ر ز نجد أن:

$$\text{قياس } \triangle أ = \text{قياس } \triangle د$$

$$\text{قياس } \triangle ب = \text{قياس } \triangle ط$$

$$\text{قياس } \triangle ح = \text{قياس } \triangle ر$$

$$\text{قياس } \triangle د = \text{قياس } \triangle ز$$

أي أن الزوايا المتناظرة متساوية.

$$\text{وأيضاً، } 2 = \frac{5}{2.5} = \frac{أ ب}{د ط}$$

$$2 = \frac{3}{1.5} = \frac{ب ح}{ط ر}$$

$$2 = \frac{2.5}{1.25} = \frac{ح د}{ر ز}$$

$$2 = \frac{4}{2} = \frac{د ز}{ز أ}$$

أي أن الأضلاع المتناظرة لها نفس النسبة.

وهذا يشير إلى أن المضلعين أ ب ح د، د ط ر ز متشابهان. حيث أن الزوايا المتناظرة متساوية في القياس، والأضلاع المتناظرة متناسبة في الطول.

ملحوظة


لتسهيل الرجعية، يمكن كتابة الرؤوس المتناظرة في الشكلين المتشابهين واحداً فوق الآخر كما يلي:
المضلعان أ ب ح د متشابهان
د ط ر ز

Similar Triangles

المثلثات المتشابهة

4-8

تأمل المثلثين أ ب ح، د ط م.



نلاحظ أن هذين المثلثين لهما نفس الشكل حيث

$$\angle A = \angle D = 80^\circ, \angle B = \angle P = 70^\circ, \angle C = \angle M = 30^\circ$$

ولكن ليس لهما نفس المساحة. في الحقيقة أطوال أضلاع Δ د ط م ضعف أطوال الأضلاع التي تناظرها في Δ أ ب ح. يمكن أيضًا قول أن الأطوال المناظرة في Δ أ ب ح، Δ د ط م لها النسبة 1، 2. ونقول أن مثل هذين المثلثين متشابهان. وسوف نحتاج إلى كم أدنى من المعلومات للبرهنة على التشابه.

يتشابه المثلثان إذا تحقق أحد الشروط التالية:

- 1- تساوى قياس الزوايا المناظرة (ز ز ز) (إذا تساوى قياس زاويتين في مثلث، وقياس زاويتين في المثلث الآخر، فإن قياس الزاوية الثالثة في المثلث الأول تساوى قياس نظيرتها في المثلث الآخر).
- 2- أطوال الأضلاع المناظرة متناسبة.
- 3- إذا تناسب طولاً ضلعين متناظرين في المثلث، وتساوى قياس الزاوية المحصورة بينهما.

مثال 11

حدد ما إذا كان Δ أ ب ح يشابه Δ د ط م.



الحل

$$\text{في } \Delta \text{ أ ب ح، قياس } \angle B = 180^\circ - 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

$$\text{في } \Delta \text{ د ط م، قياس } \angle P = 180^\circ - 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

$$\therefore \text{ قياس } \angle A = \angle D$$

$$\text{قياس } \angle B = \angle P$$

$$\text{قياس } \angle C = \angle M$$


$\therefore$ المثلثان متشابهان (ز ز ز).

ملاحظة

لتسهيل الرجعية. يمكن كتابة الرؤوس المناظرة في المثلثين واحدًا فوق الآخر كما يلي
المثلثان Δ أ ب ح متشابهان Δ د ط م

مثال 12:

البت أن $\Delta أ ب ح$ يشابه $\Delta د ط س$.



الحل

$$\frac{2}{3} = \frac{أ ب}{د ط}$$

$$\frac{2}{3} = \frac{6}{9} = \frac{أ ح}{د س}$$


$$\Delta أ ب ح \sim \Delta د ط س$$

يناسب ضلعان متناظران ويحصرا زاوية متساوية

$\therefore \Delta أ ب ح$ يشابه $\Delta د ط س$.

مثال 13:

تحقق هل $\Delta أ ب ح$ يشابه $\Delta د ط س$ ؟



الحل

$$\frac{1}{2} = \frac{5}{10} = \frac{أ ح}{د ط}$$

$$\frac{1}{2} \neq \frac{3}{5} = \frac{أ ب}{د س}$$

زوج الأضلاع المتناظرة ليس لهما نفس النسبة.

$\therefore$ المثلثان غير متشابهين.

مثال 14:

أوجد قيمة س مع العلم بأن كل الأطوال بالسنتيمتر.



الحل

عندنا قياس $\angle A =$ قياس $\angle P = 110^\circ$

قياس $\angle B =$ قياس $\angle Q = 50^\circ$

قياس $\angle C =$ قياس $\angle R = 20^\circ$

$\therefore$ الزوايا المتناظرة متساوية في القياس.

$\therefore \triangle ABC \sim \triangle PQR$ متشابهان (ز ز).

ومن ثم فإن أطوال أضلاعهما المتناظرة متناسبة.

$$\text{أي } \frac{AC}{PR} = \frac{AB}{PQ}$$

$$\frac{1.5}{1} = \frac{S}{2}$$

$$S = 1.5 \times 2 = 3$$

مثال 15:

أوجد قيمة ص، ب في المثلثين الآتيين:



الحل

$$\frac{AC}{PR} = \frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{2}{1}$$

الأضلاع المتناظرة متناسبة.

$\therefore \triangle ABC \sim \triangle PQR$ متشابهان

$\therefore \angle A = \angle P$ ، $\angle B = \angle Q$

$\therefore \angle C = \angle R$ ، $\angle D = \angle E$

ملحوظة


من الأسهل جبرياً اعتبار الضلع المجهول كنسبة للنسبة الأولى.

لاحظ أن

$$\therefore \frac{AC}{PR} = \frac{AB}{PQ}$$

مثال 16:

بالنسبة للشكل الموضح أوجد طول $\overline{د ط}$ - جميع الأطوال بالسنتيمتر.



الحل

يمكن إعادة رسم الشكل كما هو موضح أدناه

$$\angle ط = \angle ب = 90^\circ$$

$\angle ح$ مشتركة في $\triangle د ط ح$ ، $\triangle ا ب ح$

وبما أن زاويتين مناضرتين متساويتان.



$\triangle د ط ح$ ، $\triangle ا ب ح$ متشابهان.

$$\therefore \frac{د ط}{ا ب} = \frac{ط ح}{ب ح}$$

$$\frac{20}{10} = \frac{ط ح}{3}$$

$$د ط = 3 \times \frac{20}{10}$$


$$د ط = 6 \text{ سم}$$



مثال 17:

ا ح ط، ب ح د مستقيمان، فإذا كان $\overline{ا ب} \parallel \overline{د ط}$ أوجد قيمة $س$ ، ص [جميع الأطوال بالسنتيمتر].

الحل



$\triangle ا ح ب = \triangle د ح ط$ (زوايا رؤوس متناظرة)

قياس $\triangle ا$ = قياس $\triangle ط$

قياس $\triangle ب$ = قياس $\triangle د$

$\therefore$ قياسات الزوايا المتناظرة متساوية.

$\therefore \triangle ا ب ح$ ، $\triangle د ط ح$ متشابهان (ر ر ر)

$$\therefore \frac{ا ح}{د ح} = \frac{ب ح}{ط ح} = \frac{ا ب}{د ط} \quad (\text{الاصلاح المتناظرة متساوية})$$

$$\frac{1.5}{س} = \frac{س}{2} = \frac{2}{4}$$

$$\frac{1.5}{س} = \frac{2}{4} \quad \text{و} \quad \frac{س}{2} = \frac{2}{4}$$

$$\frac{4 \times 1.5}{2} = س$$


$$\therefore س = 3 \text{ سم}$$

$$\frac{4}{4} = س$$

$$\therefore س = 1 \text{ سم}$$

1- انقل ثم أكمل التالي:

(i)




$$\angle A = 60^\circ = \angle D$$

$$\angle B = 40^\circ = \angle E$$

$$\angle C = 80^\circ = \angle F$$

∴ $\Delta ABC \sim \Delta DEF$ متشابهان

(ب)



$$\frac{2}{3} = \frac{3}{4.5}$$

$$\frac{3}{4.5} = \frac{4.5}{6.75}$$

$$\angle A = \angle D \text{ (زاوية محصورة)}$$

∴ $\Delta ABC \sim \Delta DEF$ متشابهان

2- اختر زوجي المثلثات المتشابهة موضحاً سبب إجابتك

[جميع الزوايا مقاسة بالدرجات. الأضلاع مقاسة

بالسنتيمترات] المثلثات رسمت لتبدو متشابهة وإن

كانت غير ذلك.

(i)





(ب)





(ج)



(د)




(هـ)




3- أوجد الزوايا والأضلاع المجهولة والمشار إليها في الأشكال المرسومة [كل الأطوال مفاصة بالسنتيمتر].


(هـ)




(و)



(ز)



(ح)




4- أوجد الأطوال المشار إليها في الأشكال المرسومة علماً

بأن أ و ط ، ب و د مستقيمان في الشكل المرسوم في


(أ) ، (ب) ، (ج)

[جميع الأطوال بالسنتيمتر]


(أ)






(أ)




(ب)




(ج)



(د)





Applications of Similarity

تطبيقات على التشابه


5-8

الهندسة لها الكثير من التطبيقات في حياتنا اليومية. وخاصة مفهوم التشابه.


مثال 18

بنت طولها 1.2 م وقفت على بعد 2.5 م من مصباح إضاءة في الشارع وألقت ظلًا على الأرض طوله 1.5 م فما ارتفاع مصباح الإضاءة؟

الحل



بإعادة رسم الشكل هندسيًا مرة أخرى . نجد أن الشكل



ينقسم إلى مثلثين متشابهين في س د ل ت د



$$\text{وحيث } \frac{LT}{DQ} = \frac{DT}{DT}$$

$$\text{أي } \frac{س}{1.2} = \frac{4}{1.5}$$

$$\frac{1.2 \times 4}{1.5} = س$$

$$3.2 = \frac{48}{15} = \frac{4.8}{1.5}$$


ولهذا فإن ارتفاع مصباح الإضاءة 3.2 متر فوق سطح الأرض.

ملحوظة



الأضلاع المناظرة تكون في نفس النسبة. اضرب الطرفين في 1.2

تمرين 8 ج



2- عصا طولها 0.5 متر ألقت ظلًا طوله 3 أمتار. فما طول ظل عصا طولها 2 متر وضعت في نفس الموضع؟ ونفس الوقت




1- فتاة طولها 1.2 م ألقت ظلًا طوله 4.8 متر في وقت معين من الصباح . محمد طوله 1.8 متر . فما طول ظله إذا وقف في نفس الموضع في نفس الوقت؟



- 6- يرتكز طرف سلم على حائط طوله 1.5 متر، وطرفه العلوي على شجرة ارتفاعها 4 أمتار فوق سطح الأرض وطرفه السفلي على الأرض. فإذا كان الحائط يبعد 0.5 متر عن قاعدة السلم (القياس في مستوى سطح الأرض). أوجد المسافة الأفقية بين القاعدة والشجرة وقاعدة السلم.




- 7- قدر كشاف ارتفاع شجرة بإمسك مسطرة طولها 15 سم رأسياً على بعد 0.5 م أمامه. فإذا كان يبعد عن الشجرة مسافة 30 م كما هو موضح بالشكل فما هو طول الشجرة المقدر؟




- 8- أراد كشاف أن يقدر عرض نهر، مستخدماً شجرة على الشاطئ المقابل من النهر، غرس أعمدة رأسية في النقط أ، ب، ج، د كما هو موضح احسب عرض النهر المقدر.

- 3- يرتكز سلم على حائط طوله 1.5 متر، وطرفه العلوي على شجرة ارتفاعها 4 أمتار فوق سطح الأرض وطرفه السفلي على الأرض. فإذا كان الحائط يبعد 0.5 متر عن قاعدة السلم (القياس في مستوى سطح الأرض). أوجد المسافة الأفقية بين القاعدة والشجرة وقاعدة السلم.




- 4- سلم طوله 2.5 م يرتكز على حائط رأسي ونهايته الأخرى على الأرض تبعد عن قاعدة الحائط 1.5 متر، فإذا وضعت دعامة رأسية طولها 0.2 م بين الحائط والسلم كما هو موضح



- (أ) فكم يرتفع الحائط عند النقطة المسنود عليها رأس السلم؟
(ب) ما هي المسافة الأفقية من طرف قاعدة السلم إلى الدعامة الرأسية؟

- 5- فتاة طولها 1.5 م تقف على بعد 2.5 متر من عمود إنارة في الشارع ألفت ظلًا طوله 2.5 م. فكم يرتفع عمود الإضاءة عن سطح الأرض؟



Areas of Similar Figures

مساحات الشكلين المتشابهين

6-8

سنساعدك الأنشطة التالية في استقصاء النسبة بين مساحتي الشكلين المتشابهين.


مهارة التفكير: استنباط




في نهاية الأنشطة سوف يمكنك استخدام مهارة الاستنباط للحصول على صيغة رياضية للنسبة بين مساحتي الشكلين المتشابهين.

أنشطة



- 1- (أ) ما مساحة مربع طول ضلعه 2 كم ؟
 (ب) ما مساحة مربع طول ضلعه 6 كم ؟
 (ج) أوجد النسبة بين طولي ضلعي المربعين.
 (د) أوجد النسبة بين مساحتي المربعين.
- 2- (أ) ما مساحة مربع طول ضلعه 3 كم ؟
 (ب) ما مساحة مربع طول ضلعه 15 كم ؟
 (ج) أوجد النسبة بين طولي ضلعي المربعين.
 (د) أوجد النسبة بين مساحتي المربعين.
- 3- (أ) ما مساحة دائرة نصف قطرها 7 كم ؟ (اكتب إجابتك بدلالة π).
 (ب) ما مساحة دائرة نصف قطرها 21 كم ؟ (اكتب إجابتك بدلالة π).
 (ج) أوجد النسبة بين طولي نصفي قطري الدائرتين.
 (د) أوجد النسبة بين مساحتي الدائرتين.
- 4- (أ) ما مساحة دائرة طول نصف قطرها 14 كم ؟ (اكتب إجابتك بدلالة π).
 (ب) ما مساحة دائرة طول نصف قطرها 70 كم ؟ (اكتب إجابتك بدلالة π).
 (ج) أوجد النسبة بين طولي نصفي قطري الدائرتين.
 (د) أوجد النسبة بين مساحتي الدائرتين.
- 5- 
 (أ) هل المثلثان أ ب ح. د ط ر متشابهان؟
 (ب) أوجد النسبة بين أطوال الأضلاع المناظرة.
 (ج) أوجد النسبة بين مساحتي المثلثين.



- (أ) هل المستطيلان متشابهان؟
 (ب) أوجد النسبة بين أطوال أضلاعهما المتناظرة.
 (ج) أوجد النسبة بين مساحتيهما.

يتضح من الأنشطة السابقة أن النسبة بين مساحتي الشكلين المتشابهين ليست هي النسبة بين أطوال أضلاعهما المتناظرة. وبتعميم النتائج:

النسبة بين مساحتي الشكلين المتشابهين هي مربع نسبة طولي ضلعين متناظرين فيهما.

$$\left(\frac{x}{y}\right)^2 = \frac{A}{B}$$

مثال 19:

مستطيل مساحته 15 م^2 . أوجد مساحة مستطيل آخر طوله 3 أضعاف طول المستطيل الأول وعرضه 3 أضعاف عرض المستطيل الأول.

الحل

∵ المستطيلان متشابهان

$$\left(\frac{x}{y}\right)^2 = \frac{A}{B} \quad \therefore$$

$$\left(\frac{3}{1}\right)^2 = \frac{A}{15}$$

$$\therefore \text{مساحة المستطيل الثاني } A = 9 \times 15 = 135 \text{ م}^2$$

ملاحظة

أو، ولـ تشير إلى مساحة وطول ضلع الشكل الأول بينما x و y تشير إلى مساحة وطول ضلع الشكل الثاني. لاحظ تشابه المستطيلين أو تناسب أبعادهما المتناظرة.

مثال 20:

دائرتان مساحتهما 80 م^2 ، 20 م^2 . أوجد النسبة بين طولي نصفي قطريهما.

الحل

$$4 = \frac{80}{20} = \frac{x}{y} = \left(\frac{x}{y}\right)^2$$

$$2 = \sqrt{4} = \frac{x}{y}$$

∴ النسبة بين طولي نصفي قطري الدائرتين 2 : 1

تمرين 8 د

6- طائرتان ورقبتان متشابهتان مساحتهما 30 م^2 و 7.5 م^2 . أوجد النسبة بين أطوال أضلاعهما المتناظرة.

7- بتكلفت طلاء نيشان دائري 18 ديناراً، أوجد تكلفة طلاء نيشان آخر يشابهه وطول نصف قطره ضعف طول نصف قطر الأول.

8- بتكلفت شراء لوح زجاجي 11.5 دينار، أوجد تكاليف شراء لوح زجاجي آخر ليعطي نافذة ثلاثة أمتال حجم الأولى.

9- استخدم مقياس رسم في عمل تصميم هندسي لمبنى بنسبة 1 : 50 فما هي نسبة مساحة جزء من التصميم إلى المساحة المناظرة في المبنى الفعلي؟

10- تكلفة تغطية فناء 900 دينار، أوجد تكلفة تغطية فناء آخر بنفس المادة المستخدمة إذا كانت أبعاده نصف أبعاد الفناء الأول.

11- (i) هل ΔABC و ΔDEF متشابهان؟
(ب) إذا كان ΔABC مساحته 30 م^2 و ΔDEF مساحته 67.5 م^2 .

(i) أوجد النسبة بين طولي الضلعين المناظرين.

(ii) إذا كان $AC = 10.7 \text{ م}$ احسب DF .

(iii) إذا كان $EF = 16.8 \text{ م}$ احسب BC .



1- مربع مساحته 10 م^2 . أوجد مساحة المربع الذي طول ضلعه-

(أ) ضعف طول الأول

(ب) ثلاثة أمتال الطول

(ج) خمسة أمتال الطول

(د) ثمانية أمتال الطول

(هـ) نصف الطول

(و) مرة ونصف طول المربع الأول

2- دائرة مساحتها 8 م^2 . أوجد مساحة الدائرة التي طول نصف قطرها-

(أ) ضعف طول نصف قطر الأولى

(ب) ثلاثة أمتال طول نصف قطرها

(ج) ستة أمتال طول نصف قطرها

(د) عشرة أمتال طول نصف قطرها

(هـ) نصف طول نصف قطرها

(و) ربع طول نصف قطرها

(ز) مرة ونصف طول نصف قطرها

(ح) مرتان ونصف طول نصف قطرها

3- أوجد النسبة بين طولي ضلعين متناظرين في مثلثين متشابهين إذا كانت مساحتهما-

(أ) 5 م^2 و 20 م^2

(ب) 3 م^2 و 48 م^2

(ج) 18 م^2 و 2 م^2

(د) 6 م^2 و 1.5 م^2

(هـ) 108 م^2 و 3 م^2

(و) 1 م^2 و 100 م^2

(ز) 4 م^2 و 9 م^2

(ح) 72 م^2 و 50 م^2

(ط) 128 م^2 و 98 م^2


(ي) 63 م^2 و 175 م^2

(ك) 1 م^2 و 1 م^2

(ل) 1 م^2 و 1 م^2

4- قرص دائري مساحته 5 م^2 . أوجد مساحة قرص دائري آخر طول نصف قطره 3 أمتال طول نصف قطر القرص الأول.

5- متوازي أضلاع متشابهان لهما ضلعان متناظران طولهما 7 م و 9 م . أوجد النسبة بين مساحتهما.



12- إذا كان $AB = 7$ كم، $AC = 4$ كم ومساحة $\triangle ABC = 49$ كم²

أوجد:

(أ) مساحة $\triangle DEF$

(ب) مساحة شبه المنحرف $DEFC$

Volumes of Similar Figures

حجما الشكلين المتشابهين

7-8

ستساعدك الأنشطة التالية في استقصاء النسبة بين حجمي الشكلين المتشابهين.

مهارة التفكير: استنباط



في نهاية الأنشطة - سوف تكون قادرًا على استخدام مهارة الاستنباط للحصول على الصيغة الرياضية للنسبة بين حجمي الشكلين المتشابهين.

أنشطة



- 1- (أ) ما حجم مكعب طول حرفه 3 كم؟
(ب) ما حجم مكعب طول حرفه 6 كم؟
(ج) أوجد النسبة بين طولي حرفي المكعبين.
(د) أوجد النسبة بين حجمي المكعبين.
- 2- (أ) ما حجم مكعب طول حرفه 4 كم؟
(ب) ما حجم مكعب طول حرفه 1 كم؟
(ج) أوجد النسبة بين طولي حرفي المكعبين.
(د) أوجد النسبة بين حجمي المكعبين.
- 3- (أ) ما حجم متوازي مستطيلات طوله 3 كم، وعرضه 5 كم، وارتفاعه 2 كم؟
(ب) ما حجم متوازي مستطيلات طوله 15 كم، وعرضه 25 كم، وارتفاعه 10 كم؟
(ج) هل متوازي المستطيلات متشابهان؟
(د) أوجد النسبة بين طولي متوازيي المستطيلات المناظرة.
(هـ) أوجد النسبة بين حجمي متوازيي المستطيلات.

- 4- (أ) ما حجم مكعب طول حرفه 2 سم؟
 (ب) ما حجم مكعب طول حرفه $\frac{3}{2}$ سم؟
 (ج) أوجد النسبة بين طولي حرفي المكعبين.
 (د) أوجد النسبة بين حجمي المكعبين.
- 5- (أ) ما حجم أسطوانة دائرية طول نصف قطر قاعدتها 7 سم وطولها 10 سم؟ $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$
 (ب) ما حجم أسطوانة دائرية طول نصف قطر قاعدتها 21 سم وطولها 30 سم؟
 (ج) هل الأسطوانتان متشابهتان؟
 (د) أوجد النسبة بين الأطوال المتناظرة في الأسطوانتين.
 (هـ) أوجد النسبة بين حجمي الأسطوانتين.

يتضح مرة أخرى من الأنشطة أن النسبة بين حجمي شكلين متشابهين ليست نفس النسبة بين أطوالهما المتناظرة.
 ويمكن تعميم النتائج كما يلي

النسبة بين حجمي شكلين متشابهين هي مكعب النسبة بين أطوالهما المتناظرة.

$$\left(\frac{L_1}{L_2}\right)^3 = \frac{V_1}{V_2}$$
 بمعنى $\frac{V_1}{V_2} = \left(\frac{L_1}{L_2}\right)^3$
 حيث V الحجم و L الطول.

مثال 22:

كُرَّتان حجمهما 54 سم³، 16 سم³
 أوجد النسبة بين طولي نصفي قطريهما.

الحل

$$\frac{V_1}{V_2} = \left(\frac{L_1}{L_2}\right)^3$$

$$\frac{27}{8} = \frac{54}{16} =$$

$$\sqrt[3]{\frac{27}{8}} = \frac{L_1}{L_2}$$

$$\frac{3}{2} =$$

∴ النسبة بين طولي نصفي قطريهما هي 2:3

مثال 21:

متوازي مستطيلات حجمه 15 سم³.
 أوجد حجم متوازي مستطيلات مشابه طولها 3 أمثال طول متوازي المستطيلات الأول.

الحل

$$\left(\frac{L_1}{L_2}\right)^3 = \frac{V_1}{V_2}$$

$$\left(\frac{3}{1}\right)^3 = \frac{V_2}{15}$$

$$27 \times 15 = V_2 = 405 \text{ سم}^3$$



∴ حجم متوازي المستطيلات الثاني 405 سم³

ملحوظة

مثال 21

يشير V_1 إلى حجم وطول متوازي المستطيلات الأول ويشير V_2 إلى حجم وطول متوازي المستطيلات الثاني.

تمرين 8 هـ




- (أ) هل متوازي المستطيلات متشابهان؟
(ب) أوجد النسبة بين حجميهما.

8- بالون كروي الشكل حجمه 12.2 م^3 عند نفخه جزئياً وعند نفخه كلياً أصبح طول نصف قطره ثلاثة أضعاف طوله الأول. أوجد حجم الهواء في البالون في هذه اللحظة.

9- هرمان متشابهان ارتفاعهما 5 م، 15 م.

- (أ) طول قاعدة الهرم الأكبر 9 م، أوجد طول قاعدة الهرم الأصغر.
(ب) أوجد النسبة بين حجمي الهرمين الأكبر والأصغر. أعط إجابتك على صورة $\frac{1}{n}$.

10- مخروط دائري قسم إلى مقطعين س، ص بواسطة سطح يوازي القاعدة كما هو موضح، فإذا كان ارتفاع كل مقطع (هـ) وحدة



- (أ) أوجد النسبة بين حجم المخروط س والمخروط الأكبر (الذي يضم س، ص معاً).
(ب) حينئذ أوجد النسبة بين حجم س إلى ص.

1- كرة حجمها 8 م^3 أوجد حجم كرة أخرى نصف قطرها طوله:

- (أ) ضعف طول الأول.
(ب) ثلاثة أضعاف طول الأول.
(ج) خمسة أضعاف طول الأول.
(د) أربعة أضعاف طول الأول.
(هـ) نصف طول الأول.
(و) مرة ونصف طول الأول.

2- متوازي مستطيلات حجمه 1 م^3 . أوجد حجم متوازي مستطيلات آخر يشابهه وطول أحرفه:


- (أ) ضعف أطوال أحرف الأول.
(ب) خمسة أضعاف أحرف الأول.
(ج) ثمانية أضعاف أحرف الأول.
(د) عشرة أضعاف أحرف الأول.
(هـ) نصف طول أحرف الأول.
(و) $\frac{1}{10}$ طول أحرف الأول.

3- مكعبان حجمهما 27 م^3 ، 64 م^3 . أوجد النسبة بين طولي حرفيهما.

4- ثلاث كرات أحجامها 2 م^3 ، 16 م^3 ، 250 م^3 . أوجد النسبة بين أطوال أنصاف أقطارها.

5- مكعب صلب كتلته 50 جرام. أوجد كتلة مكعب مصنوع من نفس المادة ولكن طول حرفه ضعف طول حرف المكعب الأول.

6-



- (أ) هل الأسطوانتان متشابهتان؟
(ب) أوجد النسبة بين حجميهما (لا توجد حجم كل منهما).

مثال 23.

كرتان مساحة سطحيهما 18 كم²، 32 كم²، أوجد النسبة بين حجميهما.

الحل

$$\begin{aligned}\frac{1}{1} &= \left(\frac{1}{1}\right)^2 \\ \frac{9}{16} &= \frac{18}{32} = \left(\frac{1}{1}\right)^2 \\ \frac{3}{4} &= \sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{1}{1} \\ \left(\frac{1}{1}\right)^3 &= \frac{1}{1} \\ \frac{27}{64} &= \left(\frac{3}{4}\right)^3\end{aligned}$$

∴ النسبة بين حجميهما 27 : 64

تمرين 8 و

4- مكعبان مصصمان مصنوعان من نفس المادة، وكتلتيهما 27 جرامًا و125 جرامًا

- (أ) أوجد النسبة بين حجميهما.
(ب) أوجد النسبة بين طولي حرفيهما.
(ج) أوجد النسبة بين مساحتي سطحيهما.

5- جسمان متشابهان مساحتهما السطحية 25 كم²، 1 كم².

- (أ) أوجد النسبة بين مساحتي سطحيهما.
(ب) أوجد النسبة بين أطولهما المتناظرة.
(ج) أوجد النسبة بين حجميهما.

6- صنع نموذج سيارة بمقياس رسم 1 : 12

- (أ) فإذا كان طول النموذج 40 كم، أوجد طول السيارة الحقيقي.
(ب) إذا كان عرض السيارة 162 كم، أوجد عرض النموذج.
(ج) أوجد النسبة بين مساحة الجزء الدهون من النموذج إلى الجزء الدهون من السيارة.
(د) أوجد النسبة بين حجم النموذج وحجم السيارة.

1- هرمان متشابهان حجمهما 10 كم³، 80 كم³.

- (أ) أوجد النسبة بين ارتفاعيهما.
(ب) إذا كان ارتفاع الهرم الأصغر 5 كم، أوجد ارتفاع الهرم الأكبر.

2- منشوران متشابهان حجمهما 27 كم³، 64 كم³.

- (أ) أوجد النسبة بين ارتفاعيهما.
(ب) أوجد النسبة بين مساحتي سطحيهما.
(ج) أوجد النسبة بين مساحتي مقطعيهما.
(د) إذا كانت مساحة مقطع المنشور الأكبر 32 كم²، أوجد مساحة مقطع المنشور الأصغر.

3- مكعبان مساحة سطحيهما 400 كم²، 625 كم².

- (أ) أوجد النسبة بين أطوال حرفيهما.
(ب) أوجد النسبة بين حجميهما.


1- ينطبق المثلثان كُلاً على الآخر إذا تحقق أي من الشروط التالية:
(أ) الأضلاع المتناظرة متساوية (ض ض ض).




(ب) تساوى ضلعان والزاوية المحصورة بينهما (ض ز ض).



(ج) تساوت زاويتان في القياس وتناظر طول ضلع مع آخر (ز ض ز).



(د) بالنسبة للمثلثين قائما الزاوية، تساوى وتر وضلع متناظر (و ض ق).



2- إذا كان $\Delta ABC = \Delta DEF$ فإن

قياس $\angle A$ = قياس $\angle D$ ، قياس $\angle B$ = قياس $\angle E$ ، قياس $\angle C$ = قياس $\angle F$.

قياس AB = قياس DE ، قياس BC = قياس EF ، قياس AC = قياس DF .

أب = د. ط. ب ح = ط. ب ح = ط. ب ح = د. ب ح = د. ب ح = د. ب ح

3- يتشابه المثلثان إذا

(أ) تساوت الزوايا المتناظرة (إذا تساوت زاويتان في مثلث مع زاويتين في مثلث آخر فإن الزاوية الثالثة في المثلث الأول تساوي الزاوية الثالثة في المثلث الآخر).

أو (ب) الأضلاع المتناظرة متناسبة.

أو (ج) تناسب ضلعان متناظران وتساوت الزوايا المحصورة بينهما.

4- إذا ΔABC و ΔDEF متشابهان فإن

(أ) قياس $\angle A$ = قياس $\angle D$ ، قياس $\angle B$ = قياس $\angle E$ ، قياس $\angle C$ = قياس $\angle F$.

(ب) $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF}$

5- بالنسبة للشكليين المستويين المتشابهين $\left(\frac{A}{B}\right)^2 = \frac{a^2}{b^2}$

بالنسبة للشكليين المصمتين المتشابهين فإن $\left(\frac{A}{B}\right)^3 = \frac{a^3}{b^3}$

استقصاء الرياضيات

لعبة البلياردو



اشتق الاسم على الأرجح من الكلمة الفرنسية bille وتعني عصا . وعلى الرغم من أن مصدر اللعبة غير محدد، إلا أنها عرفت بفرنسا في القرن الخامس عشر وباجلته أثناء حكم الملكة إليزابيث الأولى.


ظهرت عصا البلياردو في حوالي 1820، فسمحت بدرجة تحكم كبيرة في الكرة. وبالتطورات العلمية الحديثة للبلياردو التي تعتمد إلى حد كبير على مبادئ الهندسة والديناميكا

واليوم يستطيع اللاعب الماهر تحديد مسار الكرة قبل ضربها. فيعتمد المسار على طريقة ضرب الكرة. وشكل الطاولة. وموقع الكرات الأخرى. فيمكن لأبعاد الطاولة أن تتغير ولكنها دائماً مستطيلة وطولها ضعف عرضها وعموماً تكون أبعادها 3.65 متر × 1.82 متر وارتفاعها 0.86 متر .

ويلاحظ أي شخص يلعب البلياردو أن الكرة التي يضربها يمكن أن تتوقف في مكانها بعد ارتطامها بكرة أخرى. ولحدوث ذلك فإن حركة الكرة المتحركة يجب أن تكون بطول خط مركز الكرتين! ولتحديد مسار الكرة يجب معرفة أنه عند ارتطام الكرة بحافة الطاولة فإن زاوية الانعكاس تساوي زاوية السقوط. بمعنى أنها ترند بنفس زاوية ارتطامها. من المفيد معرفة هذه الحقيقة في ألعاب مثل التنس والبلياردو.



تخيل كرة ضربت من ركن الطاولة بحيث تتحرك بزاوية 45° مع جوانب الطاولة. أين سيذهب ؟ فيما يلي " طاولة " شبيكة لمساعدتك في تحديد مسار الكرة.



وبما أن الطاولة متشابهة (تساوت النسب المتناظرة للأضلاع):


$$2 = \frac{6}{3} = \frac{8}{4} = \frac{10}{5} = \frac{12}{6}$$

فإن مسار الكرة سوف يكون نفسه منتهياً عند الركن الأعلى الأيسر في كل حالة.

ملاحظة


لوجود كرة واحدة فقط على كل طاولة شبيكة.

دعنا نتعرف على المسار في طاولة مختلفة الشكل. اتبع المسار في كل شكل. سوف تلاحظ أن الكرة تذهب إلى ركن مختلف بعد ارتدادات عديدة.




- أوجد أبسط صورة للنسبة بين طول وعرض المنضدة بالنسبة للمنضدة في كل شكل. العديد من التساؤلات يمكن أن تثار:
- 1- هل تعتقد أن الكرة سوف تنتهي دائماً في أحد الأركان؟
 - 2- هل يمكن للكرة أن تترد من الجوانب إلى ما لا نهاية؟
 - 3- هل يمكن للكرة الرجوع إلى ركنها الأصلي؟
 - 4- هل يمكن أن نتوقع أي ركن من الأركان الثلاثة سوف تنتهي الكرة عنده إذا كانت أبعاد المنضدة معروفة؟

ولإيجاد الإجابة عن هذه الأسئلة، حل التمارين الآتية بعناية على ورقة مربعة 5م 5م ثم الصفها وكأنها (منضدة البلياردو) في كراسة التدرجات. اكتب الأبعاد على الأضلاع وحاول صياغة بعض القواعد البسيطة بقدر استطاعتك. تبدأ الكرة دائماً من الركن الأيسر السفلي وتتوقف حين تصل لأي ركن.



ارسم مجموعة من 8 طاوولات بلياردو بأطوال 10 وحدات وعرض 1 إلى 8 وحدات. ضع علامة جهراء في الأماكن التي تنتهي عندها الكرات.

- هل توجد أي مفاجأة ؟
- أي المناضد لها أبسط مسار ؟
- ما هي أبعاد المنضدة ذات المسار الأكثر تعقيداً ؟
- أين تنتهي الكرة على منضدة بلياردو عرضها عدد فردي ؟



ارسم هذه المرة مجموعة من الطاوولات بأطوال (7 وحدات) وعرض من 1 إلى 7. كرر العملية - فكر في قاعدة للنكتهن بالمنضدة التي تمر الكرة بها على كل المربعات [فكر في عوامل الأعداد].

اكتب من التمارين السابقة النسب بين الطول والعرض لكل المناضد التي تنتهي الكرة فيها بالركن الأيمن السفلي - عبر عن النسب السابقة في أبسط صورة. كرر الخطوات لجميع المناضد حيث تنتهي الكرة في (i) الركن الأيمن العلوي (ii) الركن الأيسر العلوي. ما هي القواعد التي يمكن استنتاجها؟

حاول هذا الآن؟

احسب أقصر مسافة من د إلى ط مع السماح بالارتداد مرة واحدة من جانب المنضدة زوايا الارتطام والانعكاس كلتيهما 45° .



على ورقة رسم بياني ارسم جميع المسارات التي يمكن بها لكرة (✓) أن تسير لتصل طم بالكرة (د). بجانب كل شكل، اكتب عدد الارتدادات وطول المسافة المقطوعة.



ملحوظة

اعتبر كل مربع صغير قياساً لوحدة واحدة بوحدة واحدة.

ورقة المراجعة 8

قسم أ


1- فارب كل زوج من المثلثات ثم أكمل البيانات التالية:

(i) Δ ا ب ح = _____


السبب: _____

(ب) Δ د ط ر = _____

السبب: _____



2- أوجد طول ح د.




3- أكمل الفراغات المحددة التالية:

(i) Δ , Δ منشأبهان.

السبب:

$$(ب) \frac{د ط}{د ت} = \frac{د ط}{د ت} , \frac{د ط}{د ت} = \frac{د ط}{د ت}$$




4- ارجع إلى الأشكال المعطاة:

(i) واكتب قيمة:

$$\frac{ا ب}{د ط} (ii) \quad \frac{ا ح}{د ط} (iii) \quad \frac{ب ح}{د ر}$$

(ب) اذكر المثلثين المتشابهين مع تصحيح ترتيب رؤوسهما.




قسم ب

5- (i) دائرة مركزها ح . أكمل الفراغات المحددة التالية:

 Δ ا ب ح = _____


السبب: _____




- 8- منشوران متشابهان حجمهما 8 م^3 ، 27 م^3 .
 (أ) أوجد النسبة بين طوليهما.
 (ب) أوجد النسبة بين مساحتيهما السطحية.
 (ج) إذا كانت المساحة السطحية للمنشور الأصغر 8 م^2 ، أوجد المساحة السطحية للمنشور الأكبر.

قسم ج

- 9- (أ) اثبت أن المثلثين الموضحين بالشكل متطابقان، ووضح الأسباب.
 (ب) اكتب طول س ز.
 (ج) اذكر زاويتين أخرتين متساويتين.




- 10- (أ) اثبت أن ΔABH ، ΔACH متشابهان واذكر الأسباب.
 (ب) إذا كانت مساحة ΔABH ، ΔACH هي على الترتيب 2.16 م^2 ، 6 م^2 .
 (i) أوجد النسبة بين مساحتيهما، ثم
 (ii) أوجد النسبة بين طولي وتريهما.
 (iii) إذا كان $AC = 5 \text{ م}$ ، أوجد طول AB .



- (ب) اذكر ثلاثة أزواج من المثلثات المتطابقة في متوازي الأضلاع المبين.

- (i) _____ = _____
 (ii) _____ = _____
 (iii) _____ = _____




6- بالنسبة للمثلث المعطى

- (أ) اذكر زوجاً من المثلثات المتشابهة مع كتابة رؤوسهما المتناظرة بالترتيب الصحيح (أعط سبباً لإجابتك).
 (ب) احسب قيمة س. ص.



7- بالنسبة للمثلث الموضح

- (أ) احسب قيمة $\frac{AK}{AB}$ ، $\frac{AL}{AC}$.
 (ب) اذكر بعد ذلك زوجاً من المثلثات المتشابهة مع كتابة رؤوسهما بالترتيب الصحيح.
 (ج) إذا كانت مساحة ΔABC تساوي 18 م^2 ، أوجد مساحة ΔAKL .




المتوسطات الإحصائية

Statistical Averages

تعلمنا في الفصل 7 من كتاب الصف الثامن، كيفية تنظيم البيانات عن طريق الرسم البياني بالصور، وبالأعمدة، وبالقطاعات الدائرية، وبالتوزيعات التكرارية، وبالمدج التكراري. إن كل هذه الطرق تعطينا فقط صورة كلية عن البيانات، ولكنها لا تكفي لاتخاذ قرارات محددة.

على سبيل المثال: من البيانات الإحصائية قد نحتاج إلى الإجابة عن أسئلة مثل:

المستهلكون هل ادعاء مصنع الأغذية المحفوظة أن للمعلبات وزن صافي (250 جرام) حقيقي؟



المستخدم ما دخل 50% من العمال في مصنع؟

بائع التجزئة ما هو مقياس الخداء الذي على بائع التجزئة أن يطلبه أكثر؟

للإجابة عن مثل هذه الأسئلة نحتاج إلى معرفة المتوسطات الإحصائية الثلاثة: المتوسط، الوسيط، المنوال. هذه المتوسطات يمكن تسميتها أيضًا بمقاييس النزعة المركزية حيث تمثل مركز (وسط) القيم للبيانات المعطاة، وهي قلما تتساوى لأي مجموعة من البيانات. وأي هذه الأنواع الثلاثة يعتبر نموذجيًا لمجموعة بيانات يعتمد على نوع العينة أو البيانات والهدف من وراء ذلك.

في نهاية هذا الفصل سوف تكون قادرًا على:

- إيجاد المتوسط، والوسيط، والمنوال للتوزيع من:
 - مجموعة أعداد.
 - جداول التكرار.
 - المدرج التكراري.
 - الرسم البياني بالنقط.

• إيجاد المتوسط من التمثيل البياني للأصل والفروع.

1-9

Mean

المتوسط

أنتج مصنع مأكولات معلبة كتلتها الصافية 250 جراماً، ووجد في اختبار الجودة أن الكتل تدور حول 248 : 252 جرام. على سبيل المثال (الكتل بالجرام) لعشرة معلبات كانت:

250, 248, 251, 251, 250, 250, 249, 251, 248, 252

في الخفيفة. وجد أن جميع "الكتل" قريبة من 250 جراماً.

المتوسط الحسابي هو القيمة التي يمكن الحصول عليها عن طريق جمع جميع القيم ثم قسمتها على عددها.

$$\therefore \text{المتوسط} = \frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عدد القيم}}$$

$$= \frac{250 + 248 + 251 + 251 + 250 + 250 + 249 + 251 + 248 + 252}{10}$$

$$= \frac{2500}{10}$$

$$= 250 \text{ جراماً}$$

ومن هنا على المصنع أن يقول بثقة:

"في المتوسط الكتل الصافية للمعلبة هو 250 جراماً".

يُستخدم في أحيان كثيرة المصطلح "معدل" كمرادف مع "المتوسط".

مثال 1:

أوجد متوسط القيم التالية:

(أ) 51, 49, 41, 52, 47

(ب) 6, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1

الحل

$$\text{(أ) المتوسط} = \frac{51 + 49 + 41 + 52 + 47}{5}$$

$$= \frac{240}{5} = 48$$

$$\text{(ب) المتوسط} = \frac{6 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1}{15}$$

$$= \frac{45}{15} = 3$$

ملحوظة

لاحظ أن $1+1+1+1$

$$4 = 1 \times 4 =$$

$$10 = 5 \times 2 = 5 + 5$$

طريقة بديلة للمثال 1ب:

إذا عَرَّفنا القيم المعطاة باستخدام س وتكرار كل منها باستخدام ف، يمكن أن نعرض البيانات في جدول التكرار بإضافة العمود (ف × س) كما يلي:

القيم (س)	التكرار (ف)	ف × س
1	4	$4 = 1 \times 4$
2	2	$4 = 2 \times 2$
3	3	$9 = 3 \times 3$
4	3	$12 = 3 \times 4$
5	2	$10 = 2 \times 5$
6	1	$6 = 1 \times 6$
الكل	15	45

$$\frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عدد القيم}} = \text{المتوسط}$$

$$= \frac{\text{مجموع ف س}}{\text{الكل ف}}$$

$$= \frac{45}{15} = 3$$

مثال 2:

كان عدد الأهداف التي سجلتها بعض الفرق في مباريات دوري كرة القدم أحد أيام الجمعة كما يلي:

عدد الأهداف	0	1	2	3	4	5	6
عدد الفرق	26	27	19	11	3	3	1

الحل

عدد الأهداف (س)	عدد الفرق (ف)	ف × س
0	26	$0 = 0 \times 26$
1	27	$27 = 1 \times 27$
2	19	$38 = 2 \times 19$
3	11	$33 = 3 \times 11$
4	3	$12 = 4 \times 3$
5	3	$15 = 5 \times 3$
6	1	$6 = 6 \times 1$
الكل	90	131

$$\text{متوسط عدد الأهداف المسجلة} = \frac{131}{90} = 1.46 \text{ (الأقرب ثلاثة أرقام معنوية).}$$

مثال 3:

المرتبات السنوية لخمسة أشخاص كانت 32000, 6500, 6000, 5500, 5000

دينار.

(أ) أوجد متوسط المرتبات.

(ب) هل هذا المتوسط يمثل تلك المرتبات؟

الحل

$$(أ) \text{ متوسط المرتب} = \frac{32000 + 6500 + 6000 + 5500 + 5000}{5}$$

$$= \frac{55000}{5}$$

$$= 11000 \text{ دينار.}$$

(ب) المتوسط 11000 دينار هو بالتأكيد لا يمثل مرتباتهم حيث يوجد اختلاف

كبير بين المتوسط وكل من القيم. على سبيل المثال $11000 - 32000 =$

21000 دينار.


نلاحظ من المثال السابق أنه من عيوب المتوسط تأثره بالقيم المتطرفة أي

القيم الكبيرة جدًا أو الصغيرة جدًا.

مثال 4:

يمين المدرج التكراري توزيع عدد الأطفال لكل أسرة بين مجموعة من

المتزوجين . أوجد متوسط هذا التوزيع.



الحل

س ف	عدد الأسر (ف)	عدد الأطفال (س)
0	16	0
18	18	1
56	28	2
60	20	3
40	10	4
20	4	5
6	1	6
14	2	7
0	0	8
9	1	9
223	100	الكلية

$$\begin{aligned} \text{المتوسط} &= \frac{\text{مجموع س ف}}{\text{الكلية ف}} \\ &= \frac{223}{100} \\ &= 2.23 \text{ طفل} \end{aligned}$$

ملحوظة

إحصائيًا لا يجب أن يكون
المتوسط عددًا صحيحًا

مثال 5:

- متوسط الكتلة لعدد 10 طلاب هو 55.5 كيلو جرام.
(أ) أوجد الكتلة الكلية للطلاب العشرة.
(ب) أوجد المتوسط الجديد الكتلة إذا انضم إليهم طالب كتلته 62 كيلوجرام.

الحل

$$(أ) \text{ الكتلة الكلية} = \text{المتوسط} \times 10$$

$$10 \times 55.5 =$$

$$= 555 \text{ كجم}$$

$$(ب) \text{ المتوسط الجديد} = \frac{\text{الكتلة الكلية الجديدة}}{11}$$

$$\frac{62 + 555}{11} =$$

$$\frac{617}{11} =$$

$$= 56.1 \text{ كجم}$$

ملحوظة

العدد الكلي للطلاب
أصبح الآن 11

مثال 6:

متوسط مجموعة مكونة من 8 أعداد يساوي 17.5 فإذا كان 6 من هذه الأعداد هي 12، 14، 15، 19، 24، 25 فأوجد متوسط العددين الآخرين.

الحل

$$\text{مجموع الأعداد الثمانية} = 17.5 \times 8 =$$

$$140 =$$

$$\text{مجموع الأعداد الستة} = 12 + 14 + 15 + 19 + 24 + 25 =$$

$$109 =$$

$$\therefore \text{مجموع العددين الآخرين} = 140 - 109 =$$

$$31 =$$

$$\therefore \text{متوسط العددين الآخرين} = \frac{31}{2} =$$

$$15.5 =$$

مثال 7:

يوضح التمثيل البياني بالنقط نتيجته دراسة مسحية للمسافات التي يقطعها الطلاب في ذهابهم إلى المدرسة.



(أ) كم عدد الطلاب الذين شملهم المسح؟

(ب) احسب متوسط المسافات التي قطعها الطلاب.

الحل

(أ) عدد الطلاب الذين شملهم المسح = 20

المسافة بالكيلومتر س	التكرار هـ (عدد الطلاب)	ف × س
1	1	1 = 1 × 1
2	1	2
3	3	9
4	5	20
5	5	25
6	3	18
7	2	14
الكل	20	89

$$\therefore \text{متوسط المسافة المقطوعة} = \frac{89}{20} =$$

$$= 4.45 \text{ كم}$$

ملحوظة

كل نقطة تمثل البيانات المستفادة من كل طالب

مثال 8:

عدد الساعات الضائعة في أحد المصانع خلال السنة والتي تعود إلى تعطل الآلات بوضعها الرسم البياني للأصل والفرع التالي.

عدد الساعات الضائعة				
0	2	5	1	2
1	4	0	1	8
2	3	6	8	
3	1	8		
4	0			

- (أ) كم عدد الأعطال في السنة؟
 (ب) ما هو أقل عدد للساعات الضائعة؟
 (ج) ما هو أكثر عدد للساعات الضائعة؟
 (د) احسب متوسط عدد الساعات الضائعة

الحل

- (أ) بعد الفروع نجد أنها 15 عطلاً.
 (ب) أقل عدد ساعات ضائعة = 1 (من 1)
 (ج) أكثر عدد للساعات الضائعة = 40
 (د)

عدد الساعات الضائعة	
10 =	2 + 1 + 5 + 2
67 =	14 + 18 + 11 + 10 + 14
77 =	28 + 26 + 23
69 =	38 + 31
40 =	40
263 =	الكل

$$\frac{263}{15} = \text{متوسط عدد الساعات الضائعة}$$

$$= 17.5 \text{ (أقرب ثلاثة أرقام معنوية)}$$


تمرين 9

- 1- أوجد متوسط كل من مجموعات البيانات التالية:
- (أ) 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5
 (ب) 4, 4, 4, 6, 6, 7, 7, 7
 (ج) 4, 5, 6, 7, 8, 2, 6, 7
 (د) 45, 66, 67, 40, 55, 64, 76
 (هـ) 1, 2, 5, 1, 2, 5, 3, 4
- 2- (أ) أوجد متوسط كل مجموعة من المجموعات العددية التالية:
- (i) 5, 6, 7, 10, 12
 (ii) 305, 306, 307, 310, 312
 (ب) إذا كان العدد 9 هو متوسط للأعداد 2, 3, 10, 12, 15. أوجد قيمة 3.

عدد الأطفال في كل أسرة	عدد الأسر
0	46
1	92
2	98
3	104
4	60


(أ) احسب متوسط عدد الأطفال لكل أسرة.

8- يبين التمثيل البياني للمدرج التكراري عدد السكان في كل من 75 وحدة (شقة) في مجمع سكني. أوجد متوسط عدد السكان في كل وحدة.



9- يبين الرسم البياني بالأعمدة عدد الأطفال لكل أسرة في مجمع سكني.

- كم عدد الأسر التي لها طفلين؟
- كم عدد الأسر التي لديها أقل من ثلاثة أطفال؟
- كم عدد الأسر الإجمالي في المجمع السكني؟
- ما إجمالي عدد الأطفال في المجمع السكني؟
- ما متوسط عدد الأطفال في كل أسرة؟



3- متوسط خمسة أعداد هو 39، اثنان من الأعداد هما 103، 35 وكل من الأعداد الثلاثة الباقية يساوي س. أوجد

(أ) مجموع الأعداد الخمسة

(ب) القيمة العددية للعدد س.

4- أدى 6 طلاب، و4 طالبات امتحاناً. فإذا كان متوسط درجة الطلاب العشرة 51

(أ) احسب مجموع الدرجات التي حصل عليها الطلاب العشرة.

(ب) إذا كانت الدرجة المتوسطة للطلاب الستة هي 49، احسب الدرجة المتوسطة للطالبات الأربع.

5- عدد العمال الذين أبلغوا مرضى في مصنع خلال فترة محددة سجل كما يلي.

عدد العمال المبلغين مرضى	عدد الأيام (التكرار)
0	2
1	3
2	5
3	6
4	7
5	8
6	9
7	7
8	3
9	2
10	2


احسب متوسط عدد العمال المبلغين مرضى في اليوم.

6- في أحد سباقات الرماية يمكن لرجل إحراز نتيجة 1، 2، 3، 4، 5 أو 6 وكانت نتيجته بعد 100 طلقة كما هو موضح في الجدول التالي.

النتيجة	التكرار
1	26
2	15
3	14
4	15
5	18
6	12

احسب متوسط الرميات.

7- أجريت دراسة مسحية لإيجاد عدد الأطفال في كل من 400 أسرة. والنتائج يوضحها الجدول التالي.



(ب) احسب متوسط عدد جنود الحراسة في اليوم الواحد

10- يبين الشكل البياني بالنقط عدد الجنود الذين يقومون بالحراسة كل يوم (أ) ما هو العدد الكلي لجنود الحراسة؟



11- يبين الشكل البياني بالنقط نتائج دراسة مسحية لإيجاد عدد الأطفال في كل أسرة.

- (أ) كم عدد الأسر الذين شملتهم الدراسة؟
(ب) ما عدد الأطفال الإجمالي؟
(ج) ما هو متوسط عدد الأطفال في كل أسرة؟

Median

الوسيط

2-9

إذا كانت المرتبات الشهرية لخمس موظفين هي كما يلي:
900 دينار، 975 دينارًا، 1050 دينارًا، 1100 دينار، 2300 دينار
فإن متوسط الراتب الشهري = $\frac{2300 + 1100 + 1050 + 975 + 900}{5} = 1265$ دينارًا

لاحظ أن 4 موظفين من الخمسة نقاضوا أقل من 1265 دينارًا في الشهر. القيمة المتطرفة 2300 دينار تسببت في أن المتوسط أصبح لا يمثل العينة.

فإذا ما اخترنا القيمة الوسيطة لمجموعة بعد ترتيبها ترتيبًا تنازليًا أي القيمة (1050 دينارًا) سوف نجد أن هذه القيمة تعد أكثر تمثيلًا من المتوسط. نعرف هذه "القيمة الوسيطة" باسم الوسيط ولا تتأثر بالقيم المتطرفة.

الوسيط لمجموعة من القيم هو القيمة الوسطى (إذا كانت فردية) أو هو متوسط القيمتين الوسطيتين (إذا كانت زوجية) بعد ترتيب القيم ترتيبًا تنازليًا أو تصاعديًا.

مثال 9:

أوجد وسيط الأعداد

(ب) 3, 4, 2, 3, 5, 2, 6, 4, 5, 1

(أ) 3, 5, 4, 3, 1, 2, 6, 1, 3

الحل

(أ) بعد ترتيب القيم، نحصل على

6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 1

4 أعداد بعده

4 أعداد قبله

∴ الوسيط = 3

ملحوظة

هناك 9 قيم (فردية) ∴ القيمة الخامسة هي الوسيط.



عندما يكون عدد القيم زوجيًا، فإن الوسيط يساوي متوسط العددين اللذين يتوسطان الأعداد.

$$\therefore \text{الوسيط} = \frac{4+3}{2} = 3.5$$

مثال 10:

المجموع الكلي لأفضل ثلاث مواد، والمتضمنة اللغة الإنجليزية لفصل مكون من 40 طالبًا في امتحان الثانوي العام هو كما يلي.

10	7	10	8	12	3	6	6	8	5
7	8	5	8	6	4	9	6	6	4
4	6	6	9	18	7	6	3	5	4
18	8	12	8	6	10	5	8	14	6

أوجد وسيط المجموع الكلي.

الحل

بترتيب المجموع الكلي ترتيبًا تصاعديًا نحصل على

$$18, \dots, 8, 7, 7, 7, 6, 6, 4, 4, 4, 3, 3$$

20 طالبًا بعده

20 طالبًا قبله

$$\begin{aligned} \text{وسيط المجموع الكلي} &= \frac{\text{القيمة 20} + \text{القيمة 21}}{2} \\ &= \frac{7+6}{2} = 6.5 \end{aligned}$$

يمكن أيضًا استخدام نفس مجموعة البيانات في جدول التكرار التالي لإيجاد الوسيط عن طريق حساب الترتيب.

المجموع الكلي	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18
التكرار	2	4	4	10	3	7	2	3	2	1	1	1
الترتيب	الأول إلى الثاني	الثالث إلى السادس	7 إلى 10	11 إلى 20	21 إلى 23	24 إلى 30	31 إلى 32	33 إلى 35	36 إلى 37	38	39	40

من الجدول قيمة الترتيب العشرين = 6

قيمة الترتيب الواحد والعشرين = 7

$$\therefore \text{المجموع الكلي الوسيط} = \frac{7+6}{2} = 6.5$$

ملاحظة

إذا كانت n عددًا زوجيًا فإن موقع القيمتين اللتين يتوسطان مجموعة القيم $\left(\frac{n}{2}\right)$ والموقع $\left(1 + \frac{n}{2}\right)$ ولهذا فإن الوسيط بين القيمتين العشرين والواحد والعشرين

مثال 11:

عدد الأهداف المسجلة بواسطة 90 فريقاً يلعبون في دوري لكرة القدم خلال أحد أيام الجمعة هي كما يلي:

عدد الأهداف	0	1	2	3	4	5	6
عدد الفرق	26	27	19	11	3	3	1

أوجد وسيط عدد الأهداف المسجلة.

الحل

حيث يوجد عدد زوجي من الأهداف (90 هدفًا) إذن لدينا قيمتان متوسطتان القيم هما القيمة الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين على التوالي.

وبالعدد. الأهداف في الموقع الخامس والأربعين = 1

الأهداف في الموقع السادس والأربعين = 1

$$\therefore \text{العدد الوسيط للأهداف} = \frac{1+1}{2} = 1$$

مثال 12:

سئل الطلاب في أحد الفصول عن

عدد الحيوانات الأليفة التي لديهم.


يبين الشكل الجبائي للمدرج التكراري

نتيجة الدراسة المسحية. أوجد

(أ) عدد الطلبة في الفصل.

(ب) العدد الوسيط للحيوانات

الأليفة.



الحل

$$(أ) \text{ عدد الطلبة} = 1 + 3 + 5 + 12 + 18 =$$


$$39 \text{ طالبًا}$$

(ب) الوسيط يقع عند الموقع العشرون.

$\therefore$ وسيط عدد الحيوانات الأليفة = 1

مثال 13:

المسافات التي يقطعها 20 طالبًا في طريقهم إلى المدرسة (بالكيلومتر) بوضوحها الشكل البياني بالنقط التالي:



أوجد وسيط المسافة المقطوعة بواسطة الطلبة.

الحل

المسافة المقطوعة بواسطة الطالب العاشر = 4 كم

المسافة المقطوعة بواسطة الطالب الحادي عشر = 5 كم

∴ وسيط المسافة المقطوعة = $\frac{5+4}{2} = 4.5$ كم

ملحوظة

الوسيط بين الطالب العاشر والحادي عشر.

تمرين 9 ب

1- أوجد وسيط كل من المجموعات البيانية الآتية:

(أ) 3, 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1

(ب) 5, 6, 4, 7, 6, 4, 6, 7

(ج) 6, 6, 7, 2, 6, 5, 4, 2

(د) 78, 88, 71, 76, 95, 89

(هـ) 3.70, 9.20, 3.20, 3.90, 2.50

2- يبين الجدول التالي عدد الأهداف المسجلة في 20 مباراة للهوكي:

2	2	3	1	3
3	1	0	3	2
5	3	3	2	2
2	3	1	2	3

أوجد العدد الوسيط للأهداف المسجلة في كل مباراة.

3- أوجد وسيط التوزيع التالي:

3.6, 7.8, 3.6, 4.2, 7.9, 2.1, 3.6, 7.9, 5.1

4- بالنسبة للأعداد 3, 3, 11, 5, 14

(أ) أوجد الوسيط.

(ب) احسب المتوسط.

5- إذا كان وسيط مجموعة من 6 أعداد هو $2\frac{1}{2}$ ، وإذا كانت خمسة من هذه الأعداد هي 8, 1, 2, 11, 1، أوجد العدد السادس.

6- اشترك فصل به 40 طالبًا في مسابقة كانت أعلى درجة يمكن الحصول عليها فيها 9 وكانت درجاتهم كما يوضحها الجدول التالي:

الدرجة	0	1	2	3	4	5	6	6 <
عدد الطلبة	1	3	4	8	11	8	3	2

أوجد الدرجة الوسيطة.

7- أجريت دراسة مسحية عن مصروف الجيب الشهري الذي يتقاضاه 30 طالبًا في فصل والنتائج مبينة في الجدول التالي:

مبلغ المصروف (بالدينار)	20	30	50	60	75	100
عدد الطلبة الذين يتقاضون هذا المبلغ	2	6	8	3	10	1

(أ) أوجد الوسيط.

(ب) احسب المتوسط.


8- توزيع 100 قيمة للمتغير س يوضحها الجدول التالي.

س	صفر	1	2	3	4	5	6
تكرار	20	30	25	16	5	2	2


بالنسبة لهذا التوزيع، أوجد

(أ) الوسيط (ب) المتوسط.

9-



يبين الشكل البياني للنتائج التكراري نتائج الدراسة المسحية لعدد الركاب في كل سيارة أجرة عند مركز للتنسوق.




(أ) عدد الأطفال الوسيط لكل أسرة.
(ب) متوسط عدد الأطفال في كل أسرة.

11- يشير الشكل البياني بالنقط إلى غياب عدد من الطلبة أثناء أيام معينة.
(أ) كم عدد الأيام المسجلة؟
(ب) أوجد وسيط عدد الطلبة كل يوم؟



12- يبين الرسم البياني بالنقط نتائج الدراسة المسحية لإيجاد عدد الأطفال لدى كل أسرة. أوجد عدد الأطفال الوسيط لكل أسرة.



Mode

المنوال

3-9

إذا قيل لبائع أحذية بالتجربة إن متوسط قياس أقدام الرجال هو 42.1 أو إن وسيط حجم أقدام الرجال هو 41.8 سوف لا يجد تلك المعلومات مفيدة فهو على الأرجح أكثر اهتمامًا بالحجم الأكثر شيوعًا حتى يتمكن من طلب أحذية أكثر من هذا القياس

منوال التوزيع هو القيمة الأكثر تكرارًا بين القيم.

لاحظ أن التوزيع له على الأرجح أكثر من منوال ولكن لن نتعرض إلى هذه الحالات في هذا الكتاب.

ملحوظة

6 تتكرر 3 مرات
(الأكثر تكرارًا)

مثال 14:

أوجد منوال مجموعة البيانات التالية 6, 6, 7, 2, 6, 5, 4, 2

الحل

بإعادة ترتيب العينة ترتيبًا تصاعديًا 2, 2, 4, 5, 6, 6, 6, 7 نحصل على المنوال = 6

لاحظ أنه كما في حالة الوسيط فإنه يجب أيضًا ترتيب العينة ترتيبًا تصاعديًا (أو تنازليًا) لتسهيل الحصول على القيمة الأكثر تكرارًا وهي المنوال

مثال 15:

أوجد منوال العينات البيانية التالية

(أ) 0.1, 0.4, 0.2, 1, 8 (ب) 4, 2, 8, 9, 6, 5

الحل

بإعادة ترتيب العينة:

(أ) 0, 0, 0, 1, 1, 2, 4, 8

∴ المنوال = 0

(ب) بإعادة ترتيب العينة:

2, 4, 5, 6, 8, 9


التوزيع ليس له منوال

ملحوظة

تظهر كل قيمة مرة واحدة

مثال 16:

إذا كانت قياسات الأحذية التي بيعت في أحد الأيام يبينها الرسم البياني التالي بالنقط



(أ) كم عدد أزواج الأحذية التي بيعت؟

(ب) اذكر القياس المنوالي للأحذية المباعة.

الحل

- (أ) يَعدّ عدد النقط في النموذج.
 نجد أن عدد أزواج الأحذية التي بيعت = 20
- (ب) القياس 43 هو الذي له أكبر تكرار (6 أزواج)
 ∴ القياس المنوالي للأحذية المبيعة هو 43.

تمرين 9 ج

- 5- أجريت دراسة مسحية لعدد السيارات المارة في تقاطع طريق خلال 35 فترة متساوية من الوقت. سجلت النتائج في الجدول التالي، مرت على سبيل المثال 4 سيارات بالتقاطع خلال كل من 6 فترات.

عدد السيارات	التكرار
0	8
1	7
2	4
3	4
4	6
5	3
6	3

- أوجد لهذا التوزيع
 (أ) المنوال
 (ب) التوسيط.
 (ج) المتوسط.

- 6- سُئلت مجموعة من 80 طفلًا عن عدد الأقلام الملونة التي بحوزتهم وكانت النتيجة كما يبينها الجدول التالي.

عدد الأقلام الملونة	عدد الأطفال
0	23
1	19
2	29
3	9

- بالنسبة لهذا التوزيع، أوجد
 (أ) المنوال
 (ب) المتوسط

- 1- أوجد منوال كل من العينات التالية :

- (أ) 0,9,3,3,7,3,5.
 (ب) 1,6,3,3,8,1,8,6,3
 (ج) 2,0,6,5,8,2,3,5,5,3
 (د) 110 كجم، 100 كجم، 120 كجم، 110 كجم، 100 كجم، 110 كجم.

- 2- أوجد وسيط ومنوال كل من العينات التالية.

- (أ) 1,2,3,1,8,5,3,2,1,1
 (ب) 2,0,6,5,8,2,3,5,5,3


- 3- يبين الجدول التالي عدد الأهداف المسجلة في 20 مباراة للهوكي

2	2	3	1	3
3	1	0	3	2
5	3	3	2	2
2	3	1	2	3


- أوجد العدد المنوالي للأهداف المسجلة.

- 4- الدرجات التي حصل عليها 11 طالبًا في اختبار للتهجي هي كما يلي.
 9, 1, 4, 8, 7, 2, 8, 10, 9, 4, 4
 أوجد لهذه المجموعة من الدرجات،
 (أ) المنوال.
 (ب) الوسيط.
 (ج) المتوسط.

10- بين الشكل البياني للمدرج التكراري عدد السكان في كل منزل في عينة من 100 منزل في شارع معين.



- (أ) حدد العدد المتوالي للسكان في كل منزل.
 (ب) احسب متوسط عدد السكان في كل منزل.
 11- بين الشكل البياني بالنقطة الدرجات التي حصل عليها طلاب فصل بالصف الثاني الثانوي في امتحان الرياضيات.



- (أ) كم عدد الطلاب في الفصل؟
 (ب) أوجد وسيط الدرجات.
 (ج) حدد الدرجة المتوسطة.
 12- عدد الأشخاص في سيارات تمر على تقاطع تم ملاحظته وتوضيحه في الرسم البياني بالنقطة كما يلي:



- (أ) كم سيارة تم ملاحظتها؟
 (ب) حدد العدد المتوالي للأشخاص.
 (ج) أوجد وسيط عدد الأشخاص.
 (د) احسب متوسط عدد الأشخاص في كل سيارة.

7- فيما يلي مجموعة من 11 عدد:

1, 4, 5, 12, 14, 18, 20, 4, 7, 10, 14

- (أ) حدد المتوال.
 (ب) أوجد قيمة الوسيط.
 (ج) احسب متوسط الأعداد.
 (د) عند إضافة الرقم س إلى المجموعة السابقة يصبح المتوسط الجديد 10، احسب قيمة س.

8- عدد الأهداف المسجلة من إحدى الفرق في سبع مباريات، كانت كما يلي:

12, 23, 18, 14, 24, 25, 12

- (أ) اكتب العدد المتوالي للأهداف.
 (ب) أوجد عدد الأهداف التي يحتاجها الفريق في مبارياته القادمة لكي يكون متوسط عدد أهدافه في 8 مباريات يساوي 17

9- (أ) عدد الأهداف التي سجلها هدف كرة القدم

في 11 مباراة كانت كما يلي:

1, 0, 0, 2, 2, 0, 1, 2, 3, 1, 2

- اكتب العدد المتوالي للأهداف
 (ب) بين الجدول التالي عدد الفتيات اللاتي سرن مسافات معينة.

عدد الفتيات	المسافة (كم)
2	5
1	10
5	15
1	20
س	25

فإذا كان الوسيط = 20 كم، أوجد قيمة س.

ملخص

- 1- نحصل على المتوسط بجمع كل القيم وقسمتها على عددها.
- 2- الوسيط لمجموعة من القيم (n) هو القيمة الوسطى (إذا كانت n فردية) أو متوسط القيمتين المتوسطتين (إذا كانت n زوجية) وذلك بعد ترتيب مجموعة القيم ترتيبًا تصاعديًا أو تنازليًا.
- 3- منوال التوزيع هو القيمة الأكثر تكرارًا بين القيم.

رياضيات ممتعة

لعبة إحصائية
(لاعبان أو أكثر)

تستطيع شراء لعبة دوران (كما هو موضح في الشكل) مقابل عدة دنانير من محل لبيع اللعب. اختر لعبة بها درجات تتراوح بين صفر 36
اللعبة الأولى:

الهدف منها الحصول على متوسط يساوي 18



الطريقة:

يقوم كل لاعب بإدارة [لعبة الدوران]. ويُسمح له بإعادة الدوران مرة واحدة فقط.

مثال:

اللاعب الأول: يدير ويحصل على 3 نقاط ولكنه يرفض النتيجة.
يدير مرة أخرى ويسجل 10 نقاط وحسب له أول محاولة.
اللاعب الثاني: يدير ويحصل على 16 نقطة. يقبل ذلك ويتم تسجيل ذلك كأول محاولة.
اللاعب الأول: يدير ويحصل على 30 نقطة (متوسط العددين 10, 30 هو 20. وهذا قريب من العدد 18) وبالتالي يقبل 30 على أنها المحاولة الثانية.
وهذا يعني أن البيانات الخاصة به هي 10, 30.
اللاعب الثاني: يدير ويسجل صفرًا. ويرفض النتيجة (متوسط صفر 16 هو 8) وهذا بعيد جدًا عن العدد 18. يدير مرة ثانية ويسجل 22.
وهذا يعني أن البيانات الخاصة به هي 16, 22 وهذا يعطي متوسط 19.

اللاعب الأول: يدير ويسجل 11 نقطة (متوسط 10, 30 هو 11) وبالتالي يقبل العدد 11 على أنه تسجيل للمحاولة الثالثة.
وبالتالي تكون البيانات الخاصة به هي (10, 30, 11).
اللاعب الثاني: ...

اللاعب الذي يحصل على متوسط 18 قبل الآخر يكون هو الفائز.

اللعبة الثانية:

الطريقة هي نفسها كما في اللعبة الأولى. إلا أن الهدف هو الحصول على وسيط قدره 18.

وتوجد قواعد متعددة يمكن استخدامها في اللعبتين ففي البداية يمكن كتابة الحسابات. وبعد التدريب عدة مرات يسمح فقط بالحسابات الذهنية. ويمكن تحديد الوقت كذلك للقيام بالحسابات. يمكنك البدء باللعبة الثانية لأنها أسهل في إدارتها.

ورقة المراجعة 9

القسم أ

1- أوجد متوسط العينات التالية:

(أ) 1, 1, 2, 3, 5, 8, 1, 3, 2, 1

(ب) 3.6, 7.8, 3.6, 4.2, 7.9, 2.1, 3.6, 7.9, 5.1

2- أوجد وسيط كل من التوزيعات التالية:

(أ) 0, 9, 3, 3, 7, 3, 5

(ب) 2.1, 3.2, 1.3, 8.1, 5.8, 3.5, 2.3, 1.2, 1, 1

(ج) 1, 6, 8, 3, 3, 8, 1, 8, 6, 3

3- أوجد منوال كل من التوزيعات التالية:

(أ) 0, 4, 9, 9, 3, 1, 4, 7, 9

(ب) 6.9, 2.3, 2.0, 5.6, 6.9, 7.8, 9.3, 2.8, 2.8

(ج) 384, 709, 990, 709, 607, 555

4- بالنسبة للتوزيع التالي

1, 0, 3, 7, 6, 1, 4, 1, 5, 5, 0

أوجد: (أ) المتوسط.

(ب) الوسيط.

(ج) المنوال.

القسم ب


5- صندوق يحتوي على 4 كرات صفراء وعلى 6 كرات سوداء

سحبت أربع كرات عشوائياً من الصندوق. وتم عد الكرات

الصفراء المسحوبة من العبء. ثم أعيدت الكرات الأربع

إلى الصندوق قبل السحب التالي. والنتائج يشرحها

الرسم البياني بالنقطة التالية:



(أ) كم عدد مرات سحب الكرات؟

(ب) حدد العدد المنوالي للكرات الصفراء المسحوبة؟

(ج) أوجد وسيط عدد الكرات المسحوبة.

(د) احسب متوسط عدد الكرات المسحوبة.

6- اشترك في اختبار الرياضيات 4 طلاب، 6 طالبات وكانت

الدرجة المتوسطة للطلاب العشرة هي 49 درجة.

(أ) احسب الدرجة الكلية التي حصل عليها

الطلاب العشرة.

(ب) إذا كانت الدرجة المتوسطة للطالبات الست هي

51، احسب الدرجة المتوسطة للطلاب الأربعة.

7- كتل مجموعة من الطلاب في الصف الثاني الثانوي


يبينها الشكل البياني التالي للأصل - الفروع.

الكتلة بالكيلو جرام لطلاب الصف الثاني الثانوي

3	9 6
4	7 7 9 8 1 4 6 3 8 8 9
5	1 4 6 2 3 1
6	1

(أ) كم عدد الطلاب الذين شملهم المسح؟

(ب) احسب متوسط كتل الطلاب؟



10- يبين الجدول التالي نتيجة معاينة 100 صندوق لأقلام الخبر يحتوي كل منها على 20 قلماً.

عدد الصناديق	عدد الأقلام غير الصالحة في الصندوق
28	0
34	1
26	2
10	3
3	4
1	5

أوجد :

- وسيط عدد الأقلام غير الصالحة في كل صندوق.
- متوال عدد الأقلام غير الصالحة في كل صندوق.
- متوسط عدد الأقلام غير الصالحة في كل صندوق.

8- أجريت دراسة مسحية لمعرفة المدة التي سيستمع فيها مستخدمو الهواتف النقالة لإعلان عبره قبل إقبال المكالمة. النتيجة مبينة في الشكل البياني التالي للأصل والفروع.

0	2	3	2	1	5	8	9	1	4	4
1	1	5	3	3	5					
2	1	8	1	4						
3	0	0	0	0	0	0	0			

- كم عدد المتحدثين الذين شملهم المسح؟
- إذا كان أقصر وقت للمكالمة 0.1 دقيقة. فما هو الوقت الكلي للإعلان.
- احسب متوسط طول المكالمة.

القسم ب

9- قامت جمعية المستهلكين بفحص أسعار المسجلات من ماركة معينة والتي بيعت في 50 محلاً مختلفاً والنتيجة ببيئتها المدرج التكراري أوجد :

- السعر المتوالي للمسجل.
- السعر الوسيط للمسجل.
- السعر المتوسط للمسجل.

التقويم 2

القسم أ

غير مسموح باستخدام الآلة الحاسبة.

1- بالنسبة للتوزيع: 0.1, 4, 2, 5, 4, 2

أوجد:


(i) المتوسط

(ب) الوسيط

(جـ) المنوال

2- سنلت مجموعة من الطلبة عن الفاكهة المفضلة

لديهم. يبين الرسم البياني بالفضضان المعلومات التي جُمِعت.



(i) إذا كان 20 طالبًا يحبون البرتقال. أوجد عدد

الطلبة الذين شملتهم العينة.

(ب) احسب زاوية القطاع الذي يعبر عن الذين

يفضلون المانجو.

3- ارسم النقط أ (1,2) , ب (2, -5), ج (0,7) على

ورقة رسم بياني. فإذا كانت هذه النقاط ثلاث رؤوس

لمتوازي أضلاع حدد الرأس الرابع ثم اكتب إحداثياته.

4- حل المعادلتين الآتيتين

$$س + ص = 1$$

$$2س + ص = 0$$

5- ارسم جميع خطوط التماسل الممكنة في كل من

الأشكال التالية:

(i)



(ب)



(جـ)



القسم ب


6- غير مسموح باستخدام الآلة الحاسبة.

(i) أوجد مفكوك (أ + 2) (3 - 4)

(ب) حلل 5² - 22 - 21


8 - معتبراً $\left(\frac{22}{7} = \pi\right)$ احسب :

- (أ) مساحة القطاع الدائري د و ط.
(ب) حجم المنشور.



9- أ ب ح مثلث متساوي الأضلاع جميع أطواله بالسنتيمتر.

- (أ) أوجد قيمة كل من س . ص
(ب) ثم احسب محيط المثلث.



10- انقل وأكمل الجدول التالي لقيم العلاقة

$$ص = 3س - 2$$


2	0	2-	س
6			3س
2-			2-
4			ص = 3س - 2

حدد إحداثيات النقط التي عندها يقطع الخط
المستقيم محور الصادات

7- أوجد رتبة التماثل الدوراني حول النقطة (و) في كل
من الأشكال التالية.



(أ)



(ب)



(جأ)







(د)



(هأ)


11- زاوج بين الأشكال التالية وقائمة المعادلات المعطاة:
ص = 3س، ص = 3، س = 3، ص = -3س.



12- قبل عامين كان مجموع عمر ولد وأخته الصغرى 20 عاماً. وبعد ثلاثة سنوات من الآن سوف يختلف عمريهما بمقدار عشرين سنوات كون معادلتين آتيتين ثم أوجد عمر كل منهما الآن.



القسم ج

13- (i) معبراً $(\frac{22}{7} = \pi)$ احسب مساحة المنطقة المظلمة في كل من الأشكال التالية. كل الأطوال مقاسة بالسنتيمتر.



(ب) حجم مخروط هو 462 سم³ ونصف قطر قاعدته 7 سم احسب ارتفاعه (معبراً $\frac{22}{7} = \pi$).

14- لكل من الأشكال التالية ارسم مستوى تماثل واحد. مستخدماً الخط المنقط حده محور الدوران الذي يعطي أعلى رتبة من التماثل الدوراني.




التقويم 3

القسم أ


غير مسموح باستخدام الآلة الحاسبة

1- يبين الشكل البياني التالي تكاليف طباعة بطاقات الأسماء.



- (أ) كم عدد البطاقات التي تتكلف 75 ديناراً؟
 (ب) ما هي تكاليف طباعة 2500 بطاقة؟
 (ج) ما تكاليف طباعة كل بطاقة إذا تم طباعة 3000 بطاقة؟

-2



- يبين المدرج التكراري عدد حجرات النوم في كل شقة داخل المجمع السكني
 (أ) حدد العدد المنوالي لحجرات النوم.
 (ب) ما إجمالي عدد الشقق؟
 (ج) احسب متوسط عدد حجرات النوم في كل شقة؟

-3 (i) أوجد مفكوك:

(i) $5(3a+b)$

(ii) $5(3-a) > 3$

(ب) حلل

(i) $15س - 6ص$

(ii) $6س^2ص + 3س + 3ص^2$

-4 (i) ارسم النقط د (-2, 1), ط (-1, 2), ز (2, 2)

(1-, 2, 4).

(ب) صل النقط د إلى ز, ط إلى د

(ج) حدد إحداثيات نقطة تقاطع د, ط, ز.

-5 حل المعادلتين الآتيتين:


$2س - 3ص = 4$

$ص = س - 3$

-6 (معتبراً $\pi = \frac{22}{7}$) احسب:

(أ) طول القوس د ط.

(ب) محيط القطاع الدائري د و ط.



-7 اكتب أي أربعة حروف لاتينية كبيرة. يكون لها تماثل دوراني.

القسم ب

غير مسموح باستخدام الآلة الحاسبة

-8



أ ب ح د هـ و مضلع منتظم

احسب:

(i) $\angle أ ب ح$

(ii) $\angle ح أ ب$

(iii) $\angle هـ أ ح$

(ب) ما هو الاسم الخاص بالمثلث أ ح هـ ؟

9- عدد الساعات التي يقضيها مكتب خدمات مع كل من عملاء يوضحها الشكل البياني للأصل والفروع

0	9
1	1 4 0 1 6 0 4
2	6 0 7 1 7 0 7 9
3	2 1 4
4	0

(i) كم عدد العملاء الذين خدمهم المكتب؟

(ب) إذا كان أقصر وقت يستغرقه العميل هو 9

ساعات فما هو أطول وقت يستغرقه؟

(ج) احسب متوسط طول الوقت المستغرق.


10- مستخدماً النقطة (و) كمركز للمماسل الدوراني،

أكمل كلًا من الأشكال التالية، بحيث يكون له مماسل دوراني من:

(i) الرتبة 4



(ب) الرتبة 8



11- معطياً $\frac{22}{7} = \pi$ احسب:

(i) مساحة السطح المنحني للمخروط


(ب) حجم المخروط



12- دط رذ متوازي أضلاع

(i) أوجد قيم س، ص

(ب) ثم أوجد محيط متوازي الأضلاع.



13- اختصر وأعط إجابتك على صورة كسر وحيد:

$$\frac{15}{8} - \frac{13}{5} + \frac{1}{2} \quad (i) \quad \frac{5-b}{8} - \frac{2+b}{3} \quad (ب)$$

$$\frac{2}{3} - \frac{1}{x} \quad (ج)$$

14- حل المعادلات الآتية:

$$\frac{23}{5} = \frac{1+2}{2} \quad (ب) \quad \frac{3}{5} = \frac{7}{2} \quad (i)$$

$$\frac{1}{2} = \frac{5}{5} - \frac{1}{4} \quad (ج)$$

15- (i) حلل $2^2 - 2$

(ب) حينئذ أحسب قيمة $\frac{2^2 - 2}{(2+1)}$ من دون استخدام

الآلة الحاسبة إذا كان $6.54 = 2^2 - 2$, $3.46 = 2^2 - 2$.

القسم ج

يمكن استخدام الآلة الحاسبة

16- (i) انقل وأكمل الجداول الآتية لقيم العلاقاتين

$$ص = 2 - 2, ص = 3 - 8$$

جدول المعادلة $ص = 2 - 2$

3	1	0	ص
		2	ص

17- الشكل البياني بالنقط يوضح عدد الحيوانات الأليفة التي يمتلكها كل طفل في حديقته.



- ما عدد الأطفال الذي شملهم المسح؟
- ما هو العدد المتوالي للحيوانات؟
- أوجد وسيط عدد الحيوانات.
- احسب متوسط عدد الحيوانات.

جدول المعادلة $3س = 8$

س	1	3	5
ص	1		

(ب) مستخدماً $2س$ لتمثل كل وحدة من محور السينات و $1س$ لتمثل كل وحدة من محور الصادات. ارسم الشكل البياني للمعادلة $3س = 2$. وللمعادلة $3س = 8$ ، ثم استخدم الرسم البياني في حل المعادلتين الآتيتين.

الإجابات

Answers

الفصل الأول

تمرين 1

- 1- (i) 4×12 (أ) $2 - 6$ (ب) (ج) 28×21
 (د) 42×30 (هـ) $25 - 5$ (و) $4 - 16$
 (ز) 8×16 (ح) $15 - 40$ (ط) 35×21
 (ي) $8 - 24$ (ك) 16×10 (ل) $15 - 5$
 2- (i) 7×2 (أ) $4 - 2$ (ب) (ج) 3×4
 (د) 12×15 (هـ) $2 - 3$ (و) $4 - 4$
 (ز) $12 - 20$ (ح) 4×3 (ط) $5 - 6$
 3- (i) 7×34 (أ) $11 - 23$ (ب) (ج) 14×31
 (د) $34 - 33$ (هـ) $9 - 1$ (و) 12×45
 (ز) $5 - 36$ (ح) $7 - 2$ (ط) $9 - 3$
 4- (i) 3×2 (أ) $2 - 12$ (ب) (ج) $9 - 25$
 (د) $16 - 49$ (هـ) $10 - 25$ (و) $10 - 4$
 (ز) $8 - 16$ (ح) $10 - 25$ (ط) $10 - 25$

النشاط

(صفحة 12)

- 1- (i) (أ) (ii) (ب) (أ) (أ) (ب) (ج)
 (د) (أ) (ب) (ج) (د) (أ) (ب) (ج)
 2- (i) (أ) (ب) (ج) (د) (أ) (ب) (ج) (د)
 (ii) (أ) (ب) (ج) (د) (أ) (ب) (ج) (د)
 (iii) (أ) (ب) (ج) (د) (أ) (ب) (ج) (د)

تمرين 1

- 1- (i) 5×6 (أ) 9×20 (ب) (ج) 10×21
 (د) 11×18 (هـ) $2 - 15$ (و) $4 - 21$
 (ز) 12×32 (ح) $11 - 28$ (ط) $8 - 55$
 (ك) $9 - 4$ (ل) 4×4 (م) 4×4
 2- (i) 3×14 (أ) $9 - 14$ (ب) (ج) 5×5
 (د) $23 - 12$ (هـ) $14 - 3$ (و) $14 - 5$
 (ز) 12×9 (ح) $11 - 2$ (ط) $12 - 5$

- 3- (i) 2×2 (أ) 2×2 (ب) 3×3 (ج) 3×3
 (د) 2×2 (هـ) 2×2 (و) 2×2 (ز) 2×2
 (ح) 2×2 (ط) 2×2 (ك) 2×2 (ل) 2×2
 (م) 2×2 (ن) 2×2 (ي) 2×2

تمرين 1

- 1- 2×1 (أ) 2×1 (ب) (ج) 2×1
 (د) 2×1 (هـ) 2×1 (و) 2×1
 (ز) 2×1 (ح) 2×1 (ط) 2×1
 (ك) 2×1 (ل) 2×1 (م) 2×1
 (ن) 2×1 (ي) 2×1

تمرين 1

- 1- $1 - 2$ (أ) $1 - 2$ (ب) (ج) $1 - 2$
 (د) $1 - 2$ (هـ) $1 - 2$ (و) $1 - 2$
 (ز) $1 - 2$ (ح) $1 - 2$ (ط) $1 - 2$
 (ك) $1 - 2$ (ل) $1 - 2$ (م) $1 - 2$
 (ن) $1 - 2$ (ي) $1 - 2$

تمرين 1

- 1- $8 - 2$ (أ) $64 - 2$ (ب) $8 - 3$ (ج) $27 - 8$ (د) $8 - 3$

تمرين 1

1- $3, 7, 11, 29, 43$

- 2- (i) 7×3 (أ) 2×23 (ب) (ج) 2×37
 (د) 2×31 (هـ) 2×5 (و) 2×5
 3- (i) 5 (أ) 9 (ب) 49 (ج) 12 (د) 36
 (هـ) 9 (و) 36
 4- (i) 7 (أ) 12 (ب) 6 (ج) 12 (د) 7
 (هـ) 3 (و) 1 (ز) 2 (ح) 2 (ط) 16 (ك) 35 (ل) 1 (م) 6 (ن) 6

تمرين 1

- 1- (i) 3×4 (أ) 5×3 (ب) 7×8 (ج) 9×4
 (د) 18×3 (هـ) 7×8 (و) 49×21
 (ز) 4×14 (ح) 9×4 (ط) 15×5
 2- (i) 3×7 (أ) 2×3 (ب) 2×3 (ج) 2×3
 (د) 5×2 (هـ) 9×2 (و) 15×5

تمرین 1۱

[illegible]

74 (د) 96 (جـ) 5400 (پ) 7600 (ii)-3
 $\frac{1}{4}$ (ح) $\frac{1}{2}$ (ز) 8.6 (و) 30.8 (هـ)
 56 (ی) 113 (ط)

(3 + $\sqrt{5}$)(3 - $\sqrt{5}$)(2 + $\sqrt{5}$)(2 - $\sqrt{5}$) (پ) (5 + $\sqrt{2}$)(5 - $\sqrt{2}$) (ii)-4

(1 + $\sqrt{3}$)(1 - $\sqrt{3}$) (پ) (3 - $\sqrt{2}$)(2 + $\sqrt{2}$) (ii)-5
 $\sqrt{5}$ (5 - $\sqrt{5}$) (جـ)

تمرین 1ک

(أ) $1 - (3 + \text{ص} - 2 \text{ص} + 3 \text{ص} + 9)$ (ب) $(\text{ع} - 4) (\text{ع} + 16 + 4 \text{ع} + 2 \text{ع})$
 (ج) $2 (2 - \text{ز}) (2 + \text{ز} + 4)$ (د) $(\frac{1}{5} + \text{م}) (\frac{1}{25} - \frac{1}{5} + \text{م}^2)$
 (هـ) $(\frac{3}{2} \text{س} - \frac{2}{3}) (\frac{9}{4} \text{س}^2 + \text{س} + \frac{4}{9})$ (و) $(\text{ي} - \text{ج}) (\text{ي}^2 + \text{ي} \text{ج} + \text{ج}^2)$

2- (أ) $س^3 + 3ص^2س + 3س^2ص$ (ب) $(9 - \frac{1}{3})(21 + \frac{2}{3})$
(ج) $(ك + 4)(ك^2 - 10ك + 52)$ (د) $(9م - 1)(81م^2 + 9م + 1)$

3- (أ) (س - ص) (س + ص) (س⁴ + ص²س² + ص⁴)
(ب) (م - ن) (م²ن² + م²ن²ك²)

11.30 (ب) $\frac{19}{216}$ (ا) -4

3- (i) $(x + 4)$ (ب) $(x^2 - 8)$ (ج) $(5x - 17)$
 (د) $(3 - 4x)$ (هـ) $(2x + 3)$ (و) $(5x - 3)$
 (ز) $(5x + 3 + 2x)$

(ج) $(2 + \sqrt{12})$ (د) $(2 + \sqrt{3})$ (ه) $(6 + \sqrt{8})$ (و) $(3 + \sqrt{12})$
(ز) $(\sqrt{3} + 4)$ (ح) $(\sqrt{3} + 1)$ (ط) $(2 - \sqrt{13})$ (ق) $(2 - \sqrt{8})$ (ک) $(\sqrt{3} - 2)$

5- (أ) $(1 + x)(2 + x)$ (ب) $(2 - x)(2 + x)$
 (ج) $(3 + x)(3 - x)$ (د) $(6 + x)(6 - x)$
 (هـ) $(3 - x)(4 - x)$ (و) $(1 + x)(4 + x)$
 (ز) $(1 - x)(3 + x)$ (ح) $(1 + x)^2$
 (ط) $(3 + x)(3 + x)$ (ث) $(1 + x)$

(ب) من (ص + ع - ۱۳)
 (ج) د (ط + ۷ - ۴)
 (د) هـ (ب + ب + ۲)
 (هـ) ا (ب - ۳ + ۴)

تمرین 1 ح

(ب) $(2 + \text{اص}) (4 + \text{اب})$ (د) $(5 + \text{اض}) (6 + \text{اع})$
 (ج) $(1 + \text{اع}) (2 + \text{ا})$ (هـ) $(6 + \text{اب}) (7 + \text{اض})$
 (ز) $(2 + \text{اك}) (3 + \text{دا})$ (ح) $(3 + \text{اع}) (4 + \text{اض})$

2- (i) $(1 - \sqrt{2}) + (2 + \sqrt{2})$ (ب) $(1 - \sqrt{2}) + (2 + \sqrt{2})$ (ع)
 (ج) $(1 + \sqrt{2}) + (2 - \sqrt{2})$ (د) $(1 + \sqrt{2}) + (2 - \sqrt{2})$ (ح)
 (هـ) $(1 - \sqrt{2}) + (2 - \sqrt{2})$ (و) $(1 - \sqrt{2}) + (2 - \sqrt{2})$ (ز)
 (ز) $(1 + \sqrt{2}) + (2 + \sqrt{2})$ (ح) $(1 + \sqrt{2}) + (2 + \sqrt{2})$ (ع)
 (ط) $(1 - \sqrt{2}) + (2 + \sqrt{2})$ (ب) $(1 - \sqrt{2}) + (2 + \sqrt{2})$ (ع)

$$(4 + \sqrt{3})(1 + \sqrt{3}) = 3$$

تمرین 1 ط

1- (أ) $(1 + x + x^2)$ (ب) $(1 + x + x^2)$ (ج) $(1 + x + x^2)$ (د) $(1 + x + x^2)$ (هـ) $(1 + x + x^2)$ (و) $(1 + x + x^2)$ (ز) $(1 + x + x^2)$ (ح) $(1 + x + x^2)$ (ط) $(1 + x + x^2)$ (ك) $(1 + x + x^2)$ (ل) $(1 + x + x^2)$ (م) $(1 + x + x^2)$

(3 + 1)(1 + 3) (ب) (2 + 1)(1 + 2) (د) -2
(2 - 3)(3 + 4) (ج) (3 + 4)(2 + 3) (ا)
(1 - 2)(1 - 3) (و) (2 - 3)(3 + 2) (هـ)
(1 - 4)(4 - 1) (ز)

(ب) $(-5+1)(-2+1)$ (ج) $(-5+3)(-4+3)$ (د) $(-5+3)(-4+2)$ (هـ) $(-5+3)(-4+1)$

ورقة المراجعة 1

- 1- (i) $3 + 6$ (ب) $12 - 8$
 (جـ) $20 - 15$ (د) $30 - 24$
 2- (i) $5(4 + 3)$ (ب) $6(1 - 2)$
 (جـ) $4(2 + 3)$ (د) $3(2 - 17)$
 3- (i) $16 - 3$ (ب) $12 - 8 + 2$
 (جـ) $5 - 5 + 2$ (د) $6 - 2 + 2$
 4- (i) $3(2 - 3)$ (ب) $أ(أ + ب)$
 (جـ) $3(أ - ب)$ (د) $ك(أ - ب)$
 5- (i) $3 + 10 + 8$ (ب) $6 + 5 + 25$
 (جـ) $5 + 22 + 21$ (د) $ك(16 + 6) - 1$
 6- (i) $2(أ + 1) + 2(أ + 2)$ (ب) $16 - 16$
 (جـ) $12 + 13$ (د) $25 + 160 + 36$
 7- (i) $36 + 160 + 25$ (ب) $16 - 24 + 9$
 8- (i) $4(3 + 3) + 3(3 + 3)$ (ب) $2(أ + 1)$
 9- (i) $أ(أ + ب)$ (ب) 10
 10- (i) $10(أ - 3) + 3(أ + 5)$ (ii) $2(أ + 5) - 5(ب)$
 (ب) 49 (ii) 1 (iii) 7 (iv) 343 (v) 91 (vi) 37

الفصل الثاني

تمرين 2 أ

- 1- (i) $\frac{3}{4}$ (ب) $\frac{1}{3}$ (جـ) $\frac{2}{3}$ (د) $\frac{2}{3}$
 (هـ) $\frac{3}{4}$ (و) $\frac{9}{8}$ (ز) $م$ (ح) $\frac{1}{3}$
 (ط) $\frac{1}{4}$
 2- (i) $\frac{1}{3}$ (ب) 2 (جـ) $\frac{2}{3}$ (د) $\frac{2}{3}$
 (هـ) 3 (و) $\frac{2}{3}$ (ز) $\frac{2}{3}$ (ح) $\frac{3}{4}$
 (ط) $\frac{2}{3}$
 3- (i) $\frac{1}{3}$ (ب) $\frac{1}{3}$ (جـ) $\frac{1}{3}$ (د) $\frac{1}{3}$
 (هـ) $\frac{1}{3}$ (و) $\frac{1}{3}$ (ز) $\frac{1}{3}$ (ح) $\frac{1}{3}$
 (ط) $\frac{1}{3}$

تمرين 2 ب

- 1- (i) $(2 + 1)(3 + 1)$ (ب) $(3 - 1)(2 + 1)$
 (جـ) $(2 + 1)^2$ (د) $(3 - 1)^2$
 (هـ) $(4 + 1)(4 + 1)$ (و) $2(3 - 1)(3 + 1)$
 (ز) $2(1 + 1)(1 + 1)$ (ح) $3(2 + 1)(2 + 1)$
 2- (i) $\frac{1}{1 - 2}$ (ب) $\frac{1}{1 - 2}$ (جـ) $\frac{2 - 3}{1 + 2}$
 (د) $\frac{2 + 12}{2 - 1}$ (هـ) $\frac{2}{3}$ (و) 1
 (ز) $\frac{2}{3}$ (ح) $\frac{1}{3}$ (ط) $\frac{1}{2}$
 (ي) $\frac{3}{2}$

- 3- (i) $\frac{1 + 1}{2}$ (ب) $\frac{1 - 1}{3}$ (جـ) $\frac{2 - 1}{3}$
 (د) $\frac{3 + 1}{3}$ (هـ) $\frac{2 + 1}{3}$ (و) $\frac{3 - 1}{3}$
 (ز) $4 + 1$ (ح) $5 - 1$ (ط) $(2 + 1) - 2$
 (ي) $(3 + 1) - 1$ (ك) $2(2 + 1)$ (ل) $\frac{2 - 1}{3}$

تمرين 2 ج

- 1- (i) 6 (ب) 24 (جـ) $\frac{3}{2}$ (د) $\frac{5}{2}$
 (هـ) $\frac{7}{10}$ (و) $\frac{6}{10}$
 2- (i) 2 (ب) 5 (جـ) $\frac{3}{9}$ (د) $\frac{3}{9}$
 (هـ) $\frac{16}{21}$ (و) $\frac{12}{21}$ (ز) $\frac{16}{21}$
 (ط) $\frac{10}{9}$
 3- (i) $\frac{12}{3}$ (ب) $\frac{3}{2}$ (جـ) $\frac{3}{2}$ (د) $\frac{3}{2}$
 (هـ) $\frac{3}{2}$ (و) $\frac{3}{2}$ (ز) $3(أ + 1)$
 (ح) $3(أ + 1)$ (ط) $3(أ + 1)$ (ي) $2(أ + 1)$

تمرين 2 د

- 1- (i) $\frac{14}{5}$ (ب) $\frac{5}{12}$ (جـ) $\frac{13}{45}$ (د) $\frac{13}{18}$
 (هـ) $\frac{73}{63}$
 2- (i) $\frac{7}{3}$ (ب) $\frac{2}{5}$ (جـ) $\frac{7}{24}$ (د) $\frac{7}{48}$
 (هـ) $\frac{11}{48}$ (و) $\frac{19}{30}$
 3- (i) $\frac{15}{8}$ (ب) $\frac{37}{15}$ (جـ) $\frac{73}{60}$ (د) $\frac{7}{4}$
 (هـ) $\frac{8}{12}$

تمرين 2 هـ

- 1- (i) $\frac{8 + 17}{12}$ (ب) $\frac{15 + 8}{153}$ (جـ) $\frac{8 - 11}{24}$
 (د) $\frac{20 - 9}{20}$ (هـ) $\frac{11 - 3}{12}$ (و) $\frac{13 - 5}{10}$
 2- (i) $\frac{7 + 45}{6}$ (ب) $\frac{7 + 412}{15}$ (جـ) $\frac{5 - 11}{12}$
 (د) $\frac{14 - 13}{15}$ (هـ) $\frac{9 - 4}{9}$ (و) $\frac{4 - 13}{10}$
 (ز) $\frac{7 - 2}{30}$ (ح) $\frac{1}{24}$

الفصل الثالث

تمرين 3 أ

- 1- أ (2, 1) ب (1, 4) ج (4, 2) د (1, 1) هـ (2, 4) و (1, 2) ز (0, 3) ح (4, 0) ط (0, 2)
 2- أ (1, 1.5) ب (4.5, 3) ج (1.5, 0) د (3, 1.5) هـ (5, 3.5) و (0, 4.5) ز (1.5, -3.5) ح (2.5, -2.5) ط (0, 4.5) ي (2, 3.5) ك (5, -2.5)
 ل (0, 4.5)
 6- أ) نعم ب) خط مستقيم

تمرين 3 ب

أ) ص = -							ب) ص = 5						
3	2	1	0	1-	2-	3-	ص	2	1	0	1-	2-	ص
3-	2-	1-	0	1	2	3	ص	10	5	0	5-	10-	ص
(3, 3)	(2, 2)	(1, 1)	(0, 0)	(1, 1-)	(2, 2-)	(3, 3-)	(ص, ص)	(10, 2)	(5, 1)	(0, 0)	(5-, 1-)	(10-, 2-)	(ص, ص)

أ) ص = 5 +							ب) ص = -3						
1	0	1-	2-	3-	ص		2	1	0	1-	2-	ص	
6	5	4	3	2	ص		6-	5-	0	3	6	ص	
(6, 1)	(5, 0)	(4, 1-)	(3, 2-)	(2, 3-)	(ص, ص)		(6-, 2)	(5-, 1)	(0, 0)	(3, 1-)	(6, 2)	(ص, ص)	

أ) ص =							ب) ص =						
3	2	1	0	1-	2-	3-	ص	3	2	1	0	1-	2-
0	1-	2-	3-	4-	ص		0	1-	2-	3-	4-	ص	
(0, 3)	(1-, 2)	(2-, 1)	(3-, 0)	(4-, 1-)	(ص, ص)		(0, 3)	(1-, 2)	(2-, 1)	(3-, 0)	(4-, 1-)	(ص, ص)	

ورقة المراجعة 3

- 1- أ (2, 3) ب (1, 2) ج (10, 2) د (3, 0)
 2- مثلث متساوي الساقين
 3- (3, 2)
 4- (2, 2)
 5-

2	0	2-	ص
4	0	4-	ص
4-	4-	4-	4-
0	4-	8-	ص = 2

 6- أ) ص = ص ب) ص = 3 ج) ص = 1
 د) ص = ص هـ) ص = 5
 7- أ) (i) $21 + 35$ (ii) $48 - 6$
 ب) (i) $2 (م - 2)$ (ii) $س (س + 1)$

تمرين 3 ج

2	1	0	1-	2-	ص
13	9	5	1	3-	ص

- 3- أ) $1 =$ ب) $7 =$

تمرين 3 د

- 1- أ) (i) (2, 3) (ii) (2, -3) (iii) (3, -3) (iv) (2, -3) (v) (1, 3) (vi) (0, 3) (vii) (1, 3) (viii) (2, 3) (ix) (3, 3) (x) (2, 3)
 2- أ) (i) (1, 3) (ii) (1, 2) (iii) (1, 1) (iv) (0, 1) (v) (1, 1) (vi) (1, 2) (vii) (1, 3) (viii) (2, 3) (ix) (3, 3) (x) (4, 3)
 3- أ) (i) (1, 3) (ii) (2, 3) (iii) (3, 3) (iv) (4, 3) (v) (5, 3) (vi) (6, 3) (vii) (7, 3) (viii) (8, 3) (ix) (9, 3) (x) (10, 3)
 4- أ) (i) (1, 3) (ii) (2, 3) (iii) (3, 3) (iv) (4, 3) (v) (5, 3) (vi) (6, 3) (vii) (7, 3) (viii) (8, 3) (ix) (9, 3) (x) (10, 3)
 5- أ) (i) (1, 3) (ii) (2, 3) (iii) (3, 3) (iv) (4, 3) (v) (5, 3) (vi) (6, 3) (vii) (7, 3) (viii) (8, 3) (ix) (9, 3) (x) (10, 3)
 6- أ) (i) (1, 3) (ii) (2, 3) (iii) (3, 3) (iv) (4, 3) (v) (5, 3) (vi) (6, 3) (vii) (7, 3) (viii) (8, 3) (ix) (9, 3) (x) (10, 3)

تمرین 4 د

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| $\frac{1}{8} = \frac{1}{8}$ حـ -2 | $2 = -1, 0 = -1$ |
| $4 = -3$ ص -4 | $2 = -\frac{1}{2}$ حـ -3 |
| $7 = -3$ ص -6 | $5 = -3$ ص -5 |
| $3 = -5$ ص -8 | $1 = -2$ ص -7 |
| $2 = -3$ ص -10 | $2 = -7$ ص -9 |
| $2\frac{1}{2} = 1\frac{1}{2}$ ط -12 | $3 = -2$ ص -11 |

تمرین 4 هـ

- 1- (i) بی = 2، صفر = صفر (ب) بی = 2، ص = 5
(ج) بی = 3، ص = 9
(ii) بی = 5، ص = 1
(ج) بی = 1، ص = 3
(ه) بی = 3، ص = 2
(ز) بی = 1، ص = 1

تمرین 4 و

- 2- 1-4 3-4-3 2- 10-2 7-8-1
5- طول 18 كم عرض 16 كم
6- علوم 65 رياضيات 80
7- 5-2-7 3-2-8
9- كتاب اللغة الإنجليزية = 10 دينار رياضيات = 12 دينار
10- 12 28
11- 25 85
12- (أ) ص = $\frac{1}{2}$ ، ص = 1 (ب) 18

ورقة المراجعة 4

- 1- من = 3، ص = 1-
 4- من = 5، ص = 7
 6- من = 3، ص = 4

(ب) 12 وحدة مربعة

جدول من = 2، ص = 3

4	2	0	من
5-	1-	3	ص

1 = ص

1- من = 7، ص = 5
 3- من = 1، ص = 3
 5- 1317
 7- من = 2، ص = 2-
 8- (i) من = 0، ص = 3
 9- 7، 17
 10- جدول من = 4، ص = 3

4	2	0	من
13	5	3-	ص

1 = من

التَّحْوِيم 1

- (2, 3) (1 - 2) - 1
- 2 (ii) $15 - 120$ (ب) $12 + 8 >$
- (ج) $6 - 3$ (د) $6 \div 10$ (ب) $2(2 + 2)$
- 3 (ii) $15 \div 3$ (ج) $3(3 - 1)$ (د) $3(3 - 2)(2 + 3)$
- 4 (ii) $49 \div 40$ (ب) $8 + 10 + 3$ (ب) $8 + 2 + 15$
- (ج) $21 =$ (د) $15 + 38 + 24$ (ب) $3 - 2$ (ب) $4 - 2$
- 6 (ii) $3 - 4$ (ب) $2 - 3$ (ب) $4 - 2$ (ب) $3 - 4$
- 7 (ii) $1 + 1$ (ب) $3 - 4$ (ب) $7 - 1$
- 8 (ii) $1 - 1$ (ب) $1 + 1$ (ب) $20 - 16 - 36 - 24 - 6$

الفصل الرابع

تمرین 4 ا

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 2 = ص 5 = ص -2 | 3 = ص 2 = ص -1 |
| $\frac{5}{3}$ = ص 3 = ص -4 | 2 = ص 1 = ص -3 |
| 1 = ص 1 = ص -6 | 1 = ص 2 = ص -5 |
| 2 = ص 1 = ص -8 | 1 = ص 1 = ص -7 |
| 2 = ص 2 = ص -10 | 1 = ص 3 = ص -9 |

تمرین 4 پ

- 1- من 5 = -1
2- من 1 = -3
3- من 3 = -7
4- من 2 = -9
5- من 5 = -1
6- من 5 = -6
7- من 3 = -2
8- من 3 = -8
9- من 1 = -10
10- من 1 = -2
11- من 1 = -4
12- من 1 = -1

تمرین 4 ج

- | | | |
|----------|-----------|-----------|
| 1- = ص 2 | 2- = ص 3 | 1- = ص 2 |
| 2- = ب 5 | 4- = ر 5 | 3- = ب 5 |
| 2- = ص 1 | 6- = ص 1 | 5- = ب 3 |
| 2- = ط 1 | 8- = ر 1 | 7- = ر 1 |
| 4- = ص 1 | 10- = ص 1 | 9- = ر 6 |
| 3- = ر 2 | 12- = ح 2 | 11- = ب 3 |

الفصل الخامس

تمرين 15

- 1- (i) 11 (ب) 20.9
- (ج) 27.5 (د) 33
- 2- (i) 12.6 (ب) 0.785
- (ج) 5.42 (د) 11.8
- (هـ) 31.4 (و) 6.28
- (ز) 36.6 (ح) 14.1
- 3- (i) 70 (ب) 175
- (ج) 245 (د) 280
- (هـ) 315 (و) 35
- 4- (i) 7 (ب) 10
- (ج) 12 (د) 9
- 5- (i) 16.5 (ب) 27
- 6- (i) 19.8 (ب) 45
- 7- (i) 11 (ب) 29
- 8- 120
- 9- 44

تمرين 5 ب

- 1- (i) 88 (ب) 89.1
- (ج) 68.2 (د) 44
- 2- (i) 6.28 (ب) 7.07
- (ج) 0.523 (د) 1030
- (هـ) 106 (و) 21.4
- 3- (i) 35 (ب) 105
- (ج) 245 (د) 280
- 4- (i) 12 (ب) 10
- (ج) 8 (د) 6
- 5- (i) 40 (ب) 16
- (ج) 132 (د) 180
- (هـ) 6 (و) 4
- 6- (i) 27.72 (ب) 1730
- 7- 83.16
- 8- 56
- 9- 4.19
- 10- 112
- 11- 392
- 12- 28
- 13- 12.6
- 14- 392

تمرين 5 ج

- 1- (i) 138 (ب) 360
- (ج) 288 (د) 681
- 2- (i) 72 (ب) 400
- (ج) 280 (د) 957
- 3- (i) 6 (ب) 8
- (ج) 12

- 4- (i) 49 سم² (ب) 81 سم² 9 سم
- (ج) 169 سم² 13 سم
- 5- (i) 30 سم² 70 سم² (ب) 3.6 م² 4.8 م²
- (ج) 72 سم² 6 سم
- (هـ) 7 سم² 42 سم² (و) 6.7 م² 33.5 م²
- (ز) 7 سم² 56 سم² (ح) 7.8 م² 31.2 م²

تمرين 5 د

- 1- (i) 162.8 سم² (ب) 76.56 سم² (ج) 550 م²
- 2- (i) 113 سم² (ب) 283 سم² (ج) 102 م²
- 3- 55 سم²
- 4- (i) 55.44 سم² 92.4 سم² (ب) 346.5 م² 369.6 م²
- (ج) 25 م² 154 م² (د) 37 سم² 3850 سم²
- (هـ) 21 سم² 1386 سم² (و) 2.8 م² 24.64 م²
- (ز) 14 م² 651.2 م² (ح) 3.5 سم² 137.5 سم²
- 5- 6 سم

تمرين 5 هـ

- 1- (i) 5280 سم³ (ب) 70.4 سم³ (ج) 15.4 م³
- 2- (i) 24 م (ب) 4 سم (ج) 2.1 م
- 3- (i) 3 سم (ب) 12 م (ج) 12 سم
- 4- (i) 30 سم² (ب) 12.3 سم² (ج) 114 م²
- 5- (i) 0.7 سم (ب) 6 م (ج) 3 سم
- 6- (i) 154 سم² (ب) 1232 سم³

تمرين 5 و

- 1- (i) 12.6 سم² 4.19 سم³ (ب) 2460 سم² 11500 سم³
- (ج) 615 سم² 1440 سم³ (د) 19.6 سم² 8.18 سم³
- 2- (i) 6 سم² 144 سم² (ب) 3 سم² 36 سم²
- 3- (i) 7 سم² 1437 سم³ (ب) 3.5 سم² 180 سم³
- 4- (i) 288 سم² (ب) 1 سم²
- 5- 693 م²
- 6- 785 سم²
- 7- (i) 170 سم² 198 سم³ (ب) 104 سم² 94.2 سم³
- (ج) 716 سم² 1580 سم³
- 8- (i) 3768 سم³ (ب) 523 $\frac{1}{3}$ سم³ (ج) 1.67 سم
- 9- $\frac{2}{3}$
- 10- (i) $\frac{4}{3}$ (ب) $\frac{4}{9}$

ورقة المراجعة 5

- 1- (i) 5 $\frac{1}{2}$ سم 2- 100 سم³ (ب) 15 سم
- (ب) 19 $\frac{1}{4}$ سم² (ج) 1.8 م²
- 3- (i) 20 سم³ (ب) 6 م³ 4- (i) 616 سم²
- (ج) 13 سم (ب) 4851 سم³
- 5- 210 م² 6- 24 سم 7- (i) 32.5 سم²
- 8- (i) 10 سم (ب) 49 سم² 14 سم²
- 9- (i) 70 (ب) 15.7 سم²
- (ب) 90 سم²

الفصل السادس

تمرين 6

1- صنف: شكل زائعي شكل جسامي شكل سداسي شكل
سباعي شكل ثماني شكل تساعي شكل عشاري



1260 (أ)	720 (أ)	-2
135 (أ)	108 (أ)	-3
4 (أ)	7 (أ)	-4
40 -6	100 -5	
120 (أ)	30 (أ)	-7
10 (أ)	12 (أ)	-8
18 (أ)	20 (أ)	-9
8 -14	111 -13	15 -12
10 (أ)	144 (أ)	108 (أ)

ورقة المراجعة 6


144 (أ)	1440 (أ)	-1
12 (أ)	8 (أ)	-2
250 (أ)	130 (أ)	-3

الفصل السابع


تمرين 7




2 (د)	1 (ج)	1 (ب)	1 (أ)
3 (ح)	4 (ز)	2 (و)	2 (هـ)
		8 (ط)	




(جـ)




(د)




(هـ)




(و)




(ز)




(ح)



(ط)



(ي)



6- (أ) ص = 0 (محور ص) (ب) ص = 0 (محور ص) (ج) ص = - ص (د) ص = 0 (هـ) ص = ص (و) ص = 1

تمرين 7 ب


1- (أ) 1.1 (ب) 1.1 (ج) 2.2 (د) 1.1 (هـ) 4.4 (و) 1.1 (ز) 4.0 (ح) 2.2 (ط) 1.1 (ي) 2.0

2- (أ)



رتبة 2

(ب)



رتبة 2

(جـ)



رتبة 6

5- (أ) و (ب)




(جأ)

1 (د)

6- (أ)

(ب)




(د)

(جأ)



(ق)

(هأ)



6.6 (د)

5.5 (جأ)

4.4 (ب)

3.3 (أ) -7

10.10 (هأ)

9.9 (ق)

8.8 (غأ)

7.7 (ح)


(ب) 10.10

100.100 (أ) -8

ورقة المراجعة 7

1- (أ)

(ب)





(جأ)



2- (أ)

(ب)



(جأ)



3- Z, S, R, Q, P, N, J, G, F

2 (أ)

2 (أ) (أ) -4

1 (أ)

1 (أ) (أ)

3 (جأ)

2 (أ)

4 (أ) -5

5 (هأ)



1 (د)

6.2 (أ)

6.2 (أ) -6

4 (أ) شكل

2 (أ) شكل -7



الفصل الثامن

أنشطة

صفحة 158

1- (أ) نعم

(د) لا

2- (أ) نعم

(د) نعم

3- (أ) نعم

(د) لا

4- (أ) 3, 1

(د) 2, 1

5- (أ) 10.10

(د) 9.9

(ب) نعم

(هأ) نعم

(ب) نعم

(هأ) لا

(ب) نعم

(هأ) نعم

(أ) 3, 1

(هأ) 2, 1

(أ) 10.10

(هأ) 9.9

(جأ) نعم

(أ) لا

(جأ) لا

(أ) لا

(جأ) لا

(أ) نعم

(جأ) 2, 1

(جأ) 10.10

(أ) 9.9

تقرین 8 ا

- 1- (أ) $\Delta \text{ أ ب ح} = \Delta \text{ ب ص ع}$ (اضرب ضاراً)
 (ب) $\Delta \text{ أ ب ح} = \Delta \text{ د ط ر}$ (اضرب ضاراً)
 (ج) $\Delta \text{ د ط ر} = \Delta \text{ ع س ص}$ (اضرب ضاراً)
 (د) $\Delta \text{ أ ب ح} = \Delta \text{ ط ز د}$ (اضرب ضاراً)
 (هـ) $\Delta \text{ أ ب ح} = \Delta \text{ د ط ر}$ (اضرب زائراً)
 (و) $\Delta \text{ أ ب ح} = \Delta \text{ ص س ع}$ (اضرب)
 (ز) $\Delta \text{ أ ب ح} = \Delta \text{ ع ص س}$ (اضرب ضاراً)
 (ح) $\Delta \text{ أ ب ح} = \Delta \text{ س ص ع}$ (اضرب زائراً)
- 2- (أ) $\Delta \text{ س، ب، ص، د، ع} = \Delta \text{ ع، ب، ص}$ (اضرب ضاراً)
 (ب) $\Delta \text{ د، ق، ف، د، ق، ف} = \Delta \text{ د، ق، ف}$ (اضرب ضاراً)
 (ج) $\Delta \text{ ي، ح، د، ح، ي، س، ثاقبل بالثلاث، ز، ي} = \Delta \text{ س، ي، ث}$ (اضرب ضاراً)
 (د) $\Delta \text{ ر، م، ر، م، ر، م، ث، ث، م، م، ر، م، ر، م} = \Delta \text{ م، ر، م}$ (اضرب ضاراً)

- 3- (i) من = 3.2 كم
 (ب) 30 =
 (ج) من = 6 كم
 (د) 30 =
 (هـ) من = 8.5 كم
 (و) من = 30 كم
 (ز) 60 =
 (ح) 50 =
 (ط) 30 =
 (ي) من = 15 كم
 (ك) 30 =

تقریریں 8 ب

- 1- (i) Δ سر، Δ ص، Δ ب، Δ سر ص ع (ب) Δ سر ص ع، Δ سر
- 2- (ii) $\Delta\Delta$ ا ب، Δ سر، Δ سر ص ع (متشابهان)
- (ب) $\Delta\Delta$ ا ب، Δ سر ص ع (متشابهان)
- (ج) $\Delta\Delta$ سر، Δ سر ص ع (متشابهان)
- (د) $\Delta\Delta$ سر، Δ سر ص ع
- (هـ) $\Delta\Delta$ ا ب، Δ سر ص ع

- 3- (i) من = 4 (ب)
(ا) من = 30
(ج) من = 2
(هـ) من = 15
(ز) من = $7\frac{1}{2}$ ب = $19\frac{1}{2}$ (ح) ع = $3\frac{3}{4}$
- 4- (i) من = $1\frac{1}{2}$ من = 2
(ا) من = 3 ت = 4
(ب) من = 8
(ج) من = 3
(د) من = 4
(هـ) من = 3
(و) من = 6

تمرین 8 ج

- $\uparrow 1\frac{1}{3} \cdot 3$ $\uparrow 12 \cdot 2$ $\uparrow 7.2 \cdot 1$
 $\uparrow 1.5 \cdot 6$ $\uparrow 3 \cdot 5$ 4- من 0.15 ، $\uparrow$ ، $\text{ص} = 2$ م
 $\uparrow 9 \cdot 8$ $\uparrow 9 \cdot 7$

أنشطة

الصفحة 182

- | | | | |
|------------|-------------|----------------|------------------|
| 9 : 1 (أ) | 3 : 1 (جأ) | 2^2 36 (ب) | 2^2 4 (أ) -1 |
| 25 : 1 (أ) | 5 : 1 (جأ) | 2^2 225 (ب) | 2^2 9 (أ) -2 |
| 9 : 1 (أ) | 3 : 1 (جأ) | π 144 (ب) | π 49 (أ) -3 |
| 25 : 1 (أ) | 5 : 1 (جأ) | π 4900 (ب) | π 196 (أ) -4 |
| | 9 : 4 (جأ) | 3 : 2 (ب) | (أ) نعم -5 |
| | 9 : 16 (جأ) | 3 : 4 (ب) | (أ) نعم -6 |

تقریریں 8 د

- | | | | |
|----------|----------|---------|----|
| 250 (جا) | 90 (ب) | 40 (ii) | -1 |
| 22.5 (و) | 2.5 (ها) | 640 (د) | |
| 288 (جا) | 72 (ب) | 32 (ii) | -2 |
| 0.5 (و) | 2 (ها) | 800 (د) | |
| | 50 (ج) | 18 (ر) | |
| 3 (جا) | 1 (ب) | 1 (ii) | -3 |
| 10 (و) | 6 (جا) | 2 (د) | |
| 7 (ط) | 6 (ج) | 3 (ر) | |
| 100 (ل) | 10 (د) | 3 (د) | |

- 81 49 -5 27 45 -4

- 72-7 1,2-6

- 8 103.50 بشار

- $\Gamma_{\text{Laser}} = 225 \pm 10$

- 3:2 (ii) (ب) 11- نعم
11:2 (iii) 16.05 (ii)

- $2f_{33} \quad (-)$

أنشطة

(صفحة 185)

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| $^3\sqrt{216}$ (ب) | $^2\sqrt{27}$ (ii) -1 |
| 8 : 1 (ا) | 2 : 1 (جا) |
| $^3\sqrt{1}$ (ب) | $^3\sqrt{64}$ (ii) -2 |
| 1 : 64 (ا) | 1 : 4 (جا) |
| $^3\sqrt{3750}$ (ب) | $^3\sqrt{30}$ (ii) -3 |
| 5 : 1 (ا) | (جا) نعم |
| | 125 : 1 (ها) |
| $^3\sqrt{\frac{1}{8}}$ (ب) | $^3\sqrt{8}$ (ii) -4 |
| 1 : 64 (ا) | 1 : 4 (جا) |
| $^3\sqrt{41580}$ (ب) | $^3\sqrt{1540}$ (ii) -5 |
| 1 : 3 (ا) | (جا) نعم |
| | 1 : 27 (ها) |

تمرين 8هـ

- 1- (i) 64 كم^3 (أ) 216 كم^3 (ب) 1000 كم^3 (ج) 27 كم^3 (د)
- 2- (i) 8 كم^3 (أ) 125 كم^3 (ب) 512 كم^3 (ج) 0.001 كم^3 (د)
- 3- 4, 3 (أ) 5, 2, 1 (ب) 400-5 (ج) 27 : 8 (د)
- 6- (i) نعم (أ) لا (ب) 1 : 8 (ج) 3 (د)
- 8- 329.4 كم^3 (أ) 7 : 1 (ب) 8 : 1 (ج) 1 : 10 (د)

تمرين 8و

- 1- (i) 2, 1 (أ) 10 (ب) 9 (ج) 16 (د)
- 2- (i) 4, 3 (أ) 18 (ب) 16, 9 (ج) 25, 9 (د)
- 3- (i) 5, 4 (أ) 125, 64 (ب) 5, 3 (ج) 1, 125 (د)
- 4- (i) 125, 27 (أ) 1, 5 (ب) 144, 1 (ج) 1728, 1 (د)
- 5- (i) 1, 25 (أ) 4, 8 (ب) 13, 5 (ج) 1728, 1 (د)
- 6- (i) 4, 8 (أ) 13, 5 (ب) 144, 1 (ج) 1728, 1 (د)

ورقة المراجعة 8

- 1- (i) Δ ق ح ع (أ) Δ ر ذ د (ب) Δ ر ذ د (ج) Δ ر ذ د (د)
- 3- (i) Δ د ط ر (أ) Δ د ط ر (ب) Δ د ط ر (ج) Δ د ط ر (د)
- 4- (i) $\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}$ (أ) Δ أ ب ح (ب) Δ أ ب ح (ج) Δ أ ب ح (د)
- 5- Δ أ د ح (أ) Δ أ د ح (ب) Δ أ د ح (ج) Δ أ د ح (د)
- 6- Δ ز ك ل (أ) Δ ز ك ل (ب) Δ ز ك ل (ج) Δ ز ك ل (د)
- 7- (i) $\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}$ (أ) Δ أ ب ح (ب) Δ أ ب ح (ج) Δ أ ب ح (د)
- 8- $\frac{2}{3}$ (أ) $\frac{4}{9}$ (ب) $\frac{18}{9}$ (ج) $\frac{18}{9}$ (د)
- 9- (i) Δ د ت ح (أ) Δ د ت ح (ب) Δ د ت ح (ج) Δ د ت ح (د)
- 10- (i) $\frac{3}{20}$ (أ) $\frac{3}{20}$ (ب) $\frac{3}{20}$ (ج) $\frac{3}{20}$ (د)

الفصل التاسع

تمرين 9أ

- 1- (i) 2, 67 (أ) 5, 78 (ب) 5, 43 (ج) 59 (د)
- 2- (i) 8 (أ) 308 (ب) 6 (ج) 19 (د)
- 3- (i) 195 (أ) 19 (ب) 54 (ج) 54 (د)
- 4- (i) 510 (أ) 54 (ب) 54 (ج) 54 (د)

3.2-6

7- (i) 2, 1 (أ) 2, 4 (ب)

8- 2.8

9- (i) 7 (أ) 20 (ب) 25 (ج) 36 (د)

1.44 (أ)

10- (i) 135 (أ) 4.5 (ب)

11- (i) 25 (أ) 44 (ب) 1.76 (ج)

تمرين 9 ب


- 1- (i) 3 (أ) 6 (ب) 5.5 (ج) 83 (د)
- 2- 3 (أ) 4.2 (ب) 7.2 (ج)
- 4- (i) 5 (أ) 3.70 (ب) 50 (ج) 55 (د)
- 5- 3 (أ) 4 (ب) 5 (ج) 6 (د)
- 6- 4 (أ) 5 (ب) 6 (ج) 7 (د)
- 7- (i) 50 (أ) 1.5 (ب) 75 (ج) 2 (د)
- 8- (i) 1.5 (أ) 75 (ب) 2 (ج) 30 (د)
- 9- (i) 75 (أ) 2 (ب) 30 (ج) 2 (د)
- 10- (i) 2 (أ) 30 (ب) 2 (ج) 2 (د)
- 11- (i) 30 (أ) 2 (ب) 2 (ج) 2 (د)
- 12- 2 (أ) 2 (ب) 2 (ج) 2 (د)

تمرين 9 ج

- 1- (i) 3 (أ) 3 (ب) 5 (ج) 110 (د)
- 2- (i) 1, 2 (أ) 5.4 (ب) 3 (ج) 6 (د)
- 3- 3 (أ) 4 (ب) 7 (ج) 2.4 (د)
- 4- (i) 4 (أ) 2 (ب) 1.3 (ج) 21 (د)
- 5- (i) 2 (أ) 7 (ب) 9 (ج) 21 (د)
- 6- (i) 7 (أ) 4 (ب) 8 (ج) 8 (د)
- 7- (i) 4 (أ) 12 (ب) 8 (ج) 8 (د)
- 8- (i) 12 (أ) 2 (ب) 2.6 (ج) 3 (د)
- 9- (i) 2 (أ) 25 (ب) 3 (ج) 3 (د)
- 10- (i) 3 (أ) 20 (ب) 2 (ج) 2.5 (د)
- 11- (i) 25 (أ) 3 (ب) 3 (ج) 3 (د)
- 12- (i) 20 (أ) 2 (ب) 2 (ج) 2 (د)

ورقة المراجعة 9




- 1- (i) 2, 7 (أ) 5, 09 (ب) 4.5 (ج) 709 (د)
- 2- (i) 3 (أ) 3 (ب) 3 (ج) 1 (د)
- 3- (i) 9 (أ) 3 (ب) 1 (ج) 1 (د)
- 4- (i) 3 (أ) 25 (ب) 1.4 (ج) 46 (د)
- 5- (i) 25 (أ) 20 (ب) 48.15 (ج) 1.52 (د)
- 6- (i) 490 (أ) 20 (ب) 3 (ج) 117.4 (د)
- 7- (i) 20 (أ) 25 (ب) 1 (ج) 1.33 (د)
- 8- (i) 25 (أ) 3 (ب) 1 (ج) 1 (د)
- 9- (i) 120 (أ) 120 (ب) 1 (ج) 1 (د)
- 10- (i) 1 (أ) 1 (ب) 1 (ج) 1 (د)



(جـ)

التقويم 2

- 1- (أ) $2\frac{1}{7}$ (ب) 2 (جـ) 2 و 4
2- (أ) 60 (ب) 60°
3- (6, 7) 4- ص = -1، ص = 2
5- (أ) (ب)




- 6- (أ) $3 - 2 \times 2$ (ب) $5 - 7$ (جـ) $3 - 5$
7- (أ) 2 (ب) 3 (جـ) 5 (د) 1
8- (أ) $19\frac{1}{2}$ سم (ب) $115\frac{1}{2}$ سم
9- (أ) ص = 4، ص = 8 (ب) ص = 18

2	0	2-	ص	-10
6	0	6-	3 ص	
2-	2-	2-	2-	
4	2-	8-	ص = 3، ص = 2	


- 11- (أ) ص = 3 (ب) ص = -3، ص = 3 (جـ) ص = 3
(د) ص = 3، ص = 2 (هـ) ص = 3، ص = 3
12- عمر الولد = 17 سنة، عمر الأخت = 7 سنوات

- 13- (أ) (أ) $28\frac{1}{2}$ سم (ب) 130 سم (جـ) 9 سم



التقويم 3


- 1- (أ) 1000 (ب) 137.50 دينار (جـ) 0.05 دينار
2- (أ) 2 (ب) 270 (جـ) 2.5
3- (أ) (أ) 15، 5 (ب) 5 (جـ) 15، 5 (د) 5، 3
(أ) (أ) 3، 5 (ب) 2 (جـ) 2 (د) 2
4- (أ) (أ) (ب)



(جـ) (0, 0)

- 5- (أ) ص = 5، ص = 2 (ب) 31 سم
6- (أ) 11 سم (ب) 31 سم
7- أي أربعة من هذه Z, S, X, N, H, I
8- (أ) (أ) 120 (ب) 30 (جـ) 60 (د) 60
(ب) مثلث متساوي الاضلاع
9- (أ) 20 (ب) 40 ساعة (جـ) 21.45 ساعة

(i) -10



(ب)



-11 (i) 550 سم²

-12 (i) س = 2، ص = 4

-13 (i) $\frac{19}{40}$

(جـ) $\frac{3-2}{3}$

-14 (i) هـ = $1\frac{1}{5}$

(جـ) س = 5

-15 (i) $(b-f)(b+f)$

(ب) 0.308

-16 (ii)

ص	1	3	5
ص	-5	1	7

س	0	1	3
ص	2	0	-4

(ب) س = 2، ص = -2

-17 (i) 20

(ب) 1

(جـ) 1

(د) 1.5

(ب) 1232 سم³

(ب) 10 وحدات

(ب) $\frac{b-31}{24}$

(ب) ك = 5

ملاحظات

ملاحظات