

2.4.2 Разбиения и числа Стирлинга

Пусть $\mathcal{B} = \{B_1, \dots, B_k\}$ есть разбиение множества X из n элементов на k подмножеств:

$$\forall i \quad B_i \subset X, \cup B_i = X, B_i \neq \emptyset$$

$$B_i \cap B_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$$

$$|B_i| = n_i, \quad n_1 + n_2 + \dots + n_k = n.$$

Тогда набор (B_1, \dots, B_k) называется **упорядоченным разбиением** множества X , а подмножества B_i называются **блоками разбиения**.

Если \mathcal{B}_1 и \mathcal{B}_2 – два разбиения X , то разбиение \mathcal{B}_1 есть **измельчение разбиения** \mathcal{B}_2 , если каждый блок \mathcal{B}_2 есть объединение блоков \mathcal{B}_1 .

Измельчение является частичным порядком на множестве разбиений.

Число упорядоченных разбиений

$$R(n; n_1, n_2, \dots, n_k) = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_k!}$$

Число $R(n,k)$ упорядоченных разбиений на k подмножеств вычисляется по формуле:

$$R(n, k) = \sum_{n_1 + n_2 + \dots + n_k = n; n_i > 0} R(n; n_1, n_2, \dots, n_k)$$

Числа $R(n; n_1, n_2, \dots, n_k)$ называются

полиномиальными коэффициентами.

Теорема 2.7(Полиномиальная теорема)

$\forall a_1, a_2, \dots, a_k \in R$ справедливо соотношение:

$$(a_1 + a_2 + \dots + a_k)^n = \sum_{n_1 + n_2 + \dots + n_k = n; n_i \geq 0} R(n; n_1, n_2, \dots, n_k) \cdot a_1^{n_1} \cdot a_2^{n_2} \cdot \dots \cdot a_k^{n_k}$$

Если рассмотренный выше набор (B_1, \dots, B_k) рассматривать без учета порядка его блоков, то он называется **неупорядоченным разбиением** множества X , или просто **разбиением на k блоков**.

Число разбиений n -элементного множества на k блоков называется **числом Стирлинга второго рода** и обозначается **$S(n, k)$** .

$$S(n, k) = S(n-1, k-1) + k \cdot S(n-1, k) \quad (0 < k < n)$$

$$S(n, 0) = 0 \text{ при } n > 0, \quad S(n, k) = 0 \text{ при } n < k,$$

$$S(n, n) = 1, \quad S(0, 0) = 1.$$

Пример. Сколькими способами можно разместить 4 человека за двумя одинаковыми столиками, что бы столики не были пустыми?

Из формул следует удобный способ рекуррентного вычисления значений чисел Стирлинга 2 рода, который можно представить в графической форме. В этом треугольнике каждое k -е в ряду число является суммой левого стоящего над ним числа с правым, умноженным на k . Тогда число Стирлинга $S(n, k)$ находится в n -м ряду на k -м месте, если начинать счет от 0.