

Smooth Peel

Smooth Peel

สมูท พีล

น้ำยาช่วยละลายกาวบนพลาสเตอร์ปิดแผล

- 💧 อ่อนโยน
- 💧 ปลอดภัย
- 💧 เหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

วิธีใช้: สเปรย์ **สมูท พีล** ลงบริเวณขอบของพลาสเตอร์ปิดแผลจนทั่ว เพื่อช่วยละลายกาวและทำให้พลาสเตอร์ปิดแผลลอกออกได้ง่าย **สมูท พีล** บรรเทาการ ระคายเคือง และการเจ็บปวดจากการลอกพลาสเตอร์ปิดแผล

คำเตือน: ไม่ควรสเปรย์ **สมูท พีล** ลงบนแผลโดยตรง

ส่วนประกอบ: Paraffinum Liquidum, Tocopheryl Acetate, และ Oil of Melaleuca Alternifolia

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ:

NAPP PHARM CO., LTD โทร: 08-3547-4415



อย่าให้การลอกพลาสเตอร์ปิดแผลเพิ่มรอยแผลให้กับผิวที่บอบบาง...



NAPP PHARM
Innovate for delicate people

71%

ของคนไข้ เกิด MARSI จาก
การลอกพลาสติกปิดแผล¹

4 กลุ่มคน เสี่ยงเกิด MARSI²

(Medical-Adhesive Removal Skin Injury)

Newborns

การเชื่อมต่อของผิวหนังชั้น
epidermis กับ dermis ของ
เด็กแรกเกิดยังไม่แข็งแรงเท่า
ผู้ใหญ่ ผิวหนังจึงถูกลอกได้ง่าย

Older adults


โครงสร้างผิวหนังของผู้สูงอายุนั้น
อ่อนแอ เมื่อมีการดึงพลาสติก
อาจทำให้ผิวหนังชั้นบนหลุดติด
พลาสติกหรือออกมาได้

Medications

ยาบางชนิด เช่น สเตียรอยด์
ทำให้ผิวหนังบางลง ซึ่งเพิ่ม
ความเสี่ยงการเกิด MARSI
และทำให้แผลหายช้า

Malnutrition and dehydration

ผู้ป่วยที่ขาดสารอาหาร หรือ
ขาดน้ำ ผิวหนังจะแห้งเหี่ยว
และสถานะของผิวหนังมีความ
ผิดปกติไป



IV Securement
Dressing

EKG Sticky Patch



Foley Catheter
Dressing



Pressure
Dressing

ใช้ สมุท พิล ในคนไข้กลุ่มใด ?

Sources:

1. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. *Wound UK*. 2008, Vol 4, No 1.
2. Taroc, A M. A guide for adhesive removal: Principles, practice, and products. *American Nurse Today*. 2007, Vol 12, No. 10.