



อย่าให้การลอกพลาสติกปิดแผล
เพิ่มรอย**แผล**ให้กับผิวหนังบอบบาง...

Don't let the bandage removal
leave the scratch...



71% ของคนไข้ เกิด MARSI จากการลอกพลาสติกปิดแผล
of patients have MARSI from adhesive bandage removal.¹

4 กลุ่มคน เสี่ยงเกิด MARSI² (Medical-Adhesive Removal Skin Injury)



Newborns

การเชื่อมต่อของผิวหนังชั้น
epidermis กับ dermis ของเด็กแรก
เกิดยังไม่แข็งแรงเท่าผู้ใหญ่ ผิวหนัง
จึงลอกได้ง่าย



Older adults

โครงสร้างผิวหนังของผู้สูงอายุนั้นอ่อนแอ
เมื่อมีการดึงพลาสติกอาจทำให้ผิวหนัง
ชั้นบนหลุดติด พลาสติกออกมาได้



Medications

ยาบางชนิด เช่น สเตียรอยด์ ทำให้
ผิวหนังบางลง ซึ่งเพิ่มความเสี่ยง
การเกิด MARSI และทำให้แผล
หายช้า



Malnutrition and dehydration

ผู้ป่วยที่ขาดสารอาหาร หรือ ขาดน้ำ
ผิวหนังจะแห้งหยาบ และสภาวะของ
ผิวหนังมีความผิดปกติไป

Sources:

1. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. *Wound UK*. 2008, Vol 4, No 1.
2. Taroc, A.M. A guide for adhesive removal: Principles, practice, and products. *American Nurse Today*. 2007, Vol 12, No. 10.

Smooth Peel

Adhesive Bandage Remover

- 💧 Gentle
- 💧 Non-toxic
- 💧 Suitable for children and adults



Please contact: NappPharm@outlook.com