

# Aufgabe 03

Gruppe 01

6 5 2020

## Aufgabe 07 Deskriptive Statistik

```
#Workspace laden
load("data/yingtan_20_ueb3.RData")
Ca <- ljz$Ca_exch
```

- a) Wenden Sie die Methode summary auf die austauschbaren Ca-Ionen an und erläutern Sie kurz die mit dieser Funktion gewonnenen Parameter.

```
#summary der austauschbaren Ca-Ionen
summary(Ca)
```

```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##  3.772  13.633  19.491  21.926  28.718  94.311
```

Mit dem Befehl summary() werden die Quantile, der Median, der Mittelwert sowie Minimum und Maximum der Beobachtungswerte der Variable angegeben. Der Mittelwert oder auch Durchschnitt der gemessenen Ca-Ionen ist hier 21,926  $\mu\text{mol/g}$ . Der Median, bei dem die Anzahl der Werte halbiert wird, beträgt 19,491  $\mu\text{mol/g}$ . Für die Quantile wird die Anzahl der Werte in vier gleich große Teile geteilt. Das erste Quantil endet bei 13,633  $\mu\text{mol/g}$ , das zweite Quantil ist gleich Median, das dritte Quantil endet bei 28,718  $\mu\text{mol/g}$  und das vierte Quantil ist gleich der größte Beobachtungswert, also 94,311  $\mu\text{mol/g}$ .

- b) Ermitteln Sie wiederum für die austauschbaren Ca-Ionen die Streuungsparameter Varianz und Standardabweichung sowie die zentralen Momente Schiefe und Kurtosis (bezogen auf NV mit kurtosis = 0).

```
library(psych)
var(Ca)
```

```
## [1] 123.8529
```

```
psych::describe(Ca)
```


```
##      vars   n mean    sd median trimmed  mad  min   max range skew kurtosis
## X1      1 335 21.93 11.13  19.49   20.98 10.22 3.77 94.31 90.54  1.5    5.55
##      se
## X1 0.61
```

Die Varianz für die austauschbaren Ca-Ionen ist 123,85  $\mu\text{mol/g}$ . Die Standardabweichung, also die Wurzel aus der Varianz ist 11,13  $\mu\text{mol/g}$ . Das bedeutet.. Der Kurtosis-Wert ist 5,55 ( $> 0$ ), daher verläuft die Verteilung der austauschbaren Ca-Ionen im Bezug auf die Normalverteilung steilgipflig verläuft. Der Wert für die Schiefe ist 0,61 ( $> 0$ ), was zeigt, dass die Verteilung zudem linkssteil und rechtsschief verläuft.

## Aufgabe 08 Dichte-Histogramme und Box-Whisker-Plots in R

- a) Erstellen Sie ein Dichte-Histogramm für die austauschbaren Ca-Ionen. Achten Sie dabei auf aussagekräftige Klassenweiten. Ändern Sie Titel und Achsenbeschriftungen sinnvoll ab und färben Sie die Balken grau ein.

```
hist(Ca,  
     nclass = 50,  
     main = "Verteilung der austauschbaren Ca-Ionen",  
     xlab = "austauschbaren Ca-Ionen [ $\mu\text{mol/g}$ ]",  
     ylab = "Häufigkeit",  
     col = "gray")
```




- b) Um welche Verteilung handelt es sich bei der Ca-Ionenkonzentration dem visuellen Eindruck nach? Setzen Sie ihre Vermutung in Bezug zu den in Aufgabe 7b. errechneten Formparametern.

Die meisten Werte befinden sich in den ersten beiden Quantilen. Dadurch ist die Verteilung rechtsschief und linkssteil. Das spiegelt sich in dem Formparameter für die Schiefe ( $0,61 > 0$ ) wieder. Darüber hinaus verläuft die Verteilung steilgipflig. Das bedeutet, dass der Wertebereich, in dem 90% der beobachteten Werte liegen kleiner ist, als bei der Normalverteilung und so der Median kleiner als der Mittelwert ist. Außerdem ist der Parameter für die Kurtosis  $> 0$ .

- c) Erstellen Sie nun für die austauschbaren Ca-Ionen einen Box-Whisker-Plot und untersuchen Sie das Randverhalten der Verteilung. Geben Sie mögliche Ausreißer in ihrem Protokoll an ( $\text{range} = 1,5$ ). Vergeben Sie auch hier einen sinnvollen Titel sowie passende Achsenbeschriftungen. Verkleinern Sie die Balkenbreite, um eine ansprechende Grafik zu erzeugen.

```
#Erstellen von Boxplots  
boxplot(Ca,
```

```
xlab = "Häufigkeit der austauschbaren Ca-Ionen",
ylab = " austauschbare Ca-Ionen [μmol/g]",
pars = list(boxwex = 0.4))
```



### Häufigkeit der austauschbaren Ca-Ionen

Vor allem im oberen Wertebereich befinden sich Ausreißer. Sie liegen im 1,5-fachen Interquartelsabstand (Boxenlänge) von der Box entfernt. Die Box selbst geht vom ersten bis zum dritten Quantil und die Querstriche zeigen jeweils die Größte und kleinste Beobachtung ohne Ausreißer.

Um einen besseren Überblick über die Verteilung der austauschbaren Ca\_Ionen zu erhalten, sollten die zwei höchsten Werte (94,31 μmol/g und 71,7 μmol/g) evtl. aus der Berechnung rausgelassen werden, da dort scheinbar Messfehler vorliegen.

## Aufgabe 09 Plotten in R

Boxplots mit den Paketen base graphics, lattice und ggplot2 für die austauschbaren Ca-Ionen für drei unterschiedliche Datensätze (regular, catA und catQ)

```
library(dplyr)
```

```
##
## Attaching package: 'dplyr'
##
## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##   filter, lag
##
## The following objects are masked from 'package:base':
##
##   intersect, setdiff, setequal, union
```

```
ljzmod <- ljz %>%
  dplyr::filter(SAMPLING == "regular" | SAMPLING == "catA" | SAMPLING == "catQ") %>%
  dplyr::select(OBJECTID, SAMPLING, Ca_exch)
```


In dem tibble `ljzmod` sind nun die Samples `regular`, `catA` und `catQ` der austauschbaren Ca-Ionen nach ihrer Object-ID in je einer Spalte sortiert.

- Paket `base` graphics

```
#Variablen der einzelnen Samplings
regular <- ljzmod$Ca_exch[ljzmod$SAMPLING == "regular"]
catA <- ljzmod$Ca_exch[ljzmod$SAMPLING == "catA"]
catQ <- ljzmod$Ca_exch[ljzmod$SAMPLING == "catQ"]

#mit Ausreisser
boxplot(regular, catA, catQ,
  names = c("regular", "catA", "catQ"),
  ylab = "austauschbare Ca-Ionen [μmol/g]",
  main = "Verteilung der austauschbaren Ca-Ionen",
  col = "gray",
  width = c(0.4, 0.4, 0.4),
  pch = "*")
```

## Verteilung der austauschbaren Ca-Ionen




```
#ohne Ausreisser
boxplot(regular, catA, catQ,
  names = c("regular", "catA", "catQ"),
  ylab = "austauschbare Ca-Ionen [μmol/g]",
```

```

main = "Verteilung der austauschbaren Ca-Ionen\n ohne Ausreißer",
col = "gray",
width = c(0.4, 0.4, 0.4),
pch = "*",
outline = FALSE)

```



Wenn `outline = FALSE` ist, werden die Ausreißer nicht berücksichtigt.

- Paket `lattice`


```

library(lattice)

#mit Ausreisser
bwplot(Ca_exch ~ SAMPLING, data = ljzmod,
       ylab = "austauschbare Ca-Ionen [µmol/g]",
       main = "Verteilung der Austauschbaren Ca-Ionen",
       box.ratio = 0.5,
       par.settings = list(box.rectangle = list(col = "black",
                                                fill = "gray"),
                           box.umbrella = list(col = "black"),
                           plot.symbol = list(col = "black",
                                                pch = "*")))


```

## Verteilung der Austauschbaren Ca-Ionen



```
#ohne Ausreisser
bwplot(Ca_exch ~ SAMPLING, data = ljzmod,
  ylab = "austauschbare Ca-Ionen [ $\mu\text{mol/g}$ ]",
  main = "Verteilung der Austauschbaren Ca-Ionen\n ohne Ausreisser",
  box.ratio = 0.5,
  do.out = FALSE,
  par.settings = list(box.rectangle = list(col = "black",
    fill = "gray"),
    box.umbrella = list(col = "black")))
```

## Verteilung der Austauschbaren Ca-Ionen ohne Ausreisser



Mit `do.out = TRUE/FALSE` wird bestimmt, ob Ausreißer angezeigt werden sollen oder nicht.

- Paket `ggplot2`


```
library(ggplot2)
```

```
##  
## Attaching package: 'ggplot2'  
## The following objects are masked from 'package:psych':  
##  
##    %+%, alpha
```

*#mit Ausreisser*

```
ggplot(ljzmod, aes(x = SAMPLING,  
                  y = Ca_exch)) +  
  labs(title = "Verteilung der austauschbaren Ca-Ionen",  
        y = "austauschbare Ca-Ionen [µmol/g]") +  
  geom_boxplot(fill = '#A4A4A4',  
              color = "black",  
              width = 0.5,  
              outlier.shape = 8)
```

## Verteilung der austauschbaren Ca-Ionen




```
#ohne Ausreisser
ggplot(ljzmod, aes(x = SAMPLING,
                   y = Ca_exch)) +
  labs(title = "Verteilung der austauschbaren Ca-Ionen\n ohne Ausreisser",
        y = "austauschbare Ca-Ionen [µmol/g]") +
  geom_boxplot(fill = '#A4A4A4',
               color = "black",
               width = 0.5,
               outlier.shape = NA) +
  scale_y_continuous(limits = quantile(ljzmod$Ca_exch,
                                       c(0.1,0.9)))
```

```
## Warning: Removed 60 rows containing non-finite values (stat_boxplot).
```



### Verteilung der austauschbaren Ca-Ionen ohne Ausreisser



In dem Paket ggplot2 werden, wenn in dem Argument `geom_boxplot` das Unterargument `outlier.shape = NA` gesetzt ist, die Ausreißer nicht angezeigt. Mit dem Argument `scale_y_continuous` kann die y-Achse neu angepasst werden.