

# Aufgabe 06

Gruppe 01

4 6 2020

Laden Sie den Workspace yingtan\_20\_ueb3.Rdata sowie das Paket gstat und überführen Sie das Objekt ljz in ein SpatialPointsDataFrame. Reproduzieren Sie ihr Variogrammmodell aus der vorangegangenen Übung.

```
library(tidyverse)

## -- Attaching packages ----- tidyverse 1.3.0 --
## v ggplot2 3.3.0    v purrr  0.3.4
## v tibble  3.0.1    v dplyr  0.8.5
## v tidyr   1.0.2    v stringr 1.4.0
## v readr   1.3.1    v forcats 0.5.0

## -- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
## x dplyr::filter() masks stats::filter()
## x dplyr::lag()    masks stats::lag()

load("data/yingtan_20_ueb3.RData")

##SpatialPointsDataFrame##
library(sp)
#Spalten mit den Koordinaten selektieren
spatialCoords <- dplyr::select(ljz,
                               long = EAST,
                               lat = NORTH)

#Koordinatensystem definieren (s. txt-Datei Datenbeschreibung)
coordRefSys <- CRS("+proj=utm +zone=50 +ellps=WGS84 +datum=WGS84")

#SpatialPointsDataFrame erstellen
SPDFljz <- SpatialPointsDataFrame(spatialCoords,
                                  ljz,
                                  proj4string = coordRefSys)


##Reproduktion des Variogrammmodells##
#omnidirektionales empirisches Variogramm
library(gstat)
Ca <- SPDFljz@data$Ca_exch

vario_omni_Ca <- variogram(Ca ~ EAST + NORTH,
                           data = SPDFljz,
                           cutoff = 2202,
                           width = 150)

plot(vario_omni_Ca,
     main = "Omnidirektionales empirisches Variogramm",
```


```
pch = 4,  
col = "black")
```

## Omnidirektionales empirisches Variogramm



```
#Modell zum Variogramm  
vario_omni_Ca_fit <- fit.variogram(vario_omni_Ca,  
                                  vgm(model = "Exp"))  
  
plot(vario_omni_Ca,  
     model = vario_omni_Ca_fit,  
     cutoff = 2202,  
     ylim = c(0, 175),  
     pch = 4,  
     col = "black",  
     main = "Variogrammodell der austauschbaren Ca-Ionen")
```

## Variogrammmodell der austauschbaren Ca-Ionen



### Aufgabe 13 Ordinary Kriging

Ordinary Kriging (OK) ist das am häufigsten verwendete Kriging-Verfahren zur Interpolation punktueller Daten in die Fläche. Vom Prinzip her eine spezielle lineare Regressionstechnik, berücksichtigt es räumliche Strukturen durch die Integration der Variogramme in den Berechnungsprozess.

- Erstellen Sie ein reguläres Raster für die räumliche Interpolation. Entscheiden Sie sich für eine geeignete Pixelgröße und begründen Sie ihre Wahl. Erweitern Sie die bounding box des Objekts ljlz in x-Richtung jeweils um 180m und nach Norden und Süden um je 215m, damit auch das komplette, 10.5 km<sup>2</sup> große, Untersuchungsgebiet erfasst wird. Um ihr Spatial- Grid zu erzeugen, nutzen Sie die Funktion GridTopology. (3 Punkte)

HENGL, T. (2006): Finding the right pixel size. In: Computers & Geosciences, 32: 1283-1298. (Abschnitt 2.5: Grid resolution and point samples)

```
#Pixelsize nach Hengl 2006
sqrt(10500000/335) * 0.0791
```

```
## [1] 14.00389
```

```
#Anpassung der bounding box
bbox(SPDF1jlz)
```

```
##          min      max
## long  490441  493591
## lat   3121290 3125630
```

```
#library(sf)
#new_bb <- c(490261, 3121075, 493771, 3125845)
```

```

#names(new_bb) <- c("xmin", "ymin", "xmax", "ymax")
#attr(new_bb, "class") <- "bbox"

#attr(SPDFljz, "bbox") <- new_bb
#bbox(SPDFljz)

#
library(raster)

##
## Attaching package: 'raster'
## The following object is masked from 'package:dplyr':
##
##      select
## The following object is masked from 'package:tidyr':
##
##      extract
library(rgdal)

## rgdal: version: 1.5-8, (SVN revision 990)
## Geospatial Data Abstraction Library extensions to R successfully loaded
## Loaded GDAL runtime: GDAL 3.0.4, released 2020/01/28
## Path to GDAL shared files: C:/Users/helen/Documents/R/win-library/4.0/rgdal/gdal
## GDAL binary built with GEOS: TRUE
## Loaded PROJ runtime: Rel. 6.3.1, February 10th, 2020, [PJ_VERSION: 631]
## Path to PROJ shared files: C:/Users/helen/Documents/R/win-library/4.0/rgdal/proj
## Linking to sp version:1.4-2
## To mute warnings of possible GDAL/OSR exportToProj4() degradation,
## use options("rgdal_show_exportToProj4_warnings"="none") before loading rgdal.
Rljz <- raster(SPDFljz)


extent(Rljz) <- extent(SPDFljz)
dim(Rljz) <- c(14, 14) #vllt andere Pixelsize?

#Spatial Grid
bb <- bbox(SPDFljz)
cs <- c(14, 14) * 10500
cc <- bb[,1] + (cs/2)
cd <- ceiling(diff(t(bb))/cs)
GT <- GridTopology(cellcentre.offset = cc, #c(490261, 3121075)
                  cellsize = cs, #c(14, 14)
                  cells.dim = cd) #c(1920, 1080)
SpatialGrid(grid = GT, proj4string = coordRefSys)

## Object of class SpatialGrid
## Grid topology:
##      cellcentre.offset cellsize cells.dim
## long          563941    147000         1
## lat           3194790    147000         1
## SpatialPoints:
##      long      lat
## [1,] 563941 3194790

```

```
## Coordinate Reference System (CRS) arguments: +proj=utm +zone=50
## +datum=WGS84 +units=m +no_defs
vRljz <- rasterize(SPDFljz, Rljz, Ca)
spplot(vRljz)
```



- b) Wenden Sie die Methode `krige` entsprechend des Ordinary Kriging an und interpolieren Sie die Konzentration der Ca-Ionen auf die Rasterzellen des in Aufgabe a) erzeugten Objekts. Benutzen Sie ihr Variogrammmodell aus der vorangegangenen Übung und notieren Sie ihre R-Syntax im Protokoll. (1 Punkt)

```
#Ordinary Kriging
library(krige)
```

```
## Loading required package: mvtnorm
## Loading required package: MASS
##
## Attaching package: 'MASS'
## The following objects are masked from 'package:raster':
##
##   area, select
## The following object is masked from 'package:dplyr':
##
##   select
## Loading required package: invgamma
```

```
target_raster <- as(vRljz, "SpatialGridDataFrame")
interpol_Ca <- gstat::krige(Ca ~ 1,
                           SPDFljz, target_raster,
                           model = vario_omni_Ca_fit)
```

```
## [using ordinary kriging]
```

```
#summary(interpol_Ca)
#plot(raster(interpol_Ca))
```

c) Welche zwei Daten-Attribute produziert die krige-Funktion und wofür stehen sie? (1 Punkt)

Die krige-Funktion produziert zum einen var1.pred und zum anderen var1.var. var1.pred beinhaltet die Beschreibung der vorhergesagten Werte für die austauschbaren Ca-Ionen. var1.var beinhaltet die (Co)varianzen für die berechneten Werte.


d) Ermitteln Sie diejenigen Pixel in dem Vorhersagegrid der Zielgröße, für die die errechnete Kriging-Varianz den Wert der Gesamt-Varianz der Zielgröße überschreitet und definieren Sie diese als NoData. (1 Punkt)

```
#is.na(interpol_Ca) <- interpol_Ca@data$var1.pred > 79.69
```


e) Plotten Sie sowohl die vorhergesagten Ca-Ionenkonzentrationen als auch die zugehörigen Kriging-Varianzen mit Hilfe der Methode spplot. Maskieren Sie in der Abbildung der Vorhersagewerte die in d) ausgeschlossenen Pixel. Beschriften Sie vernünftig und verändern Sie die Farbskalen beider Graphiken, sodass ein gefälliger Druck in schwarz/weiß möglich ist. (3 Punkte) Hinweis: Mit Hilfe des Befehls ??Palettes erfragen Sie diverse Methoden verschiedener Pakete zur Erstellung von Farbpaletten. Insbesondere das Paket „RColorBrewer“ könnte dabei in Verbindung mit der Website <http://colorbrewer2.org/> von Interesse für Sie sein.

```
library(RColorBrewer)
mycolor <- brewer.pal(n = 9, name = "Greys")
library(sp)
library(lattice)
mylayout <- list(col.pixels = mycolor)
spplot(interpol_Ca, "var1.pred",
       main = "Vorhergesagte Ca-Ionenkonzentration",
       col.regions=brewer.pal(9, "Greys"))
```

## Vorhergesagte Ca-Ionenkonzentration



```
spplot(interpol_Ca, "var1.var")
```



- f) Interpretieren Sie kurz und knapp ihren Kriging-Varianz-Plot. Wieso ist die Kriging-Varianz als internes Gütemaß der Interpolation nur bedingt aussagekräftig? (1 Punkt)

Die Aussagekraft hängt stark von der Pixelgröße und der Beprobungsdichte ab. Je dichter beprobt wurde, desto kleiner kann die Pixelgröße gewählt werden und desto genauer wird die Interpolation. Da es aber meist mehr Einflussfaktoren für einen bestimmten Messwert (hier die Konzentration von austauschbaren Ca-Ionen) als die räumliche Nähe gibt, ist die Interpolation nur auf Basis der Distanz nur eine Annäherung bzw. grobe Schätzung. In diesem Beispiel hat bereits das Variogramm gezeigt, dass nur Orte, die sehr nah beieinander liegen, ähnliche Werte/eine geringe Varianz der Werte aufweisen. Deshalb ist die Interpolation allein nicht aussagekräftig genug.