

# Оглавление

<b>Занятие 1. Элементы комбинаторики</b>	<b>1</b>
Контрольные вопросы и задания . . . . .	3
Аудиторные задачи . . . . .	4
Дополнительные задачи . . . . .	12
Домашнее задание . . . . .	12
<b>Занятие 2. События и операции над ними. Пространство элементарных событий</b>	<b>18</b>
Контрольные вопросы и задания . . . . .	19
Аудиторные задачи . . . . .	21
Дополнительные задачи . . . . .	26
Домашнее задание . . . . .	29
<b>Занятие 3. Классическое определение вероятности</b>	<b>38</b>
Контрольные вопросы и задания . . . . .	39
Аудиторные задачи . . . . .	39
Дополнительные задачи . . . . .	52
Домашнее задание . . . . .	53
<b>Занятие 4. Геометрические вероятности. Принцип отражения</b>	<b>63</b>
Контрольные вопросы и задания . . . . .	65
Аудиторные задачи . . . . .	68
Дополнительные задачи . . . . .	81
Домашнее задание . . . . .	82
<b>Занятие 5. Условные вероятности. Независимость</b>	<b>99</b>
Контрольные вопросы и задания . . . . .	101
Аудиторные задачи . . . . .	101
Дополнительные задачи . . . . .	109
Домашнее задание . . . . .	112
<b>Занятие 6. Формула полной вероятности. Формула Байеса</b>	<b>123</b>
Контрольные вопросы и задания . . . . .	125
Аудиторные задачи . . . . .	126
Дополнительные задачи . . . . .	133

Домашнее задание . . . . .	134
<b>Контрольная работа 1</b>	<b>141</b>
Вариант 1 . . . . .	143
Вариант 2 . . . . .	147
Вариант 3 . . . . .	151
<b>Занятие 7. Алгебры и <math>\sigma</math>-алгебры. Мера</b>	<b>155</b>
Контрольные вопросы и задания . . . . .	157
Аудиторные задачи . . . . .	158
Дополнительные задачи . . . . .	163
Домашнее задание . . . . .	164
<b>Занятие 8. Случайные величины. Измеримость</b>	<b>170</b>
Контрольные вопросы и задания . . . . .	171
Аудиторные задачи . . . . .	172
Дополнительные задачи . . . . .	181
Домашнее задание . . . . .	181
<b>Занятие 11. Последовательности случайных величин. Лемма     Бореля-Кантелли</b>	<b>188</b>
Контрольные вопросы и задания . . . . .	189
Аудиторные задачи . . . . .	190
Дополнительные задачи . . . . .	190
Домашнее задание . . . . .	190

# Занятие 1. Элементы комбинаторики

## Контрольные вопросы и задания

**Сформулируйте основной принцип комбинаторики (правило умножения).**

Если множества  $A_1, \dots, A_m$  содержат соответственно  $n_1, \dots, n_m$  элементов, то количество  $m$ -мерных векторов, которые получают выбором по одному элементу из каждого множества равно  $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_m$ .

**Что называется сочетанием из  $n$  элементов по  $k$ ?**

В комбинаторике сочетанием из  $n$  по  $k$  называется набор  $k$  элементов, выбранных из данного множества, содержащего  $n$  различных элементов.

**Чему равно число сочетаний из  $n$  элементов по  $k$ ?**

Если некоторое множество содержит  $n$  элементов, то количество её  $k$ -элементных подмножеств равно

$$C_n^k = C_n^{n-k} = \frac{n!}{k! (n-k)!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!},$$

где  $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$ . Считается, что  $0! = 1$ .

**Что называется сочетанием с повторениями из  $n$  элементов по  $k$ ?**

Сочетанием (комбинацией) с повторениями называется набор из  $n$  элементов, каждый из которых может быть одного из  $k$  типов.

**Чему равно число сочетаний с повторениями из  $n$  элементов по  $k$ ?**

Количество разных комбинаций из элементов  $n$  типов по  $k$  с повторениями равно

$$C_n^k = C_{n+m-1}^{m-1} = C_{n+m-1}^m.$$

**Что называется размещением из  $n$  элементов по  $k$ ?**

Размещения из  $n$  элементов по  $k$  — это упорядоченные  $k$ -элементные подмножества множества, которое состоит из  $n$  элементов.

**Чему равно число размещений из  $n$  элементов по  $k$ ?**

Количество размещений из  $n$  элементов по  $k$  равно

$$A_n^k = k!C_n^k = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1).$$

**Чему равно число перестановок множества из  $n$  элементов?**

Количество перестановок равно  $n!$ .

**Чему равно число способов разбиения множества из  $n$  элементов на  $m$  непересекающихся неупорядоченных подмножеств, которые содержат соответственно  $k_1, \dots, k_m$  элементов?**

Первое подмножество содержит  $k_1$  элемент. Количество комбинаций, которыми можно выбрать эти элементы, равно  $C_n^{k_1}$ . Второе подмножество содержит  $k_2$  элементов, тогда его элементы можно выбрать  $C_{n-k_1}^{k_2}$  способами. Подмножество под номером  $m$  содержит  $k_m$  элементов. Эти элементы можно выбрать из оставшихся  $(n - k_1 - k_2 - \dots - k_{m-1})$   $C_{n-k_1-k_2-\dots-k_{m-1}}^{k_m}$  способами. Число способов разбиения множества из  $n$  элементов на  $m$  непересекающихся неупорядоченных подмножеств равно

$$C_n^{k_1} \cdot C_{n-k_1}^{k_2} \cdot \dots \cdot C_{n-k_1-k_2-\dots-k_{m-1}}^{k_m} = \prod_{i=1}^m C_{n-\sum_{j=0}^{i-1} k_j}^{k_i}.$$

Так как

$$n = k_1 + k_2 + \dots + k_m = \sum_{i=1}^m k_i = K_i,$$

то произведение можно записать в виде

$$\prod_{i=1}^m C_{K_i}^{k_i}.$$

## Аудиторные задачи

### 1.3

*Задание.* Посетителям кафе в качестве первого блюда предлагают борщ или суп, в качестве основного блюда — мясо, рыбу или вегетарианский салат, в качестве десерта — мороженое или пирожное. Подсчитать, сколько разных обедов из трёх блюд можно заказать в этом кафе.

*Решение.* Есть два варианта выбора первого блюда: борщ и суп. Число способов выбрать первое блюдо равно  $C_2^1 = 2$ . Основное блюдо можно выбрать тремя, т.е.  $C_3^1$  способами, так как есть 3 разных блюда на выбор. На десерт предлагают два блюда на выбор, поэтому есть  $C_2^1 = 2$  способа его заказать. Отсюда имеем, что из указанных блюд можно заказать

$$C_2^1 \cdot C_3^1 \cdot C_2^1 = 2 \cdot 3 \cdot 2 = 12$$

обедов.

#### 1.4

*Задание.* Репертуар оркестра состоит из тридцати симфоний Гайдна, девяти симфоний Бетховена и четырёх концертов Моцарта. На концерте оркестр должен исполнить три произведения. Подсчитать количество способов составить концертную программу, если:

- сначала необходимо исполнить произведение Гайдна, потом — Бетховена и к завершению — Моцарта;
- в программу должно войти по одному произведению Гайдна, Бетховена и Моцарта, исполнять которые можно в произвольном порядке;
- в программу должны войти три произвольные произведения из репертуара оркестра и выполнять их можно в произвольном порядке.

*Решение.*

- Первым произведением должно быть произведение Гайдна. Таких в репертуаре оркестра есть тридцать. Одно произведение из тридцати можно выбрать  $C_{30}^1 = 30$  способами. Вторым произведением должна быть симфония Бетховена. Количество способов выбрать одну симфонию из десяти равно  $C_9^1 = 9$ . Из четырёх концертов Моцарта один можно выбрать  $C_4^1 = 4$  способами. Итого

$$C_{30}^1 \cdot C_9^1 \cdot C_4^1 = 30 \cdot 9 \cdot 4$$

способа составить концертную программу.

- Так как порядок исполнения произведений не важен, то на любом из трёх мест может быть произведение любого из указанных авторов. Отсюда имеем, что результат, полученный в пункте а) нужно умножить на  $3!$ . Тогда количество способов составить концертную программу, где будет звучать по одному произведению каждого исполнителя, равно

$$3! \cdot C_{30}^1 \cdot C_9^1 \cdot C_4^1 = 3! \cdot 30 \cdot 9 \cdot 4.$$

- На первом месте в концертной программе может стоять любое произведение из  $30 + 9 + 4 = 43$  возможных. Количество способов его

выбрать равно  $C_{43}^1 = 43$ . На втором месте — любое из 42 оставшихся. Это  $C_{42}^1 = 42$ . На третьем — любое из оставшихся 41 произведения. Есть  $C_{41}^1 = 41$  способ, чтобы его выбрать. Отсюда имеем, что составить концертную программу можно

$$C_{43}^1 \cdot C_{42}^1 \cdot C_{41}^1 = 43 \cdot 42 \cdot 41$$

способом.

### 1.5

*Задание.* В цифровом компьютере один бит — это одно из чисел  $\{0, 1\}$ , а слово — это произвольная строка из 32-х бит. Подсчитать количество разных слов.

*Решение.* В данном случае имеем множество, которое содержит 32 бита двух типов. В качестве первого символа 32-битного слова можно выбрать одно из двух чисел. Количество способов это сделать равно  $C_2^1 = 2$ . Аналогично на всех остальных позициях может стоять либо 0, либо 1. Отсюда имеем, что всего можно составить  $2^{32}$  слова.

### 1.6

*Задание.* Сколькими способами можно упорядочить множество  $\{1, 2, \dots, 2n\}$  так, чтобы каждое чётное число имело чётный номер?

*Решение.* Каждое чётное число должно стоять на чётной позиции, каждое нечётное число — на нечётной. В множестве есть  $n$  чётных и  $n$  нечётных чисел. Количество способов разместить  $n$  чётных чисел на  $n$  чётных позициях равно  $n!$ . Аналогично можно разместить  $n$  нечётных чисел на  $n$  нечётных позициях  $n!$  способами. Так как независимо заполняем  $n$  и  $n$  ячеек, то множество можно упорядочить  $n! \cdot n!$  способами.

### 1.7

*Задание.* Среди 11-ти преподавателей кафедры есть 6 мужчин и 5 женщин. Сколькими способами из них можно выбрать комиссию из 3-х человек так, чтобы в ней было 2 мужчины и одна женщина?

*Решение.* Двух мужчин из шести можно выбрать  $C_6^2$  способами. Одну женщину из пяти —  $C_5^1$  способами. Тогда комиссию можно выбрать  $C_6^2 \cdot C_5^1$  способами.

### 1.8

*Задание.* Сколькими способами можно разместить 15 томов на книжной полке так, чтобы том I и II не стояли рядом?

*Решение.* Определим общее число перестановок из 15 элементов по формуле  $P_{15} = 15!$ .

Чтобы вычислить число «лишних» перестановок, сначала определим, сколько вариантов, в которых 2-й том находится рядом с 1-ым справа от

него. В таких перестановках 1-ый том может занимать места с первого по 14-е, а второй со второго по 15-е — всего 14 мест для этой пары книг. И при каждом таком положении первых двух томов остальные 13 книг могут занимать остальные 13 мест в произвольном порядке. Вариантов перестановки 13 книг  $P_{13} = 13!$ . Всего лишних вариантов 2-го тома справа от 1-го получится  $14 \cdot 13! = 14!$ .

Аналогично рассмотрим случай, когда второй том расположен рядом с 1-ым, но слева от него. Получается такое же число вариантов  $14 \cdot 13! = 14!$ .

Значит всего «лишних» перестановок  $2 \cdot 14!$ , а нужных способов расстановки  $15! - 2 \cdot 14!$ .

## 1.9

*Задание.* Сколькими способами можно распределить 12 разных предметов между тремя людьми так, чтобы каждый получил 4 предмета?

*Решение.* Первый человек может получить любые 4 предмета из 12. Способов это сделать  $C_{12}^4$ . Второй человек может выбрать любые 4 предмета из 8 оставшихся — это  $C_8^4$ . Третьему человеку число способов дать 4 предмета равно  $C_4^4$ . Отсюда имеем, что распределить предметы можно  $C_{12}^4 \cdot C_8^4 \cdot C_4^4$  способами.

## 1.10

*Задание.* Сколькими способами можно распределить 3 ириски, 5 карамелек и 12 шоколадных конфет среди 20-ти детей так, чтобы:

- а) каждый ребёнок получил по конфете?
- б) каждый ребёнок мог получить произвольное количество конфет?

*Решение.*

- а) В данном случае имеем множество, которое содержит 20 конфет 3 типов, причём ириски встречаются 3 раза, карамельки — 5 раз, а шоколадные конфеты — 12 раз.

Допустим, нужно распределить среди детей  $3 + 5 + 12$  разных конфет. Есть  $(3 + 5 + 12)!$  способов это сделать. А теперь нужно учесть, что из них 3 одинаковые, и не брать во внимание перестановки между ними —

$$\frac{(3 + 5 + 12)!}{3!}.$$

Но 5 и 12 из них тоже одинаковые. Тогда количество разных перестановок равно

$$C_{20}(3, 5, 12) = \frac{20!}{3!5!12!}.$$

- b) Данная задача является интерпретацией задачи о заполнении перенумерованных урн шариками. Роль урны — ребёнок, количества шариков, которые попали в урну — количество конфет, которые достались ребёнку.

Обозначим через  $k_i$  количество конфет, которые получил  $i$ -й ребёнок, причём  $0 \leq k_i \leq 20$ ,  $k_1 + k_2 + \dots + k_{20} = \sum_{i=1}^{20} k_i = 20$ .

Изобразим задачу на рисунке 1.



Рис. 1: Заполнение урн

Урна находится между двумя палочками. В одной урне может быть от  $k_i$  шариков. Точками обозначены шарики. На данном рисунке в первой и третьей урнах находится по 3 шарика, во второй — ни одного, в последней — 1.

Палочек есть 19, а точек (это конфеты) — 20. Их должны расставить на  $19 + 20$  мест произвольным образом. Количество этих решений является таким:

$$C_{20+20-1}^{19} \cdot C_{20}^{20} = C_{39}^{19} = \frac{39!}{19!20!} = 68923264410.$$

### 1.11

*Задание.* Вычислить количество неубывающих путей на двумерной целочисленной решётке

$$\mathbb{Z}_+^2 = \{(i, j) : i, j = 0, 1, 2, \dots\},$$

которые начинаются в точке  $(0, 0)$  и приводят в точку  $(m, n)$ . (Путь считается неубывающим, если на каждом шаге изменяется только одна координата, увеличиваясь на единицу.)

*Решение.* Имеем пути, состоящие из  $m + n$  ходов, среди которых ровно  $m$  «горизонтальных» и  $n$  «вертикальных» ходов. Если выберем, на каких шагах увеличиваем одну координату (например, вертикальную), будем однозначно знать, где увеличиваем вторую координату (идём по горизонтали). Значит, достаточно расставить  $m$  одинаковых шагов вверх на  $n + m$  разных ячеек. Это будет

$$C_{n+m}^m = \frac{(n+m)!}{n!m!}.$$



### 1.12

*Задание.* Вычислить количество разных частных производных порядка  $r$  бесконечно дифференцируемой функции  $n$  переменных  $f(x_1, \dots, x_n)$ .

*Решение.* Функция бесконечно дифференцируема, значит, производная порядка  $r$  есть. Рассмотрим функцию  $f(x, y)$ . Производные первого порядка:  $f'_x, f'_y$ . Первая производная — одномерная матрица (вектор). Производные второго порядка для  $f(x, y)$ :  $f''_{xx}, f''_{xy}, f''_{yx}, f''_{yy}$ .  $f''_{xy}$  и  $f''_{yx}$  одинаковые. Представим вторую производную в виде матрицы:

$$\begin{pmatrix} xx & yx \\ xy & yy \end{pmatrix}$$

Если три переменные:

$$\begin{pmatrix} xx & yx & zx \\ xy & yy & zy \\ xz & yz & zz \end{pmatrix}$$

Строим матрицы по определённому алгоритму. Столбцы — это первое измерение, а строки — второе. Столбцы соответствуют  $x, y$  и  $z$ , и в ячейках столбцов на первой позиции стоит соответствующий дифференциал. В ячейках строк указано, какой дифференциал будет вторым.

Рассмотрим третью производную для функции трёх переменных — это трёхмерная матрица. Третье измерение показывает, какой дифференциал будет третьим. Значит, срез — это то, где третьи дифференциалы фиксированы. Получится три обычные матрицы: в первой на третьей позиции будут  $x$ , во второй —  $y$ , а в третьей —  $z$ . Имеем:

$$\begin{pmatrix} xxx & yxx & zxx \\ xyx & yyx & zyx \\ xzx & yzx & zzx \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} xxy & yxy & zxy \\ xy y & yyy & zyy \\ xzy & yzy & zzy \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} xxz & yxz & zxz \\ xyz & yyz & zyz \\ xzz & yzz & zzz \end{pmatrix}.$$

Матрицы записаны с учётом повторения элементов, значит нужно взять только те элементы, которые лежат на диагонали и с одной стороны от неё (треугольник). Задача сведена к подсчёту количества элементов в  $r$ -мерной матрице  $n \times n$ .

Производный первого порядка есть столько же, сколько переменных  $n$  функции, т.е.  $n$ .

Найдём количество элементов двумерной матрицы  $n \times n$ , её верхнего треугольника. Всего элементов в матрице  $n \cdot n = n^2$ . Возьмём половину:

$$\frac{n \cdot n}{2}$$

и прибавим ещё половину диагонали, чтобы получить треугольник, получаем

$$\frac{n \cdot n}{2} + \frac{n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Для трёхмерной матрицы  $n \times n$  проделываем аналогичные шаги. Всего есть  $n \cdot n \cdot n = n^3$  элементов, на диагонали —  $n \cdot n = n^2$  элементов. Имеем:

$$\frac{n \cdot n \cdot n}{2} + \frac{n \cdot n}{2} = \frac{n^2(n+1)}{2}.$$

Обобщим для  $r$ -мерной матрицы. Всего элементов  $n^r$ , элементов на диагонали  $n^{r-1}$ . Отсюда имеем, что элементов на диагонали и выше её

$$\frac{n^r}{2} + \frac{n^{r-1}}{2} = \frac{n^{r-1}(n+1)}{2}.$$

Это и есть число разных частных производных функции  $n$  переменных порядка  $r$ .

### 1.13

*Задание.* Пусть  $\omega_n$  — количество таких перестановок элементов множества  $\{1, 2, \dots, n\}$ , что ни одно из чисел не остаётся на своём месте. Доказать, что величина  $p_n = \frac{\omega_n}{n!}$  равна

$$p_n = \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!}.$$

*Решение.* Найдём значение величины  $\omega_n$ .

Любая перестановка  $k_1 k_2 \dots k_n$  чисел  $1, 2, \dots, n$  означает вариант перестановки чисел, при котором  $i$ -е число стоит на  $k_i$ -м месте. Например, в случае четырёх чисел перестановка 3241 означает, что на первом месте стоит тройка ( $k_1 = 3$ ), на втором — двойка (на своём месте,  $k_2 = 2$ ), на третьем — четвёртая ( $k_3 = 4$ ) и на последнем — первая ( $k_4 = 1$ ). Наоборот, каждый вариант перестановки чисел обозначается единственной перестановкой чисел  $1, 2, \dots, n$ .

Будем говорить, что в перестановки  $k_1 k_2 \dots k_n$  чисел  $1, 2, \dots, n$  число  $i$  стоит на своём месте, если  $k_i = i$  (например, в перестановке 3241 двойка стоит на своём месте). Нас интересует количество беспорядков, то есть таких перестановок, в которых ни одно из чисел не стоит на своём месте. Число беспорядков можно найти, вычитая из общего количества перестановок, равного  $n!$ , количество тех перестановок, в которых хотя бы одно из чисел стоит на своём месте.

Пусть  $A_i$  — множество перестановок, в которых число  $i$  стоит на своём месте ( $i = 1, 2, \dots, n$ ). Искомое число  $\omega_n$  беспорядков, таким образом, равно

$$\begin{aligned} \omega_n &= n! - |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = n! - \sum_i |A_i| + \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| - \\ &\quad - \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \dots + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|. \end{aligned}$$

$|A_i| = (n-1)!$ , поэтому

$$\sum_i |A_i| = n \cdot (n-1)! = n!.$$

Так же  $|A_i \cap A_j| = (n-2)!$  и

$$\sum_{i < j} |A_i \cap A_j| = C_n^2 \cdot (n-2)! = \frac{n(n-1)}{2!} \cdot (n-2)! = \frac{n!}{2!}.$$

Аналогично  $|A_i \cap A_j \cap A_k| = (n-3)!$  и

$$\sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| = C_n^3 \cdot (n-3)! = \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \cdot (n-3)! = \frac{n!}{3!}.$$

Теперь приходим к нужной формуле:

$$\omega_n = n! - n! + \frac{n!}{2!} = \frac{n!}{3!} + \dots + (-1)^n = n! \cdot \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}.$$

Так как числа переставляются случайным образом, то вероятность беспорядка равна

$$p_n = \frac{\omega_n}{n!} = \frac{1}{n!} \left( \frac{n!}{2!} - \frac{n!}{3!} + \dots + (-1)^n \right) = \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!}.$$

#### 1.14

*Задание.* В классе учится 35 учеников. Из них 20 занимаются в математическом кружке, 11 — в физическом, а 10 учеников не посещают ни одного кружка. Сколько учеников посещают математический и физический кружок. Сколько учеников посещают только математический кружок?

*Решение.* Изобразим диаграмму Эйлера-Венна для данной задачи на рисунке 2.



Рис. 2: Диаграмма Эйлера-Венна для задачи 1.14

Найдём, сколько учеников занимается хотя бы в одном кружке. Это будет  $35 - 10 = 25$  учеников. Это есть количество элементов объединения двух множеств:

$$|M \cup F| = |M| + |F| - |M \cap F| = 25.$$

Отсюда можем найти, сколько учеников посещают и математический, и физический кружки:

$$|M \cap F| = |M| + |F| - |M \cup F| = 20 + 11 - 25 = 6.$$

Только математический кружок посещает  $|M| - |M \cap F| = 20 - 6 = 14$  учеников.

## Дополнительные задачи

### 1.15

*Задание.* Пусть множество  $X$  содержит  $n$  элементов, а множество  $Y$  —  $m$  элементов. Вычислить:

- а) количество функций из  $X$  в  $Y$ ;
- б) количество инъекций из  $X$  в  $Y$  ( $n \leq m$ );
- с) количество биекций из  $X$  в  $Y$  ( $n = m$ ).

*Решение.*

- а) Можно считать, что  $X = \{1, \dots, n\}$ ,  $Y = \{1, \dots, m\}$ . Каждую функцию можно отождествлять с последовательностью  $\langle f(1), \dots, f(n) \rangle = \langle y_1, \dots, y_n \rangle$ . Каждый член  $y_i$  последовательности можно выбрать  $m$  способами, что даёт  $m^n$  возможностей выбора  $\langle y_1, \dots, y_n \rangle$ .
- б) Будем определять число инъективных (то есть имеющих все различные члены) последовательностей  $\langle y_1, \dots, y_n \rangle$ . Элемент  $y_1$  может быть выбран  $m$  способами, элемент  $y_2$  можно выбрать  $m - 1$  способом из оставшихся элементов. Если уже выбраны элементы  $y_1, \dots, y_{i-1}$ , то в качестве  $y_i$  может быть выбран любой из  $m - i + 1$  элементов множества  $Y \setminus \{y_1, \dots, y_{i-1}\}$ . Принимаем, что  $m \geq n$ . если  $n > m$ , то искомое число функций равно 0. Это даёт

$$m(m-1)\dots(m-n+1) = \frac{m!}{(m-n)!}$$

возможность выбора инъективных последовательностей  $\langle y_1, \dots, y_n \rangle$ .

- с) Если  $n = m$ , то любое инъективное отображение будет биективным. Число всех биективных отображений  $X$  в  $Y$  равно  $n!$  при  $m = n$  и 0 при  $m \neq n$ .

## Домашнее задание

### 1.16

*Задание.* Подсчитать, сколько трёхзначных чисел можно записать с помощью:

- а) цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5;

- б) цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, если каждую из цифр использовать не больше одного раза.

*Решение.* Трёхзначное число можно рассматривать как трёхмерный вектор. Первой компонентой этого вектора может быть любая цифра из множества

$$A_1 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

(запись числа не может начинаться с 0).

- а) На остальных позициях может стоять любая цифра, то есть

$$A_i = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}, i = 2, 3.$$

Отсюда имеем, что из указанных цифр можно составить  $5 \cdot 6 \cdot 6 = 180$  трёхзначных чисел.

- б) На остальных позициях могут стоять любые цифры (кроме тех, что стояли на предыдущих позициях). Отсюда имеем, что из указанных цифр можно составить  $5 \cdot 5 \cdot 4 = 100$  трёхзначных чисел.

### 1.17

*Задание.* Подсчитать количество пятизначных чисел, которые делятся на 5.

*Решение.* Пятизначное число можно рассматривать как пятимерный вектор. Первой компонентой этого вектора может быть любая цифра из множества

$$A_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

(запись числа не может начинаться с 0), а на остальных позициях (кроме последней) может стоять любая цифра, то есть

$$A_i = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, i = 2, 3, 4.$$

На последней позиции может стоять цифра из множества  $A_5 = \{0, 5\}$  (чтобы число делилось на 5, оно должно оканчиваться на 0 или 5). Отсюда имеем, что можно составить  $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 2 = 18000$  пятизначных чисел, которые делятся на 5.

### 1.18

*Задание.* Замок компьютерного центра состоит из пяти кнопок, пронумерованных от 1 до 5. Чтобы открыть замок, необходимо первые две определённые кнопки нажать одновременно, а потом одну за другой нажать другие три кнопки в определённой последовательности. Подсчитать количество способов закодировать вход в компьютерный центр.

*Решение.* Рассмотрим 3 случая:

- а) сначала необходимо нажать две разные кнопки, далее их отпускают, и все остальные кнопки могут быть любыми;
- б) первые две кнопки держатся нажатыми, следующие кнопки не могут быть такими, как первые две;
- с) нельзя нажать одну и ту же кнопку больше одного раза (кнопки остаются нажатыми).

Количество способов нажать первые две кнопки равно количеству двух-элементных подмножеств в множестве из пяти элементов, то есть

$$C_5^2 = \frac{5!}{2!(5-2)!} = 10.$$

В случае а) количество способов закодировать вход в компьютерный центр равно

$$C_5^2 \cdot 5^3 = 1250.$$

Общая формула:  $C_N^n \cdot N^m$ , где  $N$  — количество кнопок,  $n$  кнопок нажимаются вместе, а затем  $m$  кнопок — по очереди.

В случае б) после нажатия двух кнопок, остаётся только 3 кнопки, которые необходимо нажать в правильном порядке, поэтому количество способов по предыдущей формуле равно

$$C_5^2 \cdot 3^3 = 270.$$

В случае в) все кнопки должны быть нажаты один раз, поэтому количество способов закодировать вход равно

$$C_5^2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 60.$$

### 1.19

*Задание.* Колоду игральных карт (52 карты, 4 масти по 13 карт в каждой) тщательно перетасовали. Подсчитать количество способов выбрать из неё 6 карт без возвращения так, чтобы среди них:

- а) был пиковый король;
- б) были представители всех мастей;
- с) было ровно 5 карт одной масти.

*Решение.*

- а) Выбрать пикового короля есть только один способ. Остальные 5 карт могут быть любыми из оставшихся 51 карты. Выбрать эти 5 карт можно  $C_{51}^5$  способами. Отсюда имеем, что из колоды можно выбрать 6 карт, среди которых был бы пиковый король,  $1 \cdot C_{51}^5$  числом способов;

b) Нужно рассмотреть следующие случаи:

- (a) 3 карты одной масти, по одной карте двух остальных мастей;
- (b) по две карты двух мастей, по одной карте двух оставшихся мастей.

Рассмотрим первый случай. Сначала нужно выбрать из четырёх мастей одну, из которой в дальнейшем будет выбрано 3 карты. Это можно сделать  $C_4^1$  способами. Далее выбираем 3 карты из тринадцати —  $C_{13}^3$  способов. Осталось выбрать по одной карте из тринадцати карт каждой из трёх мастей:  $(C_{13}^1)^3$ . По правилу произведения имеем:

$$\begin{aligned} C_4^1 \cdot C_{13}^3 \cdot (C_{13}^1)^3 &= \frac{4!}{1! \cdot 3!} \cdot \frac{13!}{3! \cdot 10!} \cdot \left( \frac{13!}{1! \cdot 12!} \right)^3 = 4 \cdot \frac{11 \cdot 12 \cdot 13}{2 \cdot 3} \cdot 13^3 = \\ &= 4 \cdot 11 \cdot 2 \cdot 13^4 = 2513368 \end{aligned}$$

способов.

Рассмотрим второй случай. Выберем две масти из четырёх —  $C_4^2$  способа. Далее выберем две карты из 13 карт этих мастей —  $(C_{13}^2)^2$ . Осталось выбрать по одной карте двух оставшихся мастей:  $(C_{13}^1)^2$ . По правилу произведения получаем, что в этом случае есть

$$\begin{aligned} C_4^2 \cdot (C_{13}^2)^2 \cdot (C_{13}^1)^2 &= \frac{4!}{2! \cdot 2!} \cdot \left( \frac{13!}{2! \cdot 11!} \right)^2 \cdot \left( \frac{13!}{1! \cdot 12!} \right)^2 = \\ &= \frac{2 \cdot 3 \cdot 4}{2 \cdot 2} \cdot \left( \frac{12 \cdot 13}{2} \right)^2 \cdot 13^2 = 6^3 \cdot 13^4 = 6169176 \end{aligned}$$

способов.

Отсюда по правилу суммы имеем, что количество способов выбрать из данной колоды 6 карт без возвращения таким образом, чтобы среди них были представители всех мастей, равно  $C_4^1 \cdot C_{13}^3 \cdot (C_{13}^1)^3 + C_4^2 \times (C_{13}^2)^2 \cdot (C_{13}^1)^2 = 2513368 + 6169176 = 8682544$ ;

- с) сначала нужно выбрать 5 карт одной масти. В одной масти 13 карт, следовательно число способов выбрать 5 карт одной масти равно  $C_{13}^5$ . Так как всего мастей 4, и нам не важно, какой именно масти будут 5 вытянутых карт (главное, чтобы одной), то число способов будет равно

$$4 \cdot C_{13}^5.$$

Шестая карта должна быть любой, но отличаться с предыдущими пятью мастью, то есть её можно выбрать из  $52 - 13 = 39$  карт. Число способов это сделать равно  $C_{39}^1$ . Отсюда имеем, что число способов выбрать из колоды карт 6 карт так, чтобы среди них было ровно 5 карт одной масти, равно

$$4 \cdot C_{13}^5 \cdot C_{39}^1.$$

### 1.20

*Задание.* Сколькими способами можно разместить 10 одинаковых открыток в 4 почтовых ящиках так, чтобы:

- а) не было пустых ящиков;
- б) во втором ящике было 3 открытки.

*Решение.*

а) Рассмотрим случай, когда в каждый ящик должна быть помещена хотя бы одна открытка. Используем метод перегородок. Выложим открытки в ряд. Для определения расклада открыток по четырём почтовым ящикам разделим ряд тремя перегородками на 4 группы: первая группа для первого ящика, вторая — для второго и так далее. Таким образом, число вариантов раскладки открыток по ящикам равно числу способов разложения трёх перегородок. Перегородки могут стоять на любом из 9 мест (между 10 открытками — 9 промежутков). Поэтому число возможных расположений равно  $C_9^3$ .

б) Рассмотрим случай, когда во второй ящик должны быть помещены 3 открытки. Поскольку открытки одинаковые, то во второй ящик можно сразу положить 3 открытки. В этом случае нужно распределить  $10 - 3 = 7$  одинаковых открыток между тремя почтовыми ящиками.

Используем метод перегородок. Рассмотрим ряд из 9 предметов: 7 одинаковых открыток и 2 одинаковые перегородки, расположенных в произвольном порядке. Каждый такой ряд однозначно соответствует некоторому способу раскладки открыток по ящикам: в первый ящик попадают открытки, расположенные левее первой перегородки, во второй — расположенные между первой и второй перегородками и т.д. (между какими-то перегородками открыток может и не быть). Поэтому число способов раскладки открыток по ящикам равно числу различных рядов из 7 открыток и 2 перегородок, т.е. равно  $C_9^2$  (ряд определяется теми двумя местами из 9, на которых стоят перегородки).

### 1.21

*Задание.* Сколькими способами можно распределить 10 путёвок среди 10 студентов (по одной каждому), если:

- а) все путёвки разные;
- б) есть 4 путёвки одного типа и 6 — другого?

*Решение.*

а) Количество возможных перестановок 10 разных путёвок равно  $10!$ ;



- б) если будем считать все 10 элементов перестановки с повторениями различными, то всего различных вариантов перестановок 10 путёвок

$$(4 + 6)! = 10!.$$

Однако среди этих перестановок не все различны. Все путёвки одного типа можно переставлять местами друг с другом, и от этого перестановка не изменится. Точно так же, можем переставлять путёвки другого типа. Таким образом, перестановка может быть записана  $4!6!$  способами. Следовательно, число различных перестановок с повторениями равно

$$\frac{(4 + 6)!}{4!6!} = \frac{10!}{4!6!}.$$

## 1.22

*Задание.* Доказать, что количество неубывающих путей на  $r$ -мерной целочисленной решётке

$$\mathbb{Z}_+^r = \{(i_1, \dots, i_r) : i_1, \dots, i_r = 0, 1, 2, \dots\},$$

которые начинаются в точке  $(0, \dots, 0)$  и приводят в точку  $(n_1, \dots, n_r)$ , равно

$$C_N(n_1, \dots, n_r) = \frac{N!}{n_1! \dots n_r!},$$

где  $N = \sum_{i=1}^r n_i$ . (Путь считается неубывающим, если на каждом шаге изменяется только одна координата, увеличиваясь на единицу.)

*Решение.* Имеем пути, состоящие из  $n_1 + \dots + n_r$  ходов, среди которых ровно  $n_1$  ходов в направлении  $r_1, \dots$ , и  $n_r$  ходов в направлении  $r_n$ . Если выберем, на каких шагах увеличиваем первую координату, будем знать, где увеличиваем остальные координаты. Далее выберем, на каких шагах увеличиваем вторую координату. И так необходимо определить, где увеличиваем  $n_1 + \dots + n_{r-1}$  координат. Тогда будем однозначно знать, где увеличиваем последнюю координату. Это будет

$$\frac{(n_1 + \dots + n_r)}{n_1! \dots n_r!}.$$

## 1.23

*Задание.* Из 100 студентов английский язык знают 28, немецкий — 30, французский — 42, английский и немецкий — 8, английский и французский — 10, немецкий и французский — 5, а все три языка знают 3 студента. Сколько студентов не знают ни одного языка?

*Решение.* Условие задачи представлено на рисунке 3 в виде диаграммы Эйлера-Венна.



Рис. 3: Диаграмма Эйлера-Венна для задачи 1.23

Сначала найдём, сколько студентов знает хотя бы один язык. Это есть мощность (количество элементов) объединения трёх множеств: Английский, Немецкий и Французский, которые обозначим первыми буквами. Мощность объединения трёх множеств можно найти как сумму мощностей этих множеств, но, так как они пересекаются, необходимо отнять мощности их пересечений и добавить пересечение всех трёх множеств, потому что его отняли дважды. Имеем

$$\begin{aligned} |H \cup A \cup F| &= |H| + |A| + |F| - |H \cap A| - |A \cap F| - |H \cap F| + |H \cap A \cap F| = \\ &= 30 + 42 + 28 - 5 - 8 - 10 + 3 = 80. \end{aligned}$$

Все остальные студенты из ста не знают ни одного языка. Их

$$100 - 80 = 20.$$

# Занятие 2. События и операции над ними.

## Пространство элементарных событий

### Контрольные вопросы и задания

**Приведите определение вероятностного эксперимента, вероятностного пространства, случайного события.**

Вероятностным экспериментом называется явление, исход которого для нас не определён, и которое можно повторить любое число раз независимым образом.

Вероятностное пространство — совокупность всех исходов вероятностного эксперимента,  $\Omega$ .

Случайное событие — подмножество всех исходов вероятностного эксперимента,  $A \subset \Omega$ .

**Запишите основные операции над случайными событиями и дайте их теоретико-множественную интерпретацию.**

Операции будем иллюстрировать на диаграммах Эйлера-Венна. На рис.4 заштрихованы области, которые соответствуют событиям, являющимся результатами таких операций.

Пересечением (произведением) двух событий  $A$  и  $B$  называют событие  $C$ , происходящее тогда и только тогда, когда одновременно происходят оба события  $A$  и  $B$ , т.е событие, состоящее из тех и только тех элементарных исходов, которые принадлежат и событию  $A$ , и событию  $B$  (рис.4, а).

Пересечение событий  $A$  и  $B$  записывают следующим образом:  $C = A \cap B$ , или  $C = AB$ .

События  $A$  и  $B$  называют несовместимыми, или непересекающимися, если их пересечение является невозможным событием, т.е если  $A \cap B = \emptyset$  (рис.4, б).

В противном случае события называют совместимыми, или пересекающимися.



Рис. 4: Диаграммы Эйлера-Венна для операций над событиями

Объединением (суммой) двух событий  $A$  и  $B$  называют событие  $C$ , происходящее тогда и только тогда, когда происходит хотя бы одно из событий  $A$  или  $B$ , т.е. событие  $C$ , состоящее из тех элементарных исходов, которые принадлежат хотя бы одному из подмножеств  $A$  или  $B$  (рис.4, в).

Объединение событий  $A$  и  $B$  записывают в виде  $C = A \cup B$ .

Разностью двух событий  $A$  и  $B$  называют событие  $C$ , происходящее тогда и только тогда, когда происходит событие  $A$ , но не происходит событие  $B$ , т.е. событие  $C$ , состоящее из тех элементарных исходов, которые принадлежат  $A$ , но не принадлежат  $B$  (рис.4, г).

Разность событий  $A$  и  $B$  записывают в виде:  $C = A \setminus B$ .

Дополнением события  $A$  (обычно обозначают  $\bar{A}$ ) называют событие, происходящее тогда и только тогда, когда не происходит событие  $A$  (рис.4, д). Другими словами,  $\bar{A} = \Omega \setminus A$ .

Событие  $A$  включено в событие  $B$ , что записывается  $A \subset B$ , если появление события  $A$  обязательно влечёт за собой наступление события  $B$  (рис.4, е), или каждый элементарный исход  $\omega$ , принадлежащий  $A$ , обяза-

тельно принадлежит и событию В.

Верхний предел последовательности  $\{A_n : n \geq 1\}$  — это случайное событие, состоящее в том, что произошло бесконечно много событий из исходной последовательности:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{m \geq n} A_m.$$

$\forall n \exists m \geq n : A_m$  произошло.

Нижний предел последовательности:  $\{A_n : n \geq 1\}$  — это случайное событие, состоящее в том, что произошли все события, начиная с некоторого из исходной последовательности:

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} A_m.$$

$\exists n \forall m \geq n$  происходит событие  $A_m$ .

### Сформулируйте законы де Моргана.

Первый закон де Моргана гласит: «Если неверно, что есть и первое, и второе, то неверно либо одно из, либо оба», что выражается следующей формулой:  $\overline{AB} = \overline{A} \cup \overline{B}$ .

Второй закон де Моргана гласит: «Если неверно, что есть первое, или неверно, что есть второе, то неверно, что есть первое и второе», что выражается следующей формулой:  $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ .

Законы де Моргана верны для любого конечного числа событий:

$$\overline{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n} = \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_n},$$

$$\overline{A_1 A_2 \dots A_n} = \overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \dots \cup \overline{A_n}.$$

## Аудиторные задачи

### 2.3

*Задание.* Рассмотрим эксперимент, который состоит в подбрасывании трёх монет. Постройте множество  $\Omega$  элементарных событий этого эксперимента. Опишите событие А, которое состоит в том, что выпало не меньше двух гербов. Вычислите вероятность события А.

*Решение.* Пусть эксперимент состоит в подбрасывании одной монеты. При математическом описании этого опыта естественно отвлечься от несущественных возможностей (например, монета встанет на ребро) и ограничиться только двумя элементарными исходами: выпадение «герба» (обозначим этот исход  $\omega_1$ ) и выпадением «цифры» (обозначим этот исход  $\omega_2$ ). Таким образом,  $\Omega_1 = \{\omega_1, \omega_2\}$ .

При подбрасывании двух монет пространство элементарных исходов будет содержать три элемента, т.е.  $\Omega_2 = \{\omega_{11}, \omega_{12}, \omega_{22}\}$ , где, например,  $\omega_{11}$  — появление «герба» и на первой, и на второй монете.

При подбрасывании трёх монет пространство элементарных исходов будет содержать элементов, т.е.  $\Omega_3 = \Omega = \{\omega_{111}, \omega_{112}, \omega_{122}, \omega_{222}\}$ , где, например,  $\omega_{111}$  — появление «герба» и на первой, и на второй, и на третьей монете.

Событие  $A$  состоит в том, что выпало не меньше двух гербов, т.е. два или три герба. Выберем из  $\Omega$  такие исходы:  $A = \{\omega_{122}, \omega_{222}\}$ .

Поскольку  $|A| = 2$ ,  $|\Omega| = 4$ , то

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

## 2.4

*Задание.* Пусть  $A$ ,  $B$ ,  $C$  — произвольные события. Найдите выражения для событий, который состоят в том, что из событий  $A$ ,  $B$  и  $C$ :

- произошло только  $A$ ;
- произошли  $A$  и  $B$ , но не произошло  $C$ ;
- произошли все три события;
- произошло хотя бы одно из этих событий;
- произошло хотя бы два события;
- произошло одно и только одно событие;
- произошло два и только два события;
- ни одно из событий не произошло;
- произошло не больше двух событий.

*Решение.*

- $A \cap \overline{B} \cap \overline{C}$ ;
- $A \cap B \cap \overline{C}$ ;
- $A \cap B \cap C$ ;
- $A \cup B \cup C$ ;
- $(A \cap B \cap \overline{C}) \cup (A \cap \overline{B} \cap C) \cup (\overline{A} \cap B \cap C)$ ;
- $(A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (B \cap \overline{A} \cap \overline{C}) \cup (C \cap \overline{A} \cap \overline{B})$ ;
- $(A \cap B \cap \overline{C}) \cup (A \cap C \cap \overline{B}) \cup (B \cap C \cap \overline{A})$ ;
- $\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}$ ;
- $(\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (B \cap \overline{A} \cap \overline{C}) \cup (C \cap \overline{A} \cap \overline{B}) \cup (A \cap B \cap \overline{C}) \cup (A \cap C \cap \overline{B}) \cup (B \cap C \cap \overline{A})$ .

## 2.5

*Задание.* Пусть  $A$  и  $B$  — некоторые события. Упростите выражение

$$C = \overline{\overline{A \cap \overline{B}} \cup \overline{A \cup \overline{B}} \cup (B \cap A)}.$$

*Решение.*  $C = \overline{\overline{A \cap \overline{B}} \cup \overline{A \cup \overline{B}} \cup \overline{B \cap A}} = (A \cap \overline{B}) \cup A \cup B \cup \overline{B} \cup \overline{A} =$   
 $= (A \cap \overline{B}) \cup A \cup \overline{A} \cup B \cup \overline{B} = (A \cap \overline{B}) \cup \Omega \cup \Omega = (A \cap \overline{B}) \cup \Omega = \Omega.$

## 2.6

*Задание.* Пусть  $\{A_n, n \in \mathbb{N}\}, \{B_n, n \in \mathbb{N}\}$  — некоторые последовательности событий. Объясните, что значат события  $\varlimsup_{n \rightarrow \infty} A_n, \varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n$ . Докажите, что:

- a)  $\overline{\varlimsup_{n \rightarrow \infty} A_n} = \varliminf_{n \rightarrow \infty} \overline{A_n};$   
b)  $\varlimsup_{n \rightarrow \infty} (A_n \cup B_n) = \varlimsup_{n \rightarrow \infty} A_n \cup \varlimsup_{n \rightarrow \infty} B_n.$

*Решение.* Верхний предел последовательности  $\{A_n : n \geq 1\}$  — это случайное событие, состоящее в том, что произошло бесконечно много событий из исходной последовательности:

$$\varlimsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{m \geq n} A_m.$$

$\forall n \exists m \geq n : A_m$  произошло.

Нижний предел последовательности:  $\{A_n : n \geq 1\}$  — это случайное событие, состоящее в том, что произошли все события, начиная с некоторого из исходной последовательности:

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} A_m.$$

$\exists n \forall m \geq n$  происходит событие  $A_m$ .

- a)  $\overline{\varlimsup_{n \rightarrow \infty} A_n} = \overline{\bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{m \geq n} A_m} = \bigcup_{n \geq 1} \overline{\bigcup_{m \geq n} A_m} = \bigcup_{n \geq 1} \bigcap_{m \geq n} \overline{A_m} = \varliminf_{n \rightarrow \infty} \overline{A_n};$   
b)  $\varlimsup_{n \rightarrow \infty} (A_n \cup B_n) = \bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{m \geq n} (A_m \cup B_m) = \prod_{n=1}^{\infty} \sum_{m=n}^{\infty} (A_m + B_m) =$   
 $= \prod_{n=1}^{\infty} \sum_{m=n}^{\infty} A_m + \prod_{n=1}^{\infty} \sum_{m=n}^{\infty} B_m = \varlimsup_{n \rightarrow \infty} A_n \cup \varlimsup_{n \rightarrow \infty} B_n.$

## 2.7

*Задание.* Пусть  $\{A_n, n \in \mathbb{N}\}$  — некоторая последовательность событий,  $\mathbb{1}(A)$  — индикатор события  $A$ . Докажите, что  $\mathbb{1}\left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}(A_n)$ .

*Решение.* Рассмотрим 4 случая:

1.  $\mathbb{1}\left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = 0, \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}(A_n) = 0;$
2.  $\mathbb{1}\left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = 0, \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}(A_n) = 1;$
3.  $\mathbb{1}\left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = 1, \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}(A_n) = 0;$
4.  $\mathbb{1}\left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = 1, \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}(A_n) = 1.$

Нужно доказать, что возможны только первый и последний случаи.

Верхний предел последовательности  $\{A_n : n \geq 1\}$  — это случайное событие, состоящее в том, что произошло бесконечно много событий из исходной последовательности:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{m \geq n} A_m.$$

Индикатор — функция двух переменных:  $\mathbb{1}(\omega, A)$ , где  $\omega$  — элементарный исход (то, что произошло),  $A$  — случайное событие (то, что рассматриваем). Если  $\omega \in A$ , то индикатор равен 1, иначе — 0.

Индикатор верхнего предела равен нулю  $\left(\mathbb{1}\left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = 0\right)$  — значит, произошло конечное множество событий из  $A_n$ . Значит, с какого-то момента события перестали происходить, и предел индикаторов равен нулю:  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}(A_n) = 0$ .

Если индикатор от верхнего предела равен единице

$$\left(\mathbb{1}\left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \mathbb{1}\left(\bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{m \geq n} A_m\right) = 1\right),$$

то произошло бесконечное множество событий из  $A_n$ . Это значит, во-первых, что пересечение не пустое, а во-вторых, что элементарный исход принадлежит этому пересечению. Верхний предел последовательности событий — это такое случайное событие, что каждый случайный исход из него принадлежит бесконечному количеству событий из последовательности. Поэтому  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}(A_n) = 1$ .

## 2.8

*Задание.* Пусть  $B$  и  $C$  — два события. Положим  $A_n = B$ , если  $n$  чётное и  $A_n = C$ , если  $n$  нечётное. Найдите событие, которое состоит в том, что:



- а) произошло бесконечно много событий из последовательности  $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ ;  
 б) произошло только конечное количество событий из последовательности  $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ .

*Решение.*

- а) По определению  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{m \geq n} A_m$ .

При  $n = 1$ :  $\bigcup_{m \geq 1} A_m = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots = B \cup C$ . Пересечение бесконечного количества одинаковых множеств даёт  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = B \cup C$ ;

- б) по определению  $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} A_m = B \cap C$ .

При  $n = 1$ :  $\bigcap_{m \geq 1} A_m = A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots = B \cap C$ , поэтому  $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = B \cap C$ .

## 2.9

*Задание.* Рассмотрим эксперимент, который состоит в выборе наугад точки в квадрате с вершинами в точках  $A(0, 0)$ ,  $B(0, 1)$ ,  $C(1, 1)$  и  $D(1, 0)$ . Опишите и изобразите вероятностное пространство этого эксперимента и следующие события:

- а)  $A$  = данная точка оказалась на расстоянии не меньшем чем  $1/4$  от сторон квадрата;  
 б)  $B$  = данная точка оказалась внутри круга с центром в начале координат и радиусом  $1/2$ ;  
 в)  $\overline{A}, \overline{B}, A \cap B$ .

*Решение.* Пространство элементарных событий (5, а)) опишем как множество упорядоченных пар  $\Omega = \{(x, y), 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ , где  $x$  — первая координата точки,  $y$  — вторая координата точки.

- а)  $A = \{(x, y), \frac{3}{4} \leq x \leq \frac{1}{4}, \frac{3}{4} \leq y \leq \frac{1}{4}\}$  (5, б));  
 б)  $B = \{(x, y), x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq \frac{1}{2}\}$  (5, в));  
 в) событие  $\overline{A}$  означает, что событие  $A$  не произошло, то есть расстояние от точки до сторон квадрата оказалось больше  $1/4$  (5, г)):

$$\overline{A} = \{(x, y), \frac{3}{4} > x > \frac{1}{4}, \frac{3}{4} > y > \frac{1}{4}\}.$$

Событие  $\overline{B}$  означает, что данная точка не оказалась внутри круга с центром в начале координат и радиусом  $1/2$  (5, д)):

$$\overline{B} = \{(x, y), \frac{1}{2} > x^2 + y^2 \leq 1, x \leq 1, y \leq 1\}$$



Рис. 5: Вероятностное пространство и события из задачи 2.9

Событие  $A \cap B$  означает, что произошло и событие  $A$ , и событие  $B$  (5, е)). Отсюда имеем, что данная точка оказалась на расстоянии не меньшем чем  $1/4$  от сторон квадрата, а так же внутри круга с центром в начале координат и радиусом  $1/2$ , т.е.

$$A \cap B = \{(x, y), x \geq \frac{1}{4}, y \geq \frac{1}{4}, x^2 + y^2 \leq \frac{1}{2}\}.$$

## Дополнительные задачи

### 2.10

*Задание.* Пусть  $A$  — множество из  $n$  элементов,  $A_1, \dots, A_k$  — подмножества  $A$  такие, что ни одно из подмножеств не является частью другого, а  $i_1, \dots, i_k$  — количество элементов подмножеств  $A_1, \dots, A_k$  соответственно. Докажите, что

$$\sum_{r=1}^k \frac{1}{C_n^{i_r}} \leq 1.$$

*Решение.* Умножим слева и справа на произведение знаменателей:

$$\prod_{r=1}^k C_n^{i_r} \sum_{r=1}^k \frac{1}{C_n^{i_r}} \leq \prod_{r=1}^k C_n^{i_r}.$$

Внесём произведение под знак суммы:

$$\sum_{r=1}^k \frac{\prod_{r'=1}^k C_n^{i_{r'}}}{C_n^{i_r}} \leq \prod_{r=1}^k C_n^{i_r}.$$

Упростим:

$$\sum_{r=1}^k \prod_{1 \leq r' \leq k, r' \neq r} C_n^{i_{r'}} \leq \prod_{r=1}^k C_n^{i_r}.$$

Обозначим номер наибольшего слагаемого как  $m$ :

$$m = \arg \max_{1 \leq r \leq k} \prod_{1 \leq r' \leq k, r' \neq r} C_n^{i_{r'}}.$$

Сумма слагаемых не больше чем наибольшее из них взятое  $k$  раз, т.е.

$$\sum_{r=1}^k \prod_{1 \leq r' \leq k, r' \neq r} C_n^{i_{r'}} \leq k \cdot \prod_{1 \leq r' \leq k, r' \neq m} C_n^{i_{r'}} \leq \prod_{r=1}^k C_n^{i_r}.$$

Поделим правую и левую часть полученного неравенства на произведение, стоящее в левой части:

$$k \leq \frac{\prod_{r=1}^k C_n^{i_r}}{\prod_{1 \leq r' \leq k, r' \neq m} C_n^{i_{r'}}} = C_n^m.$$

Если  $k \leq n$ , то неравенство выполняется для любого возможного  $m$  кроме  $m = 0$  и  $m = n$ .

$m = 0$  возможно только если  $A_1$  — пустое множество и  $k = 1$ , потому что если бы там были другие множества, пустое было бы их подмножеством, что противоречит условию задачи. Тогда  $C_0^0 = 1 \leq 1$ .

$m = n$ , то  $A_1 = A, k = 1$ , значит  $C_n^n = 1$ . Если будут другие подмножества кроме  $A_1$ , то они будут подмножествами  $A_1$ , что противоречит условию.

**Формулы Стирлинга.** Распишем левую часть неравенства:

$$\sum_{r=1}^k \frac{1}{C_n^{i_r}} = \sum_{r=1}^k \frac{1}{\frac{n!}{i_r!(n-i_r)!}} = \sum_{r=1}^k \frac{i_r!(n-i_r)!}{n!}.$$

Получили неравенство:

$$\sum_{r=1}^k \frac{i_r!(n-i_r)!}{n!} \leq 1.$$

Умножим левую и правую части неравенства на  $n!$ . Левая часть:

$$n! \cdot \sum_{r=1}^k \frac{i_r!(n-i_r)!}{n!} = \sum_{r=1}^k i_r!(n-i_r)!.$$

Получили неравенство:

$$\sum_{r=1}^k i_r! (n - i_r)! \leq n!.$$

Нижний и верхний пределы для факториала:

$$\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \exp\left(\frac{1}{12n+1}\right) < n! < \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \exp\left(\frac{1}{12n}\right).$$

Возьмём для левой части неравенства верхний предел, а для правой — нижний:

$$\begin{aligned} \sum_{r=1}^k \sqrt{2\pi i_r} \left(\frac{i_r}{e}\right)^{i_r} \exp\left(\frac{1}{12i_r}\right) \left(\frac{i_r}{e}\right)^{i_r} \sqrt{2\pi(n-i_r)} \left(\frac{n-i_r}{e}\right)^{n-i_r} \times \\ \times \exp\left(\frac{1}{12(n-i_r)}\right) \leq \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \exp\left(\frac{1}{12n+1}\right). \end{aligned}$$

Сократим на  $\sqrt{2\pi}$  и упростим:

$$\begin{aligned} \sum_{r=1}^k \sqrt{i_r(n-i_r)} \exp\left(\frac{1}{12i_r} + \frac{1}{12(n-i_r)}\right) \left(\frac{i_r}{e}\right)^{i_r} \left(\frac{n-i_r}{e}\right)^{n-i_r} \leq \\ \leq \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \exp\left(\frac{1}{12n+1}\right). \end{aligned}$$

Упростим экспоненты в знаменателях левой части:

$$\exp(-i_r) \exp(i_r - n) = \exp(-i_r + i_r - n) = \exp(-n).$$

В правой части имеем такую же степень экспоненты, поэтому сократим:

$$\begin{aligned} \sum_{r=1}^k \sqrt{i_r(n-i_r)} \exp\left(\frac{1}{12i_r} + \frac{1}{12(n-i_r)}\right) i_r^{i_r} (n-i_r)^{n-i_r} \leq \\ \leq \sqrt{n} n^n \exp\left(\frac{1}{12n+1}\right). \end{aligned}$$

Приведём подобные:

$$\sum_{r=1}^k i_r^{i_r + \frac{1}{2}} (n-i_r)^{n-i_r + \frac{1}{2}} \exp\left(\frac{1}{12i_r} + \frac{1}{12(n-i_r)}\right) \leq n^{n+\frac{1}{2}} \exp\left(\frac{1}{12n+1}\right).$$

Приведём к общему знаменателю дроби в степени экспоненты в левой части:

$$\frac{1}{12i_r} + \frac{1}{12(n-i_r)} = \frac{n-i_r+i_r}{12i_r(n-i_r)} = \frac{n}{12i_r(n-i_r)}.$$

Подставим в неравенство:

$$\sum_{r=1}^k i_r^{i_r+\frac{1}{2}} (n-i_r)^{n-i_r+\frac{1}{2}} \exp\left(\frac{n}{12i_r(n-i_r)}\right) \leq n^{n+\frac{1}{2}} \exp\left(\frac{1}{12n+1}\right).$$

Упростим выражение в левой части так, что оно станет больше:

$$\begin{aligned} \sum_{r=1}^k i_r^{i_r+\frac{1}{2}} n^{n-i_r+\frac{1}{2}} \exp\left(\frac{n}{12i_r(n-i_r)}\right) &\leq \\ &\leq n^{n+\frac{1}{2}} \exp\left(\frac{1}{12n+1}\right). \end{aligned}$$

Сократим на  $n^{n+\frac{1}{2}}$ . Получим:

$$\sum_{r=1}^k i_r^{i_r+\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{n}\right)^{i_r} \exp\left(\frac{n}{12i_r(n-i_r)}\right) \leq \exp\left(\frac{1}{12n+1}\right).$$

Внесём  $i_r^{i_r}$  в числитель дроби и поделим на экспоненту из правой части:

$$\sum_{r=1}^k \sqrt{i_r} \left(\frac{i_r}{n}\right)^{i_r} \exp\left(\frac{n}{12i_r(n-i_r)} - \frac{1}{12n+1}\right) \leq 1.$$

Сведём дроби в степени экспоненты к общему знаменателю:

$$\begin{aligned} \frac{n}{12i_r(n-i_r)} - \frac{1}{12n+1} &= \frac{n(12n+1) - 12i_r(n-i_r)}{12i_r(n-i_r)(12n+1)} = \\ &= \frac{12n^2 + n - 12i_r n + 12i_r^2}{12i_r(n-i_r)(12n+1)} = \frac{12n^2 + n - 12i_r n + 12i_r^2}{(12i_r n - 12i_r^2)(12n+1)} = \\ &= \frac{12n^2 + n - 12i_r n + 12i_r^2}{144n^2 i_r + 12i_r n - 144i_r^2 n - 12i_r^2} = \frac{12(n^2 - 2i_r n + i_r^2) + n + 12i_r n}{144n^2 i_r + 12i_r n - 144i_r^2 n - 12i_r^2} = \\ &= \frac{12(n-i_r)^2 + n + 12i_r n}{144n^2 i_r + 12i_r n - 144i_r^2 n - 12i_r^2}. \end{aligned}$$

Упростим выражение, используя нижний предел для количества сочетаний:

$$\left(\frac{n}{k}\right)^k \leq C_n^k.$$

Получим:

$$\sum_{r=1}^k \frac{1}{C_n^{i_r}} \leq \sum_{r=1}^k \frac{1}{\left(\frac{n}{i_r}\right)^{i_r}} = \sum_{r=1}^k \left(\frac{i_r}{n}\right)^{i_r}.$$

## Домашнее задание

### 2.11

*Задание.* Рассмотрим эксперимент, который состоит в подбрасывании трёх игральных кубиков. Опишите множество  $\Omega$  элементарных событий этого эксперимента; из скольких элементарных событий оно состоит? Опишите событие  $C$ , которое состоит в том, что на всех кубиках выпало одинаковое количество очков. Вычислите вероятность события  $C$ .

*Решение.* Пространство элементарных событий опишем как множество упорядоченных троек  $\Omega = \{(i, j, k), i = \overline{1, 6}, j = \overline{1, 6}, k = \overline{1, 6}\}$ , где  $i$  — количество очков, которые выпали на первом кубике,  $j$  — количество очков, которые выпали на втором кубике,  $k$  — количество очков, которые выпали на третьем кубике.

Можем рассматривать тройку чисел как вектор длины 3. Первой компонентой вектора может быть любое значение из  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ . Его можно выбрать  $C_6^1 = 6$  способами. Таким же образом находим, что есть 6 способов выбрать вторую компоненту вектора и 6 — третью. По правилу умножения имеем  $6 \cdot 6 \cdot 6 = 6^3 = 108$  разных векторов указанного вида, или элементарных событий.

$C = \{(1, 1, 1), (2, 2, 2), (3, 3, 3), (4, 4, 4), (5, 5, 5), (6, 6, 6)\}$ . Поскольку

$$|C| = 6, |\Omega| = 108,$$

то

$$P(C) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{6}{108} = \frac{1}{36}.$$

### 2.12

*Задание.* Монету подбрасывают до тех пор, пока она не выпадет 2 раза подряд одной и той же стороной, но не больше четырёх раз. Опишите множество  $\Omega$  элементарных событий. Опишите следующие события и вычислите их вероятности:

- а)  $A$  = эксперимент закончился на втором подбрасывании;
- б)  $B$  = эксперимент закончился на третьем подбрасывании;
- с)  $C$  = эксперимент закончился на четвёртом подбрасывании.

*Решение.* Пусть опыт состоит в однократном подбрасывании монеты. При математическом описании этого опыта естественно отвлечься от несущественных возможностей (например, монета встанет на ребро) и ограничиться только двумя элементарными исходами: выпадение «герба» (обозначим этот исход  $\omega_1$ ) и выпадением «цифры» (обозначим этот исход  $\omega_2$ ). Таким образом,  $\Omega_1 = \{\omega_1, \omega_2\}$ .

При двукратном подбрасывании монеты пространство элементарных исходов будет содержать четыре элемента, т.е.

$$\Omega_2 = \{\omega_{11}, \omega_{12}, \omega_{21}, \omega_{22}\},$$

где, например,  $\omega_{11}$  — появление «герба» и при первом, и при втором подбрасываниях. В данном случае эксперимент может завершиться, если при двукратном подбрасывании монеты она выпала два раза одной и той же стороной. Поэтому  $A = \{\omega_{11}, \omega_{22}\}$ .

При трёхкратном подбрасывании монеты пространство элементарных исходов будет содержать 8 элементов, т.е.

$$\Omega_3 = \{\omega_{111}, \omega_{112}, \omega_{122}, \omega_{121}, \omega_{211}, \omega_{221}, \omega_{212}, \omega_{222}\},$$

где, например,  $\omega_{111}$  — появление «герба» и при первом, и при втором, и при третьем подбрасываниях. Исходом эксперимента могут быть такие 3 подбрасывания, при которых в первый раз выпала одна сторона монеты, а в следующие 2 — другая, т.е.  $B = \{\omega_{122}, \omega_{211}\}$ .

При четырёхкратном подбрасывании монеты пространство исходов будет содержать 16 элементов, т.е.

$$\Omega_4 = \{\omega_{1111}, \omega_{1112}, \omega_{1121}, \omega_{1211}, \omega_{2111}, \omega_{1122}, \omega_{1212}, \omega_{2112}, \omega_{2211}, \omega_{2121}, \omega_{1221}, \omega_{1222}, \omega_{2122}, \omega_{2212}, \omega_{2221}, \omega_{2222}\},$$

где, например,  $\omega_{1111}$  — появление «герба» при всех четырёх подбрасываниях. Чтобы эксперимент не закончился раньше четвёртого подбрасывания, уберём из множества  $\Omega_4$  такие его элементы, которые обеспечивают конец эксперимента при втором и третьем подбрасывании. Получим  $C = \{\omega_{1211}, \omega_{1212}, \omega_{2121}, \omega_{2122}\}$ .

Пространство элементарных исходов состоит из всех элементов множеств  $A$ ,  $B$  и  $C$ , т.е.

$$\Omega = \{\omega_{11}, \omega_{22}, \omega_{122}, \omega_{211}, \omega_{1211}, \omega_{1212}, \omega_{2121}, \omega_{2122}\}.$$

Поскольку  $|A| = 2$ ,  $|\Omega| = 8$ , то

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}.$$

Так же и  $|B| = 2$ ,  $|\Omega| = 8$ , поэтому

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}.$$

Поскольку  $|C| = 4$ ,  $|\Omega| = 8$ , то

$$P(C) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}.$$

### 2.13

*Задание.* Рабочий произвёл  $n$  деталей. Пусть событие  $A_i$  состоит в том, что  $i$ -я деталь имеет дефект. Запишите событие, которое состоит в том, что:

- a) ни одна из деталей не имеет дефектов;
- b) хотя бы одна из деталей имеет дефект;
- c) ровно одна деталь имеет дефект;
- d) ровно две детали имеют дефект;
- e) хотя бы две детали не имеют дефектов;
- f) не больше двух деталей имеют дефект.

*Решение.*

$$a) \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_n} = \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i};$$

$$b) A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \bigcup_{i=1}^n A_i;$$

$$c) \bigcup_{i=1}^n \left( A_i \cap \left( \bigcap_{j=1}^n \overline{A_j} \right) \right), j \neq i;$$

$$d) \bigcup_{i,j=1}^n \left( A_i \cap A_j \cap \left( \bigcap_{k=1}^n \overline{A_k} \right) \right), i \neq j \neq k;$$

$$e) D = \{\text{хотя бы две детали не имеют дефектов}\} = \{\text{иди две детали не имеют дефектов, или 3 детали не имеют дефектов, ..., или } n \text{ деталей не имеют дефектов}\}.$$

Рассмотрим противоположное событие:  $\overline{D} = \{\text{меньше двух деталей не имеют дефекта}\} = \{\text{все детали с дефектами}\} \cup \{\text{ровно одна деталь не имеет дефекта}\} = \left( \bigcap_{i=1}^n A_i \right) \cup \left( \bigcup_k \overline{A_k} \cap A_i \right).$

Вернёмся к нужному событию. Воспользуемся правилом де Моргана:

$$D = \overline{\left( \bigcap_{i=1}^n A_i \right) \cup \left( \bigcup_k \overline{A_k} \cap A_i \right)};$$

$$f) E = \{\text{не больше двух деталей имеют дефект}\} = \{\text{все детали без дефектов}\} \cup \{\text{одна деталь с дефектом}\} \cup \{\text{две детали с дефектом}\} = \left( \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i} \right) \cup \left( \bigcup_{j=1}^n A_j \cap \left( \bigcap_{k=1}^n \overline{A_k} \right) \right) \cup \left( \bigcup_{l,m=1}^n \left( A_l \cap A_m \cap \left( \bigcap_{t=1}^n \overline{A_t} \right) \right) \right), i \neq j \neq k \neq l \neq m \neq t.$$



### 2.14

*Задание.* Пусть  $A, B, C$  — некоторые события. Что означают равенства:

a)  $A \cap B \cap C = A$ ?

b)  $A \cup B \cup C = A$ ?

*Решение.*

a) Событие  $A$  содержится и в событии  $B$ , и в событии  $C$ ;

b) событие  $A$  содержит и событие  $B$ , и событие  $C$ .

### 2.15

*Задание.* Упростите выражение:

a)  $(A \cup B) \cup (A \cup \overline{B})$ ;

b)  $(A \cup B) \cap (\overline{A} \cup B) \cap (A \cup \overline{B})$ .

*Решение.* Используя свойства операций над событиями, получаем:

a)  $(A \cup B) \cup (A \cup \overline{B}) = A \cup B \cup A \cup \overline{B} = A \cup A \cup B \cup \overline{B} = (A \cup A) \cup (B \cup \overline{B}) =$   
 $= A \cup \Omega = \Omega$ ;

b)  $(A \cup B) \cap (\overline{A} \cup B) \cap (A \cup \overline{B}) = (A \cup B) \cap (A \cup \overline{B}) \cap (\overline{A} \cup B) =$   
 $= (A \cup (B \cap \overline{B})) \cap (\overline{A} \cup B) = (A \cup \emptyset) \cap (\overline{A} \cup B) = A \cap (\overline{A} \cup B) =$   
 $= (A \cap \overline{A}) \cup (A \cap B) = \emptyset \cup (A \cap B) = A \cap B$ .

### 2.16

*Задание.* Пусть  $\{A_n, n \in \mathbb{N}\}, \{B_n, n \in \mathbb{N}\}$  — некоторые последовательности событий. Докажите, что:

a)  $\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} \overline{A_n}}$ ;

b)  $\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} \cap \underline{\lim_{n \rightarrow \infty} B_n} \subseteq \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} (A_n \cap B_n)} \subseteq \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} \cap \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} B_n}$ .

*Решение.*

a)  $\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} = \overline{\bigcup_{n \geq 1} \bigcap_{m \geq n} A_n} = \bigcap_{n \geq 1} \overline{\bigcap_{m \geq n} A_n} = \bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{m \geq 1} \overline{A_m} = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} \overline{A_n}}$ ;

b) докажем, что нижний предел входит в верхний. Распишем нижний предел:

$$\underline{\lim_{n \rightarrow \infty} B_n} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} B_m = (B_1 \cap B_2 \cap \dots) \cup (B_2 \cap B_3 \cap \dots) \cup \dots =$$

$$= B_1 B_2 B_3 \dots + B_2 B_3 B_4 \dots + \dots$$

Распишем верхний предел:

$$\begin{aligned}
\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} B_n &= \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} B_m = (B_1 \cup B_2 \cup \dots) \cap (B_2 \cup B_3 \cup \dots) \cap \dots = \\
&= (B_1 + B_2 + B_3 + \dots) (B_2 + B_3 + B_4 + \dots) \dots = \\
&= B_1 B_2 \dots + B_2 B_3 \dots + B_3 B_4 \dots + \dots + B_1 B_3 \dots + B_1 B_4 \dots + B_2 B_3 \dots + \\
&\dots = \\
&= \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} B_n + B_1 B_3 \dots + B_1 B_4 \dots + B_2 B_3 \dots + \dots
\end{aligned}$$

Видим, что в верхний предел, помимо нижнего, входят дополнительные члены. Поэтому нижний предел входит в верхний, т.е.

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} B_n \subseteq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} B_n.$$

Значит первое выражение входит в третье:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n \cap \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} B_n \subseteq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n \cap \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} B_n.$$

Докажем, что второе выражение входит в третье. Распишем второе выражение:

$$\begin{aligned}
\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (A_n \cap B_n) &= \bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{m \geq n} (A_m \cap B_m) = \bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{m \geq n} C = \\
&= (C_1 \cup C_2 \cup \dots) \cap (C_2 \cup C_3 \cup \dots) \cap \dots = \\
&= ((A_1 \cap B_1) \cup (A_2 \cap B_2) \cup \dots) \cap ((A_2 \cap B_2) \cup (A_3 \cap B_3) \cup \dots) \cap \dots = \\
&= (A_1 B_1 + A_2 B_2 + \dots) (A_2 B_2 + A_3 B_3 + \dots) \dots
\end{aligned}$$

Распишем третье выражение:

$$\begin{aligned}
\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n \cap \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} B_n &= \left( \bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{m \geq n} A_m \right) \cap \left( \bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{m \geq n} B_m \right) = \\
&= \left( \prod_{n=1}^{\infty} \sum_{m=n}^{\infty} A_m \right) \left( \prod_{n=1}^{\infty} \sum_{m=n}^{\infty} B_m \right) = (A_1 + A_2 + \dots) (A_2 + A_3 + \dots) \dots \left( \prod_{n=1}^{\infty} \sum_{m=n}^{\infty} B_m \right) = \\
&= \left( A_1 \cdot \prod_{n=1}^{\infty} \sum_{m=n}^{\infty} B_m + A_2 \cdot \prod_{n=1}^{\infty} \sum_{m=n}^{\infty} B_m + \dots \right) (A_2 + A_3 + \dots) \dots = \\
&= [A_1 (B_1 + B_2 + \dots) (B_2 + B_3 + \dots) \dots] + [A_2 (B_1 + B_2 + \dots) (B_2 + B_3 + \dots) \dots] \times \\
&\times (A_2 + A_3 + \dots) \dots = ((A_1 B_1 + A_1 B_2 + \dots) (B_2 + B_3 + \dots) \dots) + \\
&+ ((A_2 B_1 + A_2 B_2 + \dots) (B_2 + B_3 + \dots) \dots) (A_2 + A_3 + \dots) \dots
\end{aligned}$$

Все члены, полученные во втором выражении, входят в третье, значит

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (A_n \cap B_n) \subseteq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n \cap \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} B_n.$$

Докажем, что первое выражение входит во второе. Распишем первое выражение:

$$\begin{aligned}
\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n \cap \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} B_n &= \left( \bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{m \geq n} A_m \right) \cap \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} B_m \right) = \\
&= \left( \bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{m \geq n} A_m \right) \cap C = (A_1 \cup A_2 \cup \dots) \cap (A_2 \cup A_3 \cup \dots) \cap \dots \cap C = \\
&= ((A_1 \cap C) \cup (A_2 \cap C) \cup \dots) \cap (A_2 \cup A_3 \cup \dots) \cap (A_3 \cup A_4 \cup \dots) \cap \dots = \\
&= (A_1 \cdot C + A_2 \cdot C + \dots) (A_2 + A_3 + \dots) (A_3 + A_4 + \dots) \dots = \\
&= \left( A_1 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \prod_{m=n}^{\infty} B_m + A_2 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \prod_{m=n}^{\infty} B_m + \dots \right) (A_2 + A_3 + \dots) (A_3 + A_4 + \dots) \dots = \\
&= \{ [A_1 (B_1 B_2 \dots + B_2 B_3 \dots + \dots)] + [A_2 (B_1 B_2 \dots + B_2 B_3 \dots + \dots)] + \dots \} \times \\
&\quad \times (A_2 + A_3 + \dots) (A_3 + A_4 + \dots) \dots = \\
&= (A_1 B_1 B_2 \dots + A_1 B_2 B_3 \dots + A_2 B_1 B_2 \dots + A_2 B_2 B_3 \dots + \dots) \times \\
&\quad \times (A_2 + A_3 + \dots) (A_3 + A_4 + \dots) \dots = \\
&= (A_2 A_2 B_1 B_2 \dots + A_1 A_3 B_1 B_2 \dots + A_1 A_2 B_1 B_2 \dots + \\
&+ A_1 A_3 B_1 B_2 \dots + A_2 A_2 B_2 B_3 \dots + A_2 A_3 B_2 B_3 \dots + \dots) (A_3 + A_4 + \dots) \dots = \\
&= A_2 A_2 A_3 \dots B_1 B_2 \dots + A_2 A_2 A_4 \dots B_1 B_2 \dots + A_1 A_3 A_3 \dots B_1 B_2 \dots + \\
&+ A_1 A_3 A_4 \dots B_1 B_2 \dots + A_1 A_2 A_3 \dots B_1 B_2 \dots + A_1 A_2 A_4 \dots B_1 B_2 \dots + \\
&+ A_1 A_3 A_3 \dots B_1 B_2 \dots + A_1 A_3 A_4 \dots B_1 B_2 \dots + A_2 A_2 A_3 \dots B_2 B_3 \dots + \\
&+ A_2 A_2 A_4 \dots B_2 B_3 \dots + A_2 A_3 A_3 \dots B_2 B_3 \dots + A_2 A_3 A_4 \dots B_2 B_3 \dots + \dots
\end{aligned}$$

Вспомним второе выражение:

$$\begin{aligned}
\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (A_n \cap B_n) &= (A_1 B_1 + A_2 B_2 + A_3 B_3 + \dots) (A_2 B_2 + A_3 B_3 + A_4 B_4 + \dots) \times \\
&\quad \times (A_3 B_3 + A_4 B_4 + \dots) \dots = \\
&= (A_1 A_2 B_1 B_2 + A_1 A_3 B_1 B_3 + A_1 A_4 B_1 B_4 + A_2 A_2 B_2 B_2 + A_2 A_3 B_2 B_3 + A_2 A_3 B_2 B_4 + \\
&\quad + A_3 A_2 B_3 B_2 + A_3 A_3 B_3 B_3 + A_3 A_4 B_3 B_4 + \dots) (A_3 B_3 + A_4 B_4 + \dots) \dots = \\
&= A_1 A_2 A_3 \dots B_1 B_2 B_3 \dots + A_1 A_2 A_4 \dots B_1 B_2 B_4 \dots + A_1 A_3 A_3 \dots B_1 B_3 B_3 \dots + \\
&+ A_1 A_3 A_4 \dots B_1 B_3 B_4 \dots + A_1 A_4 A_3 \dots B_1 B_4 B_3 \dots + A_1 A_4 A_4 \dots B_1 B_4 B_4 \dots + \\
&+ A_2 A_2 A_3 \dots B_2 B_2 B_3 \dots + A_2 A_2 A_4 \dots B_2 B_2 B_4 \dots + A_2 A_3 A_3 \dots B_2 B_3 B_3 \dots + \\
&+ A_2 A_3 A_4 \dots B_2 B_3 B_4 \dots + A_3 A_2 A_3 \dots B_3 B_2 B_3 \dots + A_3 A_2 A_4 \dots B_3 B_2 B_4 \dots + \\
&+ A_3 A_3 A_3 \dots B_3 B_3 B_3 \dots + A_3 A_3 A_4 \dots B_3 B_3 B_4 \dots + A_3 A_4 A_3 \dots B_3 B_4 B_3 \dots + \\
&\quad + A_3 A_4 A_4 \dots B_3 B_4 B_4 \dots + \dots
\end{aligned}$$

Как доказать, что первое выражение входит во второе, не знаю. Поэтому рассмотрим второй метод. Распишем первое выражение через другое определение пределов.

$$\begin{aligned}
x \in \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n \cap \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} B_n &\Rightarrow \begin{cases} x \in \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n \\ x \in \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} B_n \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \forall n \exists m \geq n : x \in A_m \\ \exists n \forall m \geq n : x \in B_m \end{cases} \Rightarrow \\
\Rightarrow \forall n \exists m \geq n : x \in A_m \cap B_m &\Rightarrow x \in \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (A_n \cap B_n) \Rightarrow \begin{cases} \forall n \exists m \geq n : x \in A_m \\ \forall n \exists m \geq n : x \in B_m \end{cases} \Rightarrow \\
&\Rightarrow \begin{cases} x \in \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n \\ x \in \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} B_n \end{cases} \Rightarrow x \in \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n \cap \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} B_n.
\end{aligned}$$

Получили требуемый результат.

## 2.17

*Задание.* Пусть  $\{A_n, n \in \mathbb{N}\}$  — некоторая последовательность событий,  $\mathbb{1}(A)$  — индикатор события  $A$ . Докажите, что:  $\mathbb{1}\left(\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}(A_n)$ .

*Решение.* Рассмотрим 4 случая:

- (a)  $\mathbb{1}\left(\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = 0, \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}(A_n) = 0;$
- (b)  $\mathbb{1}\left(\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = 0, \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}(A_n) = 1;$
- (c)  $\mathbb{1}\left(\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = 1, \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}(A_n) = 0;$
- (d)  $\mathbb{1}\left(\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = 1, \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}(A_n) = 1.$

Нужно доказать, что возможны только первый и последний случаи.

Нижний предел последовательности:  $\{A_n : n \geq 1\}$  — это случайное событие, состоящее в том, что произошли все события, начиная с некоторого из исходной последовательности:

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} A_m.$$

Если индикатор нижнего предела равен нулю:

$$\mathbb{1}\left(\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = 0,$$

то нет такого момента, начиная с которого начали происходить все события. Имеем события, которые произошли, и которые не произошли. Индикатор событий, которые произошли, равен единице, а которые не произошли — нулю. Нижний предел последовательности чисел — это точная нижняя грань. Точная нижняя грань последовательности из нулей и единиц равна нулю, т.е.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}(A_n) = 0.$$

Если индикатор от нижнего предела равен единице:

$$\mathbb{1}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = 1,$$

то произошло бесконечное множество событий из  $A_n$  начиная с какого-то момента. Значит индикатор событий начиная с этого момента равен единице. Поэтому нижний предел равен единице:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}(A_n) = 1.$$

## 2.18

*Задание.* Рассмотрим эксперимент, который состоит в выборе наугад точки в круге единичного радиуса с центром в начале координат. Опишите и изобразите пространство элементарных событий этого эксперимента, а также следующие события:

- а)  $A$  = произведение координат точки не превышает  $1/8$ ;
- б)  $B$  = данная точка оказалась внутри круга с центром в начале координат и радиусом  $1/4$ ;
- в)  $\overline{A}, \overline{B}, A \cap B$ .

*Решение.* Пространство элементарных событий опишем как множество упорядоченных пар  $\Omega = \{(x, y), x^2 + y^2 \leq 1\}$ , где  $x$  — первая координата точки,  $y$  — вторая координата точки (6, а)).

- а)  $A = \{(x, y), x^2 + y^2 \leq 1, xy \leq \frac{1}{8}\}$  (6, б));
- б)  $B = \{(x, y), x^2 + y^2 < \frac{1}{4}\}$  (6, в));
- в) событие  $\overline{A}$  означает, что событие  $A$  не произошло, то есть произведение координат точки превышает  $1/8$  (6, г)):

$$\overline{A} = \{(x, y), xy > 1/8, x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

Событие  $\overline{B}$  означает, что точка не оказалась внутри круга радиуса  $1/4$  (6, д)):

$$\overline{B} = \{(x, y), 1 \geq x^2 + y^2 > \frac{1}{4}\}.$$



Рис. 6: Вероятностное пространство и события из задачи 2.18

Событие  $A \cap B$  означает, что произошло и событие А, и событие В. Отсюда имеем, что произведение координат точки не должно превышать  $1/8$ , а сумма квадратов координат должна быть меньше  $1/4$  (6, е)), т.е.

$$A \cap B = \{(x, y), x^2 + y^2 < \frac{1}{4}, xy \leq \frac{1}{8}\}.$$

# Занятие 3. Классическое определение вероятности

## Контрольные вопросы и задания

**Приведите определение вероятностного эксперимента, вероятностного пространства, случайного события.**

Вероятностным экспериментом называется явление, исход которого для нас не определён, и который можно повторить любое число раз независимым образом.

Вероятностное пространство — совокупность всех исходов вероятностного эксперимента,  $\Omega$ .

Случайное событие — подмножество всех исходов вероятностного эксперимента.

**Как вычислить вероятность события в случае, когда вероятностное пространство состоит из конечного количества равновероятных элементарных событий?**

В этом случае вероятность любого события  $A$  вычисляется по формуле

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|},$$

называемой классическим определением вероятности.

**Запишите формулу включений и исключений.**

Если  $B_1, B_2, \dots, B_m$  — некоторые события, то имеет место равенство

$$\begin{aligned} P\left\{\bigcup_{i=1}^m B_i\right\} &= \sum_{i=1}^m P\{B_i\} - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq m} \{B_{i_1} \cap B_{i_2}\} + \dots + \\ &+ (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq m} P\{B_{i_1} \cap B_{i_2} \cap \dots \cap B_{i_k}\} + \dots + \\ &+ (-1)^{m-1} P\{B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_m\}. \end{aligned}$$

## Аудиторные задачи

### 3.3

*Задание.* Пусть  $A$  и  $B$  такие события, что

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4}, P(\bar{A}) = \frac{1}{3}, P(B) = \frac{1}{2}.$$

Вычислите  $P(A \cup B)$ .

*Решение.* Вычислим вероятность события  $A$ :

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

Так как события независимы, то вероятность пересечения событий равна произведению пересечений, т.е.  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ .

Вычислим вероятность объединения:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{2}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{8+6-3}{12} = \frac{11}{12}.$$

### 3.4

*Задание.* Было подброшено три монеты. Найдите вероятности событий:

- a)  $A$  = хотя бы одна из монет выпала гербом;
- b)  $B$  = выпало ровно два герба;
- c)  $C$  = выпало не меньше двух гербов.

*Решение.* На первой монете может появиться или герб, или цифра. Аналогичные два элементарных исхода возможны при подбрасывании остальных монет. Таким образом, общее число возможных элементарных исходов испытания равно  $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ . Эти исходы равновероятны.

- a) Рассмотрим событие  $\bar{A} = \{\text{все монеты выпали решкой}\} = \{\text{ЦЦЦ}\}$ . Мощность этого события равна  $|\bar{A}| = 1$ . Таким образом, вероятность события  $\bar{A}$  будет

$$P(\bar{A}) = \frac{|\bar{A}|}{|\Omega|} = \frac{1}{8}.$$

Тогда вероятность необходимого события

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8};$$

- b) благоприятствующим интересующему нас событию (выпало ровно два герба) являются следующие исходы: ГГЦ, ГЦГ, ЦГГ.

Искомая вероятность равна

$$P(B) = \frac{3}{8};$$



с) опишем событие  $C = \{\text{выпало не меньше двух гербов}\} = B \cup \{ГГГ\}$ .

Искомая вероятность равна

$$P(C) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}.$$

### 3.5

*Задание.* Подброшено 12 игральных кубиков. Найдите вероятность того, что каждое из очков  $1, 2, \dots, 6$  выпало дважды.

*Решение.* На выпавшей грани «первого» игрального кубика может появиться одно очко, два очка,  $\dots$ , шесть очков. Аналогичные шесть элементарных исходов возможны при бросании остальных кубиков. Таким образом, общее число возможных элементарных исходов испытания равно  $6 \cdot 6 \cdot \dots \cdot 6 = 6^{12}$ . Эти исходы в силу симметрии кубиков равновероятны.

Благоприятствующим интересующему нас событию (каждое из очков выпадет дважды) является  $C_{12}^2 \cdot C_{10}^2 \cdot C_8^2 \cdot C_6^2 \cdot C_4^2 \cdot C_2^2$  исходов.

Искомая вероятность равна отношению числа исходов, благоприятствующих событию, к числу всех возможных элементарных исходов:

$$P = \frac{C_{12}^2 \cdot C_{10}^2 \cdot C_8^2 \cdot C_6^2 \cdot C_4^2 \cdot C_2^2}{6^{12}}.$$

### 3.6

*Задание.* Игральный кубик изготовлено так, что вероятность выпадения каждой грани пропорциональна количеству очков, изображённой на этой грани. Вычислите вероятность того, что при подбрасывании такого игрального кубика выпадет чётное количество очков.

*Решение.* Вероятность выпадения единицы пропорциональна единице, т.е. равна  $n$ , где  $n$  — любое натуральное число. Вероятность выпадения двойки равна  $2n$ , тройки —  $3n$ , четвёрки —  $4n$ , пятёрки —  $5n$  и шестёрки —  $6n$ . Вероятность выпадения хоть какого-то числа равна единице, т.е. сумма вероятностей выпадения всех граней равна единице:  $n + 2n + 3n + 4n + 5n + 6n = 21n = 1$ . Отсюда

$$n = \frac{1}{21}.$$

Интересующие нас события: выпадет 2 очка, 4 очка или 6 очков. 2 очка может выпасть с вероятностью

$$P(2) = 2 \cdot \frac{1}{21} = \frac{2}{21}.$$

4 очка может выпасть с вероятностью

$$P(4) = 4 \cdot \frac{1}{21} = \frac{4}{21}.$$

6 очков может выпасть с вероятностью

$$P(6) = 6 \cdot \frac{1}{21} = \frac{6}{21}.$$

Вероятность выпадения чётного числа равна сумме вероятностей их выпадения:

$$P(2, 4, 6) = \frac{2}{21} + \frac{4}{21} + \frac{6}{21} = \frac{12}{21}.$$

### 3.7

*Задание.* Найдите вероятность того, что наугад выбранное число из множества  $\{1, 2, \dots, 100!\}$  делится:

- а) на 2;
- б) на 2 и на 3;
- в) хотя бы на одно из чисел 2, 3, или 5.

*Решение.* Всего чисел  $100!$ .

- а) На 2 делится каждое второе число, т.е. количество чисел, которые делятся на 2, равно

$$\frac{100!}{2}.$$

Вероятность выбора чётного числа равна

$$P = \frac{\frac{100!}{2}}{100!} = \frac{1}{2};$$

- б) на 2 и на 3 делится каждое шестое число, т.е. их всего

$$\frac{100!}{6}.$$

Тогда вероятность выбора числа, которое делится и на 2, и на 3, равна

$$P = \frac{\frac{100!}{6}}{100!} = \frac{1}{6};$$

- в) на 2 делится каждое второе число, на 3 — каждое третье, на 5 — каждое пятое. Используем формулу включений-исключений:

$$P = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} - \frac{1}{10} - \frac{1}{15} + \frac{1}{30} = \frac{15 + 10 + 6 - 5 - 3 - 2 + 1}{30} = \frac{22}{30} = \frac{11}{15}.$$

### 3.8

*Задание.* В лифт девятиэтажного дома зашло пятеро человек. Известно, что каждый из них с одинаковой вероятностью может выйти на любом этаже, начиная со второго. Найдите вероятность того, что:

- a) все пятеро выйдут на 5-м этаже;
- b) все пятеро выйдут на одном и том же этаже;
- c) все пятеро выйдут на разных этажах;
- d) двое людей выйдут на 4-м этаже, двое — на 7-м и один человек выйдет на 9-м этаже.

*Решение.* Каждый из пяти человек может выйти на любом из восьми этажей. Тогда всего есть  $8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 = 8^5$  вариантов.

- a) Все пять человек могут выйти на пятом этаже одним способом. Тогда вероятность этого события равна

$$P = \frac{1}{8^5};$$

- b) все пять человек могут выйти на одном и том же этаже восемью способами. Тогда вероятность этого события равна

$$P = \frac{8}{8^5} = \frac{1}{8^4};$$

- c) первый человек может выйти на любом из восьми этажей, второй — на любом из оставшихся семи, третий — на любом из оставшихся шести, четвёртый — пяти, и наконец пятый — на оставшихся четырёх этажах. Тогда вероятность равна

$$P = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{8^5} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{8^4};$$

- d) на четвёртом этаже могут выйти 2 человека из пяти ( $C_5^2$ ). На седьмом этаже — двое из оставшихся трёх человек. Это  $C_3^2$ . На девятом — один человек из одного. Это один способ. Тогда вероятность равна

$$P = \frac{C_5^2 \cdot C_3^2}{8^5}.$$

### 3.9

*Задание.* Из колоды карт наугад выбирают 3 карты (без возвращения). Найдите вероятность того, что среди этих карт:

- a) окажется ровно одни туз;

- b) окажется хотя бы один туз;
- c) окажется тройка, семёрка, туз.

*Решение.* Всего в колоде 52 карты. Тогда есть 4 масти по 13 карт в каждой. 3 карты из 36 можно выбрать  $C_{52}^3$  способами.

- a) В колоде есть 4 туза. Один из них можно выбрать  $C_4^1$  способами. Остаётся выбрать две карты из  $52 - 4 = 48$ . Это можно сделать  $C_{48}^2$  способами. Тогда вероятность выбрать 3 карты так, что среди них окажется ровно 1 туз, равна

$$P = \frac{C_4^1 \cdot C_{48}^2}{C_{52}^3};$$

- b)  $B = \{\text{среди этих карт окажется хотя бы 1 туз}\}$ . Рассмотрим противоположное событие:  $\overline{B} = \{\text{среди трёх карт нет тузов}\}$ . Вероятность этого события равна

$$P(\overline{B}) = \frac{C_{48}^3}{C_{52}^3}.$$

Тогда вероятности интересующего нас события равна

$$P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 1 - \frac{C_{48}^3}{C_{52}^3};$$

- c) есть 4 варианта выбрать тройку, 4 выбрать семёрку и 4 — туз. Первой картой может быть тройка, семёрка или туз ( $4 \cdot 3 = 12$  карт из 52). Далее должна быть одна из восьми карт (т.е. 8 вариантов из оставшихся 51 карты). Последней картой может быть любая из четырёх (из 50 карт). По правилу произведения имеем

$$P = \frac{12}{52} \cdot \frac{8}{51} \cdot \frac{4}{50}.$$

### 3.10

*Задание.* В партии, что состоит из  $N$  деталей, есть  $M$  бракованных. Найдите вероятность того, что среди  $n$  ( $n < N$ ) наугад выбранных деталей окажется:

- a)  $m$  ( $m < M$ ) бракованных;
- b) не больше  $m$  бракованных.

*Решение.* Пространство элементарных событий  $\Omega$  является множеством  $n$ -элементных подмножеств множества из  $N$  элементов. Значит,  $|\Omega| = C_N^n$ .

- a) Посчитаем число исходов, благоприятствующих интересующему нас событию (среди  $n$  деталей ровно  $m$  бракованных):  $m$  бракованных деталей можно взять из  $M$  бракованных деталей  $C_M^m$  способами; при

этом остальные  $n - m$  деталей не должны быть бракованными; взять же  $n - m$  не бракованных деталей из  $N - M$  не бракованных деталей можно  $C_{N-M}^{n-m}$  способами. Следовательно, число благоприятствующих исходов равно  $C_M^m C_{N-M}^{n-m}$ .

Искомая вероятность равна отношению числа исходов, благоприятствующих событию, к числу всех элементарных исходов:

$$P = \frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n};$$

- б) посчитаем число исходов, благоприятствующих интересующему нас событию (среди  $n$  деталей от нуля до  $m$  бракованных): от нуля до  $m$  бракованных деталей можно взять из  $M$  бракованных деталей  $\sum_{i=0}^m C_M^i$  способами; при этом остальные от  $n - m$  до  $n$  деталей не должны быть бракованными; взять же от  $n - m$  до  $n$  не бракованных деталей из  $N - M$  не бракованных деталей можно  $\sum_{i=0}^m C_{N-M}^{n-i}$  способами. Следовательно, число благоприятствующих исходов равно  $\sum_{i=0}^m C_M^i C_{N-M}^{n-i}$ .

Искомая вероятность равна отношению числа исходов, благоприятствующих событию, к числу всех элементарных исходов:

$$P = \frac{\sum_{i=0}^m C_M^i C_{N-M}^{n-i}}{C_N^n}.$$

### 3.11

*Задание.* В купейный вагон (9 купе по 4 места в каждом) семи пассажирам продано семь билетов. Найдите вероятность того, что занятыми окажутся:

- ровно два купе;
- ровно три купе.

*Решение.* Любой из семи пассажиров может занять любое из четырёх мест в любом из девяти купе (всего мест  $4 \cdot 9 = 36$ ). Тогда общее число элементарных исходов —  $C_{36}^7$ .

- Опишем событие  $A = \{\text{заняты 2 купе}\}$ . Нужно выполнить 4 действия. Первое действие: выбрать купе, где будет 4 человека. Способов сделать это  $C_9^1$ . Второе действие: разместить четырёх человек на четырёх местах. Способов сделать это — 1. Третье действие: выбрать купе, где будет 3 человека. Это можно сделать  $C_8^1$  способом. Четвёртое действие: разместить трёх человек на четырёх местах. Это можно сделать  $C_4^3$  способами.

Тогда мощность события  $A$  равна  $|A| = C_9^1 \cdot 1 \cdot C_8^1 \cdot C_4^3$ .

Вероятность этого события равна

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{C_9^1 \cdot 1 \cdot C_8^1 \cdot C_4^3}{C_{36}^7};$$

b) Рассмотрим событие  $B = \{\text{занято 3 купе}\}$ . Тогда возможны такие ситуации:

- в одном купе находится 4 человека, в другом — 2, и в оставшемся — 1;
- в двух купе находится по 3 человека, и в оставшемся — 1 человек;
- в двух купе находится по 2 человека, и в оставшемся — 3 человека.

Тогда мощность этого события равна  $|B| = (C_9^1 C_4^4) (C_3^1 C_4^2) (C_7^1 C_4^1) + (C_9^2 (C_4^3)^2) (C_7^1 C_4^1) + (C_9^2 (C_4^2)^2) (C_7^1 C_4^3)$ .

Вероятность такого события равна

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|}.$$

### 3.12

*Задание.* Шутник Петя написал письма  $n$  адресатам, в каждый конверт вложил по одному письму, а потом наугад написал на каждом из конвертов один из  $n$  адресов. Найдите вероятность того, что:

- а) хотя бы одно письмо придёт по назначению;
- б) ровно  $m$  писем придут по назначению.

*Решение.* Разложить  $n$  писем в  $n$  конвертов можно  $n!$  способами.

- а) Найдём вероятность того, что ни одно письмо не попадёт в конверт с правильным адресом, а затем вычтем её из 1.

Из общего числа способов необходимо вычесть число тех вариантов, при которых первое письмо попадает в 1-й конверт, все способы, при которых второе письмо попадает во 2-й конверт и т.д.

Письмо, которое будет вложено в конверт с правильным адресом, можно выбрать  $n$  способами; остальные  $n-1$  письмо можно вложить в  $n-1$  конверт  $(n-1)!$  способами, поэтому общее число вариантов размещения писем по конвертам равно  $n \cdot (n-1)! = n!$ . Вычитая это число из общего числа возможных вариантов размещения писем по конвертам, равного  $n!$ , мы не оставляем ни одного варианта. Вариант, в котором, например, первое письмо попадает в 1-й конверт, а второе письмо — во 2-й, мы вычитаем дважды.

Чтобы найти, сколько вариантов мы вычли слишком большое число раз, заметим, что существует

$$C_n^2 = \frac{n!}{2!(n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2!}$$

пар писем, и если письма, образующие пару, вложены в конверты с правильными адресами, то остальные  $n-2$  письма можно распределить по конвертам

$$\frac{n(n-1)}{2!} \cdot (n-2)! = \frac{n!}{2!}$$

способами.

Прибавив число способов распределения писем в конверты, при которых два письма вложены в свои конверты, мы получим всего

$$n! - n! + \frac{n!}{2!}$$

вариантов размещения писем по конвертам.

Но теперь это слишком много, так как все варианты, при которых в свои конверты вложены три письма, не были учтены (мы вычли число таких вариантов трижды, а затем прибавили его столько раз, сколько пар писем можно образовать из трёх писем, т.е. три раза). Следовательно, мы должны вычесть число способов, которыми можно вложить в конверты с правильными адресами три письма, т.е.

$$C_n^3 \cdot (n-3)! = \frac{n!}{(n-3)!3!} \cdot (n-3)! = \frac{n!}{3!}$$

способов.

Теперь мы вычли слишком много раз число способов, которыми можно вложить в конверты с правильными адресами четыре письма и т.д. Таким образом, число способов, которыми письма можно разложить по конвертам так, что ни одно письмо не окажется в конверте с правильным адресом, равно

$$n! - n! + \frac{n!}{2!} - \frac{n!}{3!} + \dots + (-1)^{n+1} \left( \frac{1}{n!} \right),$$

а вероятность этого события равна этому числу, делённому на  $n!$ , т.е. равна числу

$$1 - 1 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n!}.$$

Следовательно, вероятность того, что по крайней мере одно письмо окажется в конверте с правильным адресом, равна

$$P = 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n!};$$

- b) найдём вероятность того, что  $n - m$  писем не попадут в конверты с правильными адресами, а затем вычтем её из 1.

Письма, которые будут вложены в конверты с правильными адресами, можно выбрать  $C_n^m$  способами; остальные  $n - m$  писем можно вложить в  $n - m$  конвертов  $(n - m)!$  способами, поэтому общее число вариантов размещения писем по конвертам равно

$$C_n^m \cdot (n - m)!.$$

Аналогично пункту а) получаем, что число способов, которыми письма можно разложить по конвертам так, что ровно  $m$  писем окажется в конверте с правильным адресом, равно

$$C_n^m \left( (n - m)! - (n - m)! + \frac{(n - m)!}{2!} - \frac{(n - m)!}{3!} + \dots \right),$$

а вероятность этого события равна этому числу, делённому на  $n!$ , т.е. равна числу

$$\begin{aligned} & C_n^m \cdot \frac{1}{n!} \left( (n - m)! - (n - m)! + \frac{(n - m)!}{2!} - \frac{(n - m)!}{3!} + \dots \right) = \\ & = \frac{1}{m! (n - m)!} \left( (n - m)! - (n - m)! + \frac{(n - m)!}{2!} - \frac{(n - m)!}{3!} + \dots \right) = \\ & = \frac{1}{m!} \left( \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots \right). \end{aligned}$$

Следовательно, вероятность того, что ровно  $m$  писем окажется в конвертах с правильными адресами, равна

$$P = 1 - \frac{1}{m!} \left( \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots \right).$$

**Число встреч** В задаче используется понятие «число встреч». Под ним понимается число перестановок множества  $\{1, \dots, n\}$  с заданным числом неподвижных элементов. Для  $n \geq 0$  и  $0 \leq k \leq n$  число встреч  $D_{n,k}$  — это число перестановок  $\{1, \dots, n\}$ , содержащих ровно  $k$  элементов, не изменивших положение в перестановке.

Числа в первом столбце ( $k = 0$ ) показывают число беспорядков (рис. 7). Так,  $D_{0,0} = 1, D_{1,0} = 0, D_{n+2,0} = (n + 1)(D_{n+1,0} + D_{n,0})$  для неотрицательного  $n$ .

Выберем  $m$  фиксированных элементов из  $n$ , затем посчитаем число беспорядков оставшихся  $n - m$  элементов. Это будет

$$(n - m)! \sum_{k=0}^{n-m} \frac{(-1)^k}{k!}.$$



$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	6	7
0	1							
1	0	1						
2	1	0	1					
3	2	3	0	1				
4	9	8	6	0	1			
5	44	45	20	10	0	1		
6	265	264	135	40	15	0	1	
7	1854	1855	924	315	70	21	0	1

Рис. 7: Фрагмент таблицы числа встреч

$$D_{n,m} = C_n^m D_{n-m,0} = \frac{n!}{m!} \sum_{k=0}^{n-m} \frac{(-1)^k}{k!}.$$

### 3.13

*Задание.* (Статистика Максвелла-Больцмана). Каждая из  $n$  разных частиц наугад попадает в одну из  $N$  ячеек.

- Найдите вероятность того, что в первой, второй и т.д.,  $N$ -ой ячейке будет соответственно  $n_1, n_2, \dots, n_N$  частиц;
- найдите вероятность  $p_k$  того, что данная ячейка содержит  $k$  частиц;
- \*докажите, что если  $n$  и  $N$  стремятся к бесконечности так, что

$$\frac{n}{N} \rightarrow \lambda,$$

то

$$p_k \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda};$$

- найдите вероятность того, что в каждой ячейке есть хотя бы одна частица;
- найдите вероятность того, что занято ровно  $r$  ячеек.

*Решение.* В случаях а), б) и д) вероятность желаемого события оценивается по формуле

$$p = \frac{r}{m}.$$

Для каждой из  $n$  разных частиц есть  $N$  вариантов попасть в одну из ячеек. Поэтому по правилу умножения имеем общее количество вариантов  $m = N^n$ . Вычислим количество  $r$  вариантов, что отвечают каждому из событий, указанных в условии задачи.

- а) Существует  $C_n^{n_1}$  способов, которыми можно отобрать  $n_1$  частицу в первую ячейку. Аналогично, количество способов отобрать  $n_2$  частицы во вторую ячейку среди  $n - n_1$  частицы, которые остались, равно  $C_{n-n_1}^{n_2}$ . Подобным же образом отбираются частицы и для других ячеек. Поэтому событию способствуют

$$\begin{aligned} r &= C_n^{n_1} \cdot C_{n-n_1}^{n_2} \cdot C_{n-n_1-n_2}^{n_3} \cdot \dots = \\ &= \frac{n!}{n_1!(n-n_1)!} \cdot \frac{(n-n_1)!}{n_2!(n-n_1-n_2)!} \cdot \frac{(n-n_1-n_2)!}{n_3!(n-n_1-n_2-n_3)!} \cdot \dots = \\ &= \frac{n!}{n_1!n_2!n_3! \dots n_N!} \end{aligned}$$

способов.

Тогда вероятность равна

$$p = \frac{\frac{n!}{n_1!n_2!n_3! \dots n_N!}}{N^n} = \frac{n!}{N^n \cdot n_1!n_2!n_3! \dots n_N!};$$

- б) сначала нужно отобрать  $k$  частиц в фиксированную ячейку (это можно сделать  $C_n^k$  способами), а потом  $n - k$  частиц распределить среди  $N - 1$  ячейки  $((N - 1)^{n-k}$  способов). По правилу умножения имеем  $r = C_n^k \cdot (N - 1)^{n-k}$  способов.

Тогда вероятность равна

$$p_k = \frac{C_n^k \cdot (N - 1)^{n-k}}{N^n}$$

с) \*распишем  $p_k$ :

$$\begin{aligned}
 p_k &= \frac{C_n^k (N-1)^{n-k}}{N^n} = \frac{n! (N-1)^{n-k}}{k! (n-k)! \cdot N^n} = \\
 &= \frac{n! (N-1)^n}{k! (n-k)! \cdot N^n (N-1)^k} = \frac{n!}{k! (n-k)! (N-1)^k} \cdot \left( \frac{N-1}{N} \right)^n = \\
 &= \frac{(n-k)! (n-k+1) \dots n}{k! (n-k)! (N-1)^k} \cdot \left( \frac{N-1}{N} \right)^n = \frac{\prod_{i=0}^{k-1} (n-i)}{k! (N-1)^k} \cdot \left( \frac{N-1}{N} \right)^n = \\
 &= \frac{\prod_{i=0}^{k-1} \left( \frac{n-i}{N-1} \right)}{k!} \cdot \left( 1 - \frac{1}{N} \right)^n.
 \end{aligned}$$

Умножим и поделим последнюю скобку на  $n$ . Получим:

$$p_k = \frac{\prod_{i=0}^{k-1} \left( \frac{n-i}{N-1} \right)}{k!} \cdot \left( 1 - \frac{\frac{n}{N}}{n} \right)^n.$$

Возьмём предел полученного выражения при

$$\frac{n}{N} \rightarrow \lambda.$$

Получим:

$$\lim_{\frac{n}{N} \rightarrow \lambda} p_k = \lim_{\frac{n}{N} \rightarrow \lambda} \left( \frac{\prod_{i=0}^{k-1} \left( \frac{n-i}{N-1} \right)}{k!} \cdot \left( 1 - \frac{\frac{n}{N}}{n} \right)^n \right) = \frac{\lambda^k}{k!} \exp(-\lambda);$$

d) вероятность соответственного события вычисляется с помощью фор-

мулы включений и исключений:  $P \left\{ \bigcup_{i=1}^m B_i \right\} = \sum_{i=1}^m P \{B_i\} -$   
 $- \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq m} P \{B_{i_1} \cap B_{i_2}\} + \dots +$   
 $+ (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq m} P \{B_{i_1} \cap B_{i_2} \cap \dots \cap B_{i_k}\} + \dots +$   
 $+ (-1)^{m-1} P \{B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_m\}$ . Обозначим через  $B_i$  событие «ячей-

ка  $i$  не содержит частиц». Тогда  $p = 1 - P \left\{ \bigcup_{i=1}^N B_i \right\}$ . Для любых  
 $i = 1, \dots, N, 1 \leq$   
 $\leq i_1 < i_2 < \dots < i_j \leq N$

$$P \{B_i\} = \frac{(N-1)^m}{N^m}, P \{B_{i_1} \cap B_{i_2} \cap \dots \cap B_{i_j}\} = \frac{(N-j)^m}{N^m}, j = 2, 3, \dots, N-1$$

( $j$  ячеек являются пустыми;  $m$  разных частиц можно разместить в  $N - j$  ячейках  $(N - j)^m$  способами). Количество слагаемых в соответствующей сумме равно  $C_N^j$ . Согласно с формулой включений и исключений имеем окончательный ответ

$$p = 1 - \frac{1}{N^m} \cdot \left[ C_N^1 \cdot (N - 1)^m - C_N^2 \cdot (N - 2)^m + \dots + (-1)^N \cdot C_N^{N-1} \cdot 1^m \right];$$

- е) решение задачи разбиваем на два шага: сначала выбираем  $r$  ячеек из  $N$ , которые будут занятыми (это можно сделать  $C_N^r$  способами), а потом размещаем  $n$  разных частиц в  $r$  ячеек таким образом, чтобы ни одна из них не была пустой (подобная задача решена в пункте г) по формуле включений и исключений). Поэтому окончательно имеем  $r = C_N^r \times$   
 $\times \left[ r^n - C_r^1 \cdot (r - 1)^n + C_r^2 \cdot (r - 2)^n - \dots + (-1)^{r-1} \cdot C_r^{r-1} \cdot 1^n \right].$

## Дополнительные задачи

### 3.14

*Задание.* Каждое из двух чисел  $a, b$  наугад выбирают из множества  $\{1, 2, \dots, n\}$ . Вычислите вероятность того, что одно из них делится на другое. Найдите предел этой вероятности при  $n \rightarrow \infty$ .

*Решение.* Вероятность будет равна

$$P = \frac{k}{m},$$

где  $k$  — сумма количества делителей каждого числа из множества  $\{1, 2, \dots, n\}$ ,  $m$  — количество разных пар чисел.

Найдём  $m$ . Это будет число комбинаций из  $n$  по 2:  $C_n^2$ .

Найдём количество множителей натурального числа. Пусть  $n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_s^{\alpha_s}$  — каноническое разложение на простые множители натурального числа  $n$ . Тогда число  $\tau(n)$  натуральных делителей числа  $n$  выражается формулой  $\tau(n) = (\alpha_1 + 1) \dots (\alpha_s + 1)$ .

Каждый натуральный делитель  $d$  числа  $n$  может быть записан в виде  $d = p_1^{\delta_1} p_2^{\delta_2} \dots p_s^{\delta_s}$ , где  $\delta_i$  — целые числа, удовлетворяющие условиям  $\delta_i \in \{0, 1, \dots, \alpha_i\}$  для  $i = 1, 2, \dots, s$ .

Докажем это утверждение. Пусть  $d$  есть какой-либо натуральный делитель  $n$ . Так как каждый простой делитель числа  $d$  является делителем числа  $n$ , то ввиду  $n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_s^{\alpha_s}$  в разложении  $d$  на простые множители могут встречаться только числа множества  $\{p_1, \dots, p_s\}$ . Поэтому число  $d$  представимо в виде  $d = p_1^{\delta_1} p_2^{\delta_2} \dots p_s^{\delta_s}$ , где  $\delta_i$ , причём показатели  $\delta_i$  должны удовлетворять условиям  $\delta_i \in \{0, 1, \dots, \alpha_i\}$  для  $i = 1, 2, \dots, s$ .

С другой стороны, если  $d$  представимо в виде  $d = p_1^{\delta_1} p_2^{\delta_2} \dots p_s^{\delta_s}$  и показатели удовлетворяют условиям  $\delta_i \in \{0, 1, \dots, \alpha_i\}$  для  $i = 1, 2, \dots, s$ , то

$n = d \left( p_1^{\alpha_1 - \delta_1} \dots p_s^{\alpha_s - \delta_s} \right) (\alpha_i - \delta_i \geq 0)$ , т.е.  $d$  является натуральным делителем числа  $n$ .

Чтобы найти число всех натуральных делителей числа  $n$ , достаточно посчитать число всевозможных упорядоченных наборов  $\delta_1, \dots, \delta_s$ , удовлетворяющих условиям  $\delta_i \in \{0, 1, \dots, \alpha_i\}$  для  $i = 1, 2, \dots, s$ . Ввиду условий  $\delta_i$  может принимать  $\alpha_i + 1$  значение, выборы различных значений  $\delta_1, \dots, \delta_s$  не зависят один от другого и в силу единственности разложения на простые множители разным наборам соответствуют различные делители  $n$ . Следовательно, число всех натуральных делителей числа  $n$  равно  $(\alpha_1 + 1) \dots (\alpha_s + 1)$ .

Можно оценить количество делителей числа. В терминах о-малое, функция делителей удовлетворяет неравенству для всех  $\epsilon > 0$ ,  $d(n) = o(n^\epsilon)$ .

Тогда имеем вероятность

$$P = \frac{\sum_{i=1}^n i^\epsilon}{C_n^2} \forall \epsilon > 0.$$

## Домашнее задание

### 3.15

*Задание.* Докажите, что для произвольных событий  $A$  и  $B$   $P(AB) = 1 - P(\bar{A}) - P(\bar{B}) + P(\bar{A}\bar{B})$ .

*Решение.*  $P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 1 - P(\bar{A}) + 1 - P(\bar{B}) - (1 - P(\bar{A} \cup \bar{B})) = 1 - P(\bar{A}) + 1 - P(\bar{B}) - 1 + P(\bar{A}\bar{B}) = 1 - P(\bar{A}) - P(\bar{B}) + P(\bar{A}\bar{B})$ .

### 3.16

*Задание.* Подбрасывают 4 игральных кубика. Найдите вероятность того, что на них выпадет одинаковое количество очков.

*Решение.* На выпавшей грани «первого» игрального кубика может появиться одно очко, два очка, ..., шесть очков. Аналогичные шесть элементарных исходов возможны при бросании остальных кубиков. Таким образом, общее число возможных элементарных исходов испытания равно  $6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 = 1296$ . Эти исходы в силу симметрии кубиков равновероятны.

Благоприятствующие интересующему нас событию (на всех гранях появится одинаковое количество очков) являются следующие шесть исходов (первым записано число очков, выпавших на «первом» кубике, вторым — число очков, выпавших на «втором» кубике, и т.д.): 1) 1, 1, 1, 1, 2) 2, 2, 2, 3) 3, 3, 3, 3, 4) 4, 4, 4, 4, 5) 5, 5, 5, 5, 6) 6, 6, 6, 6.

Искомая вероятность равна отношению числа исходов, благоприятствующих событию, к числу всех возможных элементарных исходов:

$$P = \frac{6}{6^4} = \frac{1}{6^3}.$$

### 3.17

*Задание.* Группа состоит из  $r$  студентов. Найдите вероятность того, что по крайней мере 2 студента родились в одном и том же месяце (считайте, что все месяцы года являются равновероятными для рождения).

*Решение.* Год имеет 12 месяцев. День рождения каждого из студентов может приходиться на любой месяц года (12 вариантов).

Если студентов больше чем месяцев ( $r > 12$ ), то хотя бы в одном месяце родилось хотя бы 2 человека:  $P = 1$ .

Рассмотрим случай, когда студентов в группе не больше чем месяцев в году ( $r \leq 12$ ). По правилу умножения существует всего  $n = 12^r$  вариантов размещения дней рождения студентов. Найдём количество вариантов, когда никакие два студента не имеют день рождения в тот же месяц. Для этого нужно вычислить количество способов, которыми из 12 месяцев можно выбрать упорядоченное множество из  $r$  месяцев. Используя формулу для размещения из 12 элементов по  $r$ , имеем  $A_{12}^r$ . Поэтому

$$P = 1 - \frac{A_{12}^r}{12^r}.$$

### 3.18

*Задание.* Сколько людей должно быть в комнате, чтобы вероятность того, что хотя бы двое из присутствовавших родились в один и тот же день года, была большей чем  $1/2$ ?

*Решение.* Пусть  $r$  — число людей, и будем считать, что все дни рождения равновероятны. Вычислим вероятность противоположного события  $A = \{\text{все люди родились в разные дни}\}$ . Число способов, благоприятствующих этому событию — это число размещений из 365 по  $r$ . Всего же имеется  $n = 365^r$  возможностей распределения дней рождения. То есть

$$P(A) = \frac{A_{365}^r}{365^r}.$$

Вероятность интересующего нас события  $\bar{A}$  тогда равна

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{A_{365}^r}{365^r}.$$

Вычислим вероятность  $P(\bar{A})$  для различных значений  $r$ .

$$\begin{aligned} r = 5 : P(\bar{A}) &= 1 - \frac{A_{365}^5}{365^5} = 1 - \frac{5! \cdot C_{365}^5}{365^5} = \\ &= 1 - \frac{5! \cdot \frac{365!}{5! \cdot 360!}}{365^5} = 1 - \frac{365!}{360! \cdot 365^5} = 1 - \frac{360! \cdot 361 \cdot 362 \cdot 363 \cdot 364 \cdot 365}{360! \cdot 365^5} = \\ &= 1 - \frac{361 \cdot 362 \cdot 363 \cdot 364}{365^4} = 1 - \frac{1.72 \cdot 10^{10}}{1.77 \cdot 10^{10}} = 1 - 0.97 = 0.03. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 r = 10 : P(\overline{A}) &= 1 - \frac{A_{365}^{10}}{365^{10}} = 1 - \frac{10! \cdot C_{365}^{10}}{365^{10}} = \\
 &= 1 - \frac{10! \cdot \frac{365!}{10! \cdot 355!}}{365^{10}} = 1 - \frac{365!}{355! \cdot 365^{10}} = 0.12.
 \end{aligned}$$

$$r = 20 : P(\overline{A}) = 1 - \frac{A_{365}^{20}}{365^{20}} = 1 - \frac{20! \cdot C_{365}^{20}}{365^{20}} = 1 - \frac{365!}{345! \cdot 365^{20}} = 0.41.$$

$$r = 22 : P(\overline{A}) = 1 - \frac{A_{365}^{22}}{365^{22}} = 1 - \frac{365!}{343! \cdot 365^{22}} = 0.48.$$

$$r = 23 : P(\overline{A}) = 1 - \frac{A_{365}^{23}}{365^{23}} = 1 - \frac{365!}{342! \cdot 365^{23}} = 0.51.$$

При  $r = 23$  вероятность по крайней мере одного совпадения равна  $0.51 >$

$> 0.5$ , то есть  $r = 23$  — наименьшее число, удовлетворяющее условиям задачи.

### 3.19

*Задание.* Числа  $1, 2, \dots, n$  размещены в случайном порядке. Найдите вероятность того, что числа:

- а) 1 и 2;
- б) 1, 2 и 3 размещены рядом в указанном порядке.

*Решение.* Пространство элементарных событий  $\Omega$  является множеством всех перестановок множества из  $n$  элементов. Значит  $|\Omega| = n!$ .

- а) Поскольку числа 1 и 2 стоят рядом, то их можно рассматривать как одно число (обозначим его  $n + 1$ ). Количество возможных перестановок чисел  $\{3, 4, \dots, n + 1\}$  равно  $(n - 1)!$ . Тогда вероятность данного события равна:

$$P = \frac{(n - 1)!}{n!} = \frac{1}{n};$$

- б) поскольку числа 1, 2 и 3 стоят рядом, то их можно рассматривать как одно число (обозначим его  $n + 1$ ). Количество возможных перестановок чисел  $\{4, 5, \dots, n + 1\}$  равно  $(n - 2)!$ . Тогда вероятность данного события равна:

$$P = \frac{(n - 2)!}{n!} = \frac{1}{n(n - 1)}.$$

### 3.20

*Задание.* Экзамен состоит из 10 вопросов, на каждый из которых нужно дать ответ «да» или «нет». Найдите вероятность того, что студент правильно ответил хотя бы на 70% вопросов, выбирая ответ наугад. Решите задачу, если тест состоит из 30 и из 50 вопросов.

*Решение.* На каждый вопрос есть возможность ответить двумя способами («да» или «нет»).

В случае, когда экзамен состоит из десяти вопросов, пространство элементарных событий содержит  $|\Omega| = 2^{10}$  элементов. Найдём вероятность события  $A = \{\text{студент правильно ответит хотя бы на 70\% вопросов из десяти}\}$ . Ответить правильно хотя бы на 70% вопросов означает ответить правильно хотя бы на 7 вопросов из 10, т. е. событие  $A$  допускает правильный ответ на 7, 8, 9 или 10 вопросов. На 7 вопросов правильно можно ответить  $C_{10}^7$  способами. На 8 вопросов правильно можно ответить  $C_{10}^8$  способами. На 9 —  $C_{10}^9$ . Аналогично, на 10 вопросов можно дать правильный ответ  $C_{10}^{10}$  способами. По правилу суммы имеем  $|A| = C_{10}^7 + C_{10}^8 + C_{10}^9 + C_{10}^{10} = \sum_{i=7}^{10} C_{10}^i$ . Тогда вероятность события  $A$  равна

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\sum_{i=7}^{10} C_{10}^i}{2^{10}}.$$

Аналогично находим вероятность правильного ответа на хотя бы 70% вопросов из тридцати и пятидесяти.

Когда всего есть 30 вопросов (событие  $B$ ), то 70% от них — это  $30 \cdot 0.7 = 21$  вопрос. Тогда

$$P(B) = \frac{\sum_{i=21}^{30} C_{30}^i}{2^{30}}.$$

Когда всего есть 50 вопросов (событие  $C$ ), то 70% от них — это  $50 \cdot 0.7 = 35$  вопросов. Тогда

$$P(C) = \frac{\sum_{i=35}^{50} C_{50}^i}{2^{50}}.$$

### 3.21

*Задание.* Список из  $4N$  участников турнира разбито на четыре равные группы. Найдите вероятность того, что четыре самых сильных участника турнира окажутся в разных группах.

*Решение.* Найдём сначала количество вариантов, которыми  $N$  участников можно выбрать в первую группу. Для этого достаточно из  $4N$  участников выбрать  $N$ , т. е.  $n = C_{4N}^N$ . Выберем того самого сильного участника, который попадёт в первую группу (это можно сделать четырьмя способами). В эту же группу нужно дополнительно выбрать  $N - 1$  участника из



$4N - 4$  участников, что остались ( $C_{4N-4}^{N-1}$  способов). Отсюда следует, что четыре самых сильных участника попадут в разные группы с вероятностью

$$p = \frac{4C_{4N-4}^{N-1} \cdot 3C_{3N-3}^{N-1} \cdot 2C_{2N-2}^{N-1} \cdot C_{4N}^{N-1}}{C_{2N}^N C_{3N}^N C_{2N}^N C_N^N} = \frac{6N^3}{(4N-3)(4N-2)(4N-1)}.$$

### 3.22

*Задание.* При игре в покер игрок имеет на руках пять карт из колоды в 52 карты. Найдите вероятность следующих комбинаций:

- «royal flush» (десятка, валет, дама, король и туз одной масти);
- «straight flush» (пять карт подряд одной масти, но не «royal flush»);
- «four of a kind» (четыре карты одного порядка);
- «full house» (2 карты одинакового порядка и 3 карты одинакового порядка);
- «flush» (пять карт одной масти, но не «royal flush» и не «straight flush»);
- «straight» (пять карт подряд не все одной масти).

*Решение.* Выбрать 5 карт из 52 можно  $C_{52}^5$  способами.

- Так как есть 4 масти, то десятку можно выбрать четырьмя способами. Поэтому вероятность выпадения комбинации «royal flush» равна

$$p = \frac{(C_4^1)^5}{C_{52}^5};$$

- есть 9 комбинаций пяти карт подряд одной масти. Так как мастей 4, то этих комбинаций  $9 \cdot 4 = 36$ . Поэтому вероятность комбинации «straight flush» равна

$$p = \frac{C_{36}^1}{C_{52}^5}.$$

После исключения комбинации «royal flush», получим

$$p = \frac{C_{36}^1 - C_4^1}{C_{52}^5};$$

- есть 4 масти, в каждой из которых  $52 : 4 = 13$  карт. Есть 13 способов выбрать 4 карты одного порядка. Так же нужно дополнительно выбрать одну любую карту из оставшихся  $52 - 4 = 48$  карт (это 48 способов). Отсюда имеем, что вероятность комбинации «four of a kind» равна

$$p = \frac{C_{13}^1 \cdot C_{48}^1}{C_{52}^5};$$

- d) есть карты тринадцати порядков четырёх мастей. Две карты одного порядка могут иметь любой из тринадцати порядков и любые две из четырёх мастей (это  $C_{13}^1 \cdot C_4^2$ ). Осталось выбрать 3 карты одного порядка. Имеем теперь 12 порядков карт. Поэтому есть  $C_{12}^1 \cdot C_4^3$  способов их выбрать. Итого имеем, что вероятность комбинации «full house» равна

$$p = \frac{C_{13}^1 \cdot C_4^2 \cdot C_{12}^1 \cdot C_4^3}{C_{52}^5};$$

- e) пять карт одной масти можно выбрать  $4 \cdot C_{13}^5$  способами. Отнимем из этих комбинаций «royal flush» и «straight flush». Получим  $4 \cdot C_{13}^5 - \left(\frac{1}{4}\right)^5 - C_{36}^1$ . Поэтому вероятность комбинации «flush» равна

$$p = \frac{4 \cdot C_{13}^5 - \left(\frac{1}{4}\right)^5 - C_{36}^1}{C_{52}^5};$$

- f) имея только одну масть есть 9 комбинаций пяти карт подряд. Каждая из этих пяти карт может быть любой масти. Главное, чтобы хотя бы одна карта имела масть, отличающуюся от остальных четырёх карт. Имеем  $9 \cdot 4^5$  комбинаций. Теперь отнимем от них комбинации, где все карты имеют одну масть (их 9). Поэтому вероятность «straight» равна

$$p = \frac{C_9^1 \cdot 4^5}{C_{52}^5}.$$

### 3.23

*Задание.* Компьютерный центр имеет три процессора, на которые поступило  $n$  заданий. Каждое задание выполняется на наугад выбранном процессоре. Найдите вероятность того, что ровно один процессор останется незадействованным.

*Решение.* Используем классическое определение вероятности:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|},$$

где  $|A|$  — число исходов, благоприятствующих осуществлению события, а  $|\Omega|$  — число всех равновероятных элементарных исходов.

Посчитаем  $|\Omega|$ .  $\Omega = \{(x_1, x_2, \dots, x_n), x_i = \overline{1, 3}\}$ , где 1 — выполнение задания на первом процессоре, 2 — на втором, 3 — на третьем.

Значит,  $|\Omega| = 3^n$  — число различных способов распределить  $n$  заданий по трём процессорам, причём каждый процессор может получить любое количество заданий.

Теперь посчитаем  $|A|$ . Из трёх возможных процессоров выбираем 1 нерабочий. Тогда 2 процессора будут решать  $n$  заданий:  $|A_1| = C_3^1 \cdot 2^n$ . Но тут учтена возможность, когда работает только 1 процессор. Её необходимо вычесть:  $|A_2| = C_3^1 \cdot C_2^1 \cdot 1^n$ , где  $C_2^1$  — выбор второго нерабочего процессора. Имеем, что  $|A| = |A_1| - |A_2| = C_3^1 \cdot 2^n - C_3^1 \cdot C_2^1 \cdot 1^n$ .

Искомая вероятность

$$P(A) = \frac{C_3^1 \cdot 2^n - C_3^1 \cdot C_2^1 \cdot 1^n}{3^n}.$$

### 3.24

*Задание.* (Статистика Бозе-Эйнштейна). Каждая из  $n$  одинаковых частиц наугад попадает в одну из  $N$  ячеек.

- Найдите вероятность того, что в первой, второй и т.д.,  $N$ -ой ячейке будет соответственно  $n_1, n_2, \dots, n_N$  частиц;
- докажите, что вероятность  $q_k$  того, что в данной ячейке будет  $k$  частиц, равна

$$q_k = \frac{C_{N+n-k-2}^{n-k}}{C_{N+n-1}^n};$$

- докажите, что при  $N > 2$ :  $q_0 > q_1 > q_2 > \dots$ ;
- докажите, что если  $n$  и  $N$  стремятся к бесконечности так, что

$$\frac{n}{N} \rightarrow \lambda,$$

то

$$q_k \rightarrow \frac{\lambda^k}{(1 + \lambda)^{k+1}};$$

- найдите вероятность того, что ровно  $r$  ячеек будут пустыми.

*Решение.*

- Разместим частицы в ряд. Поставим между ними  $N - 1$  перегородку. Обозначим частицу символом «0», а перегородку символом «1». Тогда распределение частиц однозначно характеризуется последовательностью из  $n$  нулей и  $N - 1$  единицы. Например, последовательность 1000101100001... означает, что в первую ячейку не попало ни одной частицы, во вторую — 3, в третью попала одна частица, в четвертую не попало ни одной частицы и т.д. Количество способов, которыми можно распределить  $n$  частиц, совпадает с количеством разных последовательностей указанного вида. Последовательность определяется однозначно, если выбрать  $N - 1$  место из  $n + N - 1$ , где будут размещены единицы. Количество таких комбинаций равно  $|\Omega| = C_{n+N-1}^{N-1}$ . Событию  $A = \{ \text{в первой, второй и т.д., } N\text{-ой ячейке окажется соответственно } n_1, n_2, \dots, n_N \text{ частиц} \}$  способствует одно элементарное событие, а именно  $\omega_0 = (n_1, n_2, \dots, n_N)$ .

Таким образом,

$$P(A) = \frac{1}{C_{n+N-1}^{N-1}};$$

b) вероятность желаемого события оценивается по формуле

$$q_k = \frac{r}{|\Omega|}.$$

Аналогично предыдущему пункту  $|\Omega| = C_{n+N-1}^{N-1}$ .

Сначала надо отобрать  $k$  частиц в фиксированную ячейку (это можно сделать одним способом), а потом  $n - k$  частиц распределить среди  $N - 1$  ячеек.

Используем метод перегородок. Разместим все  $n - k$  частиц в ряд. Чтобы отделить частицы, которые попадут в разные ячейки, поставим между ними  $N - 2$  перегородки. Обозначим частицу символом «0», а перегородку символом «1». Тогда распределение частиц по ячейкам однозначно характеризуется последовательностью из  $n - k$  нулей и  $N - 2$  единиц. Количество способов, которыми можно распределить  $n - k$  частиц, совпадает с количеством разных последовательностей указанного вида. Последовательность определяется однозначно, если выбрать  $N - 2$  места из  $n - k + N - 2$ , где будут размещены единицы. Количество таких комбинаций равно  $r = C_{n-k+N-2}^{N-2}$ .

Тогда

$$q_k = \frac{C_{n-k+N-2}^{N-2}}{C_{n+N-1}^{N-1}};$$

с) найдём вероятность  $q_0$  того, что в данной ячейке будет 0 частиц. Вероятность желаемого события оценивается по формуле

$$q_0 = \frac{r_0}{|\Omega|}.$$

Аналогично пункту а)  $|\Omega| = C_{n+N-1}^{N-1}$ .

Нужно  $n$  одинаковых частиц распределить среди  $N - 1$  ячеек.

Используем метод перегородок. Разместим все  $n$  частиц в ряд. Чтобы отделить частицы, которые попадут в разные ячейки, поставим между ними  $N - 2$  перегородки. Обозначим частицу символом «0», а перегородку символом «1». Тогда распределение частиц по ячейкам характеризуется последовательностью из  $n$  нулей и  $N - 2$  единиц. Количество способов, которыми можно распределить  $n$  частиц, совпадает с количеством разных последовательностей указанного вида. Последовательность определяется однозначно, если выбрать  $N - 2$  места из  $n + N - 2$ , где будут размещены единицы. Количество таких комбинаций равно  $C_{n+N-2}^{N-2}$ .

Тогда

$$q_0 = \frac{C_{n+N-2}^{N-2}}{C_{n+N-1}^{N-1}}.$$

Проверим формулу из пункта б). Подставим  $k = 0$ . Получим:

$$q_0 = \frac{C_{n+N-2}^{N-2}}{C_{n+N-1}^{N-1}}.$$

Видим, что получили такую же формулу, значит для дальнейшего решения можно использовать её, подставляя вместо  $k$  нужное значение.

Упростим:

$$\begin{aligned} q_0 &= \frac{\frac{(n+N-2)!}{(N-2)!(n+N-2-N+2)!}}{\frac{(n+N-1)!}{(N-1)!(n+N-1-N+1)!}} = \frac{(n+N-2)!(N-1)!n!}{(N-2)!n!(n+N-1)!} = \\ &= \frac{(n+N-2)!(N-2)!(N-1)}{(N-2)!(n+N-2)!(n+N-1)} = \frac{N-1}{n+N-1}. \end{aligned}$$

Упростим общую формулу:

$$\begin{aligned} q_k &= \frac{\frac{(n-k+N-2)!}{(N-2)!(n-k+N-2-N+2)!}}{\frac{(n+N-1)!}{(N-1)!(n+N-1-N+1)!}} = \frac{(n-k+N-2)!(N-1)!n!}{(N-2)!(n-k)!(n+N-1)!} = \\ &= \frac{(n-k+N-2)!(N-1)n!}{(n-k)!(n+N-1)!}. \end{aligned}$$

Найдём вероятность  $q_1$  того, что в данной ячейке будет одна частица:

$$\begin{aligned} q_1 &= \frac{(n-1+N-2)!(N-1)n!}{(n-1)!(n+N-1)!} = \\ &= \frac{(n+N-3)!(N-1)!(n-1)n}{(n-1)!(n+N-3)!(n+N-2)(n+N-1)} = \frac{(N-1)n}{(n+N-2)(n+N-1)}. \end{aligned}$$

Сравним  $q_0$  и  $q_1$ . Приведём к общему знаменателю. Для этого  $q_0$  умножим на  $(n+N-2)$ . Получим:

$$q_0 = \frac{(N-1)(n+N-2)}{(n+N-1)(n+N-2)}.$$

Видим, что  $q_0$  и  $q_1$  отличаются только выражением в числителе. Теперь сравним  $n$  и  $(n+N-2)$ . По условию задачи  $N > 2$ , поэтому  $N-2 > 0$ . Это значит, что  $n+N-2 > n$ , т.е.  $q_0 > q_1$ .

Докажем, что условие выполняется для  $k$ -го члена. Найдём вероятность  $q_{k+1}$  того, что в данной ячейке будет  $k+1$  частица:

$$q_{k+1} = \frac{(n-k-1+N-2)!(N-1)n!}{(n-k-1)!(n+N-1)!} = \frac{(n-k+N-3)!(N-1)n!}{(n-k-1)!(n+N-1)!}.$$

Сравним полученное выражение с  $q_k$ . В выражении для  $q_{k+1}$  и числитель, и знаменатель меньше:  $n-k+N-3 < n-k+N-2$ , а также  $n-k-1 < n-k$ . Отсюда следует, что  $q_k > q_{k+1}$ .

Итого, доказали, что условие верно для первого члена ( $q_0 > q_1$ ). Также из верности условия для  $k$ -го члена вытекает его верность для  $k + 1$ -го. Отсюда по индукции Пеано следует, что условие верно для любого натурального числа;

- d) распишем  $p_k$  (вероятность того, что в данную ячейку попадут  $k$  частиц):

$$p_k = \frac{C_{N+n-k-2}^{n-k}}{C_{N+n-1}^n} = \frac{(N+n-k-2)!n!(N-1)!}{(n-k)!(N-2)!(N+n-1)!} =$$

$$= \frac{(N+n-k-2)!(n-k)!(N-2)!(N-1) \prod_{i=0}^{k-1} (n-i)}{(n-k)!(N-2)!(N+n-k-2)! \prod_{j=1}^{k+1} (N+n-j)} = \frac{(N-1) \prod_{i=0}^{k-1} (n-i)}{\prod_{j=1}^{k+1} (N+n-j)}.$$

Поделим числитель и знаменатель на  $N$ :

$$p_k = \frac{(1 - \frac{1}{N}) \prod_{i=0}^{k-1} (\frac{n}{N} - \frac{i}{N})}{\prod_{j=1}^{k+1} (1 + \frac{n}{N} - \frac{j}{N})} =$$

$$= \frac{\frac{n}{N} (\frac{n}{N} - \frac{1}{N}) \dots (\frac{n}{N} - \frac{k-1}{N})}{(1 + \frac{n}{N} - \frac{1}{N}) (1 + \frac{n}{N} - \frac{2}{N}) \dots (1 + \frac{n}{N} - \frac{k+1}{N})} = \frac{\lambda^k}{(1 + \lambda)^{k+1}};$$

- e) вероятность желаемого события оценивается по формуле

$$p = \frac{r}{|\Omega|}.$$

Как и в пункте а) имеем общее количество вариантов  $|\Omega| = C_{n+N-1}^{N-1}$ . Вычислим количество вариантов  $r$ , которые отвечают событию, указанному в условии задачи.

Решение задачи разбиваем на два шага: сначала выбираем  $N - r$  ячеек из  $N$ , которые будут занятыми (это можно сделать  $C_N^{N-r}$  способами), а затем размещаем  $n$  одинаковых частиц в  $N - r$  ячеек таким образом, чтобы ни одна из них не была пустой. Поскольку все частицы одинаковы, то в каждую ячейку можно заранее поместить по одной частице. В этом случае задача сводится к распределению  $n - (N - r) = n - N + r$  частиц на  $N - r$  ячеек.

Используем метод перегородок. Разместим все частицы в ряд. Чтобы отделить частицы, которые будут находиться в разных ячейках, поставим между ними  $N - r - 1$  перегородку. Обозначим частицу символом «1», а перегородку символом «0».

Тогда распределение частиц по ячейкам характеризуется последовательностью из  $n - N + r$  нулей и  $N - r - 1$  единицы. Количество способов, которыми можно распределить  $n - N + r$  частиц, совпадает с количеством разных комбинаций указанного вида. Последовательность определяется однозначно, если выбрать  $N - r - 1$  мест из  $(n - N + r) + (N - r - 1) =$   
 $= n - N + r + N - r - 1 = m - 1$ , где будут стоять единицы. Количество таких комбинаций равно  $C_{n-1}^{N-r-1}$ .

Поэтому окончательно имеем  $r = C_N^{N-r} \cdot C_{n-1}^{N-r-1}$ .

Тогда вероятность указанного события равна

$$p = \frac{C_N^{N-r} \cdot C_{n-1}^{N-r-1}}{C_{n+N-1}^{N-1}}.$$





# Занятие 4. Геометрические вероятности. Принцип отражения

## Контрольные вопросы и задания

Запишите формулу для вычисления геометрической вероятности.

Случайным образом выбираются точки в области  $D$ , где:  $D \subset \mathbb{R}^n$ ,  $\Omega = D$ ,  $A \subset D$  — случайное событие.

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|},$$

где  $|A|$  —  $n$ -мерный объём  $A$ .

Геометрическое определение вероятности обобщает классическое на случай бесконечного множества элементарных исходов  $\Omega$  тогда, когда  $\Omega$  представляет собой подмножество пространства  $\mathbb{R}$  (числовой прямой),  $\mathbb{R}^2$  (плоскости),  $\mathbb{R}^n$  ( $n$ -мерного евклидова пространства).

Под мерой  $\mu(A)$  подмножества  $A$  будем понимать его длину, площадь или объём (обобщённый объём) в зависимости от того, какому пространству принадлежит  $\Omega$ : в  $\mathbb{R}$ , в  $\mathbb{R}^2$  или в  $\mathbb{R}^3$  ( $\mathbb{R}^n$ ).

Вероятностью события  $A$  называют число  $P(A)$ , равное отношению меры множества  $A$  к мере множества  $\Omega$ :

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)},$$

где  $\mu(A)$  — мера множества  $A$ .

## В чём состоит принцип отражения?

Пусть  $A$  и  $B$  — точки с целыми координатами, причём  $B$  лежит выше оси абсцисс и правее оси ординат,  $B'$  — точка, симметричная  $B$  относительно оси абсцисс.

Количество путей, начинающихся в точке  $A$  и оканчивающихся в точке  $B$ , которые касаются оси абсцисс или пересекают её, равно числу путей, оканчивающихся в точке  $B'$ .

**Опишите математические модели вероятностного эксперимента, связанные с задачей про встречу и иглой Бюффона.**

**Задача о встрече** *Задание.* Два приятеля договорились встретиться на протяжении определённого времени  $T$ . Первый приятель может ждать другого не больше чем время  $\tau_1$ , а второй ждёт первого только время  $\tau_2$ . Чему равна вероятность встречи приятелей, если каждый из них независимо от другого может прийти равновероятно в любой момент промежутка времени  $T$ .

*Решение.* Обозначим моменты прихода первого и второго приятелей через  $x$  и  $y$  соответственно. Тогда пространство элементарных событий  $\Omega$  имеет вид (рис. 8):  $\Omega = \{(x, y) : 0 \leq x \leq T, 0 \leq y \leq T\}$ .



Рис. 8: Пространство элементарных событий

Множество  $A$  точек, которые способствуют встрече, определяется неравенствами

$$A = \{(x, y) : 0 \leq x \leq y \leq \min(T, x + \tau_1), 0 \leq x \leq y \leq \min(T, x + \tau_2)\}.$$

Очевидно, что

$$m(\Omega) = T^2, m(A) = T^2 - \frac{1}{2} [T - \min(T, \tau_1)]^2 - \frac{1}{2} [T - \min(T, \tau_2)]^2.$$

Поэтому согласно с

$$P\{A\} = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}$$

имеем

$$P\{A\} = 1 - \frac{1}{2} \left\{ \left[ \max\left(0, 1 - \frac{\tau_1}{T}\right) \right]^2 + \left[ \max\left(0, 1 - \frac{\tau_2}{T}\right) \right]^2 \right\}.$$

**Игла Бюффона** *Задание.* Рассмотрим плоскость, разделённую параллельными прямыми, которые находятся на расстоянии  $2a$  одна от другой (рис. 9). На плоскость наугад бросается игла, которая имеет длину  $2l$ . Нужно найти вероятность того, что игла пересечёт хотя бы одну из прямых (в случае  $l > a$  игла может пересечь несколько прямых).



Рис. 9: Плоскость, разделённая параллельными прямыми

*Решение.* Положение иглы однозначно определяется расстоянием от центра иглы до ближайшей прямой и углом  $\phi$ , который образует игла с этой прямой. Очевидно, что  $0 \leq x \leq a$  и  $0 \leq \phi \leq \pi$ , т.е. пространство элементарных событий  $\Omega$  является прямоугольником (рис. 10 и 11):

$$\Omega = \{(x, \phi) : 0 \leq x \leq a, 0 \leq \phi \leq \pi\}.$$

Для того, чтобы игла пересекла одну из прямых необходимо и достаточно выполнение условия  $x \leq l \sin \phi$ , т.е.

$$A = \{(x, \phi) : x \leq l \sin \phi, 0 \leq x \leq a, 0 \leq \phi \leq \pi\}.$$

Рассмотрим два случая.

А.  $l \leq a$  (рис. 10). Очевидно, что

$$\mu(\Omega) = a\pi, \mu(A) = \int_0^\pi l \sin \phi d\phi = 2l, P\{A\} = \frac{2l}{a\pi}.$$

В.  $l > a$  (рис. 11). В этом случае имеем

$$\begin{aligned} \mu(A) &= a\pi - 2 \int_0^{\arcsin(\frac{a}{l})} (a - l \sin \phi) d\phi = a \left( \pi - 2 \arcsin \frac{a}{l} \right) + \\ &+ 2l \left( 1 - \sqrt{1 - \left( \frac{a}{l} \right)^2} \right), P\{A\} = \frac{\mu(A)}{a\pi}. \end{aligned}$$



Рис. 10: Случай  $l \leq a$



Рис. 11: Случай  $l > a$

В случае  $l \leq a$  с помощью иглы Бюффона можно приближённо вычислить число  $\pi$ . Действительно, пусть было проведено  $n$  экспериментов, в каждом из которых исследовалось пересекала ли игла прямую, или нет. Обозначим через  $\nu_n$  количество экспериментов, в которых произошло пересечение. Согласно с усиленным законом больших чисел

$$\frac{\nu_n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} P\{A\} = \frac{2l}{a\pi}$$

с вероятностью 1.

Отсюда следует, что

$$\frac{2ln}{a\nu_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \pi$$

с вероятностью 1, т.е. с помощью достаточного количества экспериментов можно вычислить число  $\pi$  с любой точностью.

## Аудиторные задачи

### 4.3

*Задание.* На отрезке  $[0, 10]$  числовой оси наугад выбрана точка. Найдите вероятность того, что расстояние от этой точки до середины отрезка окажется большим чем три.

*Решение.* Обозначим через  $x$  расстояние от начала отрезка к точке. Тогда пространством элементарных событий является отрезок  $\Omega = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 10\} = [0, 10]$ , а событию  $A = \{\text{расстояние от точки до середины отрезка окажется большим чем 3}\}$  способствуют точки объединения интервала  $A = \{x \in \Omega : x < 2, x > 8\} = [0, 2) \cup (8, 10]$ . Поэтому

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}.$$

### 4.4

*Задание.* В квадрате  $ABCD$  со стороной 3 наугад выбрана точка. Найдите вероятность того, что расстояние от этой точки к:

- а) центру квадрата;
- б) стороне  $AB$ ;
- в) точке  $A$ ;
- г) одной из сторон;
- е) диагонали  $AC$  не будет превышать 1.

*Решение.* Обозначим через  $x$  и  $y$  координаты точки. Пусть точка  $A$  имеет координаты  $(0, 0)$ , точка  $B — (0, 3)$ ,  $C — (3, 3)$ , и  $D$  имеет координаты  $(3, 0)$ . Тогда пространством элементарных событий является квадрат  $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 3\}$ . Площадь квадрата равна  $S_\Omega = 3^2 = 9$ .

- а) Центр квадрата — это точка  $O(3/2, 3/2)$ . Расстояние от точки к центру квадрата не должно превышать единицу — событие  $A$ . Тогда точка должна находиться в круге с радиусом 1 и центром в точке  $O$ . Событие описывается множеством

$$A = \left\{ (x, y) \in \Omega : \left( \frac{3}{2} - x \right)^2 + \left( \frac{3}{2} - y \right)^2 \leq 1 \right\}.$$

Поэтому

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{\pi \cdot 1^2}{9} = \frac{\pi}{9};$$

- б) событие  $A = \{\text{расстояние от точки к стороне } AB \text{ не будет превышать единицу}\}$  описывается множеством  $A = \{(x, y) \in \Omega : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 3\}$ . Изобразив  $A$  на плоскости, можно убедиться, что точки множества  $A$  образуют прямоугольник со сторонами 1 и 3. Поэтому

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{1 \cdot 3}{9} = \frac{1}{3};$$

- в) событие  $A = \{\text{расстояние к точке } A \text{ не будет превышать единицу}\}$  описывается множеством  $A = \{(x, y) \in \Omega : x^2 + y^2 \leq 1\}$ . Изобразив  $A$  на плоскости, можно убедиться, что  $A$  является четвертью круга с центром в начале координат и радиусом 1. Поэтому

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{\frac{1}{4} \cdot \pi 1^2}{9} = \frac{\pi}{36};$$

- г) событие  $A = \{\text{расстояние от точки к одной из сторон не превышает единицу}\}$  описывается множеством

$$A = \{(x, y) \in \Omega : 0 \leq x \leq 1, 2 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 1, 2 \leq y \leq 3\}.$$

Изобразив  $A$  на плоскости, можно убедиться, что  $A$  — исходный квадрат с вырезанным квадратом со стороной 1. Поэтому

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{3^2 - 1^2}{9} = \frac{9 - 1}{9} = \frac{8}{9};$$

- е) событие  $A = \{\text{расстояние от точки к диагонали } AC \text{ не превысит единицы}\}$  описывается множеством  $A = \{(x, y) \in \Omega : 0 \leq |y - x| \leq 1\}$ . Изобразив  $A$  на плоскости, можно убедиться, что  $A$  является квадратом без двух прямоугольных равнобедренных треугольников с катетами  $3 - \sqrt{2}$ . Поэтому

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{3^2 - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot (3 - \sqrt{2})^2}{9} = \frac{9 - (3 - \sqrt{2})^2}{9}.$$

#### 4.5

*Задание.* Точка  $(\xi, \eta)$  наугад выбрана в квадрате  $[0, 1]^2$ . Для фиксированного  $z \in (0, 1)$  вычислить вероятность:

- а)  $P(|\xi - \eta| < z)$ ;
- б)  $P(\min(\xi, \eta) < z)$ ;
- в)  $P((\xi + \eta)/2 < z)$ .

*Решение.* Пространство элементарных событий можно описать следующим образом:  $\Omega = \{(\xi, \eta) \in [0, 1]^2\}$ . Изобразив  $\Omega$  на плоскости, можно убедиться, что  $\Omega$  является квадратом со стороной 1.

- а) Событие  $A$  описывается множеством

$$A = \{(\xi, \eta) \in \Omega : |\xi - \eta| < z, z \in (0, 1)\}.$$

Изобразив  $A$  на плоскости, можно убедиться, что точки множества  $A$  образуют квадрат с двумя вырезанными прямоугольными равнобедренными треугольниками с катетами  $1 - z$ .

Найдём площадь треугольника:

$$S = \frac{1}{2} \cdot (1 - z)^2 = \frac{(1 - z)^2}{2}.$$

Тогда вероятность равна

$$P(A) = 1 - 2 \cdot \frac{(1 - z)^2}{2} = 1 - (1 - z)^2 = 1 - 1 + 2z - z^2 = z(2 - z);$$



Рис. 12:  $\xi < \eta$ ,  $\min(\xi, \eta) = \eta < z$



Рис. 13:  $\xi \geq \eta$ ,  $\min(\xi, \eta) = \xi < z$

- b) событие  $A = \{P(\min(\xi, \eta) < z)\}$  описывается множеством  $A = \{(\xi, \eta) \in \Omega : \min(\xi, \eta) < z, z \in (0, 1)\}$ . Изобразив  $A$  на плоскости, можно убедиться, что точки множества  $A$  образуют квадрат со сторонами длиной 1 без квадрата со стороной длиной  $1 - z$  (рис. 12, 13).

Поэтому

$$P = 1 - (1 - z)^2;$$

- с) рассмотрим случай, когда  $2z < 1$ . Упростим неравенство. Умножим левую и правую части на 2. Получим:  $\xi + \eta < 2z$ . Выразим  $\xi$  и  $\eta$ :  $\xi < 2z - \eta$ ,  $\eta < 2z - \xi$ .

Событие

$$A = \left\{ P \left( \frac{\xi + \eta}{2} < z \right) \right\}$$

описывается множеством

$$A = \left\{ (\xi, \eta) \in \Omega : \frac{\xi + \eta}{2} < z, z \in (0, 1) \right\}.$$

Изобразив  $A$  на плоскости, можно убедиться, что точки множества  $A$  образуют прямоугольник с катетами  $2z$  (рис. 14).

Поэтому

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{\frac{1}{2} \cdot 2z \cdot 2z}{1 \cdot 1} = 2z^2.$$

Теперь рассмотрим случай, когда  $2z > 1$  (рис. 15).

Вероятность тогда равна

$$P(A) = 1 - \frac{1}{2} \cdot (2 - 2z)^2 = 1 - 2(1 - z)^2.$$



Рис. 14: Точки множества  $A$ ,  $2z < 1$



Рис. 15: Точки множества  $A$ ,  $2z > 1$

#### 4.6

*Задание.* На отрезке  $[0, 10]$  числовой оси наугад выбраны две точки. Найдите вероятность того, что расстояние от правой точки к точке с координатой 8 окажется меньшим чем единица.

*Решение.* Обозначим через  $x$  и  $y$  расстояния от начала отрезка (точки 0) к левой и правой точкам соответственно. Тогда пространство элементарных событий можно описать следующим образом:

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq y \leq 10\},$$

а событие  $A = \{\text{расстояние от правой точки к точке 8}\}$  описывается множеством  $A = \{(x, y) \in \Omega : |\max(x, y) - 8| < 1\}$ . Изобразив  $\Omega$  и  $A$  на плоскости, можно убедиться, что  $\Omega$  является фигурой, изображённой на рис. 16.

Поэтому

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{9^2 - 7^2}{10 \cdot 10} = \frac{2 \cdot 16}{100} = \frac{32}{100} = 0.32.$$





Рис. 16: Точки множества  $A$

#### 4.7

*Задание.* На отрезке  $AB$  длиной  $a$  наугад выбраны, независимо одна от другой, шесть точек. Найдите вероятность того, что:

- две точки будут находиться от точки  $A$  на расстоянии, меньшем чем  $b$ , а четыре точки — на расстоянии, большем чем  $b$  ( $b < a$ );
- две точки будут находиться от точки  $A$  на расстоянии, меньшем чем  $c$ , одна — на расстоянии, не меньшем чем  $c$  и не большем чем  $b$ , и три точки — на расстоянии, большем чем  $b$  ( $c < b < a$ ).

*Решение.* Обозначим через  $x_1, x_2, \dots, x_6$  расстояния от точки  $A$  к выбранным точкам. Элементарный исход — кортеж расстояний от точки  $A$ :  $\omega = \langle x_1, x_2, \dots, x_6 \rangle$ . Тогда пространство элементарных исходов можно описать следующим образом:

$$\Omega = \{ \langle x_1, x_2, \dots, x_6 \rangle \in AB^6 : 0 \leq x_1 \leq a, 0 \leq x_2 \leq a, \dots, 0 \leq x_6 \leq a \}.$$

- Событие  $A = \{ \text{две точки будут находиться от точки } A \text{ на расстоянии, меньшем чем } b, \text{ а четыре точки — на расстоянии, большем чем } b \text{ } (b < a) \}$  описывается множеством

$$A = \{ \langle x_1, x_2, \dots, x_6 \rangle \in \Omega : 0 \leq x_1 < b, 0 \leq x_2 < b, b < x_3 \leq a, \dots, b < x_6 \leq a \}.$$

Возьмём нормированное расстояние  $x_i/AB$ , чтобы все точки были из  $[0, 1]$ . Потому  $b$  теперь  $b/a$ . Событие  $A$  примет вид:

$$A = \left\{ \langle x_1, x_2, \dots, x_6 \rangle \in \Omega : x_1 < \frac{b}{a}, x_2 < \frac{b}{a}, x_3 > \frac{b}{a}, x_4 > \frac{b}{a}, x_5 > \frac{b}{a}, x_6 > \frac{b}{a} \right\}.$$

Изобразим двумерный случай (рис. 17).

Теперь трёхмерные случаи ( $x_1, x_2, x_6$  и  $x_1, x_5, x_6$ ) — рис. 18.



Рис. 17: Двумерный случай ( $x_1$  и  $x_6$ )



Рис. 18: Трёхмерные случаи

Это параллелепипед со сторонами длиной  $b/a$  и  $1 - b/a$ . Для 6-мерного случая, его мера равна

$$\left(\frac{b}{a}\right)^2 \left(1 - \frac{b}{a}\right)^4.$$

Осталось учесть перестановки, ведь нет разницы, какая точка будет слева: первая или пятая. Нужно выбрать две точки из шести, которые будут слева от  $b/a$ . Посчитали 1 случай, а таких случаев  $C_6^2$ . Тогда вероятность равна

$$P = \frac{C_6^2 \left(\frac{b}{a}\right)^2 \left(1 - \frac{b}{a}\right)^4}{1^6} = 15 \left(\frac{b}{a}\right)^2 \left(1 - \frac{b}{a}\right)^4;$$

- b) событие  $A = \{\text{две точки будут находиться от точки } A \text{ на расстоянии, меньшем чем } c \text{ и не большем чем } b, \text{ и три точки — на расстоянии, большем чем } b \text{ (} c < b < a \text{)} \}$  описывается множеством

$$A = \{ \langle x_1, x_2, \dots, x_6 \rangle \in \Omega : 1 < c, x_2 < c, c \leq x_3 \leq b, b < x_4, b < x_5, b < x_6 \}.$$

Возьмём нормированное расстояние  $x_i/AB$ , чтобы все они были из

$[0, 1]$ . Потому теперь

$$A = \left\{ \langle x_1, \dots, x_6 \rangle \in \Omega : x_1 < \frac{c}{a}, x_2 < \frac{c}{a}, \frac{c}{a} \leq x_3 \leq \frac{b}{a}, \frac{b}{a} < x_4, \frac{b}{a} < x_5, \frac{b}{a} < x_6 \right\}.$$

Для 6-мерного случая мера этой фигуры равна

$$\left(\frac{c}{a}\right)^2 \left(\frac{b}{a} - \frac{c}{a}\right) \left(1 - \frac{b}{a}\right)^3.$$

Осталось учесть перестановки, ведь нет разницы, какая точка где будет находиться. Нужно выбрать две точки из шести, которые будут находиться слева от  $c/a$  — это  $C_6^2$ , а затем одну точку из четырёх, которая будет между  $c/a$  и  $b/a$  —  $C_4^1$ . Тогда вероятность равна

$$P = C_6^2 C_4^1 \left(\frac{c}{a}\right)^2 \left(\frac{b}{a} - \frac{c}{a}\right) \left(1 - \frac{b}{a}\right)^3.$$

#### 4.8

*Задание.* Точку  $(\xi, \eta)$  выбрано в квадрате  $[0, 1]^2$ . Найдите вероятность того, что уравнение  $x^2 + \xi x + \eta = 0$  имеет:

- а) действительные разные корни;
- б) кратные корни.

*Решение.* Пространство элементарных событий можно описать следующим образом:  $\Omega = \{(\xi, \eta) \in [0, 1]^2\}$ . Найдём дискриминант квадратного уравнения:  $D = \xi^2 - 4\eta$ .

- а) Чтобы уравнение имело 2 разных действительных корня, его дискриминант должен быть больше нуля:  $\xi^2 - 4\eta > 0$  или  $\xi^2 > 4\eta$ . Выразив  $\eta$ , получим:

$$\eta < \frac{\xi^2}{4}.$$

На рисунке 19 эта область изображена голубым цветом.

Найдём площадь под кривой:

$$S = \int_0^1 \frac{\xi^2}{4} d\xi = \frac{\xi^3}{12} \Big|_0^1 = \frac{1}{12}.$$

Тогда вероятность равна

$$P = \frac{\frac{1}{12}}{1 \cdot 1} = \frac{1}{12}.$$



Рис. 19:  $\eta = \frac{\xi^2}{4}$

- б) чтобы уравнение имело кратные корни, его дискриминант должен быть равен нулю — эта область обозначена линией на рисунке. Площадь линии равна нулю, поэтому вероятность данного события тоже равна нулю.

#### 4.9

*Задание.* На окружности наугад выбраны три точки  $A$ ,  $B$  и  $C$ . Найдите вероятность того, что треугольник  $ABC$  окажется:

- а) остроугольным;  
б) прямоугольным.

*Решение.* Окружность симметрична, поэтому можем выбрать начало отсчёта в точке  $A$ . Обозначим через  $x$  и  $y$  длины дуг от начала отсчёта к точкам  $B$  и  $C$ . Тогда пространство элементарных событий можно описать следующим образом:  $\Omega = \{(x, y) \in [0, 2\pi]^2\}$ . Изобразив  $\Omega$  на плоскости, можно убедиться, что  $\Omega$  является квадратом со стороной  $2\pi$ . Поэтому  $S_\Omega = 2\pi \cdot 2\pi = 4\pi^2$ .

- а) Событие  $A = \{\text{треугольник } ABC \text{ окажется остроугольным}\}$  описывается множеством  $A = \{(x, y) \in [\pi, 2\pi]^2\}$ , т.к. вершины остроугольного треугольника должны находиться по разные стороны от диаметра окружности. Изобразив  $A$  на плоскости, можно убедиться, что точки множества  $A$  образуют квадрат со сторонами длиной  $\pi$ . Поэтому  $S_A = \pi \cdot \pi = \pi^2$ .

Тогда вероятность события  $A$  равна

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{\pi^2}{4\pi^2} = \frac{1}{4};$$

- b) рассмотрим событие  $A = \{\text{треугольник } ABC \text{ окажется прямоугольным}\}$ . Оно описывается множеством

$$A = \{(x, y) \in \Omega : y - x = \pi, x - y = \pi\}.$$

Изобразив  $A$  на плоскости, можно убедиться, что точки множества  $A$  образуют прямые. Площадь прямой равна нулю. Поэтому вероятность события  $A$  равна  $P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{0}{4\pi^2} = 0$ .

#### 4.10

*Задание.* Две лодки должны подойти к одному причалу. Появление лодок — независимые случайные события, равновероятные на протяжении суток. Найдите вероятность того, что ни одной из лодок не придётся ждать освобождения причала, если стоянка первой лодки — один час, а второй — два часа.

*Решение.* Найдём вероятность того, что лодки «встретятся». Обозначим моменты появления первой и второй лодок через  $x$  и  $y$ . Тогда пространство элементарных событий  $\Omega$  имеет вид (рис. 20):

$$\Omega = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 24, 0 \leq y \leq 24\}.$$



Рис. 20: Пространство элементарных событий

Множество  $A$  точек, которые способствуют встрече, определяется неравенствами

$$A = \{(x, y) \in \Omega : 0 \leq x \leq y \leq \min(24, x + 1), 0 \leq x \leq y \leq \min(24, x + 2)\}.$$

Очевидно, что

$$\begin{aligned}\mu(\Omega) &= 24^2, \mu(A) = 24^2 - \frac{1}{2} [24 - \min(24, 1)]^2 - \frac{1}{2} [24 - \min(24, 2)]^2 = \\ &= 24^2 - \frac{1}{2} [24 - 1]^2 - \frac{1}{2} [24 - 2]^2 = 24^2 - \frac{1}{2} \cdot 23^2 - \frac{1}{2} \cdot 22^2.\end{aligned}$$

Поэтому согласно с

$$P\{A\} = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}$$

имеем

$$P\{A\} = \frac{24^2 - \frac{1}{2} \cdot 23^2 - \frac{1}{2} \cdot 22^2}{24^2} = 1 - \frac{1}{2 \cdot 24^2} \{23^2 + 22^2\}.$$

Тогда вероятность того, что лодки не «встретятся» равна вероятности противоположного события, т.е.

$$\begin{aligned}P\{\bar{A}\} &= 1 - \left(1 - \frac{1}{2 \cdot 24^2} \{23^2 + 22^2\}\right) = 1 - 1 + \frac{1}{2 \cdot 24^2} \{23^2 + 22^2\} = \\ &= \frac{1}{2 \cdot 24^2} \{23^2 + 22^2\}.\end{aligned}$$

#### 4.11

*Задание.* Путём  $\{S_1, \dots, S_x\}$  из начала координат в точку  $(x, y)$ ,  $x \in \mathbb{N}$ ,  $y \in \mathbb{Z}$  называется ломаная с вершинами в точках  $(0, 0)$ ,  $(1, S_1)$ ,  $\dots$ ,  $(x, S_x)$ , где  $S_x = y$ ,  $S_i - S_{i-1} \in \{-1, 1\}$ . Подсчитайте количество путей:

- из  $(0, 0)$  в  $(x, y)$ ;
- из  $(0, 0)$  в  $(x, y)$ , при условии, что  $S_1 > 0, \dots, S_{x-1} > 0$ ,  $S_x = y > 0$ ;
- из  $(a, b)$  в  $(x, y)$ , которые не пересекают ось абсцисс, при условии, что  $a < x$ ,  $x > 0$ ,  $y > 0$ .

*Решение.*

- Задача изображена на рисунке 21.

Переворачиваем изображение — получаем прямоугольник со сторонами  $x'$  и  $y'$ . В задании 4.22 уже нашли стороны полученного прямоугольника. Они равны

$$x' = \frac{x+y}{2}, y' = \frac{x-y}{2}.$$

Нужно выбрать шаги, на которых будем перемещаться вверх, тогда на всех остальных шагах остаётся переместиться вправо. Имеем, что путей из точки  $(0, 0)$  в точку  $(x', y')$  всего

$$C_{\frac{x+y}{2} + \frac{x-y}{2}}^{\frac{x+y}{2}} = C_{x'}^{\frac{x+y}{2}} = \frac{x!}{\left(\frac{x+y}{2}\right)! \left(x - \frac{x+y}{2}\right)!} = \frac{x!}{\left(\frac{x+y}{2}\right)! \left(\frac{x-y}{2}\right)!};$$



Рис. 21: Пути из точки  $(0,0)$  к точке  $(x,y)$

- б) если путь касается оси абсцисс, его можно отразить. Тогда количество нужных путей — разница путей от точки  $(1,1)$  в точку  $(x,y)$  и путей из точки  $(0,0)$  в точку с координатами  $(x,-y)$ . Для перевернутого треугольника — разница путей из точки

$$\left(\frac{1+1}{2}, \frac{1-1}{2}\right) = (1,0)$$

в точку

$$\left(\frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2}\right)$$

и путей из точки  $(1,0)$  в точку

$$\left(\frac{x-y}{2}, \frac{x+y}{2}\right).$$

Всего путей

$$C_{\frac{x+y}{2}-1+\frac{x-y}{2}}^{\frac{x-y}{2}} = C_{x-1}^{\frac{x+y}{2}} = \frac{(x-1)!}{\left(\frac{x-y}{2}\right)! \left(x-1-\frac{x-y}{2}\right)!} = \frac{(x-1)!}{\left(\frac{x-y}{2}\right)! \left(\frac{x+y}{2}-1\right)!}.$$

Путей, которые касаются или пересекают диагональ

$$C_{\frac{x+y}{2}-1+\frac{x+y}{2}}^{\frac{x+y}{2}} = C_{x-1}^{\frac{x+y}{2}} = \frac{(x-1)!}{\left(x-1-\frac{x+y}{2}\right)! \left(\frac{x+y}{2}\right)!} = \frac{(x-1)!}{\left(\frac{x-y}{2}-1\right)! \left(\frac{x+y}{2}\right)!}.$$

Тогда количество необходимых путей равно

$$\begin{aligned}
& \frac{(x-1)!}{\left(\frac{x-y}{2}\right)! \left(\frac{x+y}{2}-1\right)!} - \frac{(x-1)!}{\left(\frac{x-y}{2}-1\right)! \left(\frac{x+y}{2}\right)!} = \\
& = (x-1)! \cdot \left( \frac{1}{\left(\frac{x-y}{2}-1\right)! \frac{x-y}{2} \left(\frac{x+y}{2}-1\right)!} - \frac{1}{\left(\frac{x-y}{2}-1\right)! \left(\frac{x+y}{2}\right)! \frac{x+y}{2}} \right) = \\
& = \frac{(x-1)!}{\left(\frac{x-y}{2}-1\right)! \left(\frac{x+1}{2}-1\right)!} \cdot \left( \frac{1}{\frac{x-y}{2}} - \frac{1}{\frac{x+y}{2}} \right) = \\
& = \frac{(x-1)!}{\left(\frac{x-y}{2}-1\right)! \left(\frac{x+1}{2}-1\right)!} \cdot \left( \frac{2}{x-y} - \frac{2}{x+y} \right) = \\
& = \frac{(x-1)!}{\left(\frac{x-y}{2}-1\right)! \left(\frac{x+1}{2}-1\right)!} \cdot \frac{2(x+y) - 2(x-y)}{(x-y)(x+y)} = \\
& = \frac{(x-1)!}{\left(\frac{x-y}{2}-1\right)! \left(\frac{x+1}{2}-1\right)!} \cdot \frac{4y}{(x-y)(x+y)} = \\
& = \frac{(x-1)!}{\left(\frac{x-y}{2}-1\right)! \left(\frac{x+1}{2}-1\right)!} \cdot \frac{y}{\frac{x-y}{2} \cdot \frac{x+y}{2}} = \frac{(x-1)!y}{\left(\frac{x-y}{2}\right)! \left(\frac{x+y}{2}\right)!};
\end{aligned}$$

- с) чтобы путь не пересекал оси абсцисс,  $b$  должно быть больше нуля. Сведём задачу к предыдущей, отняв от координаты  $x$  координату  $a$ , а от координаты  $y$  — координату  $b$ , тем самым переместив точку  $(a, b)$  в начало координат. Теперь имеем прямоугольник со сторонами

$$x' = \frac{x-a+y-b}{2}, y' = \frac{x-a-y+b}{2}.$$

Всего путей

$$C_{\frac{x-a+y-b}{2}-1+\frac{x-a-y+b}{2}}^{\frac{x-a-y+b}{2}} = C_{x-a-1}^{\frac{x-a-y+b}{2}}.$$

Путей, которые касаются или пересекают диагональ

$$C_{\frac{x-a+y-b}{2}-1+\frac{x-a+y-b}{2}}^{\frac{x-a+y-b}{2}} = C_{x-a-1}^{\frac{x-a+y-b}{2}}.$$

Тогда количество необходимых путей равно

$$C_{x-a-1}^{\frac{x-a-y+b}{2}} - C_{x-a-1}^{\frac{x-a+y-b}{2}}.$$

#### 4.12

*Задание.* В буфете продаются пирожки стоимостью 50 коп. Около буфета собралось  $m + n$  студентов, причём  $n$  из них имеют монеты по 50 коп., а остальные  $m$  имеют только по одной гривне ( $m \leq n$ ). Найдите вероятность того, что ни одному студенту не придётся ждать сдачи, если в начале работы в кассе не было денег.





Рис. 22: Возможные пути

*Решение.* Первым должен стоять тот, который имеет 50 коп. Должно быть  $n$  шагов вверх,  $m$  шагов вправо, причём  $m < n$  (рис. 22).

Красной линией на рисунке обозначена линия, которой мы не должны касаться. Количество таких путей равно  $|\widetilde{A \rightarrow B}| = |A \rightarrow B| - |A' \rightarrow B| = C_{n+m}^n - C_{n+m}^{n+1}$ .

Событие  $D = \{\text{ни одному студенту не придётся ждать сдачи}\}$ . Его мощность равна  $|D| = C_{n+m}^n - C_{n+m}^{n+1}$ . Вероятностное пространство:  $\Omega = \{\text{все пути из } A \text{ в } B\}$ . Оно содержит  $|\Omega| = C_{n+m}^n$  элементов. Тогда вероятность равна

$$P(D) = \frac{|D|}{|\Omega|} = \frac{C_{n+m}^n - C_{n+m}^{n+1}}{C_{n+m}^n} = 1 - \frac{C_{n+m}^{n+1}}{C_{n+m}^n} = 1 - \frac{m}{n+1}.$$

## Дополнительные задачи

### 4.13

*Задание.* В квадрате наугад выбраны две точки  $A$  и  $B$ . Найдите вероятность того, что круг, диаметром которого есть отрезок  $AB$ , полностью будет содержаться в данном квадрате.

*Решение.* Пусть сторона квадрата равна  $a$ .

Опишем пространство элементарных событий

$$\Omega = \left\{ \langle (x_A, y_A), (x_B, y_B) \rangle \in [0, a]^2 \right\}.$$

Изобразив  $\Omega$  на плоскости, можно убедиться, что это квадрат со стороной  $a$ .

Если в квадрате нарисовать вписанный круг, то обе точки должны лежать внутри этого круга. Вероятность попадания первой точки в этот круг можно выразить соотношением площадей круга и квадрата, вероятность дважды попасть в этот круг есть произведение этих вероятностей (соотношений).

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{\left(\pi \cdot \left(\frac{a}{2}\right)^2\right)^2}{(a^2)^2} = \frac{\pi^2 a^4}{4a^4} = \frac{\pi}{4}.$$

#### 4.14

*Задание.* Две частицы независимо друг от друга совершают случайное блуждание на  $\mathbb{Z}$ , причём каждая из них за один шаг передвигается на единицу вправо или влево с вероятностями  $1/2$ . В начальный момент времени частицы находятся на расстоянии  $2m$  друг от друга. Каждая из частиц сделала  $n$  шагов. Найдите вероятность того, что частицы впервые встретятся на  $n$ -м шаге.

*Решение.* Пусть есть одна точка, которая находится в нуле. Тогда определить, в какой точке она находится после  $n$  шагов, можно, отняв от количества шагов вправо количество шагов влево. Путей есть  $2^n$ . Нужно почитать количества возможных путей длиной  $n$ , где разность между количеством шагов вправо и количеством шагов влево равна  $t$ . Найдём, сколько шагов вправо в таком случае нужно сделать:

$$right - left = t; \quad right + left = n \rightarrow right = \frac{t+n}{2}.$$

Тогда количество путей равно  $C_n^{\frac{t+n}{2}}$ .

Когда  $n < m$ , путей не существует, поэтому вероятность равна нулю.

Количество шагов вправо от второй точки до точки  $t$  равно  $t-2m$ . Тогда количество путей из второй точки к точке  $t$  равно  $C_n^{|t-2m|}$ .

Количество пар путей, при которых две точки встретятся в точке  $t$  при отсчёте от левой точки равно  $C_n^{\frac{t+n}{2}} C_n^{|t-2m|}$ . Правая точка может максимально уйти в точку  $2m-n$  влево — это минимум  $t$ . Максимальная точка, в которую обе могут прийти — это максимум  $t$ . Она равна  $n$ . Количество всех путей при всех возможных  $t$  равно  $\sum_{t=2m-n}^n C_n^{\frac{t+n}{2}} C_n^{|t-2m|}$ .

Количество всех путей равно  $2^n \cdot 2^n$ . Тогда вероятность равна

$$P(A) = \frac{\sum_{t=2m-n}^n C_n^{\frac{t+n}{2}} C_n^{|t-2m|}}{2^n \cdot 2^n}.$$

## Домашнее задание

### 4.15

*Задание.* На отрезке  $AB$  длиной  $l$  наугад выбрана точка  $O$ . Найдите вероятность того, что отношение  $|AO| : |AB|$  не превышает 0.6.

*Решение.* Обозначим через  $x$  расстояние от точки  $A$  до точки  $O$ . Тогда пространством элементарных событий является отрезок  $\Omega = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq l\} = [0, l]$ , а событие  $B = \{\text{отношение } |AO| : |AB| \text{ окажется не большим чем } 0.6\}$  способствуют точки отрезка

$$B = \left\{x \in \Omega : \frac{x}{l} \leq 0.6\right\} = \{x \in [0, l] : x \leq 0.6l\} = [0, 0.6l].$$

Поэтому

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{0.6l}{l} = 0.6.$$

### 4.16

*Задание.* На отрезке  $[-1, 2]$  наугад выбрано две точки  $A$  и  $B$ . Найдите вероятность того, что расстояние между ними окажется меньшим чем 2, и точка  $A$  будет лежать левее единицы.

*Решение.* Обозначим через  $x$  и  $y$  расстояния от начала отрезка к соответственно точкам  $A$  и  $B$ . Тогда пространство элементарных событий можно описать следующим образом:  $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 2\}$ , а событие  $A = \{\text{расстояние между точками } A \text{ и } B \text{ окажется меньшим чем } 2, \text{ и точка } A \text{ будет лежать левее единицы}\}$  описывается множеством  $A = \{(x, y) \in \Omega : -1 \leq x < 1, y - x < 2, y \leq 2\}$ . Изобразив  $\Omega$  и  $A$  на плоскости, можно убедиться, что  $\Omega$  является квадратом со стороной 3, а точки множества  $A$  образуют прямоугольник со сторонами длиной 2 и 3 с вырезанным треугольником с катетами длиной 1. Поэтому

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{2 \cdot 3 - \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1}{3 \cdot 3} = \frac{11}{18}.$$

### 4.17

*Задание.* Точка  $(\xi, \eta)$  наугад выбрана в квадрате  $[0, 1]^2$ . Для фиксированного  $z \in (0, 1)$  вычислить вероятности:

- а)  $P(\xi + 2\eta < z)$ ;
- б)  $P(\max(\xi, \eta) < z)$ ;
- в)  $P(\xi\eta < z)$ .

*Решение.* Пространство элементарных событий можно описать следующим образом:  $\Omega = \{(\xi, \eta) \in [0, 1]^2\}$ . Изобразив  $\Omega$  на плоскости, можно убедиться, что  $\Omega$  является квадратом со стороной 1.

- а) Событие  $A$  описывается множеством  $A = \{(\xi, \eta) \in \Omega : \xi + 2\eta < z, z \in (0, 1)\}$ . Изобразив  $A$  на плоскости, можно убедиться, что точки множества  $A$  образуют прямоугольный треугольник с катетами от  $0, 0$  до  $1/2, 1$  в зависимости от  $z$ .

Выразим длины катетов через  $z$ . При  $\xi = 0$  получаем, что

$$\eta < \frac{z}{2}.$$

При  $\eta = 0$  получаем, что  $\xi < z$ . Поэтому верхняя грань одного из катетов равна  $z$ , а второго —  $z/2$ . Найдём площадь треугольника:

$$S_A = \frac{1}{2} \cdot z \cdot \frac{z}{2} = \frac{z^2}{4}.$$

Тогда вероятность равна

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{\frac{z^2}{4}}{1} = \frac{z^2}{4}.$$

Найдём вероятности данного события при верхней и нижней гранях  $z$  (при  $z = 0$  и  $z = 1$ ).

При  $z = 0$  точки множества  $A$  образуют прямоугольный треугольник с катетом, равным нулю. Поэтому

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{0}{1 \cdot 1} = 0.$$

При  $z = 1$  точки множества  $A$  образуют прямоугольный треугольник с катетами, равными  $1/2$  и  $1$ . Поэтому

$$P(A) = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1}{1 \cdot 1} = \frac{1}{4}.$$

Отсюда следует, что вероятность данного события лежит в пределах

$$P(A) \in \left(0, \frac{1}{4}\right).$$

Пусть  $\Omega$  представляет собой куб со стороной 1;

- б) рассмотрим вариант, когда  $\eta > \xi$ . Тогда  $\max(\xi, \eta) = \eta < z$ . При  $\eta \leq \xi$  получаем, что  $\max(\xi, \eta) = \xi < z$ . Прямая  $\eta = \xi$  делит квадрат на 2 одинаковых треугольника. Пусть  $z = 1/2$ . Если  $\xi \geq \eta$ , то  $\xi < z$ . Поэтому точка может лежать в нижнем треугольнике левее от вертикальной прямой  $\xi = 1/2$ . Аналогично при  $\eta > \xi$  :  $\eta < z$  — точка может лежать в верхнем треугольнике ниже горизонтальной прямой  $\eta = 1/2$ . Объединив эти 2 случая имеем, что точка может попасть в квадрат со стороной  $z$ . Тогда вероятность равна

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{z \cdot z}{1} = z^2;$$

- с) найдём площадь фигуры с помощью интеграла. Разобьём её площадь на две фигуры: на прямоугольник со сторонами 1 и  $z$  и на фигуру, ограниченную прямыми  $\xi = z$ ,  $\xi = 1$  и кривой

$$\eta = \frac{z}{\xi}.$$

Площадь прямоугольника равна  $S_{A_1} = 1 \cdot z = z$ . Площадь фигуры под кривой найдём с помощью интеграла. Она будет равна

$$S_{A_2} = \int_z^1 \frac{z}{\xi} d\xi = z \cdot \ln \xi \Big|_z^1 = z(-\ln z + \ln 1) = z \ln z.$$

Тогда площадь фигуры равна  $S_A = S_{A_1} + S_{A_2} = z - z \ln z = z(1 - \ln z)$ . Вероятность равна

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{z(1 - \ln z)}{1} = z(1 - \ln z).$$

#### 4.18

*Задание.* На окружности выбраны три точки  $A$ ,  $B$  и  $C$ . Найдите вероятность того, что треугольник  $ABC$  окажется:

- тупоугольным;
- равнобедренным.

*Решение.* Окружность симметрична, поэтому можем выбрать начало отсчёта в точке  $A$ . Обозначим через  $x$  и  $y$  длины дуг от начала отсчёта к точкам  $B$  и  $C$ . Тогда пространство элементарных событий можно описать следующим образом:  $\Omega = \{(x, y) \in [0, 2\pi]^2\}$ . Изобразив  $\Omega$  на плоскости, можно убедиться, что  $\Omega$  является квадратом со стороной  $2\pi$ . Поэтому  $S_\Omega = 2\pi \cdot 2\pi = 4\pi^2$ .

- Событие  $A = \{1 \text{ из углов треугольника } ABC \text{ окажется тупоугольным}\}$  описывается множеством  $A = \{(x, y) \in [0, \pi]^2\}$ , т.к. вершины тупоугольного треугольника должны находиться по одну сторону от диаметра окружности. Изобразив  $A$  на плоскости, можно убедиться, что точки множества  $A$  образуют квадрат со стороной  $\pi$ . Поэтому  $S_A = \pi \cdot \pi = \pi^2$ .

Так как тупым может быть любой из трёх углов треугольника, то  $S_B = 3S_A = 3\pi^2$ , где событие  $B = \{\text{треугольник } ABC \text{ окажется тупоугольным}\}$ .

Тогда вероятность события  $B$  равна

$$P(B) = \frac{S_B}{S_\Omega} = \frac{3\pi^2}{4\pi^2} = \frac{3}{4};$$

- b) рассмотрим событие  $A = \{\text{треугольник } ABC \text{ окажется равнобедренным}\}$ . Оно описывается множеством

$$A = \left\{ (x, y) \in [0, 2\pi]^2 : x = y, y = 2\pi - x, y = 2x, x = 2y \right\}.$$

Изобразив  $A$  на плоскости, можно убедиться, что точки множества  $A$  образуют прямые. Площадь прямой равна нулю. Поэтому вероятность события  $A$  равна

$$P(A) = \frac{0}{4\pi^2} = 0.$$

#### 4.19

*Задание.* Карандаш длиной  $l$  разломано наугад на три части. Найдите вероятность того, что длина средней части окажется самой меньшей.

*Решение.* Обозначим через  $x$  и  $y$  расстояния от кончика карандаша до соответственно ближней к нему и дальней от него точек разлома. Тогда пространство элементарных событий можно описать следующим образом:

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq y \leq l\},$$

а событие  $A = \{\text{длина средней части окажется самой меньшей}\}$  описывается множеством  $A = \{(x, y) \in \Omega : y - x < x, y - x < l - y\}$  или

$$A = \{(x, y) \in \Omega : y < 2x, x > 2y - l\}.$$

Изобразив  $\Omega$  и  $A$  на плоскости, можно убедиться, что  $\Omega$  является прямоугольным треугольником с катетами длиной  $l$ , а точки множества  $A$  образуют треугольник, который лежит между прямыми  $y = 2x, y = x$  и  $y = (x + l)/2$ . Найдём координаты вершин треугольника. Решим уравнение

$$2x = \frac{x + l}{2}.$$

Получим

$$x = \frac{l}{3}, y = \frac{2l}{3}.$$

Две другие вершины имеют координаты  $(0, 0), (l, l)$ . Найдём площадь треугольника с помощью интеграла. Разобьём его на две части вертикальной прямой  $x = l/3$ . Площадь левого кусочка равна

$$S_1 = \int_0^{\frac{l}{3}} 2x dx = \left. \frac{2x^2}{2} \right|_0^{\frac{l}{3}} = x^2 \Big|_0^{\frac{l}{3}} = \frac{l^2}{9}.$$

Найдём площадь правого кусочка:

$$\begin{aligned} S_2 &= \int_{\frac{l}{3}}^l \frac{1}{2} (x + l) dx = \frac{1}{2} \left( \int_{\frac{l}{3}}^l x dx + \int_{\frac{l}{3}}^l l dx \right) = \frac{1}{2} \left( \left. \frac{x^2}{2} \right|_{\frac{l}{3}}^l + lx \Big|_{\frac{l}{3}}^l \right) = \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{l^2}{2} - \frac{l^2}{18} + l^2 - \frac{l^2}{3} \right) = \frac{l^2}{2} \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{18} + 1 - \frac{1}{3} \right) = \frac{l^2}{2} \cdot \frac{9 - 1 + 18 - 6}{18} = \\ &= \frac{20l^2}{2 \cdot 18} = \frac{10l^2}{18} = \frac{5l^2}{9}. \end{aligned}$$

Сложим две площади:

$$S = S_1 + S_2 = \frac{l^2}{9} + \frac{5l^2}{9} = \frac{6l^2}{9} = \frac{2l^2}{3}.$$

Теперь отнимем площадь прямоугольного треугольника с катетами длиной  $l$ . Получим:

$$S_A = \frac{2l^2}{3} - \frac{1}{2} \cdot l \cdot l = \frac{2l^2}{3} - \frac{l^2}{2} = \frac{l^2}{6}.$$

Поэтому

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{\frac{l^2}{6}}{\frac{l^2}{2}} = \frac{1}{3}.$$

#### 4.20

*Задание.* На паркет наугад брошена монета радиусом 1 см. Найдите вероятность того, что монета не пересечёт сторон паркета, если паркет имеет форму прямоугольников со сторонами 4 см и 8 см.

*Решение.* Положение монеты однозначно определяется расстояниями  $x$  и  $y$  от центра монеты к сторонам ближайшего прямоугольника. Очевидно, что  $0 \leq x \leq 2$  и  $0 \leq y \leq 4$ , т.е. пространство элементарных событий  $\Omega$  является прямоугольником (рис. 23):  $\Omega = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 4\}$ .

Для того, чтобы монета не пересекла ни одной из сторон паркета необходимо и достаточно выполнения условий  $1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 4$ , т.е.  $A = \{(x, y) : 1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 4\}$ .

Имеем

$$P\{A\} = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} = \frac{3}{8}.$$

#### 4.21

*Задание.* На окружности радиуса  $r$  наугад выбраны две точки. Найдите вероятность того, что расстояние между ними не превышает  $r$ .

*Решение.* На окружности наугад выбраны две точки  $A$  и  $B$ . Изобразим окружность на рис. 24.

Имеем равнобедренный треугольник  $AOB$ . Известен размер боковых сторон треугольника и угол  $\alpha$  между ними. Пусть элементарные исходы —



Рис. 23: Пространство элементарных событий  $\Omega$  и событие  $A$



Рис. 24: Окружность радиуса  $r$

это углы  $\alpha$ . Угол однозначно опишет эту систему. Если поделить напополам этот треугольник, получим 2 прямоугольных треугольника с гипотенузами  $r$ . Угол между гипотенузой и высотой равен  $\alpha/2$ . Отношение противоположного катета к гипотенузе — это

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{AC}{AO} = \frac{AC}{r}.$$



Нужно, чтобы катет  $AC$  варьировался в пределах

$$\left[-\frac{r}{2}, \frac{r}{2}\right].$$

Значит

$$\sin \frac{\alpha}{2} \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right].$$

Это соответствует углам

$$\frac{\alpha}{2} \in [-30^\circ, 30^\circ].$$

Для угла  $\alpha$  — это  $[-60^\circ, 60^\circ]$ . Имеем, что  $\Omega = \{\alpha \in [-180^\circ, 180^\circ]\}$ ,  $|\Omega| = 360^\circ$ ,  $A = \{\alpha \in [-60^\circ, 60^\circ]\}$ ,  $|A| = 120^\circ$ . Поэтому вероятность события  $A$  равна

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{120}{360} = \frac{1}{3}.$$

#### 4.22

*Задание.* Подсчитайте количество путей:

а) из  $(0, 0)$  в  $(2n, 0)$  таких, что:

- (i)  $S_1 > 0, \dots, S_{2n-1} > 0$ ;
- (ii)  $S_1 \geq 0, \dots, S_{2n-1} \geq 0$ ;

б) из  $(0, m)$  в  $(n, 0)$ , таких, что:

- (i)  $S_1 > 0, \dots, S_{2n-1} > 0$ ;
- (ii)  $S_1 \geq 0, \dots, S_{2n-1} \geq 0$ .

*Решение.* Путём  $\{S_1, \dots, S_x\}$  из начала координат в точку  $(x, y)$ ,  $x \in \mathbb{N}$ ,  $y \in \mathbb{N}$  называется ломаная с вершинами в точках  $(0, 0)$ ,  $(1, S_1)$ ,  $(2, S_2), \dots, (x, S_x)$ , где  $S_x = y$ ,  $S_i - S_{i-1} \in \{-1, 1\}$ .

а) Сведём задачу к задаче, которая решается с помощью метода отражений. Введём новую систему координат, которая повёрнута относительно данной на  $45^\circ$  по часовой стрелке. В этой системе координат за 1 шаг будет изменяться две координаты (рис. 25).

Свели данную задачу к задаче 1.22. Имеем пути, состоящие из  $n + n$  ходов, среди которых ровно  $n$  ходов в направлении  $x'$ , и  $n$  ходов в направлении  $y'$ . Если выберем, на каких шагах увеличиваем первую координату, будем знать, где увеличиваем вторую координату. Это будет  $C_{2n}^n$ .

(i) Развернём для удобства рисунок (рис. 26).

Нам нужно, чтобы путь не касался диагонали, поэтому уйдём с неё на шаг вверх в точку  $A$  и будем искать количество путей из  $A$  в  $B$ .



Рис. 25: Новая система координат



Рис. 26: Метод отражений

Количество путей из  $A$  в  $B$ , не цепляющих диагональ, равно общему количеству путей из  $A$  в  $B$  — количество путей из  $A$  в  $B'$ .

В точку  $A$  из начала координат можно попасть одним способом, как и в конечную точку из  $B$ , поэтому количество путей не изменится, если начать считать с них.

Из точки  $A$  в точку  $B$  есть  $n - 1$  вертикальный шаг и  $n - 1$  гори-

горизонтальный. Поэтому количество путей из  $A$  в  $B$  равно  $C_{2(n-1)}^{m-1} = C_{2n-2}^{m-1}$ . От этого количества нужно отнять число путей, которые пересекают диагональ (по условию задачи это те пути, у которых  $S_i \leq 0$ ). Когда из точки  $A$  попадаем на диагональ, есть путь, симметричный данному, который ведёт в точку  $B'$ . Есть  $n$  горизонтальных шагов и  $n-2$  вертикальных. Имеем  $C_{n+n-2}^n = C_{2n-2}^n$  путей.

Тогда число путей из точки  $(0,0)$  в точку  $(2n,0)$  равно

$$\begin{aligned} C_{2n-2}^{n-1} - C_{2n-2}^n &= \frac{(2n-2)!}{(n-1)!(2n-2-n+1)!} - \frac{(2n-2)!}{n!(2n-2-n)!} = \\ &= \frac{(2n-2)!}{(n-1)!(n-1)!} - \frac{(2n-2)!}{n!(n-2)!} = \\ &= (2n-2)! \left( \frac{1}{(n-2)!(n-1)(n-1)!} - \frac{1}{(n-1)!n(n-2)!} \right) = \\ &= (2n-2)! \cdot \frac{n-n+1}{(n-2)!(n-1)!(n-1)n} = \frac{(2n-2)!}{n!(n-1)!}; \end{aligned}$$

- (ii) данная задача аналогична предыдущей, только теперь нужно из числа путей из точки с координатами  $(0,0)$  в точку с координатами  $(2n,0)$  отнять число путей, ведущих из точки  $(0,0)$  в  $B'$ .

Из точки  $(0,0)$  в точку  $(2n,0)$  нужно сделать  $n$  горизонтальных шагов и  $n$  вертикальных — всего  $C_{2n}^n$ .

Из точки  $(0,0)$  в точку  $B'$  есть  $n$  горизонтальных шагов и  $n-1$  вертикальных. Всего таких путей  $C_{2n-1}^n$ .

Итого имеем

$$\begin{aligned} C_{2n}^n - C_{2n-1}^n &= \frac{(2n)!}{n!n!} - \frac{(2n-1)!}{n!(n-1)!} = \frac{(2n)!}{n!(n-1)!n} - \frac{(2n-1)!}{n!(n-1)!} = \\ &= \frac{(2n)! - (2n-1)!n}{n!n!} = \frac{(2n-1)!(2n-n)}{n!n!} = \frac{(2n-1)!n}{n!n!}; \end{aligned}$$

- b) задача проиллюстрирована на рисунке 27.

При  $n = m$  существует один путь из точки  $(0,m)$  в точку  $(n,0)$ , который соответствует линии, проведённой между этими точками:  $(0,m) \rightarrow (1,m-1) \rightarrow (2,m-2) \rightarrow \dots \rightarrow (n,0)$ .

При  $n < m$  пути между точками с заданными условиями нет.

При  $n > m$  путь возможен только при условии, что  $(m-n) \bmod 2 = 1$ . В каждую следующую точку, в которой выполняется это условие, существует больше путей чем в предыдущую. Аналогично пункту а) имеем



Рис. 27: Пути из точки  $(0, m)$  в точку  $(n, 0)$

(i)

$$\begin{aligned}
 C_{m+n-2}^{n-1} - C_{m+n-2}^n &= \frac{(m+n-2)!}{(n-1)!(m-1)!} - \frac{(m+n-2)!}{n!(m-2)!} = \\
 &= \frac{(m+n-2)!}{(n-1)!(m-2)!(m-1)} - \frac{(m+n-2)!}{(n-1)!n(m-2)!} = \\
 &= \frac{(m+n-2)!(n-m+1)}{(n-1)!(m-2)!(m-1)n} = \frac{(m+n-2)!(n-m+1)}{n!(m-1)!};
 \end{aligned}$$

(ii)

$$\begin{aligned}
 C_{m+n}^m - C_{m+n-1}^m &= \frac{(m+n)!}{m!n!} - \frac{(m+n-1)!}{m!(n-1)!} = \\
 &= \frac{(m+n)! - (m+n-1)!n}{m!n!} = \frac{(m+n-1)!(m+n-n)}{m!n!} = \\
 &= \frac{(m+n-1)!m}{m!n!}.
 \end{aligned}$$

**Второй способ** Изобразим путь, который необходимо пройти в декартовых координатах (рис. 28).

Повернём рисунок (рис. 29).

Пунктиром обозначены крайние пути, которыми можно пройти. Зелёным — линия, которую нельзя пересекать. Разница суммы шагов вниз от суммы шагов вверх будет  $m$ . Для рисунка 28  $AB = \sqrt{m^2 + n^2}$  — гипотенуза треугольника  $AOB$ .

Самый простой случай:  $m = n$  (рис. 30).





Рис. 30: Случай, когда  $m = n$



Рис. 31: Случай, когда  $n = m + 2$

такое же, как от верхнего угла до точки  $n$ . Поскольку с ростом  $n$  на 2 увеличивается  $m$  на 1, а ширина прямоугольника равна высоте этого наклонённого отрезка, то получается, что ширина результирующего прямоугольника растёт на 1.

Проводим дополнительную вертикальную ось через  $m + 2$  (рис. 32).

Смотрим на верхнюю линию от  $m'$  до  $n'$ . Это линия длиной  $m' = m + 2$ . Значит, весь предыдущий прямоугольник имеет ширину  $m + 2$ . Высота 2 — потому что двух шагов достаточно, чтобы пройти от  $m$  до  $m'$ .

Известно, что  $AB = m$ ,  $BC = n - m$  (рис. 33). Угол  $BCD = 45^\circ$  (можем



Рис. 32: Дополнительные построения



Рис. 33: Дополнительные построения

всегда ходить направо. При этом либо вниз, либо вверх. Пройтись направо —  $45^\circ$ ). Считаем синус:

$$\sin \angle BCD = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Вычисляем длину  $BD$  — это катет и высота прямоугольника:

$$BD = BC \cdot \sin \angle BCD = (n - m) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Знаем высоту, делим её на  $\sqrt{2}$  — получаем высоту в шагах:

$$h = \frac{BD}{\sqrt{2}} = \frac{(n-m)\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = \frac{n-m}{2}.$$

Найдём длину прямоугольника. Она состоит из отрезков  $DF$  и  $CD$ .  $DF = BE$ , поэтому найдём его длину из треугольника  $ABE$ :

$$BE = \frac{AB}{\cos \angle ABE} = \frac{2m}{\sqrt{2}}.$$

Найдём  $CD$  из треугольника  $BDC$ :

$$CD = DC \cdot \cos 45^\circ = (n-m) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Тогда общая длина равна

$$\begin{aligned} CF = BE + CD &= \frac{2m}{\sqrt{2}} + \frac{(n-m)\sqrt{2}}{2} = \frac{2\sqrt{2}m + \sqrt{2}(n-m)}{2} = \\ &= \frac{\sqrt{2}(2m + n - m)}{2} = \frac{\sqrt{2}(n+m)}{2}. \end{aligned}$$

Длина перевернутого прямоугольника равна

$$l = \frac{CF}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}(n+m)}{2\sqrt{2}} = \frac{n+m}{2}.$$

Всего путей из  $A$  в  $B$  есть

$$\begin{aligned} C_{\frac{n-m}{2} + \frac{n+m}{2}}^{\frac{n-m}{2}} &= C_{\frac{n-m+n+m}{2}}^{\frac{n-m}{2}} = C_n^{\frac{n-m}{2}} = \frac{n!}{\left(\frac{n-m}{2}\right)! \left(n - \frac{n-m}{2}\right)!} = \\ &= \frac{n!}{\left(\frac{n-m}{2}\right)! \left(\frac{2n+m-n}{2}\right)!} = \frac{n!}{\left(\frac{n-m}{2}\right)! \left(\frac{n+m}{2}\right)!}. \end{aligned}$$

- (i) Посчитаем количество путей, которые не касаются диагонали. Рассмотрим частный случай. Пусть  $h = 2$  и  $l = 4$ . Тогда имеем

$$C_{4+2}^2 = C_6^2 = \frac{6!}{2!4!} = \frac{5 \cdot 6}{2} = 15$$

возможных путей (рис. 35).

Оранжевым обозначены пути, которые не касаются диагонали, коричневым — которые только касаются диагонали, и розовым





Рис. 34: Вспомогательный рисунок для определения количества путей



Рис. 35: Все возможные пути для  $h = 2$  и  $l = 4$

— которые пересекают её. Путей, которые касаются диагонали

10 — это  $C_5^2$ . Т.е. это количество путей из точки  $A$  в точку  $B'$ . Их

$$\begin{aligned} C_{\frac{n+m}{2} + \frac{n-m}{2} - 1}^{\frac{n-m}{2}} &= C_{\frac{n+m+n-m-2}{2}}^{\frac{n-m}{2}} = C_{n-1}^{\frac{n-m}{2}} = \\ &= \frac{(n-1)!}{\left(\frac{n-m}{2}\right)! \left(n-1 - \frac{n-m}{2}\right)!} = \frac{(n-1)!}{\left(\frac{n-m}{2}\right)! \left(\frac{2n-2-n+m}{2}\right)!} = \frac{(n-1)!}{\left(\frac{n-m}{2}\right)! \left(\frac{n+m-2}{2}\right)!} = \\ &= \frac{(n-1)!}{\left(\frac{n-m}{2}\right)! \left(\frac{n+m}{2} - 1\right)!}. \end{aligned}$$

(ii) путей, которые пересекают диагональ — это все пути от  $A$  до  $B''$ , т.е.

$$C_{\frac{n-m}{2} + \frac{n-m}{2}}^{\frac{n-m}{2}} = C_{n-m}^{\frac{n-m}{2}} = \frac{(n-m)!}{\left(\frac{n-m}{2}\right)! \left(\frac{n-m}{2}\right)!}.$$

#### 4.23

*Задание.* В последний тур выборов вышли кандидаты  $A$  и  $B$ . Кандидат  $A$  набрал  $n$  голосов, кандидат  $B$  —  $m$  голосов. Избиратели голосовали последовательно. Найдите вероятность того, что кандидат  $A$  не отстал от  $B$ , если:

- а)  $n \geq m$ ;
- б)  $n = m$ .

*Решение.* Вероятность равна

$$P = \frac{k}{|\Omega|}.$$

Общее количество путей равно  $|\Omega| = C_{m+n}^m$ . Найдём  $k$ .

- а) Данная задача решена в пункте б) из предыдущей. Так как кандидат  $A$  может быть или наравне с кандидатом  $B$ , или лидировать, то нам подходит пункт ii). Имеем:

$$\begin{aligned} C_{m+n}^m - C_{m+n-1}^m &= \frac{(m+n)!}{m!n!} - \frac{(m+n-1)!}{m!(n-1)!} = \\ &= \frac{(m+n)! - (m+n-1)!n}{m!n!} = \frac{(m+n-1)!(m+n-n)}{m!n!} = \\ &= \frac{(m+n-1)!m}{m!n!}. \end{aligned}$$

Тогда вероятность указанного события равна

$$P = \frac{\frac{(m+n-1)!m}{m!n!}}{C_{m+n}^m} = \frac{(m+n-1)!m}{m!n!} \cdot \frac{m!n!}{(m+n)!} = \frac{m}{m+n};$$

- б) в данном случае  $k = 1$ . Поэтому вероятность равна

$$P = \frac{1}{C_{m+n}^m} = \frac{m!n!}{(m+n)!}.$$

4.24

*Задание.* Решите задачу 4.12 при условии, что в начале работы в кассе буфета было  $p$  монет по 50 коп.

В буфете продаются пирожки стоимостью 50 коп. Около буфета собралось  $m+n$  студентов, причём  $n$  из них имеют монеты по 50 коп., а остальные  $m$  имеют только по одной гривне ( $m \leq n$ ). Найдите вероятность того, что ни одному студенту не придётся ждать сдачи, если в начале работы в кассе было  $p$  монет по 50 коп.

*Решение.* Данная задача решается методом отражений (рис. 36).



Рис. 36: Возможные исходы

Количество всех возможных путей равно  $|\Omega| = C_{m+n}^n$ . Найдём количество путей, которые не пересекают диагональ:  $|A| = C_{m+n}^n - C_{n+m}^{n+p+1}$ , где  $A$  — описанное в условии событие. Найдём теперь его вероятность:

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{C_{m+n}^n - C_{n+m}^{n+p+1}}{C_{m+n}^n} = 1 - \frac{C_{n+m}^{n+p+1}}{C_{m+n}^n} = 1 - \frac{\frac{(n+m)!}{(n+p+1)!(n+m-n-p-1)!}}{\frac{(m+n)!}{n!(m+n-n)!}} = \\ &= 1 - \frac{(n+m)!n!m!}{(n+m)!(n+p+1)!(m-p-1)!} = 1 - \frac{n!m!}{(n+p+1)!(m-p-1)!}. \end{aligned}$$



# Занятие 5. Условные вероятности. Независимость

## Контрольные вопросы и задания

**Какие события называются независимыми?**

$A$  и  $B$  — независимы, если  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ .

**Какие события называются несовместимыми?**

В теории вероятностей несколько событий называются несовместными, или несовместимыми, если никакие из них не могут появиться одновременно в результате однократного проведения эксперимента (опыта).

**Запишите формулу для вычисления условной вероятности.**

Условная вероятность события  $A$  при условии, что событие  $B$  произошло — это выражение

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

## Аудиторные задачи

### 5.3

*Задание.* Трижды подбросили монету. Пусть событие  $A$  состоит в том, что дважды выпал герб, а событие  $B$  — в том, что хотя бы один раз выпал герб. Найдите условные вероятности  $P(A|B)$ ,  $P(B|A)$ . Являются ли события  $A$  и  $B$  независимы.

*Решение.* Распишем вероятностное пространство

$$\Omega = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (0, 0, 0)\},$$

где единица означает, что выпал герб, ноль — цифра. На каждом из трёх мест может стоять 2 значения, поэтому  $|\Omega| = 2^3 = 8$ .

Распишем событие  $A = \{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ . Событие  $A$  включает  $|A| = 3$  элемента. Тогда его вероятность равна

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{8}.$$

Распишем событие

$$B = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}.$$

Вероятность этого события равна

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{7}{8}.$$

Найдём вероятность перечисления этих событий:

$$P(A \cap B) = P\{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)\} = \frac{3}{8}.$$

Найдём условную вероятность события  $A$  при условии, что событие  $B$  произошло:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{8}}{\frac{7}{8}} = \frac{3 \cdot 8}{7 \cdot 8} = \frac{3}{7}.$$

Найдём условную вероятность события  $B$  при условии, что событие  $A$  произошло:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{3}{8}}{\frac{3}{8}} = 1.$$

Найдём произведение вероятностей

$$P(A)P(B) = \frac{3}{8} \cdot \frac{7}{8} = \frac{21}{64}.$$

Видим, что это не равно вероятности пересечения этих событий, значит события не независимы.

## 5.4

*Задание.* Подбрасывают два игральных кубика. Найдите вероятность того, что выпала хотя бы одна шестёрка, если известно, что сумма очков равна 8.

*Решение.* Вероятностное пространство имеет  $|\Omega| = 6^2$  элементов, так как на каждом из двух кубиков может выпасть любая из шести цифр. Рассмотрим событие  $A = \{\text{выпала хотя бы одна шестёрка}\}$ . Это значит, что нужно выбрать кубик, на котором выпадет шестёрка (это 2 варианта) и число, которое выпадет на оставшемся кубике — это 6 вариантов. Тогда вероятность этого события равна

$$P(A) = \frac{2 \cdot 6}{6^2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Рассмотрим событие  $B = \{\text{сумма осков равна восьми}\}$ . На одном кубике может выпасть двойка, тогда на втором — восьмёрка. Другим возможным исходом могут быть такие выпавшие цифры, как тройка и пятёрка. Пятый вариант — две четвёрки. Имеем 5 вариантов. Тогда вероятность события  $B$  равна

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{5}{6^2} = \frac{5}{36}.$$

Найдём вероятность пересечения этих событий:

$$P(A \cap B) = P\{(2, 6), (6, 2)\} = \frac{2}{6^2} = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}.$$

Тогда условная вероятность события  $A$  при условии, что событие  $B$  произошло, равна

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{18}}{\frac{5}{36}} = \frac{8}{18} = \frac{4}{9}.$$

## 5.5

*Задание.* Считая, что рождение мальчика или девочки являются равновероятными, найдите вероятность того, что в семье с двумя детьми оба мальчика, если известно, что

- а) старший ребёнок — мальчик;
- б) среди детей есть хотя бы один мальчик.

*Решение.* Распишем пространство элементарных событий  $\Omega = \{(b, b), (b, g), (g, b), (g, g)\}$ , где  $b$  означает мальчик,  $g$  — девочка, на первом месте стоит старший ребёнок, на втором — младший. В этом пространстве  $|\Omega| = 4$  элемента.

Пусть событие  $A = \{(b, b)\}$ .

- а) Рассмотрим событие  $B = \{(b, g), (b, b)\}$ . Его вероятность равна

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

Рассмотрим вероятность пересечения событий  $A$  и  $B$ . Это будет

$$P(A \cap B) = P(\{(b, b)\}) = \frac{1}{4}.$$

Тогда условная вероятность события  $A$  при условии того, что событие  $B$  произошло равна

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2};$$

б) рассмотрим событие  $C = \{(b, g), (b, b), (g, b)\}$ . Его вероятность равна

$$P(C) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{3}{4}.$$

Рассмотрим вероятность пересечения событий  $A$  и  $C$ . Это будет

$$P(A \cap C) = P(\{(b, b)\}) = \frac{1}{4}.$$

Тогда условная вероятность события  $A$  при условии того, что событие  $C$  произошло равна

$$P(A|C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}.$$

## 5.6

*Задание.* В урне лежат 12 красных, 8 зелёных и 10 синих шаров. Из урны наугад выбирают два шара. Найдите вероятность того, что шары разного цвета, если известно, что среди них нет синих.

*Решение.* Два шара могут быть красного цвета. Тогда есть  $C_{12}^2$  способа их выбрать. Два шара могут быть зелёного цвета — это  $C_8^2$ , могут быть синего цвета —  $C_{10}^2$ . Может быть случай, когда один из шаров красный, а другой зелёный — это  $C_{12}^1 C_8^1$ . Может быть, что 1 из шаров красный, а второй синий — это  $C_{12}^1 C_{10}^1$ . Может быть случай, когда один из шаров зелёный, а второй синий — это  $C_8^1 C_{10}^1$ . По правилу произведения получаем  $|\Omega| = C_{12}^2 + C_8^2 + C_{10}^2 + C_{12}^1 C_8^1 + C_{12}^1 C_{10}^1 + C_8^1 C_{10}^1$ .

Пусть событие  $A = \{\text{шары разного цвета}\}$ . Рассмотрим событие  $B = \{\text{среди шаров нет синих}\}$ . Его вероятность равна

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{C_{12}^2 + C_8^2 + C_{12}^1 C_8^1}{C_{12}^2 + C_8^2 + C_{10}^2 + C_{12}^1 C_8^1 + C_{12}^1 C_{10}^1 + C_8^1 C_{10}^1}.$$

Найдём вероятность пересечений событий  $A$  и  $B$ , т.е. события  $A \cap B = \{\text{один из шаров красного цвета, а второй — зелёного}\}$ . Она равна

$$P(A \cap B) = \frac{|A \cap B|}{|\Omega|} = \frac{C_{12}^1 C_8^1}{C_{12}^2 + C_8^2 + C_{10}^2 + C_{12}^1 C_8^1 + C_{12}^1 C_{10}^1 + C_8^1 C_{10}^1}.$$

Тогда условная вероятность события  $A$  при условии, что событие  $B$  произошло, равна

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{C_{12}^1 C_8^1}{C_{12}^2 + C_8^2 + C_{10}^2 + C_{12}^1 C_8^1 + C_{12}^1 C_{10}^1 + C_8^1 C_{10}^1}}{\frac{C_{12}^2 + C_8^2 + C_{12}^1 C_8^1}{C_{12}^2 + C_8^2 + C_{10}^2 + C_{12}^1 C_8^1 + C_{12}^1 C_{10}^1 + C_8^1 C_{10}^1}}} = \\ &= \frac{C_{12}^1 C_8^1}{C_{12}^2 + C_8^2 + C_{12}^1 C_8^1}. \end{aligned}$$



### 5.7

*Задание* Точка наугад выбрана в квадрате  $[0, 1]^2$ . Пусть

$$A = \left\{ \xi_1 \leq \frac{1}{2} \right\}, B = \left\{ \xi_2 \leq \frac{1}{2} \right\}, C = \left\{ \left( \xi_1 - \frac{1}{2} \right) \left( \xi_2 - \frac{1}{2} \right) < 0 \right\}.$$

Выясните, являются ли эти события независимыми:

- а) попарно;
- б) в совокупности.

*Решение* Опишем вероятностное пространство  $\Omega = [0, 1]^2$ . Его площадь равна  $S_\Omega = 1 \cdot 1 = 1$ . Событию

$$A = \left\{ \xi_1 \leq \frac{1}{2} \right\}$$

способствуют все точки квадрата, расположенные не правее вертикальной прямой

$$\xi_1 = \frac{1}{2}.$$

Событие  $A$  — это прямоугольник со сторонами длиной 1 и  $1/2$ . Его площадь равна

$$S_A = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Тогда вероятность события  $A$  равна

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{\frac{1}{2}}{1} = \frac{1}{2}.$$

Событию  $B$  способствуют точки квадрата, расположенные ниже горизонтальной прямой

$$\xi_2 = \frac{1}{2}.$$

Это прямоугольник со сторонами длиной 1 и  $1/2$ . Его площадь равна

$$S_B = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Тогда вероятность события  $B$  равна

$$P(B) = \frac{S_B}{S_\Omega} = \frac{\frac{1}{2}}{1} = \frac{1}{2}.$$

Событию  $C$  способствуют 2 квадрата со сторонами длиной  $1/2$ . Их площадь равна

$$S_C = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Тогда вероятность события  $C$  равна

$$P(C) = \frac{S_C}{S_\Omega} = \frac{\frac{1}{2}}{1} = \frac{1}{2}.$$

а) Найдём вероятность пересечения события  $A$  и  $B$ . Это будет

$$P(A \cap B) = P\left(\left\{\xi_1 \leq \frac{1}{2}, \xi_2 \leq \frac{1}{2}\right\}\right) = \frac{1}{4},$$

т.к. эти точки образуют квадрат со сторонами  $1/2$ . Видим, что

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) = \frac{1}{4},$$

поэтому события независимы.

Найдём вероятность пересечения события  $A$  и  $C$ . Это будет

$$P(A \cap C) = P\left(\left\{\xi_1 \leq \frac{1}{2}, \left(\xi_1 - \frac{1}{2}\right)\left(\xi_2 - \frac{1}{2}\right) < 0\right\}\right) = \frac{1}{4},$$

т.к. эти точки образуют квадрат со сторонами  $1/2$ . Видим, что

$$P(A \cap C) = P(A)P(C) = \frac{1}{4},$$

поэтому события независимы.

Найдём вероятность пересечения события  $C$  и  $B$ . Это будет

$$P(C \cap B) = P\left(\left\{\left(\xi_1 - \frac{1}{2}\right)\left(\xi_2 - \frac{1}{2}\right) < 0, \xi_2 \leq \frac{1}{2}\right\}\right) = \frac{1}{4},$$

т.к. эти точки образуют квадрат со сторонами  $1/2$ . Видим, что

$$P(C \cap B) = P(C)P(B) = \frac{1}{4},$$

поэтому события независимы;

б) найдём вероятность пересечения всех трёх событий:

$$\begin{aligned} P(A \cap B \cap C) &= \\ &= P\left(\left\{\xi_1 \leq \frac{1}{2}, \xi_2 \leq \frac{1}{2}, \left(\xi_1 - \frac{1}{2}\right)\left(\xi_2 - \frac{1}{2}\right) < 0\right\}\right) = 0. \end{aligned}$$

События не являются независимыми в совокупности, так как

$$P(A \cap B \cap C) = 0 \neq P(A)P(B)P(C) = \frac{1}{8}.$$

## 5.8

*Задание.* Докажите, что  $P(A_1 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1})$ .

*Решение.* Распишем правую часть по формуле условной вероятности:

$$\begin{aligned} P(A_1)P(A_2|A_1) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1}) &= P(A_1) \cdot \frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_1)} \cdot \dots \times \\ &\times \frac{P(A_1 A_2 \dots A_{n-1} A_n)}{P(A_1 A_2 \dots A_{n-1})} = P(A_1 A_2 \dots A_{n-1} A_n). \end{aligned}$$

### 5.9

*Задание.* Пусть  $P(A) \in (0, 1)$  и  $P(B|\bar{A}) = P(B|A)$ . Докажите, что  $A$  и  $B$  независимы.

*Решение.* Распишем условные вероятности:

$$P(B|\bar{A}) = \frac{P(B \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = P(B|A).$$

Известно, что  $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ , поэтому

$$\frac{P(B \cap \bar{A})}{1 - P(A)} = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}.$$

По формуле разницы множеств:  $P(B \setminus A) = P(B \cap \bar{A})$  получаем:

$$\frac{P(B \setminus A)}{1 - P(A)} = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}.$$

Так как  $P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B)$ , то

$$\frac{P(B) - P(A \cap B)}{1 - P(A)} = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}.$$

Перемножим как пропорцию:  $P(A)(P(B) - P(A \cap B)) = P(A \cap B)(1 - P(A))$ .

Раскроем скобки:  $P(A)P(B) - P(A)P(A \cap B) = P(A \cap B) - P(A \cap B)P(A)$ .

Уничтожим одинаковые члены:  $P(A)P(B) = P(A \cap B)$ . Это значит, что события  $A$  и  $B$  независимы.

### 5.10

*Задание.* Докажите, что если событие  $A$  не зависит само от себя, то или  $P(A) = 1$ , или  $P(A) = 0$ .

*Решение.* События независимы, когда вероятность пересечения равна пересечению вероятностей:  $P(A \cap A) = P(A)P(A) = (P(A))^2 = P(A)$ .

Квадрат числа равен числу, когда оно равно или нулю, или единице.

### 5.11

*Задание.* Вероятность того, что компьютер №1 проработает месяц без поломок равна 0.9, для компьютера №2 эта вероятность равна 0.8. Компьютеры работают независимо друг от друга. Найдите вероятность того, что за месяц работы:

- а) оба компьютера не сломаются;
- б) оба компьютера сломаются;

- с) ломается хотя бы один компьютер;
- д) ломается только компьютер №2;
- е) ломается один и только один из компьютеров.

*Решение.* Пусть событие  $A = \{\text{компьютер №1 не ломается}\}$ , а событие  $B = \{\text{компьютер №2 не ломается}\}$ . Их вероятности по условию равны  $P(A) = 0.9$  и  $P(B) = 0.8$ .

- а) Вероятность того, что оба компьютера не ломаются равна  $P(A \cap B) =$   
 $= P(A) P(B) = 0.9 \cdot 0.8 = 0.72$ ;

- б) событие  $\{\text{оба компьютера ломаются}\}$  означает, что не произойдёт ни событие  $A$ , ни событие  $B$ . Вероятность такого события равна

$$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{A}) P(\overline{B}) = (1 - 0.9)(1 - 0.8) = 0.1 \cdot 0.2 = 0.02;$$

- с) данное событие означает, что произойдёт хотя бы одно из событий  $\overline{A}$  или  $\overline{B}$ . По формуле включений-исключений имеем:  $P(\overline{A} \cup \overline{B}) =$   
 $= P(\overline{A}) + P(\overline{B}) - P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - 0.9 + 1 - 0.8 - 0.02 = 0.1 + 0.2 - 0.02 =$   
 $= 0.3 - 0.02 = 0.298$ ;

- д) событие означает, что произошло событие  $A$  и не произошло событие  $B$ . Вероятность этого равна  $P(A \cap \overline{B}) = P(A) P(\overline{B}) = 0.9 \cdot (1 - 0.8) =$   
 $= 0.9 \cdot 0.2 = 0.18$ ;

- е) событие означает, что произойдёт или событие  $A$ , или событие  $B$ . Вероятность того, что ломается только компьютер №1 равна

$$P(\overline{A} \cap B) = P(\overline{A}) P(B) = (1 - 0.9) \cdot 0.2 = 0.1 \cdot 0.2 = 0.02.$$

Вероятность того, что ломается только компьютер №2 равна

$$P(A \cap \overline{B}) = P(A) P(\overline{B}) = 0.9 \cdot (1 - 0.8) = 0.9 \cdot 0.2 = 0.18.$$

Нужно найти сумму этих вероятностей:  $0.02 + 0.18 = 0.2$ .

## 5.12

*Задание.* Вероятность того, что хотя бы один из четырёх сигналов будет передан правильно, равна 0.9984. Найдите вероятность правильной передачи одного сигнала, если сигналы передаются независимо друг от друга.

*Решение.* Вероятность того, что ни один из сигналов не будет передан правильно, равна  $1 - 0.9984 = 0.0016$ . Эта вероятность равна сумме четырёх вероятностей того, что сигнал не будет передан правильно, т.е. вероятность того, что один сигнал не будет передан правильно, равна  $0.0016/4 = 0.04$ . Тогда вероятность того, что 1 сигнал будет передан правильно, равна  $1 - 0.04 = 0.96$ .

### 5.13

*Задание.* Для некоторой группы людей из 60 человек данные о том, сколько человек курят и не курят и сколько из них имеют и не имеют рак лёгких отображены в таблице:

	Не курит	Курит	Всего
Не болеет раком	40	10	50
Болеет раком	7	3	10
Всего	47	13	60

Проанализовав данные в таблице, выясните, являются ли события  $X = \{\text{человек болеет раком}\}$  и  $\Pi = \{\text{человек курит}\}$  независимыми для данной группы людей.

*Решение* Из таблицы видим, что  $|X| = 10$ , при этом  $|\Omega| = 60$ . Поэтому

$$P(X) = \frac{|X|}{|\Omega|} = \frac{10}{60} = \frac{1}{6}.$$

Аналогично  $|\Pi| = 13$ . Поэтому вероятность равна

$$P(\Pi) = \frac{|\Pi|}{|\Omega|} = \frac{13}{60}.$$

Найдём произведение этих вероятностей:

$$P(X)P(\Pi) = \frac{1}{6} \cdot \frac{13}{60} = \frac{13}{360} = \frac{1}{27}.$$

Найдём вероятность пересечения этих двух событий. Пересечение содержит  $|X \cap \Pi| = 3$ . Тогда вероятность равна

$$P(X \cap \Pi) = \frac{3}{60} = \frac{1}{20}.$$

События не являются независимыми, так как

$$\frac{1}{27} \neq \frac{1}{20}.$$

## Дополнительные задачи

### 5.14

*Задание.* Докажите, что события  $A_1, \dots, A_n$ , которые заданы на одном вероятностном пространстве, независимы тогда и только тогда, когда выполняется  $2^n$  условий:  $P(A_1^{\delta_1} \dots A_n^{\delta_n}) = P(A_1^{\delta_1}) \dots P(A_n^{\delta_n})$ , где

$$\delta_i \in \{0, 1\}; A_i^{\delta_i} = \begin{cases} A_i, & \delta_i = 1, \\ \overline{A_i}, & \delta_i = 0, \end{cases} \quad i = \overline{1, n}.$$

*Решение.* Рассмотрим  $n$  случайных событий таких, что любые  $n - 1$  их них независимы, а все  $n$  — зависимы.

Рассмотрим полный граф с  $n$  вершинами ( $n$  точек на плоскости, между которыми проведены все возможные рёбра). На каждом ребре случайным образом выбрано направление. Получился ориентированный граф (рис. 37).



Рис. 37: Ориентированный граф

Пусть  $r_i$  — количество стрелок, ведущих в  $i$ -ую вершину. Например,  $r_1 = 2$ ,  $r_4 = 3$ . Событие  $A_i = \{r_i \text{ — чётное}\}$ . Утверждаем, что имеют место свойства:

- $A_1, \dots, A_n$  — зависимые:

$$r_1 + r_2 + \dots + r_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

(общее количество стрелок, которое равно количеству рёбер);

- любые  $n - 1$  события независимы.

Рассмотрим  $A_1, \dots, A_n$ . Найдём вероятность  $A_1$ . Начнём с описания вероятностного пространства. Имеем дело с классическим экспериментом.  $\Omega = \{\text{все возможные ориентации графа}\}$ ,  $|\Omega| = 2^{\frac{n(n-1)}{2}}$ . Докажем, что  $|A_1| = |\overline{A_1}|$ . Если сумеем построить биекцию (рис. 38), то  $|A_1| = |\overline{A_1}|$ .

Все стрелки оставляем, а стрелку на ребре 1, 2 меняем на противоположную (рис. 39).

Таким образом получим плохую ориентацию, при которой в вершину 1 будет идти нечётное количество стрелок — взаимно однозначное отражение.

$$P(A_1) = \frac{1}{2}, P(A_1^{\epsilon_1} \cap A_2^{\epsilon_2} \cap \dots \cap A_{n-1}^{\epsilon_{n-1}}) = \frac{1}{2^{n-1}}.$$

Проверим для  $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1})$  (рис. 40).

Покажем, что  $|A_1^{\epsilon_1} \cap \dots \cap A_{n-1}^{\epsilon_{n-1}}| = |A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}| \forall \epsilon_1, \dots, \epsilon_{n-1} = \pm 1$ . Фиксируем все возможные наборы чётности. При разных наборах  $A_i$  и  $\overline{A_i}$



Рис. 38: Слева — ориентации, в которых  $r_1$  — чётное, справа — ориентации, в которых  $r_1$  — нечётное



Рис. 39: Построение биекции



Рис. 40: Построение биекции

не пересекаются. Должны научиться устанавливать биекцию. Есть ориентация, из которой хотим получить хорошую. Взаимно-однозначное соответствие устанавливается путём перебора направлений рёбер, ведущих из

$n$ -ой вершины во все остальные.  $\bigcup_{\epsilon_1, \dots, \epsilon_{n-1} \pm 1} A_1^{\epsilon_1} \cap \dots \cap A_{n-1}^{\epsilon_{n-1}} = \Omega$ ,  
 $P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) = \frac{1}{2^{n-1}}$ .

## Домашнее задание

### 5.15

*Задание.* Из колоды игральных карт наугад вынута одна карта. Найдите вероятность того, что:

- а) эта карта является красной масти, при условии, что она является красной;
- б) порядок карты является выше чем 10, если известно, что она красной масти;
- с) эта карта является тузом, если известно, что она является красной.

*Решение.*

- а) Нужно найти вероятность события  $A$  при условии выполнения события  $B$ . Опишем оба события. Событие  $A = \{\text{вынута карта красной масти}\}$ . Красных карт половина от всего количества. Событие  $B = \{\text{карта является красной}\}$ . Видим, что события  $A$  и  $B$  идентичны, поэтому  $P(A \cap B) = P(A) = P(B)$ . Тогда условная вероятность события равна

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 1;$$

- б) нужно найти вероятность события  $A$  при условии выполнения события  $B$ . Опишем оба события. Событие  $A = \{\text{порядок выбранной карты больше десяти}\}$ . Такими картами является валет, дама, король и туз любой масти. Событие  $B = \{\text{карта является красной}\}$ . Его вероятность равна

$$P(B) = \frac{1}{2}.$$

Пересечение событий  $A$  и  $B$  даёт такие карты как валет, дама, король и туз красных мастей. Вероятность пересечения равна

$$P(A \cap B) = \frac{2 \cdot 4}{52} = \frac{4}{26} = \frac{2}{13}.$$

Тогда условная вероятность события равна

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{2}{13}}{\frac{1}{2}} = \frac{4}{13};$$



- с) нужно найти вероятность события  $A$  при условии выполнения события  $B$ . Опишем оба события. Событие  $A = \{\text{карта является тузом}\}$ . Такими картами являются 4 туза. Событие  $B = \{\text{карта является красной}\}$ . Его вероятность равна

$$P(B) = \frac{1}{2}.$$

Пересечение событий  $A$  и  $B$  даёт два красных туза. Вероятность пересечения равна

$$P(A \cap B) = \frac{2}{52} = \frac{1}{26}.$$

Тогда условная вероятность события равна

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{26}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{26} = \frac{1}{13}.$$

## 5.16

*Задание.* Игральный кубик подбросили дважды. Найдите вероятность того, что сумма очков является больше 7, если известно, что:

- а) при первом подбрасывании выпало одно очко;
- б) при первом подбрасывании выпало меньше, чем 5 очков.

*Решение.* Вероятностное пространство эксперимента, который состоит в подбрасывании игрального кубика дважды, опишем множеством  $\Omega = \{(x, y), x = \overline{1, 6}, y = \overline{1, 6}\}$ , где через  $x$  обозначим количество очков, которые выпали при первом подбрасывании игрального кубика, а через  $y$  — количество очков, которые выпали при втором его подбрасывании. Нам нужно вычислить вероятности  $P(x + y > 7 | x = 1)$  и  $P(x + y > 7 | x < 5)$ . По определению вероятности:

$$P(x + y > 7 | x = 1) = \frac{P(x + y > 7, x = 1)}{P(x = 1)}.$$

Поскольку  $\{(x, y) \in \Omega : x + y > 7, x = 1\} = \emptyset$ , а  $\{(x, y) \in \Omega : x = 1\} = \{(1, y), y = \overline{1, 6}\}$ , то

$$P(x + y > 7 | x = 1) = \frac{0}{\frac{6}{36}} = 0.$$

Далее

$$P(x + y > 7 | x < 5) = \frac{P(x + y > 7, x < 5)}{P(x < 5)}.$$

Понятно, что

$$P(x < 5) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

А для вероятности в числителе имеем:

$$\begin{aligned}
 P(x+y > 7, x < 5) &= \sum_{k=1}^4 P(x=k, k+y > 7) = \\
 &= \sum_{k=1}^4 P(x=k) P(y > 7-k) = P(x=1) P(y > 6) + P(x=2) P(y > 5) + \\
 &+ P(x=3) P(y > 4) + P(x=4) P(y > 3) = \frac{1}{6} \left( 0 + \frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{3}{6} \right) = \frac{1}{6} \cdot \frac{6}{6} = \\
 &= \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.
 \end{aligned}$$

Тут мы воспользовались тем, что результаты первого и второго подбрасываний являются независимыми событиями. Таким образом:

$$P(x+y > 7 | x < 5) = \frac{P(x+y > 5, x < 5)}{P(x < 5)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{4}.$$

### 5.17

*Задание.* Дважды подброшена монета. Рассмотрим следующие события:  $A = \{\text{при первом подбрасывании выпала решка}\}$ ,  $B = \{\text{при втором подбрасывании выпала решка}\}$ ,  $C = \{\text{результат обоих подбрасываний одинаковый}\}$ . Покажите, что события  $A$ ,  $B$ ,  $C$  попарно независимы, но не независимы в совокупности.

*Решение.* События  $A_i$  и  $A_j$  называются попарно независимыми, если для  $\forall i \neq j \rightarrow A_i$  и  $A_j$  — независимы.

Пространством элементарных исходов является множество векторов  $\Omega = \{(i, j), i, j \in \{0, 1\}\}$ , где 0 означает, что выпал герб, 1 — выпала решка,  $i$  — результат первого подбрасывания,  $j$  — результат второго подбрасывания. Пространство элементарных событий содержит  $|\Omega| = 2^2 = 4$  элемента.

Опишем данные события. Событие  $A = \{(1, 0), (1, 1)\}$ . Вероятность выпадения при первом подбрасывании решки равна

$$P(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

Опишем событие  $B = \{(0, 1), (1, 1)\}$ . Вероятность выпадения решки при втором подбрасывании равна

$$P(B) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

Опишем событие  $C = \{(0, 0), (1, 1)\}$ . Вероятность того, что результат двух подбрасываний будет одинаковым, равна

$$P(C) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

Найдём вероятность пересечения событий  $A$  и  $B$ :

$$P(A \cap B) = P(\{(1, 1)\}) = \frac{1}{4}.$$

Найдём произведение вероятностей этих событий:

$$P(A) P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Получаем, что  $P(A \cap B) = P(A) P(B)$ , значит эти события независимы.

Найдём вероятность пересечения событий  $A$  и  $C$ :

$$P(A \cap C) = P(\{(1, 1)\}) = \frac{1}{4}.$$

Найдём произведение вероятностей этих событий:

$$P(A) P(C) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Получаем, что  $P(A \cap C) = P(A) P(C)$ , значит эти события независимы.

Найдём вероятности пересечения событий  $B$  и  $C$ :

$$P(B \cap C) = P(\{(1, 1)\}) = \frac{1}{4}.$$

Найдём произведение вероятностей этих событий:

$$P(B) P(C) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Получаем, что  $P(B \cap C) = P(B) P(C)$ , значит эти события независимы.

События  $A$ ,  $B$ ,  $C$  называются независимыми в совокупности, если имеет место равенство:  $P(A \cap B \cap C) = P(A) P(B) P(C)$ .

Проверим это равенство для данной задачи:

$$P(A \cap B \cap C) = P(\{(1, 1)\}) = \frac{1}{4}.$$

Найдём произведение вероятностей всех трёх событий:

$$P(A) P(B) P(C) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}.$$

Получили, что равенство не выполняется, поэтому события не независимы.

## 5.18

*Задание.* В урне 7 белых и 3 чёрных шарика. Из неё наугад вынимают три шарика. Известно, что среди них есть чёрный шарик. Найдите вероятность того, что два других шарика белые.

*Решение.* Пространство элементарных событий имеет вид  $\Omega = \{(i, j, k) : i, j, k \in \{\text{белый, чёрный}\}, \text{ где } i, j, k \text{ — цвета вытянутых шариков}\}$ . Выпишем все его элементы:  $\Omega = \{(\text{чёрный, чёрный, чёрный}), (\text{чёрный, белый, белый}), (\text{белый, чёрный, белый}), (\text{белый, белый, чёрный}), (\text{чёрный, чёрный, белый}), (\text{чёрный, белый, чёрный}), (\text{белый, чёрный, чёрный}), (\text{белый, белый, белый})\}$ . Видим, что  $|\Omega| = 2^3 = 8$ .

Событие  $B = \{\text{среди выбранных шаров есть чёрный шар}\} = \{(\text{чёрный, чёрный, чёрный}), (\text{чёрный, белый, белый}), (\text{белый, чёрный, белый}), (\text{белый, белый, чёрный}), (\text{чёрный, чёрный, белый}), (\text{чёрный, белый, чёрный}), (\text{белый, чёрный, чёрный}), (\text{белый, белый, белый})\}$ . Вероятность этого события равна

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{7}{8}.$$

Опишем событие  $A = \{\text{два шара белые}\} = \{(\text{чёрный, белый, белый}), (\text{белый, чёрный, белый}), (\text{белый, белый, чёрный}), (\text{белый, белый, белый})\}$ .

Найдём вероятность пересечения событий  $A$  и  $B$  :  $P(A \cap B) = \{(\text{чёрный, белый, белый}), (\text{белый, чёрный, белый}), (\text{белый, белый, чёрный})\}$ .

Тогда условная вероятность события  $A$  при условии, что  $B$  произошло равна

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{8}}{\frac{7}{8}} = \frac{3}{7}.$$

## 5.19

*Задание.* Точка  $\xi = (\xi_1, \xi_2)$  наугад выбрана в квадрате  $[0, 1]^2$ . Пусть  $B = \{\xi_1 + \xi_2 \leq 1\}$ . Вычислите условную вероятность  $P(A|B)$ , если:

- а)  $A = \{|\xi_1 + \xi_2| < 1\}$ ;
- б)  $A = \{\xi_1 \cdot \xi_2 < 1/2\}$ ;
- в)  $A = \{\max\{\xi_1, \xi_2\} < 1/2\}$ ;
- г)  $A = \{\xi_1^2 + \xi_2^2 < 1/4\}$ ;
- д)  $A = \{\xi_1 > \xi_2\}$ .

*Решение.* Вероятностное пространство эксперимента, который состоит в выборе точки в квадрате  $[0, 1]^2$ , опишем множеством

$$\Omega = \{(\xi_1, \xi_2), 0 \leq \xi_1 \leq 1, 0 \leq \xi_2 \leq 1\},$$

где через  $\xi_1$  обозначена первая координата точки, а через  $\xi_2$  — вторая координата.

Вычислим вероятность события  $B$ . Это прямоугольный равнобедренный треугольник с катетами длиной 1. Тогда площадь этой фигуры равна

$$S_B = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{2}.$$

- а) Событие  $A$  — это прямоугольный равнобедренный треугольник с катетами длиной 1. Вероятность пересечения событий  $A$  и  $B$  равна

$$P(A \cap B) = \frac{1}{2}.$$

Тогда условная вероятность равна

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 1;$$

- б) событие  $A$  — это часть квадрата под веткой гиперболы

$$\xi_2 = \frac{1}{2\xi_1}.$$

Вероятность пересечения событий  $A$  и  $B$  равна

$$P(A \cap B) = \frac{1}{2}.$$

Тогда условная вероятность равна

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 1;$$

- с) множество  $A$  — это квадрат со сторонами длиной  $1/2$  (рис. 41). Веро-



Рис. 41: Точки множества  $A$

ятность пересечения событий  $A$  и  $B$  равна

$$P(A \cap B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Тогда условная вероятность равна

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2};$$

- д) множество  $A$  — четвёртая часть круга с радиусом  $1/2$ . Вероятность пересечения событий  $A$  и  $B$  равна

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4} \cdot \pi \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{16}.$$

Тогда условная вероятность равна

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{\pi}{16}}{\frac{1}{2}} = \frac{\pi}{8};$$

- е) множество  $A$  — это равнобедренный прямоугольный треугольник с катетами длиной 1. Вероятность пересечения событий  $A$  и  $B$  равна

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4} \cdot 1^2 = \frac{1}{4}.$$

Тогда условная вероятность равна

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}.$$

## 5.20

*Задание.* Монета, для которой вероятность выпадения решки равна  $p$ , подбрасывается  $n$  раз. Пусть событие  $A$  состоит в том, что решка выпала при первом подбрасывании, а событие  $B_k$  — в том, что выпало ровно  $k$  решек. Для каких пар  $(n, k)$  события  $A$  и  $B_k$  являются независимыми?

*Решение.* Известно, что  $P$  (выпала решка) =  $p$ . Пусть  $\Omega = \{(i_1, i_2, \dots, i_n) : i_j \in \{0, 1\}, j = \overline{1, n}\}$ , где 0 означает, что выпал орёл, 1 — выпала решка. Пространство элементарных исходов содержит  $|\Omega| = 2^n$  элементов.

Запишем событие  $A = \{(i_1, i_2, \dots, i_n) \in \Omega : i_1 = 1\}$ . Запишем событие  $B_k = \left\{ (i_1, i_2, \dots, i_n) \in \Omega : \sum_{j=1}^n i_j = k \right\}$ .

Вероятность события  $A$  составляет  $P(A) = p$ , что равно вероятности выпадения решки.

Вероятность того, что выпадет ровно  $k$  решек равна  $P(B_k) = (C_n^k \cdot p^k) \times (C_{n-k}^{n-k} \cdot (1-p)^{n-k})$ , где  $C_n^k$  — выбор  $k$  монет из  $n$ , которые выпадут решкой,  $p^k$  — вероятность выпадения  $k$  решек,  $C_{n-k}^{n-k}$  — выбор  $(n-k)$  монет из  $(n-k)$ , которые выпадут орлом,  $(1-p)^{n-k}$  — вероятность выпадения орлов на  $(n-k)$  монетах, так как это событие противоположно выпадению решек.

Из условия независимости событий имеем:  $P(A) \cdot P(B_k) = P(A \cap B_k)$ .

Найдём вероятность пересечения:  $P(A \cap B_k) = p \cdot (C_{n-1}^{k-1} \cdot p^{k-1}) \times (C_{n-k}^{n-k} (1-p)^{n-k})$ , где  $p$  — вероятность выпадения решки при первом

подбрасывании монеты,  $C_{n-1}^{k-1}$  — выбор  $k-1$  подбрасывания из  $n-1$ , при котором выпадет решка,  $p^{k-1}$  — вероятность такого выпадения,  $C_{n-k}^{n-k}$  — выбор  $(n-k)$  подбрасываний, среди  $(n-k)$ , при которых выпадут орлы,  $(1-p)^{n-k}$  — вероятность такого выпадения.

Приравниваем полученные соотношения:  $p \cdot (C_n^k \cdot p^k) \times \times (C_{n-k}^{n-k} \cdot (1-p)^{n-k}) = p \cdot (C_{n-1}^{k-1} \cdot p^{k-1}) \cdot (C_{n-k}^{n-k} \cdot (1-p)^{n-k})$ . Отсюда  $C_n^k \cdot p = C_{n-1}^{k-1}$ . Выразим  $p$  из последнего соотношения:  $p = \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} \cdot \frac{k!(n-k)!}{n!} = \frac{k}{n}$ , или  $k = pn$ .

## 5.21

*Задание.* Вероятность безотказной работы реле при перегреве равна 0.95, при вибрации — 0.9, при перегреве и вибрации — 0.8. Найдите вероятность отказа реле, если вероятность перегрева равна 0.2, вероятность вибрации — 0.1, и считая, что перегрев и вибрация являются независимыми событиями.

*Решение.* Пусть событие  $A = \{\text{реле перегрелось}\}$ , событие  $B = \{\text{произошла вибрация}\}$ , событие  $C = \{\text{произошёл отказ реле}\}$ , такие что

$$P(A) = 0.2, P(B) = 0.1, P(\bar{C}|A) = 0.95, P(\bar{C}|B) = 0.9, \\ P(\bar{C}|A \cap B) = 0.2.$$

Распишем условную вероятность:

$$P(\bar{C}|A) = \frac{P(\bar{C} \cap A)}{P(A)} = \frac{P(\bar{C} \cap A)}{0.2} = 0.95.$$

Отсюда  $P(\bar{C} \cap A) = 0.2 \cdot 0.95 = 0.19$ .

Распишем условную вероятность:

$$P(\bar{C}|B) = \frac{P(\bar{C} \cap B)}{P(B)} = \frac{P(\bar{C} \cap B)}{0.1} = 0.9.$$

Отсюда  $P(\bar{C} \cap B) = 0.1 \cdot 0.9 = 0.09$ .

Распишем условную вероятность:

$$P(\bar{C}|A \cap B) = \frac{P(\bar{C} \cap A \cap B)}{P(A \cap B)} = \frac{P(\bar{C} \cap A \cap B)}{P(A)P(B)} = \frac{P(\bar{C} \cap A \cap B)}{0.2 \cdot 0.1} = \\ = \frac{P(\bar{C} \cap A \cap B)}{0.02} = 0.2.$$

Отсюда  $P(\bar{C} \cap A \cap B) = 0.2 \cdot 0.02 = 0.004$ .

Посчитаем  $P(\overline{C \cap A}) = P(C \cup \bar{A}) = P(C) + P(\bar{A}) - P(C \cap \bar{A}) = P(C) + 1 - 0.2 - P(C \cap \bar{A}) = 1 - 0.19$ . Тогда  $P(C) - P(C \cap \bar{A}) = 0.2 - 0.19 = 0.01$ .

Найдём  $P(\overline{C \cap B}) = P(C \cup \overline{B}) = P(C) + P(\overline{B}) - P(C \cap \overline{B}) = P(C) + 1 - 0.1 - P(C \cap \overline{B}) = 1 - 0.09$ . Отсюда  $P(C) - P(C \cap \overline{B}) = 0.1 - 0.09 = 0.01$ .

Найдём  $P(\overline{C \cap A \cap B}) = P(C \cup \overline{A} \cup \overline{B}) = P(C) + P(\overline{A}) + P(\overline{B}) - P(C \cap \overline{A}) - P(C \cap \overline{B}) - P(\overline{A} \cap \overline{B}) + P(C \cap \overline{A} \cap \overline{B}) = P(C) + 1 - 0.2 + 1 - 0.1 - P(C \cap \overline{A}) - P(C \cap \overline{B}) - (1 - 0.2)(1 - 0.1) + P(C \cap \overline{A} \cap \overline{B}) = P(C) - P(C \cap \overline{A}) - P(C \cap \overline{B}) + P(C \cap \overline{A} \cap \overline{B}) + 0.98 = 1 - 0.004 = 0.996$ . Отсюда  $P(C) - P(C \cap \overline{A}) - P(C \cap \overline{B}) + P(C \cap \overline{A} \cap \overline{B}) = 0.016$ .

Составим систему:

$$\begin{cases} P(C) = P(C \cap \overline{A}) + 0.01; \\ P(C) = P(C \cap \overline{B}) + 0.01; \\ P(C) = P(C \cap \overline{B}) - P(C \cap \overline{A} \cap \overline{B}) + P(C \cap \overline{A}) + 0.016. \end{cases}$$

Получили 3 уравнения и 4 неизвестных. Упростим:  $P(C) = P(C) - 0.01 - P(C \cap \overline{A} \cap \overline{B}) + P(C) - 0.01 + 0.016 = 0.006 - P(C \cap \overline{A} \cap \overline{B}) + 2P(C)$ .

Выразим вероятность события  $C$ . Получим:  $P(C) = 0.012 - 0.5P(C \cap \overline{A} \cap \overline{B})$ .

Отсюда  $P(C \cap \overline{A} \cap \overline{B}) = 0.024 - 2P(C)$ .

По формуле включений-исключений:  $P(\overline{C \cap \overline{A} \cap \overline{B}}) = P(\overline{C} \cup A \cup B) = P(\overline{C}) + P(A) + P(B) - P(\overline{C} \cap A) - P(\overline{C} \cap B) - P(A \cap B) + P(\overline{C} \cap A \cap B) = 1 - P(C) + 0.2 + 0.1 - 0.2 \cdot 0.1 + 0.04 = 0.92 - P(C)$ .

Это равно  $0.92 - P(C) = 1 - P(C \cap \overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - 0.024 + 2P(C)$ . Тогда  $0.92 - P(C) = 0.076 + 2P(C)$ . Выразим вероятность события  $C$  из этого уравнения:  $3P(C) = 0.92 - 0.076 = 0.844$ . Отсюда  $P(C) = 0.844/3 = 0.281(3)$ .

## 5.22

*Задание.* Вероятность того, что сервер будет атакован на протяжении дня равна 0.1. Считая, что в разные дни атаки происходят независимо, найти вероятность того, что за неделю сервер:

- будет атакован 2 раза;
- не будет атакован.

*Решение.*

- За неделю сервер будет атакован 2 раза и в остальные 5 дней не будет атакован. Нужно выбрать 2 дня из семи, когда сервер будет атакован — это  $C_7^2$ . Тогда вероятность того, что сервер будет атакован ровно 2 раза за неделю, равна  $P = C_7^2 \cdot (0.1)^2 (1 - 0.1)^5$ ;
- вероятность того, что сервер не будет атакован ни разу за неделю, равна  $P = (1 - 0.1)^7$ .



### 5.23

*Задание.* Пусть событие  $R_i$  состоит в том, что  $i$ -ый игрок в покер имеет на руках «royal flush» (то есть 10, В, Д, К, Т одной масти). Покажите, что наличие одного «royal flush» увеличивает вероятность второго «royal flush», то есть  $P(R_2|R_1) > P(R_2)$ .

*Решение.* Распишем условную вероятность

$$P(R_2|R_1) = \frac{P(R_2 \cap R_1)}{P(R_1)}.$$

Нужно доказать, что  $P(R_2 \cap R_1) > P(R_2)P(R_1)$ .

Найдём вероятность того, что у первого игрока будет на руках «royal flush». Выберем одну масть из четырёх:  $C_4^1$ . Вероятность сочетания равна

$$P(R_1) = \frac{C_4^1}{C_{52}^5}.$$

Найдём вероятность того, что у двух игроков появится «royal flush». Сначала выберем данное сочетание карт одной масти. Остаётся 3 масти. Выбрать одну из них можно  $C_3^1$  способом. Тогда вероятность равна

$$P(R_1 \cap R_2) = \frac{C_4^1 C_3^1}{C_{52}^{10}} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 10! \cdot 42!}{52!} = \frac{12 \cdot 10! \cdot 42!}{52!}.$$

Распишем произведение вероятностей:

$$P(R_1)P(R_2) = \left( \frac{C_4^1}{C_{52}^5} \right)^2 = \left( \frac{4 \cdot 5! \cdot 47!}{52!} \right)^2 = \frac{16 \cdot 5! \cdot 5! \cdot 47! \cdot 47!}{52! \cdot 52!}.$$

Нужно показать, что

$$\frac{12 \cdot 10! \cdot 42!}{52!} > \frac{16 \cdot 5! \cdot 5! \cdot 47! \cdot 47!}{52! \cdot 52!}.$$

Сократим на

$$\frac{4}{52!}$$

и распишем факториалы:

$$3 \cdot 5! \cdot 5 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 42! > \frac{4 \cdot 5! \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 42! \cdot 43 \cdot 44 \cdot 45 \cdot 46 \cdot 47 \cdot 47!}{52!}.$$

Сократим на  $3 \cdot 5 \cdot 5! \cdot 42!$ , а также сократим дробь на  $47!$ . Получим:

$$7 \cdot 8 \cdot 9 > \frac{4 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 43 \cdot 44 \cdot 45 \cdot 46 \cdot 47}{48 \cdot 49 \cdot 50 \cdot 51 \cdot 52} = \frac{32 \cdot 43 \cdot 44 \cdot 45 \cdot 46 \cdot 47}{48 \cdot 49 \cdot 50 \cdot 51 \cdot 52}.$$

Получили, что дробь справа — это 32, умноженное на число меньше единицы. Это число не будет превышать 32. А слева —  $504 > 32$ . Неравенство доказано.

### 5.24

*Задание.* Монета находится в одном из  $n$  ящиков. Вероятность того, что она в  $i$ -м ящике равна  $p_i$ . Если вы будете искать монету в  $i$ -м ящике и она действительно там, вы найдёте её с вероятностью  $a_i$ . Покажите, что вероятность  $p$  того, что монета находится в  $j$ -м ящике, при условии, что вы искали и не нашли её в  $i$ -м ящике, равна

$$p = \begin{cases} \frac{p_j}{1-p_i a_i}, & i \neq j, \\ \frac{(1-a_i)p_i}{1-p_i a_i}, & i = j. \end{cases}$$

*Решение.* Пусть Событие  $B = \{\text{монета находится в } j\text{-м ящике}\}$ . Его вероятность равна  $P(B) = p_j$ . Событие  $A = \{\text{находим монету в } i\text{-м ящике}\}$ , т.е. мы её ищем, находим, монета там лежит. Его вероятность равна  $P(A) = p_i a_i$ .

Пусть  $i \neq j$ . Вероятность пересечения событий  $\bar{A}$  и  $B$  означает, что монета находится в каком-то  $j$ -м ящике. Тогда условная вероятность события  $B$  при условии, что произошло событие  $\bar{A}$ , равна

$$P(B|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(\bar{A})} = \frac{p_j}{1-p_i a_i}.$$

Рассмотрим случай, когда  $i = j$ . Тогда мы не находим её в  $i$ -м ящике, но она там находится. Вероятность в этом случае равна

$$p = \frac{(1-a_i)p_i}{1-p_i a_i}.$$

### 5.25

*Задание.* Допустим, что  $A$  и  $B$  такие события, что  $P(A|B) = P(B|A)$ ;  $P(A \cup B) = 1$ ;  $P(A \cap B) > 0$ . Докажите, что  $P(A) > 1/2$ .

*Решение.* Распишем условные вероятности:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

По условию задачи это равно

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Отсюда видим, что  $P(A) = P(B)$ .

По формуле включений-исключений:  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 1$ . Выразим отсюда вероятность события  $A$ . Имеем:

$$P(A) = \frac{1}{2} + \frac{P(A \cap B)}{2}.$$

По условию  $P(A \cap B) > 0$ . Поэтому

$$P(A) > \frac{1}{2}.$$

### 5.26

*Задание.* Пусть события  $A$  и  $B$  независимы и  $A \subset B$ . Докажите, что или  $P(A) = 0$ , или  $P(B) = 1$ .

*Решение.* Так как события независимы, то справедлива формула  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ . Так как  $A \subset B$ , то  $A \cap B = A$ . Поэтому  $P(A \cap B) = P(A) = P(A)P(B)$ .

Если  $P(A) \neq 0$ , то можно на него сократить, тогда  $P(B) = 1$ . Иначе  $P(A) = 0$ , тогда  $P(B) \in (0, 1)$ .

### 5.27

*Задание.* Докажите, что  $P(A_1 \dots A_n | C) = P(A_1 | C)P(A_2 | A_1 C) \dots \cdot P(A_n | A_1 A_2 \dots A_{n-1} C)$ .

*Решение.* Распишем левую часть:

$$P(A_1 \dots A_n | C) = \frac{P(A_1 \dots A_n C)}{P(C)}.$$

Распишем правую часть:

$$\begin{aligned} P(A_1 | C)P(A_2 | A_1 C) \dots P(A_n | A_1 A_2 \dots A_{n-1} C) &= \\ = \frac{P(A_1 C)}{P(C)} \cdot \frac{P(A_1 A_2 C)}{P(A_1 C)} \dots \frac{P(A_1 A_2 \dots A_{n-1} A_n C)}{P(A_1 A_2 \dots A_{n-1} C)}. \end{aligned}$$

Всё кроме числителя последней дроби и знаменателя первой дроби сокращается. Получаем то, что требовали:

$$P(A_1 | C)P(A_2 | A_1 C) \dots P(A_n | A_1 A_2 \dots A_{n-1} C) = \frac{P(A_1 A_2 \dots A_{n-1} A_n C)}{P(C)}.$$

А это равно левой части.

### 5.28

*Задание.* Пусть событие  $A$  такое, что  $P(A)$  равно 0 или 1. Докажите, что  $A$  и произвольное событие  $B$  независимы.

*Решение.*  $P(A) = 0$  или  $P(A) = 1 \Rightarrow \forall B, \quad A \text{ и } B \text{ — независимы.}$

1.  $P(A) = 0$ . Тогда  $P(A)P(B) = 0$ . Вероятность пересечения  $P(A \cap B) \leq$

$$\leq P(A) \Rightarrow P(A \cap B) = 0;$$

2. Рассмотрим случай, когда  $P(A) = 1 \Rightarrow P(\bar{A}) = 0$ . По предыдущему пункту  $P(\bar{A} \cap B) = 0 \Rightarrow P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) \Rightarrow \Rightarrow P(A \cap B) = P(B) = P(A) \cdot P(B) = 1 \cdot P(B) = P(B)$ .



# Занятие 6. Формула полной вероятности. Формула Байеса

## Контрольные вопросы и задания

Приведите определение полной группы гипотез.

Набор случайных событий  $H_1, \dots, H_n$  называется полным набором гипотез, если выполнены следующие условия:

1.  $P(H_i) > 0, i = \overline{1, n}$ ;
2.  $H_i \cap H_j = \emptyset, i \neq j$  (они несовместны);
3.  $\bigcup_{i=1}^n H_i = \Omega$ .

Запишите формулу для вычисления условной вероятности, формулу полной вероятности, формулу Байеса.

Условная вероятность события  $A$  при условии, что событие  $B$  произошло — это выражение

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Формула полной вероятности:  $P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|H_i)P(H_i)$ .

Формула Байеса:

$$P(H_i|A) = \frac{P(A|H_i)P(H_i)}{\sum_{k=1}^n P(A|H_k)P(H_k)}.$$

**Когда применяется формула полной вероятности, формула Байеса?**

В формуле полной вероятности содержатся априорные вероятности. Формула Байеса переоценивает вероятности гипотез — апостериорные вероятности.

## Аудиторные задачи

### 6.3

*Задание.* В первой урне находятся 1 белый и 4 красных шара, а во второй урне — 2 белых и 7 красных шаров. Из второй урны наугад вынули 1 шар и переложили её в первую урну. После этого из первой урны наугад вынули 1 шар. Найдите вероятность того, что этот шар окажется красным.

*Решение.* Введём событие  $A = \{\text{шар, вынутый из первой урны после перекладывания одного шара из другой урны, окажется красным}\}$  и сделаем гипотезы о том, какого цвета шар переложили:  $H_1 = \{\text{из второй урны переложили в первую белый шар}\}$ ,  $H_2 = \{\text{из второй урны переложили в первую красный шар}\}$ .

Проверяем, что это полная группа гипотез:

$$P(H_1) = \frac{2}{9} > 0, P(H_2) = \frac{7}{9} > 0.$$

События не могут произойти одновременно.  $P(H_1) + P(H_2) = 1$ . Поэтому имеем полную группу гипотез.

Найдём условные вероятности:

$$P(A|H_1) = \frac{4}{6}, P(A|H_2) = \frac{5}{6}.$$

Значит по формуле полной вероятности:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(H_1)P(A|H_1) + P(H_2)P(A|H_2) = \frac{2}{9} \cdot \frac{4}{6} + \frac{7}{9} \cdot \frac{5}{6} = \\ &= \frac{2}{9} \cdot \frac{2}{3} + \frac{7}{9} \cdot \frac{5}{6} = \frac{4}{27} + \frac{35}{54} = \frac{8+35}{54} = \frac{43}{54}. \end{aligned}$$

### 6.4

*Задание.* Из урны, которая содержит 3 чёрных и 2 белых шара, наугад вынуты два шара и переложены в другую урну, которая содержит 4 чёрных и 4 белых шара. Найдите вероятность того, что:

- а) шар, вынутый после этого наугад из второй урны, окажется белым;
- б) из первой урны переложили в другую два чёрных шара, при условии, что шар, вынутый после этого из второй урны, оказался белым.

*Решение.* В первой урне содержится 3 чёрных и 2 белых шара, во второй — 4 чёрных и 4 белых.

- а) Введём событие  $A = \{\text{вынутый из второй урны после переложения шар окажется белым}\}$ .

Есть 3 разные гипотезы:  $H_1 = \{\text{переложили 2 белых шара}\}$ ,  $H_2 = \{\text{переложили 2 чёрных шара}\}$ ,  $H_3 = \{\text{переложили 1 белый и 1 чёрный шар}\}$ .

Находим вероятности этих гипотез:

$$P(H_1) = \frac{C_2^2}{C_5^2} = \frac{2! \cdot 3!}{5!} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 3}{2 \cdot 3 \cdot 4} = \frac{1}{2 \cdot 5} = \frac{1}{10} > 0;$$

$$P(H_2) = \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3!}{2!} \cdot \frac{2! \cdot 3!}{5!} = \frac{3}{10} > 0;$$

$$P(H_3) = \frac{C_3^1 \cdot C_2^1}{C_5^2} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} = \frac{3}{5} > 0.$$

В сумме вероятности гипотез дают единицу. Гипотезы не могут одновременно происходить, поэтому они являются полным набором гипотез.

Найдём условные вероятности:

$$P(A|H_1) = \frac{6}{10}, P(A|H_2) = \frac{4}{10}, P(A|H_3) = \frac{1}{2}.$$

По формуле полной вероятности:

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{1}{10} \cdot \frac{6}{10} + \frac{2}{10} \cdot \frac{4}{10} + \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{10} \cdot \frac{3}{5} + \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{5} + \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} = \\ &= \frac{3}{50} + \frac{6}{50} + \frac{3}{10} = \frac{3+6+15}{50} = \frac{24}{50} = \frac{12}{25}; \end{aligned}$$

- б)  $A$  стало условием. Знаем, что это событие произошло. По формуле Байеса:

$$\begin{aligned} P(H_2|A) &= \frac{P(H_2)P(A|H_2)}{P(H_1)P(A|H_1) + P(H_2)P(A|H_2) + P(H_3)P(A|H_3)} = \\ &= \frac{P(H_2)P(A|H_2)}{P(A)} = \frac{3}{10} \cdot \frac{4}{10} \cdot \frac{25}{12} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

## 6.5

*Задание.* Некоторое изделие выпускается двумя заводами, причём объём продукции первого завода в 3 раза больше объёма продукции второго завода. Доля бракованных изделий составляет 0.1 на первом заводе, и 0.05 — на втором. Изделия, выпущенные обоими заводами за одинаковый промежуток времени, смешали и пустили в продажу. Вы приобрели такое изделие. Найдите вероятность того, что изделие было изготовлено на первом заводе, если оно окажется:

а) качественным;

б) бракованным.

*Решение.*

а) Это задача на формулу Байеса. Нам известно, что изделие оказалось качественным:  $A = \{\text{изделие оказалось качественным}\}$ . Гипотезы:  $H_1 = \{\text{изготовили это изделие на первом заводе}\}$ ,  $H_2 = \{\text{это изделие изготовили на втором заводе}\}$ . Нужно найти  $P(H_1|A)$ . Вероятности гипотез:

$$P(H_1) = \frac{3}{4}, P(H_2) = \frac{1}{4}.$$

Условные вероятности:  $P(A|H_1) = 0.9$ ,  $P(A|H_2) = 0.095$ . По формуле полной вероятности:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(H_1)P(A|H_1) + P(H_2)P(A|H_2) = \frac{3}{4} \cdot 0.9 + \frac{1}{4} \cdot 0.095 = \\ &= \frac{3}{4} \cdot \frac{9}{10} + \frac{1}{4} \cdot \frac{95}{100} = \frac{27}{40} + \frac{95}{400} = \frac{365}{400} = \frac{73}{80}. \end{aligned}$$

Применяем формулу Байеса:

$$P(H_1|A) = \frac{P(A|H_1)P(H_1)}{P(A)} = \frac{9}{10} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{80}{73} = \frac{27 \cdot 2}{73} = \frac{54}{73};$$

б) введём событие  $B = \{\text{изделие оказалось бракованным}\}$ . Условные вероятности:  $P(B|H_1) = 0.1$ ,  $P(B|H_2) = 0.05$ . События  $A$  и  $B$  — противоположные:

$$P(B) = 1 - P(A) = 1 - \frac{73}{80} = \frac{7}{80}.$$

По формуле Байеса:

$$P(H_1|B) = \frac{P(B|H_1)P(H_1)}{P(B)} = \frac{1}{10} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{80}{7} = \frac{3 \cdot 2}{7} = \frac{6}{7}.$$

## 6.6

*Задание.* Три приятеля — Андрей, Борис и Володя — пришли в тир. Андрей попадает в мишень с вероятностью  $3/5$ , Борис — с вероятностью  $1/2$ , а Володя — с вероятностью  $2/5$ . Одновременно они выстрелили по мишени и две пули попали. Что вероятнее: попал Володя в мишень или нет?

*Решение.* Введём событие  $A = \{2 \text{ выстрела из трёх оказались точными}\}$ . Введём гипотезы:  $H_1 = \{\text{Володя попал}\}$ ,  $H_2 = \{\text{Володя не попал}\}$ . Их вероятности равны

$$P(H_1) = \frac{2}{5}, P(H_2) = \frac{3}{5}.$$



Условные вероятности:  $P(A|H_1) = P(\{\text{или Андрей попал, Борис — нет, или Андрей не попал, а Бори попал}\})$ . События несовместные.

$$P(A|H_1) = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{10} + \frac{2}{10} = \frac{1}{2};$$

$$P(A|H_2) = P(\{\text{Андрей и Борис попали}\}) = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{10}.$$

По формуле Байеса:

$$P(H_1|A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{P(A)} = \frac{1}{5P(A)}, P(H_2|A) = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{P(A)} = \frac{9}{50P(A)}.$$

Имеем, что  $P(H_1|A) > P(H_2|A) \Rightarrow$  более вероятно, что Володя попал при этих двух точных выстрелах.

## 6.7

*Задание.* Группа студентов, которые сдают экзамен, состоит из 5 отличников, 10 хороших студентов и 15 слабых студентов; отличник всегда получает оценку «отлично», хороший студент — оценки «отлично» и «хорошо» с одинаковыми вероятностями, слабый студент — «хорошо» и «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» с одинаковыми вероятностями. Найдите вероятность того, что наугад выбранный студент получит оценку:

- а) «отлично»;
- б) «хорошо».

*Решение.*

- а) Введём событие  $A = \{\text{наугад выбранный студент получит «отлично»}\}$ . Сделаем гипотезы:  $H_1 = \{\text{выбранный студент — отличник}\}$ ,  $H_2 = \{\text{выбранный студент — хороший}\}$ ,  $H_3 = \{\text{выбранный студент — слабый}\}$ . Их вероятности равны:

$$P(H_1) = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}, P(H_2) = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}, P(H_3) = \frac{15}{30} = \frac{1}{2}.$$

Условные вероятности:

$$P(A|H_1) = 1, P(A|H_2) = \frac{1}{2}, P(A|H_3) = 0.$$

Таким образом,

$$P(A) = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3};$$

- б) введём событие  $B = \{\text{студент получает «хорошо»}\}$ . Условные вероятности:

$$P(B|H_1) = 0, P(B|H_2) = \frac{1}{2}, P(B|H_3) = \frac{1}{3}.$$

Таким образом,

$$P(B) = 0 \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}.$$

## 6.8

*Задание.* Допустим, что частоты генотипов  $AA$ ,  $Aa$  и  $aa$  в некоторой популяции равны  $p^2$ ,  $2pq$  и  $q^2$  соответственно ( $p + q = 1$ , генотипы  $Aa$  и  $aA$  считаются одинаковыми). Известно, что кто-то имеет генотип  $Aa$ . Докажите, что вероятность того, что генотип его брата тоже  $Aa$ , равна  $(1 + pq)/2$ .

*Решение.*  $AA$  — доминантный генотип,  $aa$  — рецессивный,  $Aa$  — гибридный.

Братья имеют одних и тех же родителей. Допустим, мама имеет генотип  $AA$ , а папа —  $Aa$ . Возможные случаи для ребёнка:  $AA$ ,  $Aa$ .

Каждая буква выбирается с вероятностью  $1/2$ . Если зафиксировать генотипы родителей, то генотипы братьев будут условно независимыми. Но они зависимы через родителей.

Частоты генотипов:  $AA = p^2$ ,  $Aa = 2pq$ ,  $aa = q^2$ , где  $p + q = 1$ .

Пусть событие  $B = \{\text{генотип одного из братьев} = Aa\}$ . Введём гипотезы:

Гипотеза	Генотип 1	Генотип 2	$P(H_i)$	$P(B H_i)$
$H_1$	$AA$	$AA$	$p^4$	0
$H_2$	$AA$	$Aa$	$2p^3q$	$\frac{1}{4}$
$H_3$	$AA$	$aa$	$p^2q^2$	1
$H_4$	$Aa$	$AA$	$2p^3q$	$\frac{1}{4}$
$H_5$	$Aa$	$Aa$	$4p^2q^2$	$\frac{1}{4}$
$H_6$	$Aa$	$aa$	$2pq^3$	$\frac{1}{4}$
$H_7$	$aa$	$AA$	$p^2q^2$	1
$H_8$	$aa$	$Aa$	$2pq^3$	$\frac{1}{4}$
$H_9$	$aa$	$aa$	$q^4$	0

Перемножаем 2 последних столбца и складываем. Получим вероятность того, что у обоих братьев генотипы  $Aa$ :

$$\begin{aligned}
 & 2p^3q \cdot \frac{1}{4} + p^2q^2 \cdot 1 + 2p^3q \cdot \frac{1}{4} + 4p^2q^2 \cdot \frac{1}{4} + 2pq^3 \cdot \frac{1}{4} + p^2q^2 \cdot 1 + 2pq^3 \cdot \frac{1}{4} = \\
 & = p^3q + 3p^2q^2 + pq^3 = pq(p^2 + 3pq + q^2) = pq[(p^2 + 2pq + q^2) + pq] = \\
 & = pq(1 + pq).
 \end{aligned}$$

Тогда вероятность равна:

$$\frac{pq(1 + pq)}{2pq} = \frac{1 + pq}{2}.$$

## 6.9

*Задание.* Частица совершает случайное симметрическое блуждание на числовой оси, делая шаг вправо или влево с вероятностью  $1/2$ . Найдите вероятность того, что частица, которая стартовала из точки  $x$ , рано или поздно попадёт в точку 0.

*Решение.* Из каждой точки частица с одинаковой вероятностью перемещается вправо и влево (рис. 42).



Рис. 42: Возможные движения частицы

Частица перемещается на шаг вправо или влево. Получаем аналогичную задачу для  $x + 1$  или  $x - 1$ .

Пусть  $f(x)$  — вероятность того, что частица из  $x$  попала в 0. Введём гипотезы:  $H_1 = \{\text{частица сделает шаг вправо из точки } x\}$ ,  $H_2 = \{\text{частица сделает шаг влево из точки } x\}$ . Введём событие  $A = \{\text{частица из } x \text{ перейдёт в } 0\}$ . Вероятности гипотез равны

$$P(H_1) = P(H_2) = \frac{1}{2}.$$

По формуле полной вероятности:

$$P(A) = \frac{1}{2} \cdot P(A|H_1) + \frac{1}{2} P(A|H_2).$$

Имеем уравнение:

$$f(x) = \frac{1}{2} \cdot f(x+1) + \frac{1}{2} \cdot f(x-1).$$

Уравнение описывает прямую  $f(x) = ax + b$ . Поскольку  $f(0) = 1$ , значит  $b = 1$ . Значит  $f(x) = ax + 1$ . Вероятность  $f(x) \in [0, 1]$ . Только прямая  $y = 1$  (43) удовлетворяет условию  $f(x) \leq 1 \Rightarrow a = 0$ .



Рис. 43: Возможные движения частицы

Таким образом  $f(x) = 1$ .

## 6.10

*Задание.* Рассмотрим последовательность независимых экспериментов, в каждом из которых некоторое событие — «успех» происходит с вероятностью  $p$ , а противоположное событие — «неудача» — происходит с вероятностью  $q = 1 - p$ . Найдите вероятность того, что два последовательных «успеха» произойдут раньше трёх последовательных «неудач».

*Решение.* Следим за событием, которое заканчивается «успехом» или «неудачей». Количество экспериментов не ограничено. Введём гипотезы:  $H_1 = \{\text{первым был «успех»}\}$ ,  $H_2 = \{\text{первой была «неудача»}\}$ . Условные вероятности:  $x = P(A|H_1)$ ,  $y = P(A|H_2)$ . Основное событие  $A = \{2 \text{ последовательных «успеха» произойдут раньше чем 3 последовательные «неудачи»}\}$ . Вероятности гипотез:  $P(H_1) = p$ , а  $P(H_2) = q = 1 - p$ . Вероятность того, что событие  $A$  произойдёт при том, что первый эксперимент завершился «успехом», равна  $P(A|<<y>>) = P(A|<<yy>>)P(\text{«успех» во втором эксперименте}) + P(\text{«неудача» во втором эксперименте})P(A|<<yn>>) = x$ . Вероятность того, что произойдёт событие  $A$  при том, что в первом эксперименте будет «неудача», равна  $P(A|<<n>>) = y$ . Условная вероятность события  $A$  при условии, что первый эксперимент завершился «успехом», равна  $x = p \cdot 1 + (1 - p)y$ , где  $y = p(1 - p)y + p^2 + (1 - p)px$ . Есть система уравнений:

$$\begin{cases} x = p + (1 - p)y, \\ y = p(1 - p)y + p^2 + (1 - p)px. \end{cases}$$

Подставим  $x$ , получим уравнение относительно  $y$ :  $P(A) = px + qy$ .

## 6.11

*Задание.* Подводная лодка атакует корабль, выпуская по нему последовательно и независимо друг за другом  $n$  торпед. Каждая торпеда попадает в корабль с вероятностью  $p$  и, попав, — с одинаковыми вероятностями поражает один из  $m$  отсеков, на которые разделена подводная часть корабля. Корабль идёт на дно, если поражено не меньше двух отсеков. Найдите вероятность того, что корабль потопят.

*Решение.* Введём событие  $A = \{\text{корабль потопят}\}$ .

Введём гипотезы  $H_i = \{\text{в корабль попало } i \text{ торпед}\}$ ,  $i = 0, 1, 2, \dots, n$ . Условные вероятности события  $A$  при том, что в корабль попадёт 0 или 1 торпеда, равны  $P(A|H_0) = 0$ ,  $P(A|H_1) = 0$ . Рассмотрим вероятности того, что в 1 отсек попало  $i$  торпед:  $1/m^2$  — вероятность затопления одного и того же отсека при попадании двух торпед,  $1/m^3$  — вероятность затопления одного и того же отсека при попадании трёх торпед,  $\dots$ ,  $1/m^3$  — вероятность затопления одного и того же отсека при попадании  $n$  торпед.

Предположим, что в корабль попало  $t$  торпед. При этом: первая торпеда попала в один и тот же отсек, что и другие (а других пока нет) с вероятностью 1, 2-ая после 1-ой ракеты — с вероятностью  $1/m$ , 3-ая после 2-ой — с вероятностью  $1/m^2, \dots, t$ -ая с вероятностью  $1/m^{t-1}$ .

Следовательно:

$$P(A|H_t) = 1 - \frac{1}{m^{t-1}}, \quad t \leq 1;$$

По формуле полной вероятности:

$$P(A) = C_n^2 p^2 q^{n-2} \left(1 - \frac{1}{m}\right) + C_n^3 p^3 q^{n-3} \left(1 - \frac{1}{m^2}\right) + \dots + C_n^n p^n \left(1 - \frac{1}{m^n}\right) = \sum_{i=2}^n C_n^i p^i q^{n-i} \left(1 - \frac{1}{m^{i-1}}\right).$$

## Дополнительные задачи

### 6.12

*Задание.* В волейболе команда может получить очко только на собственной подаче. Поэтому каждая подача заканчивается или получением одного очка командой, которая подавала мяч, или переходом подачи другой команде. Выигрывает та команда, которая первой получит  $N$  очков. Допустим, что команды имеют одинаковую вероятность  $p > 0$  получить очко на собственной подаче. Покажите, что в этом случае команда, которая подаёт первой, имеет большие шансы на выигрыш. (Указание: введите в рассмотрение вероятность  $p'$  того, что команда получит следующее очко, при условии, что она подаёт).

*Решение.* Вероятность того, что команда получит очко при своей подаче равна  $p$ . Если эта команда не получает очко при подаче, то подача переходит другой команде — вероятность равна  $1 - p$ .

Есть такие состояния:  $A_1$  — команда забила,  $A_0$  — перешёл мяч команде  $B$ ,  $B_1$  — команда  $B$  забила,  $B_0$  — перешёл мяч команде  $A$ .

Начальное состояние — у команды мяч — состояние  $A$ . При этом  $P(B_1) = P(B_0) = 0$ . Нужно составить матрицу переходов. Строки — текущее состояние, колонки — то, в которое можно перейти.

	$A$	$A_1$	$A_0$	$B$	$B_1$	$B_0$
$A$	0	$p$	$1 - p$	0	0	0
$A_1$	1	0	0	0	0	0
$A_0$	0	0	0	1	0	0
$B$	0	0	0	0	$p$	$1 - p$
$B_1$	0	0	0	1	0	0
$B_0$	1	0	0	0	0	0

Команды работают абсолютно одинаково. Если игра начнётся в состоянии  $A$ , то вероятность пройти  $N$  раз через состояние  $A_1$  такая же как начать игру в состоянии  $B$  и пройти  $N$  раз через состояние  $B_1$ . Начали в состоянии  $A$ . Пусть есть вероятность  $p_A^N$  того, что команда  $A$  начала и забила первая  $N$  голов. Тогда с вероятностью  $p \cdot p_A^{N-1}$  она забьёт  $N$  голов при условии, что в первый раз она забила. Вероятность того, что команда  $B$  первой забьёт  $N$  голов обозначим  $p_B^N = p_A^N (1 - p) + p^k (1 - p) x$ , где  $k$  — количество голов, которые успела забить команда  $A$ , а это не меньше чем  $p_A^N$ ,  $x$  — вероятность

того, что команда  $B$  забьёт первая  $N$  голов при условии, что команда  $A$  уже забила  $k$  голов.

## Домашнее задание

### 6.13

*Задание.* В первой урне содержатся 1 белый и 9 чёрных шаров; во второй урне — 1 чёрный и 5 белых шаров. Из каждой урны наугад вынута по одному шару, а остальные пересыпали в третью урну. Найдите вероятность того, что шар, вынутый наугад из третьей урны, окажется белым.

*Решение.* Введём полную группу гипотез:  $H_1 = \{\text{из обеих урн вынули по одному белому шару}\}$ ;  $H_2 = \{\text{из первой урны достали 1 белый шар и из второй — 1 чёрный шар}\}$ ;  $H_3 = \{\text{из обеих урн вынули по одному чёрному шару}\}$ ;  $H_4 = \{\text{из первой урны достали 1 чёрный шар и из второй урны — 1 белый шар}\}$ . Определим вероятности этих гипотез:

$$P\{H_1\} = \frac{1}{10} \cdot \frac{5}{6} = \frac{1}{12}, \quad P\{H_2\} = \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{60}, \quad P\{H_3\} = \frac{9}{10} \cdot \frac{1}{6} = \frac{3}{10 \cdot 2} = \frac{3}{20},$$

$$P\{H_4\} = \frac{9}{10} \cdot \frac{5}{6} = \frac{3}{4}.$$

Введём событие  $A = \{\text{из третьей урны вытянули белый шар}\}$ . В то же время

$$P\{A|H_1\} = \frac{4}{14} = \frac{2}{7}, \quad P\{A|H_2\} = \frac{5}{14} = P\{A|H_4\}, \quad P\{A|H_3\} = \frac{6}{14} = \frac{3}{7}.$$

Согласно с формулой полной вероятности  $P\{A\} = \sum_{i=1}^{\infty} P\{H_i\} \cdot P\{A|H_i\}$  имеем

$$P\{A\} = \frac{1}{12} \cdot \frac{2}{7} + \frac{1}{60} \cdot \frac{5}{14} + \frac{3}{20} \cdot \frac{3}{7} + \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{14} = \frac{38}{105}.$$

### 6.14

*Задание.* Два стрелка стреляют по мишени. Один из них попадает в 5 случаях, а другой — в 8 случаях из 10. Перед выстрелом они подбрасывают правильную монету для определения очередности. Сторонний наблюдатель знает условия стрельбы, но не видит, кто в данный момент стреляет. Он видит, что стрелок попал по мишени. Найдите вероятность того, что стрелял первый стрелок.

*Решение.* Первый стрелок попадает по мишени с вероятностью

$$P(A|H_1) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2},$$

второй стрелок — с вероятностью

$$P(A|H_2) = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}.$$

Априорные вероятности этих гипотез одинаковы:

$$P(H_1) = P(H_2) = \frac{1}{2}.$$

Рассмотрим событие  $A = \{\text{стрелок попал в цель}\}$ . Поэтому вероятность стрелять первому стрелку по формуле Байеса равна

$$\begin{aligned} P(H_1|A) &= \frac{P(A|H_1)P(H_1)}{P(A|H_1)P(H_1) + P(A|H_2)P(H_2)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4} + \frac{2}{5}} = \\ &= \frac{\frac{1}{4}}{\frac{5+8}{20}} = \frac{20}{4 \cdot 13} = \frac{5}{13}. \end{aligned}$$

### 6.15

*Задание.* Среди  $N$  экзаменационных билетов есть  $n$  «счастливых». Студенты подходят за билетами по одному. У кого больше шансов вынуть счастливый билет: у того, кто подошёл первым, или у того, кто подошёл вторым? Найдите вероятность того, что студент, который подошёл первым, вынул счастливый билет, если известно, что студент, который подошёл вторым, вынул счастливый билет.

*Решение.* Если студент сдаёт экзамен первым, то вероятность вынуть счастливый билет равна  $n/N$ . Рассмотрим ситуацию, когда он сдаёт вторым. Введём гипотезы:  $H_1$  — первый забрал «счастливый» билет,  $H_2$  — первый не забрал «счастливый» билет. Событие  $A = \{\text{студент сдал экзамен}\}$ .

$$\begin{aligned} P(A|H_1) &= \frac{n-1}{N-1}, \quad P(A|H_2) = \frac{n}{N-1}, \quad P(H_1) = \frac{n}{N}, \quad P(H_2) = 1 - \frac{n}{N} = \\ &= \frac{N-n}{N}. \end{aligned}$$

Используем формулу полной вероятности:

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{n-1}{N-1} \cdot \frac{n}{N} + \frac{n}{N-1} \cdot \frac{N-n}{N} = \frac{n}{N(N-1)} \cdot (n-1 + N-n) = \\ &= \frac{n(N-1)}{N(N-1)} = \frac{n}{N}. \end{aligned}$$

Вывод: без разницы, когда сдавать.

Вероятность того, что студент, который пошёл первым, вынул счастливый билет, если известно, что студент, который пошёл вторым, вынул счастливый билет:

$$\begin{aligned} P(H_1|A) &= \frac{P(A|H_1)P(H_1)}{P(A|H_1)P(H_1) + P(A|H_2)P(H_2)} = \\ &= \frac{\frac{n-1}{N-1} \cdot \frac{n}{N}}{\frac{n-1}{N-1} \cdot \frac{n}{N} + \frac{n}{N-1} \cdot \frac{N-n}{N}} = \frac{\frac{n-1}{N-1} \cdot \frac{n}{N}}{\frac{n}{N(N-1)} \cdot (n-1 + N-n)} = \frac{n-1}{N-1}. \end{aligned}$$

### 6.16

*Задание.* На вход радиолокационного устройства с вероятностью 0.4 попадает сигнал с шумом и с вероятностью 0.6 — только шум. Если попадает сигнал с шумом, то устройство регистрирует наличие сигнала с вероятностью 0.7, а если попадает только шум, то устройство регистрирует наличие сигнала с вероятностью 0.5. Известно, что устройство зарегистрировало сигнал. Найдите вероятность того, что сигнал действительно попал на вход радиолокационного устройства.

*Решение.* Введём событие  $A = \{\text{устройство зарегистрировало наличие сигнала}\}$  и сделаем гипотезы о том, какой же сигнал попал на радиолокационное устройство:  $H_1 = \{\text{попал сигнал с шумом}\}$ ,  $H_2 = \{\text{попал только шум}\}$ . Нам нужно найти условную вероятность  $P(H_1|A)$ . По формуле Байеса:

$$\begin{aligned} P(H_1|A) &= \frac{P(A|H_1)P(H_1)}{P(A|H_1)P(H_1) + P(A|H_2)P(H_2)} = \frac{0.7 \cdot 0.4}{0.7 \cdot 0.4 + 0.5 \cdot 0.6} = \\ &= \frac{7 \cdot 4}{7 \cdot 4 + 5 \cdot 6} = \frac{7 \cdot 2}{7 \cdot 2 + 5 \cdot 3} = \frac{14}{14 + 15} = \frac{14}{29}. \end{aligned}$$

### 6.17

*Задание.* В Лондоне в половину дней года идёт дождь. Прогноз погоды сбывается в  $2/3$  случаев, то есть условная вероятность того, что будет идти дождь, при условии, что его прогнозировали, и условная вероятность того, что дождя не будет, при условии, что его не прогнозировали, равны  $2/3$ . Если прогнозируют дождь, мистер Пиквик всегда берёт зонт. Если же дождь не прогнозируют, то мистер Пиквик берёт зонт с вероятностью  $1/3$ . Найдите вероятность того, что:

- а) мистер Пиквик не имеет зонта, при условии, что идёт дождь;
- б) дождя нет, при условии, что мистер Пиквик имеет зонт.

*Решение.* Выберем событие  $A = \{\text{мистер Пиквик берёт зонт}\}$  и сделаем гипотезы о том, будет или нет дождь, прогнозировали его или нет:  $H_1 = \{\text{дождь прогнозировали}\}$ ,  $H_2 = \{\text{дождь не прогнозировали}\}$ ,  $X_1 = \{\text{идёт дождь}\}$ ,  $X_2 = \{\text{дождь не идёт}\}$ . Есть такие условия:

$$\begin{aligned} P(X_1) &= P(X_2) = \frac{1}{2}, \quad P(X_1|H_1) = \frac{2}{3}, \\ P(X_2|H_2) &= \frac{2}{3}, \quad P(A|H_1) = 1, \quad P(A|H_2) = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

- а) Нужно найти условную вероятность  $P(\bar{A}|X_1)$ . Найдём сначала вероятность того, что идёт дождь. По формуле полной вероятности:  $P(X_1) = P(X_1|H_1)P(H_1) + P(X_1|H_2)P(H_2) = P(H_1)P(X_1|H_1) + (1 - P(H_1))P(X_2|H_2) = P(H_1) \cdot \frac{2}{3} + (1 - P(H_1)) \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \cdot P(H_1) +$



$+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\cdot P(H_1)=\frac{1}{3}\cdot P(H_1)+\frac{1}{3}=\frac{1}{2}$ . Умножим полученное равенство на 6:  $2P(H_1)+2=3$ . Перенесём двойку в правую сторону:  $2P(H_1)=3-2=1$ . Выразим вероятность:

$$P(H_1)=\frac{1}{2}.$$

Требуемая условная вероятность равна

$$\begin{aligned} P(\bar{A}|X_1) &= \frac{P(\bar{A}\cap X_1|H_1)P(H_1)+P(\bar{A}\cap X_1|H_2)P(H_2)}{P(X_1)} = \\ &= 2\cdot\frac{1}{2}(P(\bar{A}|H_1)P(X_1|H_1)+P(\bar{A}|H_2)P(X_1|H_2)) = \\ &= (1-1)\cdot\frac{2}{3}+\left(1-\frac{1}{3}\right)\cdot\frac{1}{3}=0\cdot\frac{2}{3}+\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{2}{9}; \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} P(X_2|A) &= \frac{P(X_2\cap A)}{P(A)} = \\ &= \frac{P(X_2\cap A|H_1)P(H_1)+P(X_2\cap A|H_2)P(H_2)}{P(A|H_1)P(H_1)+P(A|H_2)P(H_2)} = \\ &= \frac{P(X_2|H_1)P(A|H_1)P(H_1)+P(X_2|H_2)P(A|H_2)P(H_2)}{P(A|H_1)P(H_1)+P(A|H_2)P(H_2)} = \\ &= \frac{\frac{1}{3}\cdot 1\cdot\frac{1}{2}+\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3}\left(1-\frac{1}{2}\right)}{1\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\left(1-\frac{1}{2}\right)} = \frac{\frac{1}{6}+\frac{2}{9}\cdot\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{6}+\frac{1}{9}}{\frac{1}{2}+\frac{1}{6}} = \frac{\frac{3+2}{18}}{\frac{3+1}{6}} = \\ &= \frac{5}{18}\cdot\frac{6}{4} = \frac{5}{12}. \end{aligned}$$

## 6.18

*Задание.* Найдите целое число  $\beta$ , для которого вероятность того, что при подбрасывании игрального кубика серия из трёх последовательных единиц окажется раньше серии из  $\beta$  не единиц приблизительно равна  $1/2$ .

*Решение.* Обозначим через «0» цифры 2, 3, 4, 5, 6, а через 1 — единицу. Подбрасывание кубика будем рассматривать как последовательность из этих цифр.

Каждую подходящую нам последовательность (для которой 3 последовательные единицы идут раньше  $\beta$  не единиц) можно поделить на блоки:

1. последний блок может иметь вид:

а) 1, 1, 1, если он единственен;

б) 0, ..., 0, 1, 1, 1, где количество нулей может быть от 1 до  $\beta-1$ .

2. остальные блоки имеют вид:

а)  $0, \dots, 0, 1$ ;

б)  $0, \dots, 0, 1, 1$ , где количество нулей от 1 до  $\beta - 1$ .

Замечания:

1. блок не может начинаться с единицы, потому что это единица относится к предыдущему блоку (кроме 1а)). Примеры:  $[001] [1001]$  — неверно,  $[0011] [001]$  — верно;
2. блок не может содержать «разрывов» между единицами:  $[0101]$  — неверно,  $[01] [01]$  — верно;
3. блок не может содержать 3 или больше единиц, если он не последний.

Теперь интересующие нас последовательности будет строить из блоков. Вероятность некоторой последовательности равна произведению вероятностей выпадения каждой цифры в последовательности, а также равна произведению вероятностей блоков.

Рассмотрим случай, когда  $\beta \neq 0$ . Вероятность того, что серия из трёх единиц выпадет раньше, чем 0 не единиц равна нулю.

Рассмотрим случай, когда  $\beta = 1$ . Существует такая единственная последовательность: 111. Вероятность этого равна  $(1/6)^3$ .

Рассмотрим случай, когда  $\beta \geq 2$ . Теперь строим блоки. В любой случае есть последний блок. Также может быть от нуля до  $\infty$  остальных блоков.

Оценим вероятность последнего блока:

$$\sum_{k=1}^{\beta-1} \left(\frac{5}{6}\right)^k \left(\frac{1}{6}\right)^3 = \left(\frac{1}{6}\right)^3 \sum_{k=1}^{\beta-1} \left(\frac{5}{6}\right)^k.$$

Применим формулу для суммы геометрической прогрессии:

$$\frac{\frac{5}{6} - \left(\frac{5}{6}\right)^\beta}{1 - \frac{5}{6}} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^3 = \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{6} - \left(\frac{5}{6}\right)^\beta\right).$$

Если последний блок единственный, то возможен случай, когда  $k = 0$ . Тогда

$$P = \left(\frac{1}{6}\right)^3.$$

Оценим вероятности обычных блоков (2):

а)

$$\sum_{k=1}^{\beta-1} \left(\frac{1}{6}\right) \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^k = \frac{1}{6} \cdot \frac{\frac{5}{6} - \left(\frac{5}{6}\right)^\beta}{1 - \frac{5}{6}} = \frac{5}{6} - \left(\frac{5}{6}\right)^\beta;$$

б)

$$\sum_{k=1}^{\beta-1} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^k = \frac{1}{6} \left(\frac{5}{6} - \left(\frac{5}{6}\right)^\beta\right).$$

Обозначим

$$\frac{5}{6} - \left(\frac{5}{6}\right)^\beta = x_\beta.$$

Теперь будем получать различные конфигурации при различном числе блоков. При одинаковом числе блоков будем получать различные конфигурации при разном количестве блоков типа 2. Сумма количеств блоков 2 равна  $m$  — количество блоков. Блоки типа 2a) и 2b) может переставлять местами.

Рассмотрим случай, когда есть только последний блок:

$$P = \sum_{k=0}^{\beta-1} \left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^k = \left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \frac{1 - \left(\frac{5}{6}\right)^\beta}{1 - \frac{5}{6}} = \frac{1}{36} \cdot \left(1 - \left(\frac{5}{6}\right)^\beta\right) \neq \frac{1}{2}$$

при любых  $\beta$ .

Пусть есть несколько блоков:

$$P_1 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{m=0}^k C_k^m (P_a^\beta)^m \cdot (P_b^\beta)^{k-m},$$

где первая сумма — количество блоков, вторая сумма — количество блоков типа 2a),  $C_k^m$  — перестановки блоков,

$$P_a^\beta = \sum_{k=1}^{\beta-1} \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^k = \frac{5}{6} - \left(\frac{5}{6}\right)^\beta = x_\beta$$

— вероятность 2a),

$$P_b^\beta = \frac{1}{6} \left( \frac{5}{6} - \left(\frac{5}{6}\right)^\beta \right) = \frac{1}{6} \cdot x_\beta$$

— вероятность 2b),

$$P_1 = \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left( \frac{5}{6} - \left(\frac{5}{6}\right)^\beta \right)$$

— вероятность последнего блока.

Тогда

$$P = P_1 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \left( x_\beta + \frac{1}{6} \cdot x_\beta \right)^k = P_1 \sum_{k=1}^{\infty} \left( \frac{7}{6} \cdot x_\beta \right)^k.$$

Введём обозначение

$$M_\beta = \frac{7}{6} \cdot x_\beta, \quad M_\beta < 1.$$

Тогда

$$P = P_1 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} (M_\beta)^k = P_1 \cdot \frac{M_\beta}{1 - M_\beta} \approx \frac{1}{2}.$$

Необходимо решить последнее уравнение относительно  $\beta$ . Имеем

$$\frac{1}{36} \cdot x_\beta \cdot \frac{\frac{7}{6} \cdot x_\beta}{1 - \frac{7}{6} \cdot x_\beta} = \frac{1}{2}.$$

Упростим:

$$\frac{7}{216} \cdot x_\beta^2 = \frac{1}{2} - \frac{7}{12} \cdot x_\beta.$$

Умножим на 216:  $7x_\beta^2 + 126x_\beta - 108 = 0$ . Найдём дискриминант  $D = 126^2 + 4 \cdot 7 \cdot 108 = 18900$ . Найдём корень из дискриминанта:  $\sqrt{D} \approx 137.4743$ . Найдём корни уравнения:

$$x_\beta = \frac{-126 - 137.4773}{14}, x_\beta = \frac{-126 + 137.4773}{14} \approx \frac{11.4773}{14} = 0.8198.$$

Первый корень не подходит.

$$\frac{5}{6} - \left(\frac{5}{6}\right)^\beta = 0.8198.$$

Перенесём одну дробь в правую часть:

$$\left(\frac{5}{6}\right)^\beta = 0.01353(3).$$

Отсюда

$$\beta = \log_{\frac{5}{6}} 0.01353 = \frac{\lg 0.01353}{\lg \frac{5}{6}} = \frac{-1.868595}{-0.079181} = 23.6 \approx 24.$$

## 6.19

*Задание.* При случайном блуждании на прямой частица делает шаг вправо с вероятностью  $1/5$ , шаг влево с вероятностью  $1/5$  и с вероятностью  $3/5$  остаётся на месте. Найдите вероятность того, что частица, которая стартовала из точки  $x$ , рано или поздно попадёт в точку  $0$ .

*Решение.* Введём гипотезы:  $H_1$  — частица делает шаг вправо,  $H_2$  — частица делает шаг влево,  $H_3$  — частица остаётся на месте. По формуле полной вероятности

$$P(A_0) = \frac{1}{5} \cdot P(A|H_1) + \frac{1}{5} \cdot P(A|H_2) + \frac{3}{5} \cdot P(A|H_3).$$

Составим уравнение

$$f(x) = \frac{1}{5} \cdot f(x-1) + \frac{1}{5} \cdot f(x+1) + \frac{3}{5} \cdot f(x).$$

Приведём подобные:

$$\frac{2}{3}f(x) = \frac{1}{5} \cdot f(x-1) + \frac{1}{5} \cdot f(x+1).$$

Умножим на  $5/2$ . Получим:

$$f(x) = \frac{1}{2} \cdot f(x-1) + \frac{1}{2} \cdot f(x+1).$$

Этому удовлетворяет функция  $f(x) = ax + b$ , причём  $a = 0$ . Имеем, что  $f(x) = 1$ .

## 6.20

*Задание.* Маленький мальчик заблудился при спуске с горы. Руководитель спасательной службы оценил, что вероятность того, что мальчик пошёл западным склоном, равна  $p$ , а вероятность, что он подался восточным склоном, равна  $1 - p$ . В спасательной службе работает  $n$  людей, которые будут искать мальчика независимо друг от друга, и каждый из которых, ища в правильном направлении, с вероятностью  $q$  может найти мальчика. Определите, как руководитель должен поделить спасателей на две группы так, чтобы вероятность найти мальчика была максимальной.

*Решение.* Введём гипотезы  $H_1 = \{\text{мальчик пошёл на запад}\}$ ,  $H_2 = \{\text{мальчик пошёл на восток}\}$ . Их вероятности равны  $P(H_1) = p$ ,  $P(H_2) = 1 - p$ .

Есть  $n$  спасателей. Пусть  $m$  из них пошло на запад. Тогда  $n - m$  — пошло на восток.

Введём событие  $A = \{\text{никто не нашёл мальчика}\}$ . Запишем условные вероятности:  $P(A|H_1) = (1 - q)^m$ ,  $P(A|H_2) = (1 - q)^{n-m}$ ,  $P(\bar{A}|H_1) = 1 - (1 - q)^m$ ,  $P(\bar{A}|H_2) = 1 - (1 - q)^{n-m}$ .

По формуле полной вероятности:  $P(\bar{A}) = p(1 - (1 - q)^m) + (1 - p)(1 - (1 - q)^{n-m})$ .

Найдём производную этой вероятности и приравняем к нулю:  $(P(\bar{A}))'_m = 0$ . Выразим  $m$ .



# Контрольная работа 1

## Вариант 1

1

*Задание.* В сундуке лежат 10 красных, 6 синих и 4 зелёных пуговицы. Найдите вероятность того, что две наугад вынутые пуговицы будут разного цвета.

*Решение.* Опишем пространство элементарных исходов:  $\Omega = \{(x, y), x, y \in \text{красный, синий, зелёный}\}$ . Нужно выбрать две пуговицы из двадцати, поэтому  $|\Omega| = C_{20}^2$ .

Опишем событие  $A = \{\text{две наугад вынутые пуговицы будут разного цвета}\} = \{(x, y) \in \Omega : x \neq y\}$ . Выберем сначала одну красную пуговицу —  $C_{10}^1$ , а затем — одну синюю —  $C_6^1$ . По правилу умножения есть  $C_{10}^1 \cdot C_6^1$  способов вынуть одну красную и одну синюю пуговицу. Второй случай: одна из пуговиц красная, другая — зелёная —  $C_{10}^1 \cdot C_4^1$ . Третий случай: одна из пуговиц синяя, другая — зелёная —  $C_6^1 \cdot C_4^1$ . По правилу суммы имеем, что  $|A| = C_{10}^1 \cdot C_6^1 + C_{10}^1 \cdot C_4^1 + C_6^1 \cdot C_4^1$ .

Тогда вероятность равна

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{C_{10}^1 \cdot C_6^1 + C_{10}^1 \cdot C_4^1 + C_6^1 \cdot C_4^1}{C_{20}^2}.$$

2

*Задание.* Подбросили 10 игральных кубиков. Найдите вероятность того, что единица выпала хотя бы на двух кубиках, если известно, что она выпала хотя бы на одном кубике.

*Решение.* Опишем пространство элементарных событий:  $\Omega = \{(x_1, x_2, \dots, x_{10}) : x_i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, i = \overline{1, 10}\}$ . На каждом кубике может выпасть число от одного до шести (6 вариантов), поэтому  $|\Omega| = 6^{10}$ .

Рассмотрим событие  $A = \{\text{единица не выпала ни на одном кубике}\}$ . На каждом кубике может выпасть число от одного до пяти. Таких вариантов есть  $5^{10}$ . Тогда вероятность события  $A$  равна

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{5^{10}}{6^{10}}.$$

Тогда событие  $\bar{A} = \{\text{единица выпала хотя бы на одном кубике}\}$  имеем вероятность

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{5^{10}}{6^{10}}.$$

Рассмотрим событие  $B = \{\text{единица выпала хотя бы на двух кубиках}\}$ . Рассмотрим пересечение событий  $\bar{A} \cap B = \{\text{единица выпала хотя бы на двух кубиках}\} = B$ . Рассмотрим противоположное событие:  $\bar{B} = \{\text{единица выпала ровно на одном кубике}\} \cup \{\text{единица не выпала ни на одном кубике}\} = B_1 \cup A$ . Найдём количество способов выпадения цифр на кубиках, которые ему удовлетворяют.

$B_1 = \{\text{единица выпала ровно на одном кубике}\}$ . Нужно выбрать 1 кубик из десяти, на котором выпала единица — это  $C_{10}^1$ . На остальных десяти кубиках может быть любое число от двух до шести —  $5^9$ . По правилу умножения  $|B_1| = C_{10}^1 \cdot 5^9$ . Вероятность этого события равна

$$P(B_1) = \frac{|B_1|}{|\Omega|} = \frac{C_{10}^1 \cdot 5^9}{6^{10}}.$$

Тогда вероятность события  $B$  равна

$$P(B) = P(A) + P(B_1) = \frac{5^{10}}{6^{10}} + \frac{C_{10}^1 \cdot 5^9}{6^{10}} = \frac{5^{10} + C_{10}^1 \cdot 5^9}{6^{10}}.$$

Условная вероятность события  $B$  при условии, что событие  $\bar{A}$  произошло, равна

$$P(B|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B)}{P(\bar{A})} = \frac{\frac{5^{10} + C_{10}^1 \cdot 5^9}{6^{10}}}{1 - \frac{5^{10}}{6^{10}}}.$$

### 3

*Задание.* Допустим, что в среднем 5 мужчин из 100 и 25 женщин из 10000 являются дальтониками. Наугад выбранный человек оказался дальтоником. Какова вероятность того, что это был мужчина?

*Решение.* Рассмотрим событие  $A = \{\text{наугад выбранный человек оказался дальтоником}\}$ . Рассмотрим гипотезы:  $H_1 = \{\text{выбранный человек — мужчина}\}$ ,  $H_2 = \{\text{выбранный человек — женщина}\}$ . Мужчин и женщин в популяции одинаковое количество, поэтому вероятности гипотез равны

$$P(H_1) = \frac{1}{2} = P(H_2).$$

Условные вероятности:

$$P(A|H_1) = \frac{5}{100}, P(A|H_2) = \frac{25}{10000}.$$

По формуле Байеса

$$P(H_1|A) = \frac{P(A|H_1)P(H_1)}{P(A|H_1)P(H_1) + P(A|H_2)P(H_2)} = \frac{\frac{5}{100} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{5}{100} \cdot \frac{1}{2} + \frac{25}{10000} \cdot \frac{1}{2}}.$$



*Задание.* Петя играет в орлянку. Он начинает игру, имея одну гривну. Если выпадет орёл, то Петя получает одну гривну, в другом случае — теряет одну гривну. Была сыграна 21 игра, после которой Петя остался без денег и без долга. Найдите вероятность того, что Петя впервые остался без денег именно в последней игре.

*Решение.* На рисунке 44 изображены возможные пути.



Рис. 44: Пути

Они ограничиваются красной линией. Зелёную линию пересекать не можем. Касаться её можно только в точке  $(21, 0)$ .

Перевернём изображение (рис. ??).



Рис. 45: Перевернутое изображение

Теперь можем ходить направо и вверх. Всего путей из точки  $A$  (начальной) в точку  $B$  (конечную)  $C_{10+11}^{10} = C_{21}^{10}$ . По методу отражения путей, которые касаются или пересекают диагональ столько, сколько путей из точки  $A'$  в точку  $B$ . Их  $C_{9+11}^9 = C_{20}^9$ . Тогда путей, которые не касаются и не пересекают диагональ  $C_{21}^{10} - C_{20}^9$ .

А вероятность такого события равна

$$P = \frac{C_{21}^{10} - C_{20}^9}{C_{21}^{10}}.$$

## 5

*Задание.* В равнобедренный прямоугольный треугольник с катетами длиной 1 см наугад бросили точку. Найдите вероятность того, что расстояние от этой точки до какой-то из вершин треугольника не превышает 0.5 см.

*Решение.* Эта задача на геометрическую вероятность. Пространство элементарных событий  $\Omega$  — равнобедренный прямоугольный треугольник с катетами длиной 1. Его площадь равна

$$S_{\Omega} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{2}.$$

Событие  $A = \{\text{расстояние от наугад выбранной точки в данном треугольнике до какой-то из его вершин не превышает } 0.5\}$  на рисунке 46 закрашено чёрным цветом.



Рис. 46: Пространство элементарных событий  $\Omega$  и событие  $A$

Точки множества  $A$  образуют 3 части. Первая часть — четверть круга с радиусом 0.5 возле прямого угла. Его площадь равна

$$S_1 = \frac{1}{4} \cdot \pi \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{16}.$$

Две остальные части равны. Их площади можно найти по формуле для площади сектора круга. Треугольник равнобедренный и прямоугольный, поэтому углы равны  $45^\circ$ . Тогда

$$S_2 = S_3 = \frac{\pi \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{\pi}{4}}{2\pi} = \frac{\pi}{16 \cdot 2}.$$

Тогда

$$S_A = S_1 + S_2 + S_3 = \frac{\pi}{16} + 2 \cdot \frac{\pi}{16 \cdot 2} = \frac{\pi}{16} + \frac{\pi}{16} = \frac{\pi}{8}.$$

Вероятность этого события равна

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{\frac{\pi}{8}}{\frac{1}{2}} = \frac{\pi}{4}.$$

## Вариант 2

### 1

*Задание.* Из множества  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$  независимо друг от друга выбирают число  $\xi$  и число  $\eta$ . Найдите вероятность того, что число  $\xi^2 - \eta^2$  делится на 2.

*Решение.* Пространством элементарных исходов является  $\Omega = \{(\xi, \eta) : \xi, \eta \in \{1, 2, 3, 4, 5\}\}$ . На каждом из двух мест может стоять любая из данных пяти цифр, поэтому  $|\Omega| = 5^2$ .

Рассмотрим событие  $A = \left\{(\xi, \eta) \in \Omega : (\xi^2 - \eta^2) : 2\right\}$ . Его наступлению способствуют такие пары чисел:  $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (2, 4), (4, 2), (1, 3), (3, 1), (1, 5), (5, 1), (3, 5), (5, 3)$ . Этих пар 13, поэтому  $|A| = 13$ .

Тогда вероятность события равна

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{13}{5^2} = \frac{13}{25}.$$

### 2

*Задание.* Подбросили два игральных кубика. Найдите вероятность того, что на одном из них выпала тройка, если известно, что на кубиках выпало разное количество очков.

*Решение.* Пространство элементарных исходов имеет вид  $\Omega = \{(x_1, x_2) : x_1, x_2 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$ . Оно содержит  $|\Omega| = 6^2$  элементов.

Введём событие  $A = \{(x_1, x_2) \in \Omega : x_1 \neq x_2\} = \{\text{на кубиках выпало разное количество очков}\}$ . На одном из кубиков может выпасть любое число из шести — 6 вариантов, а на втором кубике — любое из оставшихся пяти — 5 вариантов. По правилу произведения  $|A| = 6 \cdot 5$ . Тогда вероятность этого события равна

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{6 \cdot 5}{6^2} = \frac{5}{6}.$$

Введём событие  $B = \{\text{на одном из кубиков выпала тройка}\}$ . Опишем пересечение введённых событий:  $A \cap B = \{(x_1, x_2) \in \Omega : x_1 = 3 \neq x_2 \text{ or } x_1 \neq 3 = x_2\}$ . На одном из кубиков может быть только тройка — 1 вариант. А на другом кубике — любая из оставшихся цифр — 5 вариантов. По правилу произведения  $|A \cap B| = 1 \cdot 5 \cdot C_2^1 = 5 \cdot 2$ . Тогда вероятность этого пересечения равна

$$P(A \cap B) = \frac{|A \cap B|}{|\Omega|} = \frac{5 \cdot 2}{6^2} = \frac{5}{2 \cdot 6}.$$

Условная вероятность события  $B$  при условии, что событие  $A$  произошло, равна

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{5}{6^2}}{\frac{5}{6}} = \frac{5 \cdot 6}{5 \cdot 6 \cdot 3} = \frac{1}{3}.$$

### 3

*Задание.* Кандидат  $A$  набрал на выборах 6 голосов, а кандидат  $B$  — 4 голоса (кандидатов было два и явка избирателей была 100%). Избиратели голосовали последовательно. Найдите вероятность того, что кандидат  $A$  всегда опережал  $B$  не меньше, чем на один голос.

*Решение.* Изобразим задачу на рисунке 47.



Рис. 47: Пути

Красным обозначены граничные пути, зелёным — линия, которой нельзя касаться. В начале выборов разница у каждого кандидата было 0 голосов, в конце у кандидата  $A$  было 6 голосов, а у кандидата  $B$  — 4 голоса. Поэтому разность голосов в конце составляет 2 голоса. Перевернём изображение (рис. 48).



Рис. 48: Метод отражений

Всего возможных путей есть столько, сколько путей из точки  $S$  в точку  $F$ . Их

$$|\Omega| = C_{6+4}^4 = C_{10}^4 = \frac{10!}{4! \cdot 6!} = 210.$$

Путей из точки  $S$  в точку  $F$  существует

$$|S \rightarrow F| = C_{5+4}^4 = C_9^4 = \frac{9!}{4! \cdot 5!} = \frac{6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9}{2 \cdot 3 \cdot 4} = \frac{6 \cdot 7 \cdot 9}{2} = 2 \cdot 7 \cdot 9 = 149.$$

Путей, которые касаются диагонали —

$$|S' \rightarrow F| = C_{5+3}^3 = C_8^3 = \frac{8!}{3! \cdot 5!} = \frac{6 \cdot 7 \cdot 8}{2 \cdot 3} = 7 \cdot 8 = 56.$$

Тогда путей, которые не пересекают диагональ и удовлетворяют указанному в условии событию  $C$  будет  $|C| = |S \rightarrow F| - |S' \rightarrow F| = 149 - 56 = 93$ . И его вероятность равна

$$P(C) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{93}{210}.$$

4

*Задание.* На отрезок наугад брошено две точки. Найдите вероятность того, что из трёх образованных отрезков можно составить треугольник.

*Решение.* Пусть отрезок начинается в точке 0 и заканчивается в точке  $c$ . Выбираем на нём наугад две точки: точку  $a$  и точку  $b$ , причём  $a$  лежит не правее  $b$  (рис. 49).



Рис. 49: Отрезок  $[0, c]$

Тогда пространство элементарных исходов имеет вид  $\Omega = \{(a, b) : 0 \leq a \leq b \leq c\}$ . Изобразив его на плоскости, видим, что это прямоугольный треугольник с катетами длиной  $c$  (рис. 50).



Рис. 50: Пространство элементарных событий  $\Omega$  и событие  $A$

Площадь треугольника равна

$$S_{\Omega} = \frac{1}{2} \cdot c \cdot c = \frac{c^2}{2}.$$

Событие

$$A = \left\{ (a, b) \in \Omega : a \leq \frac{c}{2}, b \geq \frac{c}{2}, a \leq \frac{c}{2} + b \right\}.$$

Точки множества  $A$  образуют прямоугольный треугольник с катетами  $c/2$ . Его площадь равна

$$S_A = \frac{1}{2} \cdot \frac{c}{2} \cdot \frac{c}{2} = \frac{c^2}{8}.$$

Тогда вероятность события  $A$  равна

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{c^2}{8} \cdot \frac{2}{c^2} = \frac{1}{4}.$$

## 5

*Задание.* В первой урне находятся 3 чёрных и 3 белых шарика, а во второй — 2 чёрных и 3 белых шарика. Из второй урны наугад вынули два шарика и переложили в первую. После этого из первой урны вынимают два шарика. Найдите вероятность того, что они окажутся разного цвета.

*Решение.* Введём событие  $A = \{\text{вынутые после перекладывания шарика из первой урны окажутся разного цвета}\}$ . Введём гипотезы по поводу того, каких цветов оказались шарика, переложённые в первую урну из второй:  $H_1 = \{\text{чёрный, белый}\}$ ,  $H_2 = \{\text{белый, чёрный}\}$ ,  $H_3 = \{\text{чёрный, чёрный}\}$ ,  $H_4 = \{\text{белый, белый}\}$ . Найдём вероятности этих гипотез:

$$P(H_1) = \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4}, P(H_2) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4}, P(H_3) = \frac{2}{5}, P(H_4) = \frac{3}{5}.$$

Найдём условные вероятности события  $A$  при условии выполнения каждой из этих гипотез. Пусть произошла гипотеза  $H_1$ . Тогда в первой урне стало 4 чёрных и 4 белых шарика. Вероятность того, что 2 вынутые шарика окажутся разного цвета, равна

$$P(A|H_1) = \frac{4}{8} \cdot \frac{4}{7} \cdot 2.$$

Пусть произошла гипотеза  $H_2$ . Тогда в первой урне стало 4 чёрных и 4 белых шарика. Вероятность того, что 2 вынутые шарика окажутся разного цвета, равна

$$P(A|H_2) = \frac{4}{8} \cdot \frac{4}{7} \cdot 2.$$

Пусть произошла гипотеза  $H_3$ . Тогда в первой урне стало 5 чёрных и 3 белых шарика. Вероятность того, что 2 вынутые шарика окажутся разного цвета, равна

$$P(A|H_3) = \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{7} \cdot 2.$$

Пусть произошла гипотеза  $H_4$ . Тогда в первой урне стало 3 чёрных и 5 белых шарика. Вероятность того, что 2 вынутые шарика окажутся разного цвета, равна

$$P(A|H_4) = \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} \cdot 2.$$

По формуле для полной вероятности

$$P(A) = \sum_{i=1}^4 P(H_i) \cdot P(A|H_i).$$

## Вариант 3

### 1

*Задание.* Что вероятней: выиграть у равносильного противника 3 шахматных партии из 4 или 5 партий из 8?

*Решение.* Найдём вероятность выиграть 3 шахматные партии из четырёх. Пространство элементарных событий состоит из  $|\Omega_1| = 2^4$  элементов, так как каждую из четырёх партий можно выиграть или проиграть. Введём событие  $A = \{3 \text{ партии из четырёх будут удачными}\}$ . Нужно выбрать одну партию из четырёх, которая не будет удачной — это  $C_4^1 = |A|$ . Тогда вероятность этого события равна

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega_1|} = \frac{C_4^1}{2^4} = \frac{4}{4^2} = \frac{1}{4}.$$

Найдём вероятность выиграть 4 шахматные партии из восьми. Пространство элементарных событий в данном случае состоит из  $|\Omega_2| = 2^8$  элементов. Пусть событие  $B = \{5 \text{ партий из восьми закончатся победой}\}$ . Нужно выбрать 5 партий из восьми, которые закончатся победой — это

$$|B| = C_8^5 = \frac{8!}{5! \cdot 3!} = \frac{6 \cdot 7 \cdot 8}{2 \cdot 3} = 7 \cdot 8.$$

Тогда вероятность этого события равна

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{7 \cdot 8}{2^8} = \frac{7}{2^5} = \frac{7}{32}.$$

Сравним две полученные вероятности. Для этого первую умножим на 8:

$$\frac{8}{8} \cdot \frac{1}{4} = \frac{8}{32}.$$

Видим, что

$$\frac{8}{32} > \frac{7}{32},$$

поэтому  $P(A) > P(B)$ . Тогда вероятность выиграть 3 шахматные партии из четырёх больше, чем вероятность выиграть 5 партий из восьми.

## 2

*Задание.* В сундуке лежат 9 красных, 6 синих и 5 зелёных пуговиц. Наугад вынули 2 пуговицы. Найдите вероятность того, что пуговицы разного цвета, если известно, что среди них нет зелёных.

*Решение.* Опишем событие  $A = \{\text{среди двух пуговиц нет зелёных}\}$ . Возможны варианты: (красная, красная), (синяя, синяя), (красная, синяя), (синяя, красная). Вероятность того, что вытянем одну красную и одну синюю пуговицу, равна

$$\frac{9}{20} \cdot \frac{6}{19}.$$

Вероятность того, что две пуговицы будут красными, равна

$$\frac{9}{20} \cdot \frac{8}{19}.$$

Наконец, вероятность того, что две пуговицы будут синими, равна

$$\frac{6}{20} \cdot \frac{5}{19}.$$

Тогда по правилу суммы имеем вероятность указанного события:

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{2 \cdot 9 \cdot 6}{20 \cdot 19} + \frac{9 \cdot 8}{20 \cdot 19} + \frac{6 \cdot 5}{20 \cdot 19} = \frac{9 \cdot 6 + 9 \cdot 4 + 3 \cdot 5}{10 \cdot 19} = \frac{54 + 36 + 15}{10 \cdot 19} = \\ &= \frac{105}{10 \cdot 19} = \frac{21}{2 \cdot 19}. \end{aligned}$$

Введём событие  $B = \{\text{пуговицы оказались разного цвета}\}$ . Найдём пересечение двух событий:  $A \cap B = \{\text{пуговицы оказались разного цвета, и среди них нет зелёных}\}$ . Есть два варианта: (красный, синий), (синий, красный). Вероятность этого пересечения равна

$$P(A \cap B) = \frac{2 \cdot 9 \cdot 6}{20 \cdot 19} = \frac{9 \cdot 6}{10 \cdot 19} = \frac{9 \cdot 3}{5 \cdot 19}.$$

Тогда по формуле для условной вероятности получаем, что

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{9 \cdot 3}{5 \cdot 19} \cdot \frac{2 \cdot 19}{21} = \frac{9 \cdot 2}{5 \cdot 7} = \frac{18}{35}.$$

## 3

*Задание.* На отрезок наугад брошены две точки. Найдите вероятность того, что левый из трёх образованных отрезков будет самым коротким.

*Решение.* Пусть отрезок начинается в точке 0 и заканчивается в точке  $c$ . Выбираем на нём наугад две точки: точку  $a$  и точку  $b$ , причём  $a$  лежит не правее  $b$  (рис. 49).

Тогда пространство элементарных исходов имеет вид  $\Omega = \{(a, b) : 0 \leq a \leq b \leq c\}$ . Изобразив его на плоскости, видим, что это прямоугольный треугольник с катетами длиной  $c$  (рис. 51).





Рис. 51: Пространство элементарных событий  $\Omega$  и событие  $A$

Площадь треугольника равна

$$S_{\Omega} = \frac{1}{2} \cdot c \cdot c = \frac{c^2}{2}.$$

Пусть событие  $A = \{(a, b) \in \Omega : a \leq b - a, a \leq c - b\}$ . Изобразив его на рисунке, видим, что это треугольник, образованный прямой  $b = c - a$ , прямой  $b = 2a$  и одним из катетов исходного треугольника. Его площадь найдём с помощью интеграла:

$$S_1 = \int_0^{\frac{c}{3}} (c - a) da = \left( ca - \frac{a^2}{2} \right) \Big|_0^{\frac{c}{3}} = c \cdot \frac{c}{3} - \frac{c^2}{9 \cdot 2} = \frac{c^2}{3} - \frac{c^2}{18} = \frac{6c^2 - c^2}{18} = \frac{5c^2}{18}.$$

От этой площади нужно отнять площадь треугольника под прямой  $b = 2a$ . Она равна

$$S_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{c}{3} \cdot \frac{2c}{3} = \frac{c^2}{9}.$$

Площадь треугольника равна

$$S_A = S_1 - S_2 = \frac{c^2}{6}.$$

Тогда вероятность этого события равна

$$P(A) = \frac{S_A}{S_{\Omega}} = \frac{1}{3}.$$

4

*Задание.* Частица совершает случайное симметрическое блуждание на прямой, делая шаг вправо или влево с вероятностью  $1/2$ . Найдите вероятность того, что через  $2n$  шагов частица впервые вернётся в исходную точку.

*Решение.* Задача изображена на рисунке 52.



Рис. 52: Задача про случайное блуждание частицы на прямой



Рис. 53: Метод отражений

Красным обозначены крайние пути, зелёным — линия, которую нельзя пересекать. Перевернём изображение (рис. 53).

Всего путей

$$|\Omega| = C_{n+n} = \frac{(2n)!}{n!n!}.$$

Начальная точка — точка  $A$ , конечная — точка  $B$ . Всего путей из  $A$  в  $B$  существует

$$|A \rightarrow B| = C_{n-1+n-1}^{n-1} = \frac{(2n-1)!}{(n-1)!(n-1)!}.$$

Путей, которые пересекают диагональ будет

$$|A' \rightarrow B| = C_{n-2+n}^n = \frac{(2n-2)!}{n!(n-2)!}.$$

Тогда путей, которые не пересекают диагональ будет

$$2(|A \rightarrow B| - |A' \rightarrow B|) = 2 \cdot \left( \frac{(2n-1)!}{(n-1)!(n-1)!} - \frac{(2n-2)!}{n!(n-2)!} \right),$$

так как частица может двигаться и вправо, и влево.

Тогда вероятность указанного в условии задачи события равна

$$P = \frac{2 \cdot \left( \frac{(2n-1)!}{(n-1)!(n-1)!} - \frac{(2n-2)!}{n!(n-2)!} \right)}{\frac{(2n)!}{n!n!}} = \frac{1}{2n-1}.$$

*Задание.* Среди 5 стрелков есть 3 хороших, которые метко стреляют с вероятностью 0.8, и 2 средних, которые попадают в цель с вероятностью 0.5. Вызвали наугад двух стрелков, они выстрелили по мишени и оба попали. Найдите вероятность того, что стреляли два средних стрелка.

*Решение.* Введём событие  $A = \{\text{два стрелка попали по мишени}\}$  и гипотезы о том, каких стрелков вызвали:  $H_1 = \{\text{оба стрелка были хорошими}\}$ ,  $H_2 = \{\text{оба стрелка были средними}\}$ ,  $H_3 = \{\text{первый стрелок был хорошим, а второй — средним}\}$ ,  $H_4 = \{\text{первый стрелок был средним, а второй хорошим}\}$ . Нужно найти вероятность

$$P(H_2|A) = \frac{P(A|H_2)P(H_2)}{\sum_{i=1}^4 P(A|H_i)P(H_i)}.$$

Вероятность того, что выбрали два хороших стрелка равна

$$P(H_1) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{10}.$$

Вероятность того, что выбрали два средних стрелка равна

$$P(H_2) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{5 \cdot 2} = \frac{1}{10}.$$

Вероятность того, что один из стрелков был хорошим, а второй — средним равна

$$P(H_3) = P(H_4) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}.$$

Найдём условные вероятности:

$$\begin{aligned} P(A|H_1) &= \frac{8}{10} \cdot \frac{8}{10} = \frac{4}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{16}{25}, \quad P(A|H_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}, \quad P(A|H_3) = \\ &= P(A|H_4) = \frac{8}{10} \cdot \frac{1}{2} = \frac{4}{5 \cdot 2} = \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

Тогда по формуле Байеса получаем

$$P(H_2|A) = \frac{\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{10}}{\frac{3}{10} \cdot \frac{16}{25} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{10} + 2 \cdot \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{5}}$$



# Занятие 7. Алгебры и $\sigma$ -алгебры. Мера

## Контрольные вопросы и задания

Приведите определение алгебры событий,  $\sigma$ -алгебры событий, конечно-аддитивной меры, счётно-аддитивной меры, вероятностной меры, монотонного класса.

Совокупность  $\mathcal{A}$  подмножеств называется алгеброй, если выполнены свойства:

1.  $\emptyset \in \mathcal{A}$ ,
2.  $A \in \mathcal{A} \Rightarrow \bar{A} \in \mathcal{A}$ ,
3.  $A, B \in \mathcal{A} \Rightarrow A \cup B \in \mathcal{A}$ .

Совокупность множеств называется  $\sigma$ -алгеброй, если выполняются следующие условия:

1.  $\Omega \in \mathcal{A}$ ,
2.  $A \in \mathcal{A} \Rightarrow \bar{A} \in \mathcal{A}$ ,
3.  $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{A}$ .

Функция  $\mu : \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty]$  называется конечно-аддитивной мерой (иногда объёмом), если она удовлетворяет следующим аксиомам:

1.  $\mu(\emptyset) = 0$ ,
2. если  $\{E_n\}_{n=1}^N \subset \mathcal{F}$  — конечное семейство попарно непересекающихся множеств из  $\mathcal{F}$ , то есть  $E_i \cap E_j = \emptyset$ ,  $i \neq j$ , то  $\mu\left(\bigcup_{n=1}^N E_n\right) = \sum_{n=1}^N \mu(E_n)$ .

Функция  $\mu : \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty]$  называется счётно-аддитивной (или  $\sigma$ -аддитивной) мерой, если она удовлетворяет следующим аксиомам:

1.  $\mu(\emptyset) = 0$ ,
2. ( $\sigma$ -аддитивность) Если  $\{E_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{F}$  — конечное семейство попарно непересекающихся множеств из  $\mathcal{F}$ , то есть  $E_i \cap E_j = \emptyset$ ,  $i \neq j$ , то
 
$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n).$$

Вероятностная мера (вероятность) — это функция  $P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ ,  $\mathcal{F}$  —  $\sigma$ -алгебра:

1.  $P(\Omega) = 1$ ,
2. если  $A_n \in \mathcal{F}$ ,  $A_n \cap A_m = \emptyset$ ,  $n \neq m$ , то  $P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$ .

Совокупность  $\mu$  подмножеств множества  $\Omega$  называется монотонным классом, если для любой монотонной последовательности  $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$  (т.е. такой, что  $A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset \dots$  или  $A_1 \subset A_2 \subset \dots$ ) её предел  $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n$  тоже лежит в  $\mu$ .

**Сформулируйте теорему про монотонный класс.**

Пусть  $\mathcal{A}$  — алгебра подмножеств множества  $\Omega$ . Тогда монотонный класс, порождаемый  $\mathcal{A}$  совпадает с алгеброй, порождаемой  $\mathcal{A}$ :  $m(\mathcal{A}) = \sigma(\mathcal{A})$ .

## Аудиторные задачи

### 7.3

*Задание.* Опишите  $\sigma$ -алгебру подмножеств отрезка  $[0, 1]$ , порождённую множествами:

- a)  $[0, 1/2]$ ;
- b)  $[0, 2/3]$  и  $[1/3, 1]$ ;
- c)  $[0, 1/2]$  и  $[1/2, 1]$ .

*Решение.* Множество  $\Omega = [0, 1]$ .

- a)  $A = [0, 1/2]$ . Опишем  $\sigma$ -алгебру подмножеств:

$$\mathcal{A}_A = \{\emptyset, \Omega, A, \bar{A}\} = \left\{ \emptyset, [0, 1], \left[0, \frac{1}{2}\right], \left(\frac{1}{2}, 1\right] \right\};$$

- b)  $B = [0, 2/3]$ ,  $C = [1/3, 1]$ . Введём непересекающиеся множества, которые в объединении дают всё множество:

$$D_1 = \left[0, \frac{1}{3}\right], D_2 = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right], D_3 = \left(\frac{1}{2}, 1\right].$$

Тогда

$$\mathcal{A}_D = \left\{ \emptyset, \Omega, \bigcup_{i=1}^k D_i, k = \overline{1, 3} \right\};$$

с)  $A = [0, 1/2]$ ,  $B = [1/2, 1]$ . Введём непересекающиеся множества, которые в объединении дают всё множество:

$$D_1 = \left[0, \frac{1}{2}\right), D_2 = \left\{\frac{1}{2}\right\}, D_3 = \left(\frac{1}{2}, 1\right].$$

Тогда

$$\mathcal{A}_D = \left\{ \emptyset, \Omega, \bigcup_{i=1}^k D_i, k = \overline{1, 3} \right\}.$$

#### 7.4

*Задание.* Пусть  $\mathcal{B}$  —  $\sigma$ -алгебра, порождённая интервалами  $(a, b]$ . Докажите, что множества  $(a, b)$ ,  $[a, b]$ ,  $\{a\}$  тоже принадлежат  $\mathcal{B}$ .

*Решение.*  $\mathcal{B}$  замкнута относительно конечного объединения или пересечения множеств, которые в неё входят.  $\mathcal{B}$  —  $\sigma$ -алгебра. Рассмотрим интервалы

$$\left(a, b - \frac{1}{n}\right].$$

Возьмём бесконечное пересечение

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a, b - \frac{1}{n}\right].$$

Тогда приблизимся к точке  $b$ , но сама она входить не будет:

$$(a, b) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a, b - \frac{1}{n}\right].$$

Для любого  $n$  отрезок

$$\left(a, b - \frac{1}{n}\right]$$

по условию принадлежит  $\sigma$ -алгебре  $\mathcal{B}$ . Тогда его счётное объединение тоже принадлежит  $\sigma$ -алгебре:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a, b - \frac{1}{n}\right] \in \mathcal{B}$$

по определению. Тогда  $(a, b) \in \mathcal{B}$ .

Отрезок, где оба конца входят,

$$[a, b] = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}, b\right].$$

В каждый этот интервал точка  $a$  входит. Тогда в их пересечение точка  $a$  входит:

$$\forall n \left( a - \frac{1}{n}, b \right] \in \mathcal{B} \Rightarrow \bigcap_{n=1}^{\infty} \left( a - \frac{1}{n}, b \right] \in \mathcal{B} \Rightarrow [a, b] \in \mathcal{B}.$$

Множество, состоящее из одной точки:

$$\{a\} = [a, a] = \left( a - \frac{1}{n}, a \right].$$

Для любого  $n$  отрезок такого вида принадлежит  $\mathcal{B}$ , тогда их счётное пересечение принадлежит  $\mathcal{B}$ , тогда  $[a, a] \in \mathcal{B}$ . А это значит, что  $\{a\} \in \mathcal{B}$ .

## 7.5

*Задание.* Пусть  $\Omega = \mathbb{R}^2$ ,  $\mathcal{B}$  — борелевская  $\sigma$ -алгебра в  $\mathbb{R}^2$ . Докажите, что:

- a)  $\{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\| < 1\} \in \mathcal{B}$ ;
- b)  $\{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\| \leq 1\} \in \mathcal{B}$ ;
- c)  $\{(1, 1)\} \in \mathcal{B}$ ;
- d)  $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \in \mathcal{B}$ ;
- e)  $[0, 1]^2 \in \mathcal{B}$ ;
- f)  $(0, 1) \times [2, 3] \in \mathcal{B}$ ;
- g)  $\{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : \sin x_1 + \cos(x_1 + x_2^3) > 1/7\} \in \mathcal{B}$ .

*Решение.* Есть борелевская  $\sigma$ -алгебра в  $\mathbb{R}^2$ .

- a)  $\{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\| < 1\} \in \mathcal{B}$  — внутренняя часть круга с центром в точке 0 и радиусом 1, открытое множество, а значит принадлежит  $\sigma$ -алгебре, как открытое множество;
- b) это замкнутое множество. И как дополнение к открытому множеству принадлежит  $\sigma$ -алгебре;
- c)  $\{(1, 1)\}$  — замкнутое множество. Поэтому принадлежит  $\sigma$ -алгебре. Или  $(1, 1) = \{1\} \times \{1\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ ;
- d)  $\mathbb{Q}$  — множество рациональных чисел — счётное множество. Всякие счётные объединения и пересечения не выводят за границы  $\sigma$ -алгебры.  $(r_i, r_j) \in \mathcal{B}$  как замкнутое множество (точка).  $\forall i, j \bigcup_{i=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} (r_i, r_j) \in \mathcal{B}$ .
- e)  $[0, 1]^2$  — замкнутое множество в  $\mathbb{R}^2 \Rightarrow [0, 1]^2 \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ . Второй способ:  $[0, 1]^2 = [0, 1] \times [0, 1]$ . Знаем, что  $[0, 1] \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ . Тогда  $[0, 1] \times [0, 1] \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2) \Rightarrow [0, 1]^2 \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ ;



- f) покажем, что  $[2, 3) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ . Будем считать, что  $\sigma$ -алгебра порождается интервалами  $(a, b) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ . Можем записать данный интервал в виде

$$(2, 3) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left( 2 - \frac{1}{n}, 3 \right).$$

В каждый этот интервал точка 2 входит. Тогда точка 2 входит в пересечение, потому что отступили влево. Тогда  $[2, 3) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ . По определению  $(0, 1) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$  (это открытое множество). Тогда  $(0, 1) \times [2, 3) \in \mathcal{B}$ ;

- g) функции  $\sin x_1$  и  $\cos(x_1 + x_2^3)$  — ограниченные:  $-1 \leq \sin x_1 \leq 1$ ,  $-1 \leq \cos(x_1 + x_2^3) \leq 1$ . А интервалы по определению  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$  ей принадлежат. Тогда  $\{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : \sin x_1 + \cos(x_1 + x_2^3) > 1/7\} \in \mathcal{B}$ .

## 7.6

*Задание.* Пусть  $\mu$  — конечно-аддитивная мера на алгебре  $\mathcal{B}$  и пусть множества  $A, A_1, A_2, \dots$  принадлежат  $\mathcal{B}$ . Докажите, что если:

- a)  $A = \bigcup_{n=1}^k A_n$  и  $A_n$  попарно не пересекаются, то  $\mu(A) = \sum_{n=1}^k \mu(A_n)$ ;  
b)  $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$  и  $A_n$  попарно не пересекаются, то  $\mu(A) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$ .

*Решение.*

- a)  $A = \bigcup_{n=1}^k A_n$ ,  $A_i \cap A_j = \emptyset$ ,  $i \neq j$ . Тогда  $\mu(A) = \sum_{n=1}^k \mu(A_n)$  — следует из определения конечно-аддитивной меры;  
b)  $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ ,  $A_i \cap A_j = \emptyset$ ,  $i \neq j$ . Каждое конечное объединение принадлежит множеству  $A$ . Для произвольного  $k \geq 1$  рассмотрим конечное объединение:  $\bigcup_{n=1}^k A_n \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A$ . Из монотонности можем утверждать, что  $\mu\left(\bigcup_{n=1}^k A_n\right) \leq \mu(A)$ . Мера конечно-аддитивна, и множества не пересекаются. Из определения конечно-аддитивной меры  $\mu\left(\bigcup_{n=1}^k A_n\right) \leq \sum_{n=1}^k \mu(A_n) \leq \mu(A) \forall k$ . Переходя к границе при  $k \rightarrow \infty$  получаем  $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) \leq \mu(A)$  — для  $A_i \cap A_j = \emptyset$ ,  $i \neq j$ .

## 7.7

*Задание.* Пусть  $\mu$  — неотрицательная аддитивная функция, которая задана на алгебре  $\mathcal{B}$ . Докажите, что  $\mu$  является  $\sigma$ -аддитивной функцией тогда

и только тогда, когда для произвольных множеств  $A, A_1, A_2, \dots$ , которые принадлежат  $\mathcal{B}$ , из того, что  $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$  следует, что  $\mu(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$ .

*Решение.*  $\mu$  — некоторая неотрицательная аддитивная функция на алгебре  $\mathcal{B}$ . Доказать, что  $\mu$  —  $\sigma$ -аддитивная мета тогда и только тогда, если из того, что  $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$  следует, что  $\mu(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$ .

Пусть  $\mu$  —  $\sigma$ -аддитивная. Это означает, что имеем  $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$  для множеств, которые не пересекаются ( $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$ ).

Если  $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ , то по монотонности  $\mu(A) \leq \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)$ .

Объединение множеств, которые не пересекаются обозначим как  $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} B_n$ , где  $B_1 = A_1, B_2 = A_2 \cap \overline{A_1}, B_3 = A_3 \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_1}, \dots$

Откуда следует, что  $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mu\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$ .

Имеем, что  $B_2 = A_2 \cap C \Rightarrow B_2 \subseteq A_2 \Rightarrow \mu(B_2) \leq \mu(A_2)$ . Поэтому  $\mu(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$ . В одну сторону доказали. Знаем, что  $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \Rightarrow \mu(A) \leq \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$  выполняется для любых множеств  $A, A_1, A_2, \dots$

По предыдущей задаче (задача 7.6)  $\mu(A) \geq \sum_{n=1}^k \mu(A_n)$  для множеств, которые не пересекаются. Для множеств, которые не пересекаются возможно только равенство:  $\mu(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$  для  $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$ .

## 7.8

*Задание.* Пусть  $\Omega$  — множество рациональных точек на  $[0, 1]$ , а  $\mathcal{F}$  — алгебра множеств, каждое из которых является бесконечной суммой множеств  $A$  вида  $\{r : a < r < b\}, \{r : a < r \leq b\}, \{r : a \leq r < b\}$ , которые не пересекаются, и пусть  $P(A) = b - a$ . Докажите, что  $P$  является конечно-аддитивной, но не счётно-аддитивной функцией множеств.

*Решение.*  $\Omega = \{[0, 1] \cap \mathbb{Q}\}$  — множество рациональных точек.  $\mathcal{F}$  — алгебра множеств, порождённая интервалами любого вида (открытыми, полуоткрытыми, замкнутыми). Хотим показать, что  $P = b - a$  — конечно-аддитивная, но не счётно-аддитивная.

$\mathbb{Q}$  — счётное множество,  $\mathbb{Q} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \{r_i\}$ . Длина отрезка  $[0, 1] - P(\Omega) = 1$ . Если бы  $P$  была счётно-аддитивной мерой, то должно бы быть, что  $P(\Omega) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} \{r_i\}\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(\{r_i\})$ . Каждое  $P(\{r_i\}) = 0$ , так как  $\{r_i\}$  — замкнутый интервал с концами  $r_i, r_i$ . Поэтому  $P(\Omega) = 0$  — противоречие. Поэтому

$P$  не является счётно-аддитивной мерой.

## 7.9

*Задание.* На алгебре всех подмножеств множества рациональных чисел отрезка  $[0, 1]$  введите меру так, чтобы мера каждого рационального числа была положительной, а мера множества всех рациональных чисел из  $[0, 1]$  была бы равна единице.

*Решение.*  $\Omega = \{\mathbb{Q} \cap [0, 1]\}$  — счётное множество, счётный набор рациональных точек:  $\Omega = \{r_1, r_2, \dots, r_n, \dots\}$ .

Хотим, чтобы  $P(\Omega) = 1 = \sum_{n=1}^{\infty} P(\{r_n\}) = P(\{r_1\}) + P(\{r_2\}) + \dots$

Каждое  $P(\{r_n\})$  больше нуля и меньше единицы.

Просуммируем:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1.$$

Поэтому все вероятности не нулевые и в сумме дают единицу.

## 7.10

*Задание.* Может ли число всех событий некоторого вероятностного пространства равняться 129; 130; 128?

*Решение.* Число всех событий некоторого вероятностного пространства может равняться числу, которое является степенью двойки. Числа 129 и 130 не являются степенями двойки, поэтому не могут быть числом всех событий некоторого вероятностного пространства. А число  $128 = 2^7$ , поэтому может быть числом всех событий некоторого вероятностного пространства.

## Дополнительные задачи

### 7.11

*Задание.* Пусть  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  — произвольное вероятностное пространство. Докажите, что множество значений функции  $\mathbb{P}(A)$ ,  $A \in \mathcal{F}$  является закрытым подмножеством отрезка  $[0, 1]$ .

*Решение.* Для любого события  $A \in \mathcal{F}$  выполняется равенство  $\mathbb{P}(A) \geq 0$  — по определению вероятностной меры на  $(\Omega, \mathcal{F})$ , а вероятность достоверного события равна единице:  $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ . Так как  $A \subseteq \Omega$ , то  $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(\Omega) = 1$ . То есть  $\mathbb{P}(A) \in [0, 1]$ .

Пусть  $y_1, y_2, \dots$  — точки  $Y$ . Пусть  $\Gamma$  — множество всех последовательностей  $\gamma = \{\epsilon_1, \epsilon_2, \dots\}$ , где  $\epsilon_i = 0$  или 1. В прямом произведении топологических пространств  $\Gamma$  — это компактное топологическое пространство, и каждая из функций  $\epsilon_i = \epsilon_i(\gamma)$  — это непрерывная функция. Из ограниченности  $\mathbb{P}(Y)$  и признака Вейерштрасса следует, что функция  $\phi(\gamma)$  определена

на рядом

$$\phi(\gamma) = \sum_{i=1}^{\infty} \epsilon_i \mathbb{P}(y_i)$$

— это тоже непрерывная функция на  $\Gamma$ . Так как непрерывный образ компактного пространства это компакт, то он закрыт и так как образ  $\phi(\Gamma)$  — это множество всех значений  $\mathbb{P}$  на подмножествах  $Y$ , доказательство закончено.

## Домашнее задание

### 7.12

*Задание.* Опишите  $\sigma$ -алгебру подмножеств отрезка  $[0, 1]$ , порождённую множествами:

- a)  $[1/3, 1/2]$ ;
- b) множеством рациональных точек отрезка  $[0, 1]$ ;
- c)  $\{0\}$  и  $\{1\}$ .

*Решение.* Множество  $\Omega = [0, 1]$ .

- a)  $A = [1/3, 1/2]$ . Опишем  $\sigma$ -алгебру подмножеств:

$$\mathcal{A}_A = \{\emptyset, \Omega, A, \overline{A}\} = \left\{ \emptyset, [0, 1], \left[ \frac{1}{3}, \frac{1}{2} \right], \left[ 0, \frac{1}{3} \right) \cup \left( \frac{1}{2}, 1 \right] \right\};$$

- b) пусть  $B = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$  — множество рациональных точек отрезка  $[0, 1]$ . Тогда  $\mathcal{A}_B = \{\emptyset, \Omega, B, \overline{B}\} = \{\emptyset, [0, 1], \mathbb{Q} \cap [0, 1], [0, 1] \setminus \mathbb{Q}\}$ ;
- c)  $C = \{0\}, E = \{1\}$ . Введём непересекающиеся множества, которые в объединении дают весь отрезок:  $D_1 = \{0\}, D_2 = (0, 1), D_3 = \{1\}$ . Тогда  $\mathcal{A}_D = \left\{ \emptyset, \Omega, \bigcup_{i=1}^k D_i, k = \overline{1, 3} \right\} =$   
 $= \{\emptyset, [0, 1], \{0\}, (0, 1), \{1\}, [0, 1], (0, 1), \{0\} \cup \{1\}\}.$

### 7.13

*Задание.* Пусть  $\Omega = \mathbb{R}$ ,  $\mathcal{B}$  — борелевская  $\sigma$ -алгебра на  $\mathbb{R}$ . Докажите, что  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \in \mathcal{B}$ .

*Решение.* Минимальная  $\sigma$ -алгебра, содержащая множество всех интервалов на вещественной прямой, называется борелевской  $\sigma$ -алгеброй в  $\mathbb{R}$  и обозначается  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ .

Борелевская  $\sigma$ -алгебра содержит все закрытые интервалы на  $\mathbb{R}$ . Любое счётное объединение закрытых интервалов на  $\mathbb{R}$  принадлежит  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ . Тогда можем взять все рациональные числа  $q$  из  $\mathbb{Q}$ , которых счётное количество.

Тогда берём множество закрытых интервалов вида  $[q, q]$ ,  $q \in \mathbb{Q}$ . Объединение всех этих множеств, которые принадлежат  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$  по определению даст множество, принадлежащее  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ , т.е. множество  $\mathbb{Q} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ . Тогда его дополнение  $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ .

#### 7.14

*Задание.* Пусть  $\Omega = \mathbb{R}$ ,  $\mathcal{B}$  — борелевская  $\sigma$ -алгебра на  $\mathbb{R}^2$ . Докажите, что:

- а)  $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \times \mathbb{Q} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ ;
- б)  $\{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : \max(\sin(x_1 x_2), \arctg(x_2 - x_1)) > 0.1\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ .

*Решение.*

- а)  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ ,  $\mathbb{Q} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \Rightarrow (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \times \mathbb{Q} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ ;
- б) функции  $\arctg \phi$  и  $\sin \phi$  — ограниченные. В случае максимума синуса функция будет лежать в пределах от 0.1 до единицы. В случае максимума арктангенса — от 0.1 до  $\pi/2$  не включая  $\pi/2$ . А интервалы по определению  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$  ей принадлежат. Тогда  $\{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : \max(\sin(x_1 x_2), \arctg(x_2 - x_1)) > 0.1\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ .

#### 7.15

*Задание.* Является ли алгеброй ( $\sigma$ -алгеброй) совокупность множеств, которые состоят из:

- а) всех подмножеств  $\mathbb{R}$ ;
- б) всех счётных множеств и их дополнений;
- в) всех множеств вида  $A \cap B$ , где  $A$  — произвольное открытое, а  $B$  — произвольное замкнутое множество;
- г) всех множеств вида  $A \cup B$ , где  $A$  — произвольное открытое, а  $B$  — произвольное замкнутое множество.

*Решение.* Множество  $\mathcal{A}$ , элементами которого являются множества  $\Omega$  (не обязательно все), называется алгеброй (алгеброй событий), если оно удовлетворяет следующим условиям:

1.  $\Omega \in \mathcal{A}$  (алгебра событий содержит достоверное событие);
2. если  $A \in \mathcal{A}$ , то  $\overline{A} \in \mathcal{A}$  (вместе с любым событием алгебра содержит противоположное событие);
3. если  $A \in \mathcal{A}$  и  $B \in \mathcal{B}$ , то  $A \cup B \in \mathcal{A}$  (вместе с любыми двумя событиями алгебра содержит их объединение).

Множество  $\mathcal{F}$ , элементами которого являются подмножества  $\Omega$  (не обязательно все), называется  $\sigma$ -алгеброй ( $\sigma$ -алгеброй событий), если выполнены следующие условия:

1.  $\Omega \in \mathcal{F}$  ( $\sigma$ -алгебра событий содержит достоверное событие);
  2. если  $A \in \mathcal{F}$ , то  $\bar{A} \in \mathcal{F}$  (вместе с любым событием  $\sigma$ -алгебра содержит противоположное событие);
  3. если  $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ , то  $A_1 \cup A_2 \cup \dots \in \mathcal{F}$  (вместе с любым счётным набором событий  $\sigma$ -алгебра содержит их объединение).
- а) Совокупность множеств, которая состоит из всех подмножеств  $\mathbb{R}$  является  $\sigma$ -алгеброй, так как содержит всё множество  $\mathbb{R}$ , все подмножества  $\mathbb{R}$  и их дополнения, счётные объединения подмножеств;
- б)  $\mathcal{A} = \{A \subset \Omega \mid A \text{ — счётно} \}$  —  $\sigma$ -алгебра, если  $\Omega$  — счётно.

В данном случае  $\Omega$  — совокупность всех счётных множеств и их дополнений. Среди них будут не только счётные множества. Поэтому такая совокупность множеств не будет алгеброй;

- с)
- д) совокупность всех открытых множеств образует борелевскую  $\sigma$ -алгебру, что в свою очередь является  $\sigma$ -алгеброй. Аналогично с замкнутыми множествами.

Если рассматривать вещественную прямую, то это любого вида интервалы (открытые —  $[a, b]$ , полуоткрытые —  $[a, b)$ ,  $(a, b]$ , замкнутые —  $[a, b]$ ).

Тогда что пересечение, что объединение даст любые интервалы (открытые, полуоткрытые, замкнутые), которые принадлежат заданной совокупности множеств.

Пересечение и объединение открытого и замкнутого множеств даст открытое или замкнутое множество, которое принадлежит этой совокупности.

Получаем  $\sigma$ -алгебру.

## 7.16

*Задание.* Опишите  $\sigma$ -алгебру, порождённую:

- а) событиями нулевой вероятности;
- б) событиями вероятности единица.

*Решение.*  $\mathcal{A} = \{A \mid P(A) = 0\} \cup \{A \mid P(A) = 1\}$ . Вероятность дополнения к событию нулевой вероятности — событие вероятности  $1 - 0$ , которое равно 1. Множество элементарных исходов имеет вероятность 1, потому оно уже

включено. Пустое множество имеет вероятность 0, поэтому оно тоже включено. Объединение событий нулевой вероятности с событием вероятности 1 согласно правилу  $\sigma$ -аддитивности даст событие вероятности 1, т.е. это уже учли.

Объединение событий нулевой вероятности с непустым пересечением можно представить следующим образом. Пусть  $B$  — это пересечение всех объединяемых множеств. Тогда объединение можно записать в виде  $A_1 \setminus B \cup A_2 \setminus B \cup \dots \cup B$ . Имеем объединение непересекающихся случайных событий. Если вероятностная мера  $P$  монотонная, т.е. если  $A \subset B$ , то  $P(A) \leq P(B)$ , тогда поскольку пересечение принадлежит каждому множеству, то его вероятность нулевая. По свойству сигма-аддитивности результат равен нулю.

Объединение событий вероятности 1 — это будет дополнение к пересечению множеств вероятности 0 согласно правилу де Моргана. Каждое множество имеет вероятность 0. И если выбранная вероятностная мера обладает свойством монотонности, то пересечение имеет вероятность 0, а дополнение к нему — вероятность 1.

Если вероятностная мера не обладает свойством монотонности, то возможно лишь одно решение в общем случае:  $\{\emptyset, \Omega\}$  при условии, что нет других событий с вероятностью 0 и 1.

### 7.17

*Задание.* Пусть  $\{A_n\}_{n \geq 1}$  — некоторая последовательность событий. Докажите, что событие  $\liminf A_n$  принадлежит  $\sigma$ -алгебре, порождённой этой последовательностью.

*Решение.* Нижний предел последовательности запишем в виде  $\liminf A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} A_m$ .

Пусть  $\mathcal{A}$  —  $\sigma$ -алгебра, порождённая последовательностью событий  $\{A_n\}_{n \geq 1}$ . По условию каждое  $A_n$  принадлежит  $\sigma$ -алгебре. По определению  $\sigma$ -алгебры любое счётное пересечение и объединение  $A_m$  принадлежит  $\sigma$ -алгебре. Тогда и нижний предел принадлежит  $\sigma$ -алгебре.

### 7.18

*Задание.* Докажите, что если  $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots$  — неубывающая последовательность  $\sigma$ -алгебр, то их объединение  $\mathcal{A} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{A}_n$  является алгеброй.

*Решение.* Последовательность является неубывающей. Это значит, что  $\mathcal{A}_1 \subseteq \mathcal{A}_2 \subseteq \dots$ . То есть объединение элементов этой последовательности даст наибольшую  $\sigma$ -алгебру из последовательности, то есть такую  $\sigma$ -алгебру  $\mathcal{A}_n$ , у которой  $n$  будет наибольшим.

Получаем, что  $\mathcal{A} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{A}_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{A}_n = \mathcal{A}_{\infty}$ . А это и есть  $\sigma$ -алгебра.

Если элемент  $B$  принадлежит какой-то из  $\sigma$ -алгебр из последовательности, то он принадлежит и объединению:  $B \in \mathcal{A}_i \Rightarrow B \in \mathcal{A} \forall i > 0$ .

Если элемент  $B$  принадлежит какой-то из  $\sigma$ -алгебр из последовательности, то и  $\bar{B}$  ей принадлежит, а значит принадлежит и объединению:  $B \in \mathcal{A}_i \Rightarrow \bar{B} \in \mathcal{A}_i \Rightarrow \bar{B} \in \mathcal{A}$ .

Если счётное количество событий принадлежит хоть одной  $\sigma$ -алгебре из заданной последовательности, то ей принадлежит и их счётное объединение, которое принадлежит и объединению данных  $\sigma$ -алгебр:  $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}_i \Rightarrow A_1 \cup A_2 \cup \dots \in \mathcal{A}_i \Rightarrow A_1 \cup A_2 \cup \dots \in \mathcal{A}$ .

Получаем, что  $\mathcal{A}$  — алгебра.

### 7.19

*Задание.* На отрезке  $[0, 1]$  наугад выбрана точка. Пусть событие  $A_n$  означает, что точка выбрана в отрезке

$$\left[0, \frac{n}{n+1}\right),$$

а событие  $B_n$  — в том, что точка выбрана в интервале  $(0, 1/n)$ . Что означают события  $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ ,  $\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$ ?

*Решение.* Распишем объединение отрезков:

$$\begin{aligned} \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n &= \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[0, \frac{n}{n+1}\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[0, \frac{n+1-1}{n+1}\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[0, 1 - \frac{1}{n+1}\right) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[0, 1 - \frac{1}{n+1}\right) = [0, 1). \end{aligned}$$

Точку выбираем из интервала  $[0, 1)$ .

Распишем пересечение отрезков:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(0, \frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(0, \frac{1}{n}\right) = (0, 0) = \emptyset.$$

Точку выбираем из пустого множества.

### 7.20

*Задание.* Пусть  $\Omega$  — некоторое счётное множество, а  $\mathcal{F}$  — совокупность всех его подмножеств. Для  $A \in \mathcal{F}$  положим  $\mu(A) = 0$ , если  $A$  конечно, и  $\mu(A) = \infty$ , если  $A$  бесконечно. Докажите, что функция множеств  $\mu$  является конечно-аддитивной, но не счётно-аддитивной.

*Решение.* Счётное объединение конечных множеств даёт счётное множество. Его мера по условию равна бесконечности. При этом сумма мер равна нулю, так как мера конечного множества равна нулю:  $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = 0$ . Полу-

чили, что не выполняется свойство счётной аддитивности:  $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \infty \neq 0 = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$ .



7.21

*Задание.* Докажите, что:

- a)  $P\left(\varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k\right);$   
b)  $P\left(\varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n\right) \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} P(A_n) \leq \overline{\varliminf}_{n \rightarrow \infty} P(A_n) \leq P\left(\varlimsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right).$

*Решение.*

- a) По определению нижнего предела:  $P\left(\varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k\right).$

Получаем неубывающую последовательность пересечений событий:

$\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k \subseteq \bigcap_{k=n+1}^{\infty} A_k$ . Их объединение будет стремиться к последнему элементу. Поэтому

$$P\left(\varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k\right);$$

- b) пересечение множеств входит в каждое множество

$$\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k \subseteq A_t, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \forall t \geq n.$$

По свойству монотонности получаем

$$P\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k\right) \leq P(A_t), \quad \forall n \in \mathbb{N}, \forall t \geq n.$$

Для любого  $t$ , которое не меньше фиксированного  $n$ , данное неравенство справедливо. Нижний предел вероятностей — это предел одной из подпоследовательностей этих вероятностей. Поскольку это предел, то  $t$  будет стремиться к бесконечности, что больше любого заранее заданного  $n$ . Это значит, что неравенство сохраняется и для нижнего предела, то есть

$$P\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k\right) \leq \varliminf_{t \rightarrow \infty} P(A_t), \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

В левой части неравенства можем увеличивать  $n$  и сделать сколь угодно большим. Иными словами

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k\right) \leq \varliminf_{t \rightarrow \infty} P(A_t).$$

По доказанному из первого пункта

$$P\left(\varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n\right) \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} P(A_n).$$

По свойствам нижнего и верхнего пределов

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} P(A_n) \leq \overline{\varliminf_{n \rightarrow \infty}} P(A_n).$$

Распишем вероятность верхнего предела

$$P\left(\overline{\varliminf_{n \rightarrow \infty}} A_n\right) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right).$$

Верхний предел последовательности случайных событий — это пересечение монотонно невозрастающей последовательности объединений случайных событий. Значит вероятность верхнего предела последовательности сходится к пределу вероятности объединений

$$P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right).$$

Любое множество последовательности входит в объединение множеств из этой последовательности

$$A_t \subseteq \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \forall t \geq n.$$

По свойству монотонности

$$P(A_t) \leq P\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right), \quad \forall n \in \mathbb{N}, \forall t \geq n.$$

Неравенство справедливо для любого  $t$ , которое не меньше фиксированного натурального  $n$ . Поэтому можем перейти к пределу. Он может не существовать, поэтому используем верхний предел

$$\overline{\varliminf_{t \rightarrow \infty}} P(A_t) \leq P\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right), \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

В правой части неравенства может увеличивать  $n$  и сделать его сколько угодно большим. Иными словами

$$\overline{\varliminf_{t \rightarrow \infty}} P(A_t) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right).$$

Получаем

$$\overline{\varliminf_{n \rightarrow \infty}} P(A_n) \leq P\left(\overline{\varliminf_{n \rightarrow \infty}} A_n\right).$$

# Занятие 8. Случайные величины. Измеримость

## Контрольные вопросы и задания

Приведите определение  $\sigma$ -алгебры борелевых множеств, измеримой функции, борелевской функции, случайной величины,  $\sigma$ -алгебры, порождённой случайной величиной.

Борелевская  $\sigma$ -алгебра — наименьшая  $\sigma$ -алгебра, порождённая открытыми множествами.

Пусть  $(X, \mathcal{F})$  и  $(Y, \mathcal{G})$  — два множества с выделенными алгебрами подмножеств. Тогда функция  $f : X \rightarrow Y$  называется  $\mathcal{F}/\mathcal{G}$ -измеримой, или просто измеримой, если полный прообраз любого множества из  $\mathcal{G}$  принадлежит  $\mathcal{F}$ , то есть

$$\forall B \in \mathcal{G}, f^{-1}(B) \in \mathcal{F},$$

где  $f^{-1}(B)$  означает полный прообраз множества  $B$ .

Борелева (борелевская) функция:  $\xi : (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ .

Есть  $(\Omega, \mathcal{F})$  — пространство элементарных событий  $\Omega$  с  $\sigma$ -алгеброй событий  $\mathcal{F}$  на нём. Есть пара  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ , где  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$  —  $\sigma$ -алгебра борелевых подмножеств на  $\mathbb{R}$ . Отображение  $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  называется случайной величиной, если выполняется  $\forall B \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}) : \{\omega : \xi(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}$ , другими словами,  $\xi^{-1}(B) \in \mathcal{F}$  (прообраз каждого множества  $B$  должен быть измеримым).

$\sigma$ -алгебра, порождённая случайной величиной  $\xi : X \rightarrow \mathbb{R}$ , определяется следующим образом:

$$\sigma(\xi) = \{ \xi^{-1}(B) \mid B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \},$$

где  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$  — борелевская сигма-алгебра на вещественной прямой.

**Сформулируйте меру про сходимости по вероятности множеств из минимальной  $\sigma$ -алгебры.**

Последовательность случайных величин  $\{\xi_n : n \geq 1\}$  сходится по вероятности к случайной величине  $\xi$ , если:

$$\forall \epsilon > 0, \quad P\{|\xi_n - \xi| > \epsilon\} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

### Какие $\sigma$ -алгебры называются независимыми?

Пусть  $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2 \subset \mathcal{F}$  две сигма-алгебры на одном и том же вероятностном пространстве. Они называются независимыми, если любые их представители независимы между собой, то есть:

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \mathbb{P}(A_1) \cdot \mathbb{P}(A_2), \quad \forall A_1 \in \mathcal{A}_1, A_2 \in \mathcal{A}_2.$$

### Приведите определение независимых случайных величин.

Пусть дано семейство случайных величин  $(X_i)_{i \in I}$ , так что

$$X_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \quad \forall i \in I.$$

Тогда эти случайные величины попарно независимы, если попарно независимы порождённые ими сигма-алгебры  $\{\sigma(X_i)\}_{i \in I}$ . Случайные величины независимы в совокупности, если таковы порождённые ими сигма-алгебры.

## Аудиторные задачи

### 8.3

*Задание.* Пусть  $\xi, \eta$  — случайные величины, которые определены на вероятностном пространстве  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ . Докажите, что множества  $A = \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) < \eta(\omega)\}$ ,  $B = \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = \eta(\omega)\}$ ,  $C = \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \leq \eta(\omega)\}$  являются событиями.

*Решение.* Есть  $\xi, \eta$  — случайные величины на вероятностном пространстве  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ . Нужно доказать, что множества являются событиями, то есть они принадлежат  $\sigma$ -алгебре  $\mathcal{F}$ .

Нужно проверить, что

$$A = \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) < \eta(\omega)\} \in \mathcal{F}.$$

Пусть

$$\forall c \in \mathbb{R} : \quad \{\omega : \xi(\omega) \leq c\} \in \mathcal{F}, \forall b \in \mathbb{R} : \quad \{\omega : \xi(\omega) \leq b\} \in \mathcal{F}.$$

Множество вещественных чисел  $\mathbb{R}$  является несчётным. Нужно счётное количество операций. Может разделить две случайные величины рациональной точкой

$$\begin{aligned} A &= \bigcup_{c_i \in \mathbb{Q}} \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) < c_i < \eta(\omega)\} = \\ &= \bigcup_{c_i \in \mathbb{Q}} (\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) < c_i\} \cap \{\omega : \eta(\omega) > c_i\}). \end{aligned}$$

С каждым множеством  $\sigma$ -алгебра содержит дополнение. Тогда  $\{\omega : \eta(\omega) > b\} \in \mathcal{F}$ . По условию

$$B = \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = \eta(\omega)\}.$$

Дополнение к нему равно

$$\overline{B} = \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > \eta(\omega)\} \cup \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) < \eta(\omega)\}.$$

По предыдущим пунктам каждое из этих множеств принадлежит  $\mathcal{F}$ . Из этого следует, что объединение принадлежит  $\mathcal{F}$ .

$C$  можно представить как

$$C = A \cup B \in \mathcal{F},$$

так как  $A \in \mathcal{F}$  и  $B \in \mathcal{F}$ .

#### 8.4

*Задание.* Пусть  $\xi, \eta$  — случайные величины, которые определены на вероятностном пространстве  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ . Докажите, что следующие функции являются случайными величинами:

- а)  $\xi + \eta$ ;
- б)  $\xi \cdot \eta$ ;
- в)  $\max\{\xi, \eta\}$ .

*Решение.* Если функция непрерывна, то она является измеримой. В каждом случае  $\phi(\xi, \eta)$  — случайная величина, если  $\phi$  — непрерывная функция. Тогда она борелевская.

#### 8.5

*Задание.* Пусть  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  — вероятностное пространство,  $\xi(\omega)$  — действительная функция, которая определена на  $\Omega$ . Должна ли  $\xi$  быть случайной величиной, если случайной величиной есть:

- а)  $\xi^2$ ;
- б)  $|\xi|$ ;
- в)  $e^\xi$ .

*Решение.*  $\xi$  — случайная величина. Отсюда следует, что  $\xi^2, |\xi|, e^\xi$  — случайные величины (взяли непрерывные функции). В первых двух случаях будем строить контрпример, в третьем случае  $\xi$  будет случайной величиной. Первые две функции не являются взаимно-однозначным отображением. Третья — взаимно-однозначное отображение (рис. 54).

- а)



Рис. 54: Функции

b) Строим контрпример. Пусть

$$\xi(\omega) = \begin{cases} 1, \omega \in A, \\ -1, \omega \in \tilde{A}, \end{cases}$$

где  $A$  — измеримое множество,  $\tilde{A}$  — не измеримое множество. Тогда видим, что  $\xi$  не является случайной величиной, потому что

$$\{\omega : \xi(\omega) = -1\} = \tilde{A} \notin \mathcal{F}$$

— не измеримое множество ( $\sigma$ -алгебра — это только измеримые множества).

$$\xi^2(\omega) \equiv 1, |\xi(\omega)| \equiv 1, \quad \forall \omega$$

c)  $e^\xi$ . Тожественная единица — это число (константа) — случайная величина;

d) что значит, что  $e^\xi$  — случайная величина?  $e^\xi$  — случайная величина. Отсюда следует, что  $\forall c \in \mathbb{R} : \{\omega : e^{\xi(\omega)} \leq c\}$ . Можем записать, что это множество  $\{\omega : \xi(\omega) \leq \ln c\} \in \mathcal{F}$ , где  $\ln c \equiv d \in \mathbb{R}$ . Доказали, что для любого  $d \in \mathbb{R}$  множество  $\{\omega : \xi(\omega) \leq d\} \in \mathcal{F}$ . Тогда действительно  $\xi$  является случайной величиной.

## 8.6

*Задание.* Пусть  $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$  — последовательность случайных величин, которые заданы на вероятностном пространстве  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ . Докажите, что функции  $\inf_n \xi_n, \sup_n \xi_n$  являются случайными величинами.

*Решение.* Нужно показать, что  $\forall c \in \mathbb{R} : \left\{ \omega : \inf_n \xi_n(\omega) \leq c \right\} \in \mathcal{F}$ .

Выписываем это множество и думаем, как его изобразить. Хотя бы один элемент должен быть меньше  $c$ . Отсюда следует, что

$$\left\{ \omega : \inf_n \xi_n(\omega) \leq c \right\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{ \omega : \xi_n(\omega) \leq c \right\}.$$

Каждое множество, которое стоит под знаком объединения, по определению принадлежит  $\sigma$ -алгебре  $\mathcal{F}$  и их счётное объединение принадлежит  $\sigma$ -алгебре  $\mathcal{F}$ .  $\sigma$ -алгебра замкнута относительно счётной операции объединения.

$$\left\{ \omega : \sup_n \xi_n(\omega) > c \right\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{ \omega : \xi_n(\omega) > c \right\} \in \mathcal{F}.$$

Это следует из того, что  $\{\omega : \xi_n(\omega) > c\} \in \mathcal{F}$ , так как это случайная величина.

## 8.7

*Задание.* Пусть  $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$  — последовательность случайных величин, которые определены на одном и том же вероятностном пространстве. Докажите, что множества:  $A = \{\omega \in \Omega \mid \text{последовательность } \{\xi_n(\omega)\}_{n \geq 1} \text{ ограничена}\}$ ,  $B = \{\omega \in \Omega \mid \xi_1 + \xi_2 \geq 5\}$ ,  $C = \{\omega \in \Omega \mid \xi_1 - 3\xi_2\xi_3 + \xi_4^2 \cos \xi_1 \geq 0\}$  являются случайными событиями.

*Решение.* Чтоб доказать, что  $A$  является случайным событием, нужно показать, что  $\{\omega \in \Omega \mid \text{последовательность } \{\xi_n(\omega)\}_{n \geq 1} \text{ ограничена}\} \in \mathcal{F}$  для произвольного  $x \in \mathbb{R}$ .

Последовательность  $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$  называется ограниченной, если она ограниченная сверху и ограниченная снизу, то есть существует такое число  $x > 0$ , что для любого номера  $n$ ,  $|\xi_n(\omega)| \leq x$ . Имеем:  $\{\omega \in \Omega \mid \text{последовательность } \{\xi_n(\omega)\}_{n \geq 1} \text{ ограничена}\} = \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} \{\omega \mid \exists x > 0, \forall n, -x \leq \xi_n(\omega) \leq x\} = \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} \{\omega \mid \xi_n(\omega) \leq x\} \setminus \{\omega \mid \xi_n(\omega) < -x\}$ . Поскольку  $\xi_n$  является случайной, то оба множества  $\{\omega \mid \xi_n(\omega) \leq x\}$  и  $\{\omega \mid \xi_n(\omega) < -x\}$  принадлежат  $\sigma$ -алгебре  $\mathcal{F}$ , а значит и их разница  $\{\omega \mid \xi_n(\omega) \leq x\} \setminus \{\omega \mid \xi_n(\omega) < -x\}$  принадлежит этой  $\sigma$ -алгебре. Тогда и

$$\bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} \{\omega \mid \xi_n(\omega) \leq x\} \setminus \{\omega \mid \xi_n(\omega) < -x\} \in \mathcal{F}.$$

Чтобы доказать, что  $B$  является случайным событием, нужно показать, что  $\{\omega \in \Omega \mid \xi_1 + \xi_2 \geq x\} \in \mathcal{F}$  для произвольного  $x \in \mathbb{R}$ . Умножим на -1

$$\{\omega \in \Omega \mid -\xi_1 - \xi_2 \leq -x\}.$$

Нужно доказать, что

$$\{\omega \in \Omega \mid -\xi \leq x\} \in \mathcal{F}.$$

Знаем, что

$$\{\omega \in \Omega \mid \xi \leq x\} \in \mathcal{F}.$$

Умножим на -1

$$\{\omega \in \Omega \mid -\xi \geq x\} \in \mathcal{F}.$$

Дополнение к этому множеству имеет вид

$$\{\omega \in \Omega \mid -\xi < x\} \in \mathcal{F}.$$

Из того, что  $\xi$  — случайная величина следует, что

$$\{\omega \in \Omega \mid \xi > x\} \in \mathcal{F}.$$

Нужно показать, что

$$\{\omega \in \Omega \mid \xi = x\} \in \mathcal{F}.$$

Берём два случайных события  $\{\omega \in \Omega \mid \xi \leq c_1\} \in \mathcal{F}$  и  $\{\omega \in \Omega \mid \xi \leq c_2\} \in \mathcal{F}$ , причём  $c_2 < c_1$ . Возьмём разность этих событий

$$\{\omega \in \Omega \mid c_2 < \xi \leq c_1\} \in \mathcal{F}.$$

По свойству случайных величин это выполняется для любых  $c_2 < c_1$ . Значит можем взять такое  $c_2$ , что

$$\lim_{c_2 \rightarrow c_1-} \{\omega \in \Omega \mid c_2 < \xi \leq c_1\} = \{\omega \in \Omega \mid \xi = c_1\} \in \mathcal{F}.$$

Отсюда следует, что

$$\{\omega \in \Omega \mid \xi \geq c\} \in \mathcal{F}.$$

Тогда и

$$\{\omega \in \Omega \mid \xi_1 + \xi_2 \geq c\} \in \mathcal{F}.$$

По условию  $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$  являются случайными величинами. Непрерывные функции от этих случайных величин являются измеримыми. Значит по предыдущему пункту

$$C = \{\omega \in \Omega \mid \xi_1 - 3\xi_2\xi_3 + \xi_4^2 \cos \xi_1 \geq c\} \in \mathcal{F}.$$

Это выполняется для любого  $c \in \mathbb{R}$ . Выберем  $c = 0$ .

$$C = \{\omega \in \Omega \mid \xi_1 - 3\xi_2\xi_3 + \xi_4^2 \cos \xi_1 \geq 0\} \in \mathcal{F}.$$

## 8.8

*Задание.* Пусть вероятностное пространство  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  является отрезком  $[0, 1]$  из  $\sigma$ -алгебры борелевских множеств и мерой Лебега. Опишите  $\sigma$ -алгебру, порождённую случайной величиной:

а)  $\xi(\omega) = 1/2$ ;

б)  $\xi(\omega) = \begin{cases} \omega, & \omega \in [0, 1/2), \\ 1, & \omega \in [1/2, 1]. \end{cases}$

*Решение.*

а)  $\xi(\omega) = 1/2$ . Нарисуем график этого отображения (рис. 55)

$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  — вероятностное пространство, где  $\Omega = [0, 1]$ . Отрезок  $[0, 1]$  является атомом для  $\xi$ , поскольку все значения равны для любой точки. Сформируем некоторое множество  $\mathcal{A} = \{B \subset \mathcal{F} \mid B \supset [0, 1] \text{ или } B \cap [0, 1] = \emptyset\} = \{[0, 1], \emptyset\}$  — тривиальная  $\sigma$ -алгебра.

Проверим, что  $\mathcal{A}$  — это действительно  $\mathcal{F}_\xi$ , то есть  $\sigma$ -алгебра, порождённая  $\xi$ . Нужно убедиться, что





Рис. 55: График  $\xi(\omega) = 1/2$

- (a)  $\forall B \subset \mathcal{A} \exists \Delta \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \quad B = \xi^{-1}(\Delta);$   
 (b)  $\forall \Delta \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \quad \xi^{-1}(\Delta) \in \mathcal{A}.$

Проверяем первое условие:

- а) для  $\emptyset$  должно найтись множество на  $\xi(\omega)$ , такая что её прообраз совпадает с множеством, которое не содержит  $1/2$ . Если  $B = \emptyset$ , то  $\Delta$  — произвольное множество из  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ , которое не содержит точку  $1/2$ ;  
 б) если  $B = [0, 1]$ , в качестве  $\Delta$  можно взять  $\{1/2\}$ .

Проверяем второе условие:

- а) если  $\Delta \supset \{1/2\}$ , тогда  $\xi^{-1}(\Delta) = [0, 1] \in \mathcal{A}$ ;  
 б) если  $\Delta \not\supset \{1/2\}$ , то  $\xi^{-1}(\Delta) = \emptyset \in \mathcal{A}$ .

Убедились, что все прообразы являются  $\emptyset$  или  $[0, 1]$ ;

- б) нарисуем график (рис. 56.



Рис. 56: График

$$\xi(\omega) = \begin{cases} \omega, & \omega \in [0, 1/2), \\ 1, & \omega \in [1/2, 1]. \end{cases}$$

Отображение  $\xi : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ . Будем рассматривать борелевскую  $\sigma$ -алгебру. Отрезок

$$\left[\frac{1}{2}, 1\right]$$

является атомом для  $\xi$ . Отсюда следует, что множество

$$\mathcal{A} = \left\{ B \subset \mathcal{F} \mid B \supset \left[\frac{1}{2}, 1\right] \text{ or } B \cap \left[\frac{1}{2}, 1\right] = \emptyset \right\}.$$

Наша гипотеза: это и есть  $\sigma$ -алгебра, порождённая  $\xi$ . Должны проверить такие 2 условия:

- (a)  $\forall B \subset \mathcal{A} \exists \Delta \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \quad B = \xi^{-1}(\Delta);$
- (b)  $\forall \Delta \in \mathcal{B}([0, 1]), \quad \xi^{-1}(\Delta) \in \mathcal{A}.$

Проверяем первое условие:

а) пусть

$$B \supset \left[\frac{1}{2}, 1\right].$$

Предъявим  $\Delta$ . Тогда  $\Delta = \{1\} \cup (B \setminus [0, 1]);$

б) пусть

$$B \cap \left[\frac{1}{2}, 1\right] = \emptyset.$$

Оно будет прообразом для  $\Delta = B$ .

Проверяем второе условие:

а) пусть  $\Delta \supset \{1\}$ , тогда

$$\xi^{-1}(\Delta) = \left[\frac{1}{2}, 1\right] \cup \left(\Delta \cap \left[\frac{1}{2}, 1\right]\right) \in \mathcal{A},$$

потому что это множество полностью содержит отрезок

$$[1/2, 1];$$

б) если  $\Delta \not\supset \{1\}$ , то

$$\xi^{-1}(\Delta) = \Delta \cap \left[0, \frac{1}{2}\right) \in \mathcal{A}.$$

Поэтому это действительно  $\sigma$ -алгебра, порождённая  $\xi$ .

## 8.9

*Задание.* Опишите  $\sigma$ -алгебру, порождённую дискретной случайной величиной.

*Решение.* Любую дискретную случайную величину можем изобразить как

$$\xi(\omega) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot \mathbb{1}(\omega \in A_i),$$

где

$$\Omega = \bigsqcup_{i=1}^n A_i, P(A_i) > 0, A_i \cap A_j = \emptyset.$$

В каждом случае  $\xi$  принимает  $n$  разных значений  $\{x_1, \dots, x_n\}$ . Или если она принимает счётное количество значений

$$\xi(\omega) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \cdot \mathbb{1}(\omega \in A_i),$$

где

$$\Omega = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i, P(A_i) > 0, A_i \cap A_j = \emptyset, A_i = \{\omega \mid \xi(\omega) = x_i\}.$$

Тогда  $A_i$  — атомы для  $\xi$ . Тогда

$$\sigma(\xi) = \left\{ B \in \mathcal{F} \mid B = \bigcup_{i \in M} A_i \right\} = \mathcal{A},$$

где  $M$  — некоторое множество индексов. Нарисуем график (рис. 57).



Рис. 57: График

Проверим, что  $\mathcal{A}$  — действительно  $\sigma$ -алгебра, порождённая величиной  $\xi$ . Нужно проверить условия:

1.  $\forall B \subset \mathcal{A} \exists \Delta \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \quad B = \xi^{-1}(\Delta);$
2.  $\forall \Delta \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \quad \xi^{-1}(\Delta) \in \mathcal{A}.$

Пусть  $B \in \mathcal{A}$ . Тогда

$$B = \bigcup_{i \in M} A_i,$$

где  $M$  — некоторое множество индексов.

Например,  $B = A_1 \cup A_3$ .

Возьмём

$$\Delta = \bigcup_{i \in M} \{x_i\}.$$

Тогда  $\xi^{-1}(\Delta) = B$ . Показали первое условие.

Допустим, что ни одна из  $x_1, x_2, x_3, \dots$  не входит в  $\Delta$ . Тогда

$$\xi^{-1}(\Delta) = \emptyset \in \mathcal{A}.$$

Множество  $M$  может содержать  $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}, \dots$ .

Пусть некоторые  $x_i \in \Delta$ . Сформируем множество индексов

$$\{M \mid \forall i \in M, \quad x_i \in \Delta\}.$$

Тогда прообразом будет

$$\xi^{-1}(\Delta) = \bigcup_{i \in M} A_i.$$

Проверили оба условия. Значит  $\mathcal{A}$  является  $\sigma$ -алгеброй, порождённой случайной величиной  $\xi$ .

## 8.10

*Задание.* Докажите, что последовательность событий  $\{A_n\}_{n \geq 1}$  является последовательностью независимых событий тогда и только тогда, когда  $\{\mathbb{1}(A_n)\}_{n \geq 1}$  является последовательностью независимых случайных величин. Здесь  $\mathbb{1}(A)$  — индикатор события  $A$ .

*Решение.*

$$\mathbb{1}(A_n) = \begin{cases} 1, & \omega \in A_n, \\ 0, & \omega \notin A_n \ (\omega \in \overline{A_n}). \end{cases}$$

Пусть есть последовательность независимых событий  $\{A_n\}_{n \geq 1}$ . По определению

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i^{\epsilon_i}\right) = \prod_{i=1}^n P(A_i^{\epsilon_i}).$$

Пусть  $x_i \in \{0, 1\}$ . Тогда

$$P(\mathbb{1}(A_1^{\epsilon_1}) = x_1, \mathbb{1}(A_2^{\epsilon_2}) = x_2, \dots, \mathbb{1}(A_n^{\epsilon_n}) = x_n) = \prod_{i=1}^n P(\mathbb{1}(A_i^{\epsilon_i}) = x_i) (*).$$

Знаем, что  $\mathbb{1}(A_1) = 1 \iff A_1$  произошло, и  $\mathbb{1}(\overline{A_1}) = 0 \iff \overline{A_1}$  не произошло  $\Rightarrow A_1$  произошло.

Из того, что

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i^{\epsilon_i}\right) = \prod_{i=1}^n P(A_i^{\epsilon_i})$$

следует, что

$$P(\mathbb{1}(A_1^{\epsilon_1}) = x_1, \dots, A_n^{\epsilon_n} = x_n) = \prod_{i=1}^n P(A_i^{\epsilon_i}), (*) = \prod_{i=1}^n P(A_i^{\epsilon_i}).$$

### 8.11

*Задание.* Пусть  $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$  — независимые алгебры. Докажите, что порождённые ими  $\sigma$ -алгебры тоже независимы.

*Решение.* Пусть  $A_1, A_2$  из наших  $\sigma$ -алгебр. Тогда для каждого  $\epsilon$  найдутся  $B_1, B_2$  из наших алгебр, такие, что  $P(A_i \Delta B_i) \leq \epsilon$ ,  $i = 1, 2$ . Отсюда  $P(A_1 A_2) - P(A_1)P(A_2) \leq P(B_1 A_2 + (A_1 A_2) \setminus (B_1 A_2)) - (P(A_1) - \epsilon)(P(A_2) - \epsilon) \leq P(B_1 A_2) + P(A_2(A_1 \setminus B_1)) - P(A_1 A_2) + 2\epsilon \leq P((B_1 \setminus A_1) A_2) + P(A_1 A_2) - P(A_1)P(A_2) + 3\epsilon \leq 4\epsilon$ .

В силу произвольности  $\epsilon$  имеем  $P(A_1 A_2) \leq P(A_1)P(A_2)$ . Аналогично доказывается обратное неравенство, откуда и следует независимость  $A_1$  и  $A_2$ .

## Дополнительные задачи

### 8.12

*Задание.* Пусть  $\xi_1, \dots, \xi_n$  — случайные величины и  $\phi(x_1, \dots, x_n)$  — борелевская функция. Докажите, что функция  $\phi(\xi_1(\omega), \dots, \xi_n(\omega))$  является случайной величиной.

*Решение.*

## Домашнее задание

### 8.13

*Задание.* Пусть  $A$  — случайное событие. Докажите, что

$$\mathbb{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \notin A \end{cases}$$

является случайной величиной.

*Решение.* Нужно доказать, что  $\forall c \in \mathbb{R}, \quad \{\omega \mid \mathbb{1}_A(\omega) \leq c\} \in \mathcal{F}$ , где  $\mathcal{F}$  — сигма-алгебра.

Пусть  $c \geq 1$ . Тогда

$$\{\omega \mid \mathbb{1}_A(\omega) \leq c\} = \Omega \in \mathcal{F}.$$

В частности, при  $c = 1$  получаем

$$\{\omega \mid \mathbb{1}_A(\omega) \leq 1\} = \Omega \in \mathcal{F},$$

так как по определению индикатора события он может принимать значение или 0, или 1, что всегда не больше единицы. То есть неравенство справедливо для всех  $\omega$  из  $\Omega$ .

По условию  $A \in \mathcal{F}$ . По определению  $\sigma$ -алгебры  $\bar{A} \in \mathcal{F}$ .

Осталось доказать, что это выполняется и для  $c < 1$ . Получаем множество

$$\{\omega \mid \mathbb{1}_A < 1\} = \bar{A} \in \mathcal{F}.$$

Доказали, что соотношение выполняется для любого вещественного числа  $c$ . Следовательно индикатор случайного события — случайная величина.

### 8.14

*Задание.* Пусть  $\xi, \eta$  — случайные величины, определённые на вероятностном пространстве  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ . Докажите, что следующие функции являются случайными величинами:

- a)  $\xi - \eta$ ;
- b)  $\min\{\xi, \eta\}$ ;
- c)  $\xi^\eta$ , где  $\xi$  — положительная случайная величина.

*Решение.* Если функция непрерывна, то она является измеримой.

- a) Чтобы доказать, что  $\xi - \eta$  является случайной величиной, нужно показать, что  $\{\omega \mid \xi - \eta \leq x\} \in \mathcal{F}$  для произвольного  $x \in \mathbb{R}$ . Имеем:

$$\{\omega \mid \xi - \eta \leq x\} = \{\omega \mid \xi \leq \eta + x\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} (\{\omega \mid \xi < r_n\} \cap \{\omega \mid r_n < x - \eta\}),$$

где  $\{r_n\} = \mathbb{Q}$ . Так как  $\xi$  и  $\eta$  являются случайными величинами, то и множества  $\{\omega \mid \xi < r_n\}$  и  $\{\omega \mid r_n < x - \eta\}$  принадлежат  $\sigma$ -алгебре  $\mathcal{F}$ , а значит и их пересечение и объединение принадлежит этой  $\sigma$ -алгебре;

- b) нужно показать, что  $\{\omega \mid \min\{\xi, \eta\} \leq x\} \in \mathcal{F}$  для произвольного  $x \in \mathbb{R}$ . Распишем  $\{\omega \mid \min\{\xi, \eta\} \leq x\} = \{\omega \mid \xi \leq x\} \cup \{\omega \mid \eta \leq x\}$ . Так как  $\xi$  и  $\eta$  являются случайными величинами, то и множества  $\{\omega \mid \xi \leq x\}$  и  $\{\omega \mid \eta \leq x\}$  принадлежат  $\sigma$ -алгебре  $\mathcal{F}$ , а значит и их объединение принадлежит этой  $\sigma$ -алгебре;

- c) нужно показать, что  $\{\omega \mid \xi^\eta \leq x\} \in \mathcal{F}$  для произвольного  $x \in \mathbb{R}$ . Распишем  $\{\omega \mid \xi^\eta \leq x\} = \{\omega \mid \eta \cdot \ln \xi \leq \ln x\}$ .

Покажем сначала, что  $\ln \xi$  — случайная величина. Имеем множество  $\{\omega \mid \ln \xi \leq \ln x\} = \{\omega \mid \ln \xi \leq x'\} \in \mathcal{F}$ . Следовательно  $\ln \xi$  — случайная величина.

Покажем, что квадрат случайной величины тоже является случайной величиной  $\{\omega : \xi \leq x\} = \{\xi^2 \leq x^2 = x'\} \in \mathcal{F}$ .

Вернёмся к основной задаче

$$\begin{aligned} & \{\omega \mid \eta \cdot \ln \xi \leq \ln x\} = \\ & = \left\{ \omega \mid \eta^2 + \frac{1}{4} \cdot 2\eta \cdot \ln \xi + \xi^2 - \eta^2 + \frac{1}{4} \cdot 2\eta \cdot \ln \xi - \xi^2 \leq \ln x \right\} = \\ & = \left\{ \omega \mid \left[ (\eta + \ln \xi)^2 - (\eta - \ln \xi)^2 \right] \cdot \frac{1}{4} \leq \ln x \right\} = \\ & = \left\{ \omega \mid (\eta + \ln \xi)^2 - (\eta - \ln \xi)^2 \leq 4 \ln x \right\} = \\ & = \left\{ \omega \mid [\eta - (-\ln \xi)]^2 - [\eta - \ln \xi]^2 \leq 4 \ln x \right\} \in \mathcal{F}. \end{aligned}$$

Значит  $\xi^\eta$  — случайная величина.

## 8.15

*Задание.* Пусть  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  — вероятностное пространство,  $\xi(\omega)$  — действительная функция, определённая на  $\Omega$ . Должна ли  $\xi$  быть случайной величиной, если случайной величиной есть:

- a)  $\cos \xi$ ;
- b)  $\xi^\xi$ , где  $\xi$  — положительная случайная величина.

*Решение.* Функции не являются взаимно-однозначными, поэтому  $\xi$  не будет случайной величиной.

- a) Строим контрпример. Пусть

$$\xi(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ -1, & \omega \in \tilde{A}, \end{cases}$$

где  $A$  — измеримое множество,  $\tilde{A}$  — неизмеримое множество. Тогда  $\xi$  не является случайной величиной, потому что  $\{\omega \mid \xi(\omega) = -1\} = \tilde{A} \in \mathcal{F}$  — неизмеримое множество ( $\sigma$ -алгебра — это только измеримые множества);

- b) строим контрпример. Пусть

$$\xi(\omega) = \begin{cases} 0.45, & \omega \in A, \\ 0.25, & \omega \in \tilde{A}, \end{cases}$$

где  $A$  — измеримое множество,  $\tilde{A}$  — неизмеримое множество. Тогда  $\xi$  не является случайной величиной, потому что  $\{\omega \mid \xi(\omega) = -1\} = \tilde{A} \in \mathcal{F}$  — неизмеримое множество ( $\sigma$ -алгебра — это только измеримые множества)

### 8.16

*Задание.* Пусть  $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$  — последовательность случайных величин, определённых на одном и том же вероятностном пространстве. Докажите, что  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \xi_n$  является случайной величиной.

*Решение.* Запишем верхний предел последовательности в виде  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \inf_{m \geq 1} \sup_{n \geq m} \xi_n$ .

Считаем, что  $\sup_{n \geq 1} \xi_n$  может принимать значение  $+\infty$ , тогда

$$\left\{ \omega \mid \eta(\omega) = \sup_{n \geq 1} \xi_n = +\infty \right\} \in \mathcal{F}.$$

Аналогично  $\inf_{n \geq 1} \xi_n$  может принимать значение  $-\infty$ , тогда

$$\left\{ \omega \mid \xi(\omega) = \inf_{n \geq 1} \xi_n = -\infty \right\} \in \mathcal{F}.$$

Покажем, что  $\sup_{n \geq 1} \xi_n$  — случайная величина

$$\begin{aligned} \forall c \in \mathbb{R}, \quad \{\omega \mid \eta(\omega) \leq c\} &= \left\{ \omega \mid \sup_{n \geq 1} \xi_n(\omega) \leq c \right\} = \\ &= \{\omega \mid \forall n \geq 1, \quad \xi_n(\omega) \leq c\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{\omega \mid \xi_n(\omega) \leq c\} \in \mathcal{F}, \end{aligned}$$

так как каждое из множеств принадлежит  $\mathcal{F}$ . Следовательно супремум случайных величин — это случайная величина.

Покажем, что  $\inf_{n \geq 1} \xi_n$  — случайная величина

$$\begin{aligned} \forall c \in \mathbb{R}, \quad \{\omega \mid \xi(\omega) \leq c\} &= \left\{ \omega \mid \inf_{n \geq 1} \xi_n(\omega) \leq c \right\} = \\ &= \{\omega \mid \forall n \geq 1, \quad \xi_n(\omega) \leq c\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{\omega \mid \xi_n(\omega) \leq c\} \in \mathcal{F}, \end{aligned}$$

так как каждое из множеств принадлежит  $\mathcal{F}$ . Следовательно инфимум случайных величин — это случайная величина.

Из этого следует, что верхний предел последовательности случайных величин — случайная величина.

### 8.17

*Задание.* Пусть  $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$  — последовательность случайных величин, определённых на одном и том же вероятностном пространстве. Докажите, что множество  $A = \{\omega \in \Omega \mid \text{последовательность } \{\xi_n\}_{n \geq 1} \text{ является монотонной}\}$  является случайным событием.



*Решение.* Чтобы доказать, что множество  $A$  является случайным событием, нужно показать, что  $A \in \mathcal{F}$ . Поскольку последовательность является монотонной, то:

$$\begin{aligned} A &= \{\forall n \geq 1, \quad \xi_n - \xi_{n-1} \leq 0\} = \\ &= \bigcap_{n=1}^{\infty} \{\omega \in \Omega : \xi_n - \xi_{n-1} \leq 0\} \cup \{\omega \in \Omega : \xi_{n-1} - \xi_n \leq 0\}. \end{aligned}$$

Поскольку  $\xi_n - \xi_{n-1}$  является случайной величиной при произвольных  $n$ , то

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \{\omega \in \Omega : \xi_n - \xi_{n-1} \leq 0\} \cup \{\omega \in \Omega : \xi_{n-1} - \xi_n \leq 0\} \in \mathcal{F},$$

поскольку  $\mathcal{F}$  есть  $\sigma$ -алгебра.

### 8.18

*Задание.* Пусть вероятностное пространство  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  является отрезком  $[0, 1]$  с  $\sigma$ -алгеброй борелевских множеств и мерой Лебега. Опишите  $\sigma$ -алгебру, порождённую случайной величиной:

а)  $\xi(\omega) = \omega/2$ ;

б)  $\xi(\omega) = \begin{cases} 1/4, & \omega \in [0, 1/4), \\ 1/2, & \omega \in [1/4, 3/4), \\ 1, & \omega \in [3/4, 1]. \end{cases}$

*Решение.*

а) Нарисуем график этого отображения (рис. 58).




Рис. 58:  $\xi(\omega) = \omega/2$

$\sigma$ -алгебра, порождённая  $\xi$  — это совокупность всех случайных событий вида  $\xi^{-1}(\Delta)$ , где  $\Delta \in \mathcal{B}([0, 1])$ . Это множество всех прообразов борелевских подмножеств из  $[0, 1]$ , то есть  $\mathcal{F}_\xi = \{A \subset \mathcal{F} \mid A = \xi^{-1}(\Delta), \Delta \in \mathcal{B}([0, 1])\}$ .

Пусть  $\mathcal{A}$  — сигма-алгебра, порождённая случайной величиной  $\xi$ . Она имеет вид  $\mathcal{A} = \{B \subset \mathcal{F} \mid [0, 1], \emptyset\}$ .

Гипотезы: это и есть  $\sigma$ -алгебра, порождённая  $\xi$ .

Условия, которые должны выполняться:

- (а)  $\forall B \subset \mathcal{A}, \exists \Delta \in \mathcal{B}([0, 1]), \quad B = \xi^{-1}(\Delta)$ , то есть в это множество входят только прообразы борелевских подмножеств из  $[0, 1]$ ;
- (б)  $\forall \Delta \in \mathcal{B}([0, 1]), \quad \xi^{-1}(\Delta) \in \mathcal{A}$ , то есть все прообразы открытых множеств туда вошли.

Проверяем первое условие. Пусть  $B = [0, 1]$ . Тогда

$$\Delta = \left[0, \frac{1}{2}\right].$$

Пусть  $B = \emptyset$ . Тогда

$$\Delta = \left(\frac{1}{2}, 1\right].$$

Проверяем второе условие. Пусть

$$\Delta = \left(\frac{1}{2}, 1\right],$$

тогда

$$\xi^{-1}(\Delta) = \emptyset \in \mathcal{A}.$$

Если

$$\Delta = \left[0, \frac{1}{2}\right],$$

то

$$\xi^{-1}(\Delta) = [0, 1] \in \mathcal{A}.$$

Отсюда следует, что это действительно  $\sigma$ -алгебра, порождённая  $\xi$ .

б) Нарисуем график (рис. 59).




Рис. 59: График

$\xi : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ . Будем рассматривать борелевскую  $\sigma$ -алгебру. Отрезки  $\left[0, \frac{1}{4}\right)$ ,  $\left[\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right)$ ,  $\left[\frac{3}{4}, 1\right]$  являются атомами для  $\xi$ .

Дискретную случайную величину можем изобразить как

$$\xi(\omega) = \sum_{i=1}^3 x_i \cdot \mathbb{1}(\omega \in A_i),$$

где

$$\Omega = \bigsqcup_{i=1}^3 A_i, \quad P(A_i) > 0, \quad A_i \cap A_j = \emptyset.$$

$\xi$  принимает 3 разные значения

$$\left\{ x_1 = \frac{1}{4}, x_2 = \frac{1}{2}, x_3 = 1 \right\}$$

в данном случае.

Тогда  $A_i$  — атомы для  $\xi$ . Тогда

$$\sigma(\xi) = \left\{ B \in \mathcal{F} \mid B = \bigcup_{i \in M} A_i = \left\{ \frac{1}{4} \right\} \cup \left\{ \frac{1}{2} \right\} \cup \{1\} \right\} = \mathcal{A},$$

где  $M = \{1, 2, 3\}$  — множество индексов.

Проверим, что  $\mathcal{A}$  является действительно  $\sigma$ -алгеброй, порождённой случайной величиной  $\xi$ . Нужно проверить условия:

- (а)  $\forall B \in \mathcal{A}, \exists \Delta \in \mathcal{B}([0, 1]), \quad B = \xi^{-1}(\Delta);$
- (б)  $\forall \Delta \in \mathcal{B}([0, 1]), \quad \xi^{-1}(\Delta) \in \mathcal{A}.$

Пусть  $B \in \mathcal{A}$ . Тогда

$$B = \bigcup_{i \in M} A_i = [0, 1],$$

где  $M = \{1, 2, 3\}$  — множество индексов.

Возьмём

$$\Delta = \bigcup_{i \in M} \{x_i\} = \left\{ \frac{1}{4} \right\} \cup \left\{ \frac{1}{2} \right\} \cup \{1\}.$$

Тогда  $\xi^{-1}(\Delta) = [0, 1]$ . Показали первое условие.

Допустим, что ни одна из  $x_1, x_2, x_3$  не входит в  $\Delta$ . Тогда

$$\xi^{-1}(\Delta) = \emptyset \in \mathcal{A}.$$

Пусть некоторые  $x_i \in \Delta$ . Сформируем множество индексов

$$\{M \mid \forall i \in M, \quad x_i \in \Delta\}.$$

Тогда прообразом будет

$$\xi^{-1}(\Delta) = \bigcup_{i \in M} A_i.$$

Проверили оба условия. Значит  $\mathcal{A}$  является  $\sigma$ -алгеброй, порождённой случайной величиной  $\xi$ .

### 8.19

*Задание.* Пусть  $\xi$  и  $\eta$  — независимые случайные величины,  $f$  и  $g$  — борелевские функции. Докажите, что случайные величины  $f(\xi)$  и  $g(\eta)$  являются независимыми.

*Решение.*  $\eta$  и  $\xi$  — независимые случайные величины.  $f, g$  — борелевские функции.

Борелева (борелевская) функция — отображение пространства вещественных чисел в пространство вещественных чисел, для которого прообраз любого борелевского множества есть борелевское множество.

Борелевское множество — множество, которое может быть получено в результате не более чем счётной совокупности операций объединения и пересечения открытых и замкнутых множеств пространства вещественных чисел.

Из независимости случайных величин  $\xi$  и  $\eta$  следует

$$P(\xi \in B_1, \eta \in B_2) = P(\xi \in B_1)P(\eta \in B_2), \forall B_1, B_2 \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

$f(\xi), g(\eta)$  — случайные величины.

$$\begin{aligned} P\{f(\xi) \in B_1, g(\eta) \in B_2\} &= P\{\xi \in f^{-1}(B_1), \eta \in g^{-1}(B_2)\} = \\ &= P\{\xi \in B'_1, \eta \in B'_2\} = P(\xi \in B'_1)P(\eta \in B'_2) = P(f(\xi) \in B_1)P(g(\eta) \in B_2). \end{aligned}$$

### 8.20

*Задание.* Пусть  $\xi$  и  $\eta$  — зависимые случайные величины,  $f$  и  $g$  — борелевские функции. Могут ли случайные величины  $f(\xi)$  и  $g(\eta)$  быть независимыми?

*Решение.*  $\xi$  и  $\eta$  — зависимые случайные величины. Из предыдущей задачи следует, что  $f(\xi)$  и  $g(\eta)$  — тоже зависимы, где  $f, g$  — борелевские функции.

# Занятие 11.

## Последовательности случайных величин. Лемма Бореля-Кантелли

### Контрольные вопросы и задания

Сформулируйте лемму Бореля-Кантелли, закон «нуля или единицы» Колмогорова; запишите теоретико-множественное изображение событий  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n$ ,  $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n$ .

Лемма Бореля-Кантелли.

1. Если

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < +\infty,$$

$$\text{то } P\left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = 0;$$

2. если  $\{A_n\}$  — независимы и

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = +\infty$$

(ряд, составленный из вероятностей, расходится), то  $P\left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = 1$ .

Закон «нуля или единицы» Колмогорова. Пусть дано вероятностное пространство  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  и определённая на нём последовательность независимых случайных величин  $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$  (не обязательно одинаково распределённых). Пусть  $\mathcal{F}_{\infty}$  — её остаточная  $\sigma$ -алгебра, то есть

$$\mathcal{F}_{\infty} = \sigma\left(\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n \geq m} \mathcal{F}_n\right),$$

где  $\mathcal{F}_n$  есть  $\sigma$ -алгебра, порождённая случайной величиной  $X_n$ .

Тогда если  $A \in \mathcal{F}_\infty$ , то  $\mathbb{P}(A) = 0$  или  $\mathbb{P}(A) = 1$ .

Другими словами,  $A$  — остаточное событие, если оно измеримо относительно  $\sigma$ -алгебры, порождённой случайными величинами  $\{X_n\}_{n=1}^\infty$ , но независимо от любого конечного подмножества этих величин. Согласно теореме, такое событие имеет вероятность ноль или единица.

Пусть  $\{A_n\}_{n \geq 1}$  — последовательность случайных событий.

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m.$$

Это означает, что  $\forall n \exists m$ ,  $A_m$  произошло. В последовательности

$$\{A_n\}_{n \geq 1}$$

происходит бесконечно много событий  $A_n$ .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} A_m =$$

$= \{ \text{начиная с некоторого номера в } \{A_n\}_{n \geq 1} \text{ происходят все события } A_n \}.$   
 $\exists n \forall m, \quad A_m \text{ произошло.}$

## Аудиторные задачи

## Дополнительные задачи

## Домашнее задание