

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УКРАИНЫ
“КИЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ ИГОРЯ
СИКОРСКОГО”**

**ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ №4

Дисциплина: «Методы вычислений»

Тема: «Вычисление собственных значений»

Выполнила

студентка 3 курса группы ФИ-41

Лавягина Ольга Алексеевна

Проверила

Стёпочкина Ирина Валерьевна

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Исходная система	2
2	Матрицы M_i и M_i^{-1}	3
3	Результирующая матрица в форме Фробениуса	4
4	Полученное характеристическое уравнение.	5
5	Собственные числа	6
6	Листинг программы.	7
7	Проверка полученных результатов в WolframAlpha	9
	Выводы	10

1 ИСХОДНАЯ СИСТЕМА

Нужно найти собственные значения матрицы A с помощью метода Данилевского.

Для варианта 8 матрица имеет вид

$$A = \begin{bmatrix} 5.26 & 0.10 & 0.55 & 1.28 \\ 1.10 & 4.44 & 1.30 & 0.16 \\ 0.55 & 1.30 & 6.44 & 2.10 \\ 1.28 & 0.16 & 2.10 & 8.10 \end{bmatrix},$$

2 МАТРИЦЫ M_I И M_I^{-1}

$M3^{-1}$:

```
[[ 1.    0.    0.    0. ]
 [ 0.    1.    0.    0. ]
 [ 1.28  0.16  2.1   8.1 ]
 [ 0.    0.    0.    1. ]]
```

$M3$:

```
[[ 1.          0.          0.          0.          ]
 [ 0.          1.          0.          0.          ]
 [-0.60952381 -0.07619048  0.47619048 -3.85714286]
 [ 0.          0.          0.          1.          ]]
```

$M2^{-1}$:

```
[[ 1.          0.          0.          0.          ]
 [ -0.73528571  2.46851429  14.97428571 -49.60771429]
 [ 0.          0.          1.          0.          ]
 [ 0.          0.          0.          1.          ]]
```

$M2$:

```
[[ 1.          0.          0.          0.          ]
 [ 0.29786569  0.40510197 -6.06611264  20.09618278]
 [ 0.          0.          1.          0.          ]
 [ 0.          0.          0.          1.          ]]
```

$M1^{-1}$:

```
[[ 0.3173714  19.29793352 -113.01569875  203.12210164]
 [ 0.          1.          0.          0.          ]
 [ 0.          0.          1.          0.          ]
 [ 0.          0.          0.          1.          ]]
```

$M1$:

```
[[ 3.15088251 -60.80552127  356.09918898 -640.01387824]
 [ 0.          1.          0.          0.          ]
 [ 0.          0.          1.          0.          ]
 [ 0.          0.          0.          1.          ]]
```

3 РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ МАТРИЦА В ФОРМЕ ФРОБЕНИУСА

$M_1^{-1} M_2^{-1} M_3^{-1} A M_3 M_2 M_1$:

```
[ [ 2.42400000e+01 -2.08379900e+02 7.61624474e+02 -1.00373945e+03]
  [ 1.00000000e+00 0.00000000e+00 0.00000000e+00 0.00000000e+00]
  [ 0.00000000e+00 1.00000000e+00 0.00000000e+00 0.00000000e+00]
  [ 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00 0.00000000e+00]]
```

4 ПОЛУЧЕННОЕ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ

Характеристический полином строится раскрытием характеристического определителя матрицы $P = M_1^{-1}M_2^{-1}M_3^{-1}AM_3M_2M_1$ по первой строке. Он, вследствие подобия матриц A и P , является так же и характеристическим полиномом матрицы A .

Раскрываем по первому столбцу

$$p(\lambda) = (-1)^3 \cdot (\lambda^4 - 24.24\lambda^3 + 208.3799\lambda^2 - 761.624474\lambda + 1003.73945) .$$

5 СОБСТВЕННЫЕ ЧИСЛА

Собственные числа были найдены из уравнения $P(\lambda) = 0$. Уравнение имеет 4 действительных корня (рис. 5.1):

$$\lambda_1 = 3.57273, \lambda_2 = 4.97342, \lambda_3 = 5.59192, \lambda_4 = 10.1019.$$




Рисунок 5.1 — График корней

6 ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ

Листинг файла `__main__.py`

```
from solve import frobenius

if __name__ == '__main__':
    matrix_size = 4
    A = [[5.26, 0.10, 0.55, 1.28],
          [1.10, 4.44, 1.30, 0.16],
          [0.55, 1.30, 6.44, 2.10],
          [1.28, 0.16, 2.10, 8.10]]
    result = frobenius(A)
    #polynomial = danilevsky(result)
```

Листинг файла `solve.py`

```
from numpy import array, zeros, round

def frobenius(matrix):
    matrix = array(matrix, dtype='f8', copy=True)
    assert matrix.ndim == 2 and matrix.shape[0] == matrix.shape[1]
    print('A:')
    print(matrix)
    m3 = zeros((4,4), dtype='f8')
    m3[0,0] = 1
    m3[1,1] = 1
    m3[3,3] = 1
    m3[2,0] = matrix[3,0]
    m3[2,1] = matrix[3,1]
    m3[2,2] = matrix[3,2]
    m3[2,3] = matrix[3,3]
    print('M3^-1:')
    print(m3)
    M3 = m3.copy()
    M3[2,0] = -m3[2,0] / matrix[3,2]
    M3[2,1] = -m3[2,1] / matrix[3,2]
    M3[2,2] = 1 / matrix[3,2]
    M3[2,3] = -m3[2,3] / matrix[3,2]
    print('M3:')
    print(M3)
    m3AM3 = m3.dot(matrix.dot(M3))
    print('M3^-1 AM3:')
    print(m3AM3)

    m2 = zeros((4,4), dtype='f8')
    m2[0,0] = 1
    m2[2,2] = 1
```



```

m2[3,3] = 1
m2[1,0] = m3AM3[2,0]
m2[1,1] = m3AM3[2,1]
m2[1,2] = m3AM3[2,2]
m2[1,3] = m3AM3[2,3]
print('M2-1:')
print(m2)
M2 = m2.copy()
M2[1,0] = -m2[1,0] / m3AM3[2,1]
M2[1,1] = 1 / m3AM3[2,1]
M2[1,2] = -m2[1,2] / m3AM3[2,1]
M2[1,3] = -m2[1,3] / m3AM3[2,1]
print('M2:')
print(M2)
m2m3AM3M2 = round(m2.dot(m3AM3.dot(M2)), 15)
print('M2-1 M3-1 AM3M2:')
print(m2m3AM3M2)

m1 = zeros((4,4), dtype='f8')
m1[1,1] = 1
m1[2,2] = 1
m1[3,3] = 1
m1[0,0] = m2m3AM3M2[1,0]
m1[0,1] = m2m3AM3M2[1,1]
m1[0,2] = m2m3AM3M2[1,2]
m1[0,3] = m2m3AM3M2[1,3]
print('M1-1:')
print(m1)
M1 = m1.copy()
M1[0,0] = 1 / m2m3AM3M2[1,0]
M1[0,1] = - m1[0,1] / m2m3AM3M2[1,0]
M1[0,2] = - m1[0,2] / m2m3AM3M2[1,0]
M1[0,3] = - m1[0,3] / m2m3AM3M2[1,0]
print('M1:')
print(M1)
P = round(m1.dot(m2m3AM3M2.dot(M1)), 8)
print('M1-1 M2-1 M3-1 AM3M2M1:')
print(P)

return P

```

7 ПРОВЕРКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В WOLFRAMALPHA

Была использована функция `eigenvalues` и получены такие результаты (рис. 7.1):

$$\lambda_1 = 10.1019, \lambda_2 = 5.59192, \lambda_3 = 4.97342, \lambda_4 = 2.57273.$$

Input:	
eigenvalues	$\begin{pmatrix} 5.26 & 0.1 & 0.55 & 1.28 \\ 1.1 & 4.44 & 1.3 & 0.16 \\ 0.55 & 1.3 & 6.44 & 2.1 \\ 1.28 & 0.16 & 2.1 & 8.1 \end{pmatrix}$
Results:	
$\lambda_1 \approx 10.1019$	
$\lambda_2 \approx 5.59192$	
$\lambda_3 \approx 4.97342$	
$\lambda_4 \approx 3.57273$	

Рисунок 7.1 — Проверка полученных результатов в WolframAlpha

ВЫВОДЫ

Собственные числа матрицы были найдены с помощью метода Данилевского. Для этого исходная матрица A была преобразована так, что она имеет ненулевые элементы только в первой строке, и элементы на смещённой диагонали равны единице, то есть матрица приведена к форме Фробениуса.

Найдены собственные числа матрицы с помощью WolframAlpha. Полученные решения полностью совпадают.