

Санкт-Петербургский политехнический университет  
Высшая школа прикладной математики и  
вычислительной физики,  
Физико-механический институт

Направление подготовки  
01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Отчет по лабораторной работе №4  
по дисциплине «Интервальный анализ»

Выполнил студент гр. 5030102/80201  
Игнатъев Д. Д.  
Проверил  
Баженов А. Н.

Санкт-Петербург  
2021

# Содержание

	Страница
<b>1 Постановка задачи</b>	<b>3</b>
1.1 Использование теоремы Зюзина . . . . .	3
1.2 Использование субдифференциального метода Ньютона . . . . .	3
<b>2 Теория</b>	<b>3</b>
2.1 Теорема Зюзина . . . . .	3
2.2 Субдифференциальный метод Ньютона . . . . .	3
<b>3 Реализация</b>	<b>4</b>
<b>4 Результаты</b>	<b>4</b>
4.1 Итерационный процесс с разложением матрицы на диагональную и недиагональную части . . . . .	4
4.2 Итерационный процесс по субградиентному методу Ньютона . . . . .	5
<b>5 Обсуждение</b>	<b>7</b>

# 1 Постановка задачи

## 1.1 Использование теоремы Зюзина

Дана ИСЛАУ

$$\begin{cases} [2, 5] \cdot x_1 + [6, 7] \cdot x_2 = [-1, 1] \\ [0.5, 2] \cdot x_1 + [4, 6] \cdot x_2 = [-2, 2] \end{cases} \quad (1)$$

Для нее необходимо построить итерационную схему с разложением матрицы на диагональную и недиагональную части по теореме Зюзина, а также провести вычисления и привести иллюстрации:

- Брусов итерационного процесса
- Радиусов решения в зависимости от номера итерации

## 1.2 Использование субдифференциального метода Ньютона

Даны две ИСЛАУ:

$$\begin{cases} [3, 4] \cdot x_1 + [5, 6] \cdot x_2 = [-3, 3] \\ [-1, 1] \cdot x_1 + [-3, 1] \cdot x_2 = [-1, 2] \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} [3, 4] \cdot x_1 + [5, 6] \cdot x_2 = [-3, 4] \\ [-1, 1] \cdot x_1 + [-3, 1] \cdot x_2 = [-1, 2] \end{cases} \quad (3)$$

Необходимо построить итерационную схему субдифференциального метода Ньютона, провести вычисления и привести иллюстрации брусков итерационного процесса, а также сравнить полученные результаты для систем (2) и (3).

# 2 Теория

## 2.1 Теорема Зюзина

Пусть в интервальной линейной системе уравнений

$$Cx = d, \quad C \in KR^{n \times n}, \quad d \in KR^n$$

правильная проекция матрицы  $C$  имеет диагональное преобладание. Тогда формальное решение системы существует и единственно.

Итерационный процесс строится следующим образом

$$D = \text{diag}\{c_{ii}\}_{i=1}^n \quad E = C \ominus D$$

$$Cx = d \Leftrightarrow Dx = d \ominus Ex$$

$$x^{k+1} = \text{inv } D \cdot (d \ominus Ex^k), \quad k = 0, 1, \dots$$

## 2.2 Субдифференциальный метод Ньютона

Итерационная процедура субдифференциального метода Ньютона описывается следующей формулой:

$$x^k = x^{k-1} - \tau(D^{k-1})^{-1}\mathcal{F}(x^{k-1}),$$

где  $\mathcal{F}(x) = \text{sti}(C \cdot \text{sti}^{-1}(x)) - x + \text{sti}(d)$  ( $\text{sti}$  - операция стандартного погружения, отображения из  $KR^n$  в  $R^{2n}$ ),  $D^{k-1}$  - какой-нибудь субградиент отображения  $\mathcal{F}$  в точке  $x^{k-1}$ ,  $\tau$  - константа, в данной работе выбрана единицей.

### 3 Реализация

Для осуществления вычислений и визуализации результатов использовалась среда Octave с библиотекой полной интервальной арифметики kinterval.

## 4 Результаты

### 4.1 Итерационный процесс с разложением матрицы на диагональную и недиагональную части

Здесь и далее пунктиром обозначено допустимое множество  $\Xi_{\text{tol}}$  рассматриваемой ИСЛАУ. Также здесь и далее начальный брус обозначен синим цветом. Число итераций - 10.




Рис. 1: Изображение брусков при решении задачи (1)




Рис. 2: Зависимость радиусов брусов от числа итераций при решении задачи (1)

## 4.2 Итерационный процесс по субградиентному методу Ньютона

Результирующий брус отрисован сплошной линией красного цвета. При решении задачи (2) использовался параметр  $\tau = 1$ , финальный брус получен на четвертой итерации метода.




Рис. 3: Решение задачи (2) субградиентным методом Ньютона,  $\tau = 1$

Решение задачи (3) с параметром  $\tau = 1$ . Число итераций - 300.




Рис. 4: Решение задачи (3) субградиентным методом Ньютона,  $\tau = 1$

Решение задачи (3) с параметром  $\tau = 0.05$ . Число итераций - 300.




Рис. 5: Решение задачи (3) субградиентным методом Ньютона,  $\tau = 0.05$

## 5 Обсуждение

1. Из второго графика можем увидеть, что на второй итерации метод выдал более адекватную внутреннюю оценку, чем на последней. В свою очередь, финальный результат выходит за пределы допускового множества. Середина брусков практически не меняется по мере итераций. После пятой итерации размеры брусков меняются на очень малую величину, если сравнивать с предыдущими итерациями.
2. При решении задачи (2) получена точная внутренняя оценка. Субградиентный метод Ньютона сошелся очень быстро - после четвертой итерации итерационный процесс остановился.
3. При решении задачи (3) не была получена внутренняя оценка. Тем не менее, результат адекватный - большая часть площади полученного бруса находится внутри допускового множества. Метод проделал все 300 итераций вплоть до заданных извне ограничений. При уменьшении параметра  $\tau$  получен другой брус. Он все еще не является строгой внутренней оценкой  $\Xi_{\text{tol}}$ , но эта оценка более удачна, так как полученный брус больше по площади, чем предыдущий, и значимая его часть лежит внутри допускового множества. Улучшить этот результат можно с помощью релаксационного параметра метода Ньютона.