

第一周

第一题

求下列近似值的误差限：

$$x_1^* + x_2^* + x_4^* \quad (1)$$

$$x_1^* x_2^* x_3^* \quad (2)$$

$$x_2^*/x_4^* \quad (3)$$

其中

$$x_1^* = 1.1021, \quad x_2^* = 0.031, \quad x_3^* = 385.6, \quad x_4^* = 56.430 \quad (4)$$

解：由于

$$\varepsilon(x_1^*) = \frac{1}{2} \times 10^{-4}, \quad \varepsilon(x_2^*) = \frac{1}{2} \times 10^{-3}, \quad \varepsilon(x_3^*) = \frac{1}{2} \times 10^{-1}, \quad \varepsilon(x_4^*) = \frac{1}{2} \times 10^{-3} \quad (5)$$

那么

$$\varepsilon(x_1^* + x_2^* + x_4^*) \approx \varepsilon(x_1^*) + \varepsilon(x_2^*) + \varepsilon(x_4^*) \approx 1.05 \times 10^{-3} \quad (6)$$

$$\varepsilon(x_1^* x_2^* x_3^*) \approx |x_2^* x_3^*| \varepsilon(x_1^*) + |x_3^* x_1^*| \varepsilon(x_2^*) + |x_1^* x_2^*| \varepsilon(x_3^*) \approx 0.215 \quad (7)$$

$$\varepsilon(x_2^*/x_4^*) \approx \frac{|x_2^*| \varepsilon(x_4^*) + |x_4^*| \varepsilon(x_2^*)}{|x_4^*|^2} \approx 9 \times 10^{-4} \quad (8)$$

第二题

序列 $\{y_n\}$ 满足递推关系

$$y_n = 10y_{n-1} - 1, \quad n \in \mathbb{N}^* \quad (9)$$

若 $y_0 = \sqrt{2} \approx 1.41$ （三位有效数字），计算到 y_{10} 时误差有多大？这个计算过程稳定吗？

解：设 y_n^* 为 y_n 的近似值，那么 $\varepsilon(y_n^*) = y_n^* - y_n$ ，于是由

$$\begin{cases} y_0 = \sqrt{2} \\ y_n = 10y_{n-1} - 1 \end{cases}, \quad \begin{cases} y_0^* = 1.41 \\ y_n^* = 10y_{n-1}^* - 1 \end{cases} \quad (10)$$

可知 $\varepsilon(y_0^*) = \frac{1}{2} \times 10^{-2}$ ， $\varepsilon(y_n^*) = 10\varepsilon(y_{n-1}^*)$ ，进而

$$\varepsilon(y_{10}^*) = 10^{10} \varepsilon(y_0^*) = \frac{1}{2} \times 10^8 \quad (11)$$

因此计算过程不稳定。

第二周

第一题

给出 $f(x) = \ln x$ 的数值表

x_n	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
$y_n = \ln x_n$	-0.916291	-0.693147	-0.510826	-0.356675	-0.223144

使用线性插值及二次插值计算 $\ln 0.54$ 的近似值。

解：记 $x_0 = 0.54, y_0 = \ln 0.54$ 。

对于线性插值，由于 $x_2 < x_0 < x_3$ ，那么取 x_2, x_3 进行线性插值，插值函数为

$$L_1(x) = \frac{x - x_3}{x_2 - x_3} y_2 + \frac{x - x_2}{x_3 - x_2} y_3 \quad (12)$$

代入数据

$$\ln 0.54 \approx L_1(0.54) \approx -0.620219 \quad (13)$$

截断误差为

$$|R_1(x)| = \frac{|f''(\xi)|}{2} |x - x_2| |x - x_3| = \frac{|x - x_2| |x - x_3|}{2\xi^2} \leq \frac{|x - x_2| |x - x_3|}{2x_2^2} \quad (14)$$

于是

$$|R_1(0.54)| \leq 4.8 \times 10^{-3} < \frac{1}{2} \times 10^{-2} \quad (15)$$

对于二次插值，取 x_1, x_2, x_3 进行抛物线插值，插值函数为

$$L_2(x) = \frac{(x - x_2)(x - x_3)}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)} y_1 + \frac{(x - x_3)(x - x_1)}{(x_2 - x_3)(x_2 - x_1)} y_2 + \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} y_3 \quad (16)$$

代入数据

$$\ln 0.54 \approx L_2(0.54) \approx -0.615320 \quad (17)$$

截断误差为

$$|R_2(x)| = \frac{|f'''(\xi)|}{6} |x - x_1| |x - x_2| |x - x_3| = \frac{|x - x_1| |x - x_2| |x - x_3|}{3\xi^3} \leq \frac{|x - x_1| |x - x_2| |x - x_3|}{3x_1^3} \quad (18)$$

于是

$$|R_2(0.54)| \leq 1.75 \times 10^{-3} < \frac{1}{2} \times 10^{-2} \quad (19)$$

对于二次插值，取 x_2, x_3, x_4 进行抛物线插值，插值函数为

$$L_2(x) = \frac{(x - x_3)(x - x_4)}{(x_2 - x_3)(x_2 - x_4)} y_2 + \frac{(x - x_4)(x - x_2)}{(x_3 - x_4)(x_3 - x_2)} y_3 + \frac{(x - x_2)(x - x_3)}{(x_4 - x_2)(x_4 - x_3)} y_4 \quad (20)$$

代入数据

$$\ln 0.54 \approx L_2(0.54) \approx -0.616838 \quad (21)$$

截断误差为

$$|R_2(x)| = \frac{|f'''(\xi)|}{6} |x - x_2||x - x_3||x - x_4| = \frac{|x - x_2||x - x_3||x - x_4|}{3\xi^3} \leq \frac{|x - x_2||x - x_3||x - x_4|}{3x_2^3} \quad (22)$$

于是

$$|R_1(0.54)| \leq 8.96 \times 10^{-4} < \frac{1}{2} \times 10^{-2} \quad (23)$$

第二题

在 $[-4, 4]$ 上给出 $f(x) = e^x$ 的等距结点函数表, 若用二次插值求 e^x 的近似值, 要求截断误差不超过 10^{-6} , 那么使用函数表的步长 h 应取多少?

解: 假设插值点为 $x_0 - h, x_0, x_0 + h$, 那么截断误差为

$$|R_2(x)| = \frac{|f'''(\xi)|}{3!} |(x - x_0 + h)(x - x_0)(x - x_0 - h)| \leq \frac{\sqrt{3}}{27} e^4 h^3 \quad (24)$$

当且仅当 $\xi = 4$ 且 $x = x_0 \pm \frac{h}{\sqrt{3}}$ 时等号成立。令 $|R_2(x)| \leq 10^{-6}$ 可知 $h \leq 6.58 \times 10^{-3}$ 。

第三题

如果 $f(x) = a_0 + \cdots + a_n x^n$ 有 n 个不同实数根 x_1, \cdots, x_n , 证明:

$$\sum_{k=1}^n \frac{x_k^m}{f'(x_k)} = \begin{cases} 0, & 0 \leq m \leq n-2 \\ a_n^{-1}, & m = n-1 \end{cases} \quad (25)$$

证明: 由于 f 有 n 个不同实数根 x_1, \cdots, x_n , 那么

$$f(x) = a_n(x - x_1) \cdots (x - x_n) = a_n \omega_{n+1}(x) \quad (26)$$

记 $p_m(x) = x^m$, 那么

$$\sum_{k=1}^n \frac{x_k^m}{f'(x_k)} = a_n^{-1} \sum_{k=1}^n \frac{p_m(x_k)}{\omega'_{n+1}(x_k)} = a_n^{-1} p_m[x_1, \cdots, x_n] = a_n^{-1} \frac{p_m^{(n)}(\xi)}{n!} = \begin{cases} 0, & 0 \leq m \leq n-2 \\ a_n^{-1}, & m = n-1 \end{cases} \quad (27)$$

第三周

第一题

求次数不大于3的多项式 $P(x)$, 使得满足条件

$$P(x_0) = f(x_0), \quad P'(x_0) = f'(x_0), \quad P''(x_0) = f''(x_0), \quad P(x_1) = f(x_1) \quad (28)$$

解: 令

$$P(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + A(x - x_0)^3 \quad (29)$$

由 $P(x_1) = f(x_1)$ 可知

$$f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x_1 - x_0)^2 + A(x_1 - x_0)^3 = f(x_1) \quad (30)$$

因此

$$A = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{(x_1 - x_0)^3} - \frac{f'(x_0)}{(x_1 - x_0)^2} - \frac{f''(x_0)}{x_1 - x_0} \quad (31)$$

于是

$$P(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 \quad (32)$$

$$+ \left(\frac{f(x_1) - f(x_0)}{(x_1 - x_0)^3} - \frac{f'(x_0)}{(x_1 - x_0)^2} - \frac{f''(x_0)}{x_1 - x_0} \right) (x - x_0)^3 \quad (33)$$

第二题

求次数不高于4次的多项式 $P(x)$, 使得满足条件

$$P(0) = P'(0) = 0, \quad P(1) = P'(1) = 1, \quad P(2) = 1 \quad (34)$$

解: 记 $P(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$, 那么可得如下线性方程

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ -\frac{3}{2} \\ \frac{9}{4} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (35)$$

因此

$$P(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^3 + \frac{9}{4}x^2 \quad (36)$$

第四周

第一题

已知 $f(x) = x^7 + x^4 + 3x + 1$, 求 $f[2^0, \dots, 2^7]$ 和 $f[2^0, \dots, 2^8]$ 。

解: 注意到

$$f[x_0, \dots, x_k] = \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!} \quad (37)$$

于是

$$f[2^0, \dots, 2^7] = 1, \quad f[2^0, \dots, 2^8] = 0 \quad (38)$$

第五周

第一题

对于权 $\rho = 1 + x^2$, 求区间 $[-1, 1]$ 上的首1正交多项式 φ_n , 其中 $n = 0, 1, 2, 3$.

解: 递推公式为

$$\varphi_0(x) = 1 \quad (39)$$

$$\varphi_n(x) = x^n - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\int_{-1}^1 (1+x^2)x^n \varphi_k(x) dx}{\int_{-1}^1 (1+x^2)\varphi_k^2(x) dx} \varphi_k(x) \quad (40)$$

于是

$$\varphi_0 = 1, \quad \varphi_1 = x, \quad \varphi_2 = x^2 - \frac{2}{5}, \quad \varphi_3 = x^3 - \frac{9x}{14}, \quad \varphi_4 = x^4 - \frac{46x^2}{51} + \frac{37}{357} \quad (41)$$

第二题

对于Chebyshev多项式 $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$, 令 $S_n(x) = T_n(2x-1)$, 其中 $x \in [0, 1]$, 证明: $\{S_n(x)\}$ 是 $[0, 1]$ 上权 $\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{x-x^2}}$ 的正交多项式, 并求 $S_0(x), S_1(x), S_2(x), S_3(x)$.

证明: 由于 $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$, 那么 $S_n(x) = \cos(n \arccos(2x-1))$, 其中 $x \in [0, 1]$, 于是

$$(S_m(x), S_n(x)) = \int_0^1 \rho(x) S_m(x) S_n(x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \frac{\pi}{2}, & m = n \neq 0 \\ \pi, & m = n = 0 \end{cases} \quad (42)$$

于是 $\{S_n(x)\}$ 是 $[0, 1]$ 上权 $\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{x-x^2}}$ 的正交多项式, 且

$$S_0(x) = 1, \quad S_1(x) = 2x-1, \quad S_2(x) = \cos(2 \arccos(2x-1)), \quad S_3(x) = \cos(3 \arccos(2x-1)) \quad (43)$$

第三题

用 T_3 的零点作为插值点, 求 $f(x) = e^x$ 在区间 $[-1, 1]$ 上的二次插值多项式, 并估计其最大误差界。

解: T_3 的零点为 $x_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}, x_1 = 0, x_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 那么容易求得其二次插值多项式为

$$P(x) = \frac{2\left(e^{\frac{\sqrt{3}}{2}} - e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}}\right)^2}{3} x^2 + \frac{e^{\frac{\sqrt{3}}{2}} - e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}}}{\sqrt{3}} x + 1 \quad (44)$$

其最大误差界为

$$|R_2| \leq \frac{\|f'''\|_{\infty}}{24} = \frac{e}{24} \quad (45)$$

第四题

求函数 $f(x) = 1/x$ 在区间 $[1, 3]$ 上对于 $\text{span}\{1, x\}$ 的最佳平方逼近多项式。

解: 记 $S(x) = a_0 + a_1 x$ 为函数 $f(x) = 1/x$ 在区间 $[1, 3]$ 上对于 $\text{span}\{1, x\}$ 的最佳平方逼近多项式, 那么

$$\begin{pmatrix} (1, 1) & (1, x) \\ (x, 1) & (x, x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (f(x), 1) \\ (f(x), x) \end{pmatrix} \quad (46)$$

于是

$$a_0 = \frac{13}{2} \ln 3 - 6, \quad a_1 = 3 - 3 \ln 3 \quad (47)$$

因此

$$S(x) = \left(\frac{13}{2} \ln 3 - 6 \right) + (3 - 3 \ln 3)x \quad (48)$$

平方偏差为

$$\|\delta\|_2^2 = \|f(x) - S(x)\|_2^2 = 12 \ln 3 - \frac{13}{2} \ln^2 3 - \frac{16}{3} \quad (49)$$

第五题

求函数 $f(x) = \ln x$ 在区间 $[1, 2]$ 上对于 $\text{span}\{1, x\}$ 的最佳平方逼近多项式。

解：记 $S(x) = a_0 + a_1 x$ 为函数 $f(x) = \ln x$ 在区间 $[1, 2]$ 上对于 $\text{span}\{1, x\}$ 的最佳平方逼近多项式，那么

$$\begin{pmatrix} (1, 1) & (1, x) \\ (x, 1) & (x, x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (f(x), 1) \\ (f(x), x) \end{pmatrix} \quad (50)$$

于是

$$a_0 = 10 \ln 4 - \frac{29}{2}, \quad a_1 = 9 - 6 \ln 4 \quad (51)$$

因此

$$S(x) = \left(10 \ln 4 - \frac{29}{2} \right) + (9 - 6 \ln 4)x \quad (52)$$

第六周

第一题

已知实验数据如下，用最小二乘法求形如 $y = a + bx^2$ 的经验公式，并计算均方误差。

x_i	19	25	31	38	44
y_i	19.0	32.3	49.0	73.3	97.8

解：由于

$$(1, 1) = 5, \quad (1, x^2) = (x^2, 1) = 5327, \quad (x^2, x^2) = 7277699 \tag{53}$$

$$(f(x), 1) = 271.4, \quad (f(x), x^2) = 369321.5 \tag{54}$$

于是

$$\begin{pmatrix} 5 & 5327 \\ 5327 & 7277699 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 271.4 \\ 369321.5 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.97 \\ 0.05 \end{pmatrix} \tag{55}$$

因此

$$y = 0.97 + 0.05x^2 \tag{56}$$

均方误差为

$$\|\delta\|^2 = \|f - y\|^2 = 0.015 \tag{57}$$

第二题

已知实验数据如下，用最小二乘法拟合 $y = f(x)$ ，并计算均方误差。

x	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
y	0	1.27	2.16	2.86	3.44	3.87	4.15	4.37	4.51	4.58	4.62	4.64

解：三次函数拟合

$$f(x) = a + bx + cx^2 + dx^4 \tag{58}$$

那么

$$\begin{pmatrix} (1, 1) & (1, x) & (1, x^2) & (1, x^3) \\ (x, 1) & (x, x) & (x, x^2) & (x, x^3) \\ (x^2, 1) & (x^2, x) & (x^2, x^2) & (x^2, x^3) \\ (x^3, 1) & (x^3, x) & (x^3, x^2) & (x^3, x^3) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1, f(x)) \\ (x, f(x)) \\ (x^2, f(x)) \\ (x^3, f(x)) \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.04421 \\ 0.25569 \\ -0.00491 \\ 0.00003 \end{pmatrix} \tag{59}$$

因此

$$f(x) = 0.04421 + 0.25569x - 0.00491x^2 + 0.00003x^4 \tag{60}$$

均方误差为

$$\|\delta\|^2 = \|f - y\|^2 = 0.00871 \tag{61}$$

第三题

确定如下求积公式中的待定系数，使其代数精度尽量高，并指明所构造出的求积公式所具有的代数精度。

$$\int_{-2h}^{2h} f(x)dx \approx A_{-1}f(-h) + A_0f(0) + A_1f(h) \quad (62)$$

解：由如下方程

$$\int_{-2h}^{2h} dx = A_{-1} + A_0 + A_1 \quad (63)$$

$$\int_{-2h}^{2h} xdx = A_{-1}(-h) + A_1h \quad (64)$$

$$\int_{-2h}^{2h} x^2dx = A_{-1}h^2 + A_1h^2 \quad (65)$$

解得

$$A_{-1} = \frac{8}{3}h, \quad A_0 = -\frac{4}{3}h, \quad A_1 = \frac{8}{3}h \quad (66)$$

此时

$$\int_{-2h}^{2h} x^3dx = A_{-1}(-h^3) + A_1h^3 = 0 \quad (67)$$

$$\int_{-2h}^{2h} x^4dx = \frac{64}{5}h^5, \quad A_{-1}h^4 + A_1h^4 = \frac{16}{3}h^5 \quad (68)$$

因此该求积公式具有3次代数精度。

第四题

确定如下求积公式中的待定系数，使其代数精度尽量高，并指明所构造出的求积公式所具有的代数精度。

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx \frac{1}{3}f(-1) + \frac{2}{3}f(x_1) + f(x_2) \quad (69)$$

解：由如下方程

$$\int_{-1}^1 dx = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} + 1 \quad (70)$$

$$\int_{-1}^1 xdx = \frac{1}{3}(-1) + \frac{2}{3}x_1 + x_2 \quad (71)$$

$$\int_{-1}^1 x^2dx = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}x_1^2 + x_2^2 \quad (72)$$

解得

$$x_1 = \frac{1 - \sqrt{6}}{5}, \quad x_2 = \frac{3 + 2\sqrt{6}}{15}; \quad \text{or} \quad x_1 = \frac{1 + \sqrt{6}}{5}, \quad x_2 = \frac{3 - 2\sqrt{6}}{15} \quad (73)$$

当 $x_1 = \frac{1 - \sqrt{6}}{5}, x_2 = \frac{3 + 2\sqrt{6}}{15}$ 时

$$\int_{-1}^1 x^3dx = 0, \quad \frac{1}{3} + \frac{2}{3}x_1^3 + x_2^3 = \frac{2(57 - 2\sqrt{6})}{225} \quad (74)$$

此时该求积公式具有2次代数精度。

当 $x_1 = \frac{1 + \sqrt{6}}{5}, x_2 = \frac{3 - 2\sqrt{6}}{15}$ 时

$$\int_{-1}^1 x^3 \mathrm{d}x = 0, \quad \frac{1}{3} + \frac{2}{3}x_1^3 + x_2^3 = \frac{2(57 + 2\sqrt{6})}{225} \quad (75)$$

此时该求积公式具有2次代数精度。

第八周

第一题

证明：Cotest公式具有5次代数精度。

证明：Cotest公式为

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{90} \left(7f(a) + 32f\left(\frac{3a+b}{4}\right) + 12f\left(\frac{a+b}{2}\right) + 32f\left(\frac{a+3b}{4}\right) + 7f(b) \right) \quad (76)$$

注意到

$$\int_a^b x^0 dx = \frac{b-a}{90} \left(7f(a)^0 + 32f\left(\frac{3a+b}{4}\right)^0 + 12f\left(\frac{a+b}{2}\right)^0 + 32f\left(\frac{a+3b}{4}\right)^0 + 7f(b)^0 \right) = b-a \quad (77)$$

$$\int_a^b x^1 dx = \frac{b-a}{90} \left(7f(a)^1 + 32f\left(\frac{3a+b}{4}\right)^1 + 12f\left(\frac{a+b}{2}\right)^1 + 32f\left(\frac{a+3b}{4}\right)^1 + 7f(b)^1 \right) = \frac{b^2-a^2}{2} \quad (78)$$

$$\int_a^b x^2 dx = \frac{b-a}{90} \left(7f(a)^2 + 32f\left(\frac{3a+b}{4}\right)^2 + 12f\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + 32f\left(\frac{a+3b}{4}\right)^2 + 7f(b)^2 \right) = \frac{b^3-a^3}{3} \quad (79)$$

$$\int_a^b x^3 dx = \frac{b-a}{90} \left(7f(a)^3 + 32f\left(\frac{3a+b}{4}\right)^3 + 12f\left(\frac{a+b}{2}\right)^3 + 32f\left(\frac{a+3b}{4}\right)^3 + 7f(b)^3 \right) = \frac{b^4-a^4}{4} \quad (80)$$

$$\int_a^b x^4 dx = \frac{b-a}{90} \left(7f(a)^4 + 32f\left(\frac{3a+b}{4}\right)^4 + 12f\left(\frac{a+b}{2}\right)^4 + 32f\left(\frac{a+3b}{4}\right)^4 + 7f(b)^4 \right) = \frac{b^5-a^5}{5} \quad (81)$$

$$\int_a^b x^5 dx = \frac{b-a}{90} \left(7f(a)^5 + 32f\left(\frac{3a+b}{4}\right)^5 + 12f\left(\frac{a+b}{2}\right)^5 + 32f\left(\frac{a+3b}{4}\right)^5 + 7f(b)^5 \right) = \frac{b^6-a^6}{6} \quad (82)$$

但是

$$\int_a^b x^6 dx = \frac{b^7-a^7}{7} \quad (83)$$

$$\frac{b-a}{90} \left(7f(a)^6 + 32f\left(\frac{3a+b}{4}\right)^6 + 12f\left(\frac{a+b}{2}\right)^6 + 32f\left(\frac{a+3b}{4}\right)^6 + 7f(b)^6 \right) = \frac{b^7-a^7}{7} + \frac{(b-a)^7}{2688} \quad (84)$$

因此Cotest公式具有5次代数精度。

第二题

使用Simpson公式计算积分 $\int_0^1 e^{-x} dx$ ，并估计误差。

解：记 $f(x) = e^{-x}$ ，那么由Simpson公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right) \quad (85)$$

计算得

$$\int_0^1 e^{-x} dx \approx \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{e} + \frac{4}{\sqrt{e}} \right) \approx 0.632334 \quad (86)$$

误差为

$$|R[f]| = \frac{1}{2880} e^{-\xi} \leq \frac{1}{2880} \approx 3.47 \times 10^{-4} \quad (87)$$

第三题

若用复合梯形公式计算积分 $I = \int_0^1 e^x dx$, 问区间 $[0, 1]$ 应分多少等份才能使截断误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-5}$? 若改用复合Simpson公式, 要达到同样精度区间 $[0, 1]$ 应分多少等份?

解: 若用复合梯形公式计算积分 $I = \int_0^1 e^x dx$, 那么截断误差为

$$\frac{1}{12n^2} e^\xi \leq \frac{e}{12n^2} \leq \frac{1}{2} \times 10^{-5} \quad (88)$$

可得 $n \geq 212.85$, 因此区间 $[0, 1]$ 应分 213 等份才能使截断误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-5}$ 。

若用复合Simpson公式计算积分 $I = \int_0^1 e^x dx$, 那么截断误差为

$$\frac{1}{2880n^4} e^\xi \leq \frac{e}{2880n^4} \leq \frac{1}{2} \times 10^{-5} \quad (89)$$

可得 $n \geq 3.71$, 因此区间 $[0, 1]$ 应分 4 等份才能使截断误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-5}$ 。

第九周

第一题

分别使用梯形公式和Simpson公式计算如下积分：

$$\int_0^1 \frac{x}{4+x^2} dx, \quad n=8 \quad (90)$$

解：记 $f(x) = x/(4+x^2)$ ，那么由梯形公式

$$T_n = \frac{b-a}{2n} \left(f(a) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b) \right) \quad (91)$$

可得 $T_8 \approx 0.11140$ ；由Simpson公式

$$S_n = \frac{b-a}{6n} \left(f(a) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + 4 \sum_{k=1}^n f\left(\frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right) + f(b) \right) \quad (92)$$

可得 $S_8 \approx 0.11157181$ 。

第二题

分别使用梯形公式和Simpson公式计算如下积分：

$$\int_0^{\frac{\pi}{6}} \sqrt{4-\sin^2 x} dx, \quad n=6 \quad (93)$$

解：记 $f(x) = \sqrt{4-\sin^2 x}$ ，那么由梯形公式

$$T_n = \frac{b-a}{2n} \left(f(a) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b) \right) \quad (94)$$

可得 $T_6 \approx 1.03562$ ；由Simpson公式

$$S_n = \frac{b-a}{6n} \left(f(a) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + 4 \sum_{k=1}^n f\left(\frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right) + f(b) \right) \quad (95)$$

可得 $S_6 \approx 1.03576389$ 。

第三题

构造Gauss型求积公式

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1) \quad (96)$$

解：求关于权函数 $\rho(x) = 1/\sqrt{x}$ 的2次正交多项式，由递推关系

$$\varphi_0 = 1 \quad (97)$$

$$\varphi_n = x^n - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(x^n, \varphi_k)}{(\varphi_k, \varphi_k)} \varphi_k \quad (98)$$

其中

$$(f, g) = \int_0^1 \rho f g \quad (99)$$

容易知道

$$\varphi_0(x) = 1, \quad \varphi_1(x) = x - \frac{1}{3}, \quad \varphi_2(x) = x^2 - \frac{6}{7}x + \frac{3}{35} \quad (100)$$

那么 x_0, x_1 为多项式 $\varphi_2(x)$ 的零点, 不妨

$$x_0 = \frac{15 - 2\sqrt{30}}{35}, \quad x_1 = \frac{15 + 2\sqrt{30}}{35} \quad (101)$$

那么

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = A_0 + A_1 \iff A_0 + A_1 = 2 \quad (102)$$

$$\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x}} dx = A_0 x_0 + A_1 x_1 \iff x_0 A_0 + x_1 A_1 = \frac{2}{3} \quad (103)$$

解得

$$A_0 = 1 + \frac{\sqrt{30}}{18}, \quad A_1 = 1 - \frac{\sqrt{30}}{18} \quad (104)$$

因此

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} f(x) dx \approx \left(1 + \frac{\sqrt{30}}{18}\right) f\left(\frac{15 - 2\sqrt{30}}{35}\right) + \left(1 - \frac{\sqrt{30}}{18}\right) f\left(\frac{15 + 2\sqrt{30}}{35}\right) \quad (105)$$

第四题

用 $n = 2, 3$ 的Gauss-Legendre公式计算积分

$$\int_1^3 e^x \sin x dx \quad (106)$$

解: 记

$$f(x) = e^x \sin x \quad (107)$$

$$g(x) = f(x+2) = e^{x+2} \sin(x+2) \quad (108)$$

那么

$$\int_1^3 f(x) dx = \int_{-1}^1 g(x) dx \quad (109)$$

首先求Legendre多项式 $L_n(x)$

$$L_1(x) = x, \quad L_2(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}, \quad L_3(x) = \frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x, \quad L_4(x) = \frac{35}{8}x^4 - \frac{15}{4}x^2 + \frac{8}{3} \quad (110)$$

当 $n = 2$ 时, 记

$$\int_{-1}^1 g(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) \quad (111)$$

$L_3(x)$ 的零点为

$$x_0 = 0, \quad x_1 = -\frac{\sqrt{15}}{5}, \quad x_2 = \frac{\sqrt{15}}{5} \quad (112)$$

由

$$\int_{-1}^1 dx = A_0 + A_1 + A_2 \iff A_0 + A_1 + A_2 = 2 \quad (113)$$

$$\int_{-1}^1 x dx = A_0 x_0 + A_1 x_1 + A_2 x_2 \iff A_0 x_0 + A_1 x_1 + A_2 x_2 = 0 \quad (114)$$

$$\int_{-1}^1 x^2 dx = A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 + A_2 x_2^2 \iff A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 + A_2 x_2^2 = \frac{2}{3} \quad (115)$$

解得

$$A_0 = \frac{8}{9}, \quad A_1 = \frac{5}{9}, \quad A_2 = \frac{5}{9} \quad (116)$$

因此

$$\int_1^3 f(x) dx = \int_{-1}^1 g(x) dx \approx \frac{5}{9} g(-\sqrt{15}/5) + \frac{8}{9} g(0) + \frac{5}{9} g(\sqrt{15}/5) \approx 10.948 \quad (117)$$

当 $n = 3$ 时, 记

$$\int_{-1}^1 g(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) + A_3 f(x_3) \quad (118)$$

$L_4(x)$ 的零点为

$$x_0 = -\sqrt{\frac{1}{35} (15 - 2\sqrt{30})}, \quad x_1 = \sqrt{\frac{1}{35} (15 - 2\sqrt{30})} \quad (119)$$

$$x_2 = -\sqrt{\frac{1}{35} (15 + 2\sqrt{30})}, \quad x_3 = \sqrt{\frac{1}{35} (15 + 2\sqrt{30})} \quad (120)$$

由

$$\int_{-1}^1 dx = A_0 + A_1 + A_2 + A_3 \iff A_0 + A_1 + A_2 + A_3 = 2 \quad (121)$$

$$\int_{-1}^1 x dx = A_0 x_0 + A_1 x_1 + A_2 x_2 + A_3 x_3 \iff A_0 x_0 + A_1 x_1 + A_2 x_2 + A_3 x_3 = 0 \quad (122)$$

$$\int_{-1}^1 x^2 dx = A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 + A_2 x_2^2 + A_3 x_3^2 \iff A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 + A_2 x_2^2 + A_3 x_3^2 = \frac{2}{3} \quad (123)$$

$$\int_{-1}^1 x^3 dx = A_0 x_0^3 + A_1 x_1^3 + A_2 x_2^3 + A_3 x_3^3 \iff A_0 x_0^3 + A_1 x_1^3 + A_2 x_2^3 + A_3 x_3^3 = 0 \quad (124)$$

解得

$$A_0 = \frac{1}{36} (18 + \sqrt{30}), \quad A_1 = \frac{1}{36} (18 + \sqrt{30}) \quad (125)$$

$$A_2 = \frac{1}{36} (18 - \sqrt{30}), \quad A_3 = \frac{1}{36} (18 - \sqrt{30}) \quad (126)$$

因此

$$\int_1^3 f(x)dx = \int_{-1}^1 g(x)dx \approx \frac{1}{36} \left(18 + \sqrt{30} \right) g \left(-\sqrt{\frac{1}{35} \left(15 - 2\sqrt{30} \right)} \right) \quad (127)$$

$$+ \frac{1}{36} \left(18 + \sqrt{30} \right) g \left(\sqrt{\frac{1}{35} \left(15 - 2\sqrt{30} \right)} \right) \quad (128)$$

$$+ \frac{1}{36} \left(18 - \sqrt{30} \right) g \left(-\sqrt{\frac{1}{35} \left(15 + 2\sqrt{30} \right)} \right) \quad (129)$$

$$+ \frac{1}{36} \left(18 - \sqrt{30} \right) g \left(\sqrt{\frac{1}{35} \left(15 + 2\sqrt{30} \right)} \right) \quad (130)$$

$$\approx 10.950140 \quad (131)$$

第十周

第一题

$$\int_1^3 \frac{dx}{x} = \ln 3 = 1.09861228866811 \dots \tag{132}$$

第一问

使用Romberg方法计算积分 $\int_1^3 \frac{dx}{x}$ 。

解：精确数值积分值如下

n	T_n	S_n	C_n	R_n
2^0	$\frac{4}{3}$	$\frac{10}{9}$	$\frac{742}{675}$	$\frac{431686}{392931}$
2^1	$\frac{7}{6}$	$\frac{11}{10}$	$\frac{342611}{311850}$	$\frac{694837621103}{632468286450}$
2^2	$\frac{67}{60}$	$\frac{9137}{8316}$	$\frac{66175037683}{60235074900}$	$\frac{172360324405522117934761}{156889128027453583261500}$
2^3	$\frac{30581}{27720}$	$\frac{1260484963}{1147334760}$	$\frac{26180652570471192967}{23830656645774069000}$	$\frac{25439163417497615873531779822787373174797}{23155724434891620520320214190676005223000}$

近似数值积分值为

n	T_n	S_n	C_n	R_n
2^0	1.33333	1.11111	1.0992592	1.09863054837
2^1	1.16667	1.10000	1.0986403	1.09861258816
2^2	1.11667	1.09873	1.0986130	1.09861229119
2^3	1.10321	1.09862	1.0986123	1.09861228868

第二问

使用三点Gauss-Legendre求积公式计算积分 $\int_1^3 \frac{dx}{x}$ 。

解：注意到

$$\int_1^3 \frac{dx}{x} = \int_{-1}^1 \frac{dx}{x+2} \tag{133}$$

令 $f(x) = 1/(x+2)$ ，三点Gauss-Legendre求积公式为

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx \frac{5}{9} f(-\sqrt{15}/5) + \frac{8}{9} f(0) + \frac{5}{9} f(\sqrt{15}/5) \tag{134}$$

代入数据可得

$$\int_1^3 \frac{dx}{x} = \int_{-1}^1 \frac{dx}{x+2} \approx \frac{56}{51} \approx 1.0980 \tag{135}$$

第三问

使用五点Gauss-Legendre求积公式计算积分 $\int_1^3 \frac{dx}{x}$ 。

解：注意到

$$\int_1^3 \frac{dx}{x} = \int_{-1}^1 \frac{dx}{x+2} \quad (136)$$

令 $f(x) = 1/(x+2)$ ，五点Gauss-Legendre求积公式为

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx \frac{128}{225} f(0) + \frac{1}{900} (322 + 13\sqrt{70}) f\left(-\frac{1}{3}\sqrt{\frac{1}{7}(35-2\sqrt{70})}\right) \quad (137)$$

$$+ \frac{1}{900} (322 + 13\sqrt{70}) f\left(\frac{1}{3}\sqrt{\frac{1}{7}(35-2\sqrt{70})}\right) \quad (138)$$

$$+ \frac{1}{900} (322 - 13\sqrt{70}) f\left(-\frac{1}{3}\sqrt{\frac{1}{7}(35+2\sqrt{70})}\right) \quad (139)$$

$$+ \frac{1}{900} (322 - 13\sqrt{70}) f\left(\frac{1}{3}\sqrt{\frac{1}{7}(35+2\sqrt{70})}\right) \quad (140)$$

代入数据可得

$$\int_1^3 \frac{dx}{x} = \int_{-1}^1 \frac{dx}{x+2} \approx \frac{12244}{11145} \approx 1.098609 \quad (141)$$

第四问

将区间 $[1, 3]$ 分为四等份，使用复合两点Gauss-Legendre求积公式计算积分 $\int_1^3 \frac{dx}{x}$ 。

解：使用两点Gauss-Legendre求积公式计算积分

$$\int_a^b \frac{dx}{x} = \int_{-1}^1 \frac{dx}{x - \frac{a+b}{a-b}} \quad (142)$$

记 $f(x) = 1/(x - \frac{a+b}{a-b})$ ，两点Gauss-Legendre求积公式为

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx f(-1/\sqrt{3}) + f(1/\sqrt{3}) \quad (143)$$

代入数据

$$\int_a^b \frac{dx}{x} = \int_{-1}^1 \frac{dx}{x + \frac{b+a}{b-a}} \approx -\frac{3(a-b)(a+b)}{a^2 + 4ab + b^2} \quad (144)$$

注意到

$$\int_1^3 \frac{dx}{x} = \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{x} + \int_{\frac{3}{2}}^2 \frac{dx}{x} + \int_2^{\frac{5}{2}} \frac{dx}{x} + \int_{\frac{5}{2}}^3 \frac{dx}{x} \quad (145)$$

代入数据可得

$$\int_1^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{x} \approx \frac{15}{37}, \quad \int_{\frac{3}{2}}^2 \frac{dx}{x} \approx \frac{21}{73}, \quad \int_2^{\frac{5}{2}} \frac{dx}{x} \approx \frac{27}{121}, \quad \int_{\frac{5}{2}}^3 \frac{dx}{x} \approx \frac{33}{181}, \quad (146)$$

因此

$$\int_1^3 \frac{dx}{x} = \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{x} + \int_{\frac{3}{2}}^2 \frac{dx}{x} + \int_2^{\frac{5}{2}} \frac{dx}{x} + \int_{\frac{5}{2}}^3 \frac{dx}{x} \approx \frac{64983552}{59154601} \approx 1.09854 \quad (147)$$

第五问

比较如上计算结果。

解：在使用Romberg方法计算数值积分时，越靠借右下角，数值精度越高。

Gauss-Legendre求积公式的数值精度如下

	精确值	积分值	误差
三点Gauss-Legendre求积公式	$\ln 3$	$\frac{56}{51}$	5.73×10^{-4}
五点Gauss-Legendre求积公式	$\ln 3$	$\frac{12244}{11145}$	3.04×10^{-6}
复合两点Gauss-Legendre求积公式	$\ln 3$	$\frac{64983552}{59154601}$	7.47×10^{-5}

因此五点Gauss-Legendre求积公式数值精度最高。

第二题

确定如下数值微分公式的截断误差表达式

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h}(4f(x_0 + h) - 3f(x_0) - f(x_0 + 2h)) \quad (148)$$

解：由 $f(x)$ 的Taylor展开

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!}(x - x_0)^3 \quad (149)$$

因此

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(x_0)}{2!}h^2 + \frac{f^{(3)}(\alpha)}{3!}h^3 \quad (150)$$

$$f(x_0 + 2h) = f(x_0) + 2f'(x_0)h + 4\frac{f''(x_0)}{2!}h^2 + 8\frac{f^{(3)}(\beta)}{3!}h^3 \quad (151)$$

进而截断误差为

$$f'(x_0) - \frac{1}{2h}(4f(x_0 + h) - 3f(x_0) - f(x_0 + 2h)) = \frac{1}{3}h^2(2f^{(3)}(\beta) - f^{(3)}(\alpha)) = \frac{1}{3}h^2f^{(3)}(\xi) \quad (152)$$

第三题

对于对称正定矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，定义 $\|x\|_A = \sqrt{(Ax, x)}$ ，证明 $\|x\|_A$ 为向量范数。

- $\|x\|_A \geq 0$ ，当且仅当 $x = 0$ 时等号成立。
- $\|\lambda x\|_A = |\lambda| \|x\|_A$
- $\|x + y\|_A \leq \|x\|_A + \|y\|_A$

证明：由于 A 为正定矩阵，那么存在可逆矩阵 Q ，使得成立 $A = Q^T Q$ ，因此

$$\|x\|_A = \sqrt{(Ax, x)} = \sqrt{x^T A x} = \sqrt{(Qx)^T (Qx)} = \|Qx\|_2 \quad (153)$$

对于正定性，显然 $\|x\| \geq 0$ ，且

$$\|x\|_A = 0 \iff \|Qx\|_2 = 0 \iff Qx = 0 \iff x = 0 \quad (154)$$

对于绝对齐性，注意到

$$\|\lambda x\|_A = \|\lambda Qx\|_2 = |\lambda| \|Qx\|_2 = |\lambda| \|x\|_A \quad (155)$$

对于三角不等式，注意到

$$\|x + y\|_A = \|Q(x + y)\|_2 = \|Qx + Qy\|_2 \leq \|Qx\|_2 + \|Qy\|_2 = \|x\|_A + \|y\|_A \quad (156)$$

第十一周

第一题

对于 $\lambda \neq 0$, 设

$$A = \begin{pmatrix} 2\lambda & \lambda \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (157)$$

证明: 当 $|\lambda| = 2/3$ 时, $\text{cond}(A)_\infty$ 取到最小值。

证明: 由于

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\lambda} & -1 \\ -\frac{1}{\lambda} & 2 \end{pmatrix} \quad (158)$$

因此

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq 2} \sum_{j=1}^2 |a_{ij}| = \max\{3|\lambda|, 2\} = \begin{cases} 3|\lambda|, & |\lambda| \geq \frac{2}{3} \\ 2, & |\lambda| < \frac{2}{3} \end{cases} \quad (159)$$

$$\|A^{-1}\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq 2} \sum_{j=1}^2 |a_{ij}| = \max\left\{1 + \frac{1}{|\lambda|}, 2 + \frac{1}{|\lambda|}\right\} = 2 + \frac{1}{|\lambda|} \quad (160)$$

因此

$$\text{cond}(A)_\infty = \|A^{-1}\|_\infty \|A\|_\infty = \begin{cases} 6|\lambda| + 3, & |\lambda| \geq \frac{2}{3} \\ 4 + \frac{2}{|\lambda|}, & |\lambda| < \frac{2}{3} \end{cases} \quad (161)$$

因此当 $|\lambda| = 2/3$ 时, $\text{cond}(A)_\infty$ 取到最小值7。

第二题

设

$$A = \begin{pmatrix} 100 & 99 \\ 99 & 98 \end{pmatrix} \quad (162)$$

计算 A 的条件数 $\text{cond}(A)_2$ 与 $\text{cond}(A)_\infty$ 。

解: 由于

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -98 & 99 \\ 99 & -100 \end{pmatrix} \quad (163)$$

且 $A^T A$ 与 $(A^{-1})^T A^{-1}$ 的特征值均为

$$19603 + 2574\sqrt{58}, \quad \frac{1}{19603 + 2574\sqrt{58}} \quad (164)$$

那么

$$\|A\|_2 = \sqrt{19603 + 2574\sqrt{58}} \approx 198 \quad (165)$$

$$\|A^{-1}\|_2 = \sqrt{19603 + 2574\sqrt{58}} \approx 198 \quad (166)$$

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq 2} \sum_{j=1}^2 |a_{ij}| = \max\{199, 197\} = 199 \quad (167)$$

$$\|A^{-1}\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq 2} \sum_{j=1}^2 |a_{ij}| = \max\{197, 199\} = 199 \quad (168)$$

因此

$$\text{cond}(A)_2 = \|A^{-1}\|_2 \|A\|_2 = 19603 + 2574\sqrt{58} \approx 39206 \quad (169)$$

$$\text{cond}(A)_\infty = \|A^{-1}\|_\infty \|A\|_\infty = 39601 \quad (170)$$

第三题

设

$$A = \begin{pmatrix} 10 & a & 0 \\ b & 10 & b \\ 0 & a & 5 \end{pmatrix} \quad (171)$$

$\det A \neq 0$ 。求线性方程 $Ax = b$ 的Jacobi迭代和Gauss-Seidel迭代收敛的充分必要条件。

解：由题意

$$\det A = 500 - 15ab \neq 0 \iff ab \neq \frac{100}{3} \quad (172)$$

Jacobi迭代矩阵为

$$B_J = I - D^{-1}A = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{a}{10} & 0 \\ -\frac{b}{10} & 0 & -\frac{b}{10} \\ 0 & -\frac{a}{5} & 0 \end{pmatrix} \quad (173)$$

而矩阵 B_J 的特征值为

$$0, \quad \frac{1}{10}\sqrt{3ab}, \quad -\frac{1}{10}\sqrt{3ab} \quad (174)$$

因此

$$\rho(B_J) = \frac{\sqrt{3|ab|}}{10} \quad (175)$$

而Jacobi迭代收敛 \iff

$$\rho(B_J) < 1 \iff \frac{\sqrt{3|ab|}}{10} < 1 \iff |ab| < \frac{100}{3} \quad (176)$$

Gauss-Seidel迭代矩阵为

$$B_G = I - (D - L)^{-1}A = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{a}{10} & 0 \\ 0 & \frac{ab}{100} & -\frac{b}{10} \\ 0 & -\frac{a^2b}{500} & \frac{ab}{50} \end{pmatrix} \quad (177)$$

而矩阵 B_G 的特征值为

$$0, \quad 0, \quad \frac{3ab}{100} \quad (178)$$

因此

$$\rho(B_G) = \frac{3|ab|}{100} \quad (179)$$

而Gauss-Seidel迭代收敛 \iff

$$\rho(B_G) < 1 \iff \frac{3|ab|}{100} < 1 \iff |ab| < \frac{100}{3} \quad (180)$$

第三题

对于线性方程组 $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$, 若使用迭代法

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} + \alpha \left(\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} \right) \quad (181)$$

求迭代法收敛的充分必要条件, 并求出收敛最快的 α 。

解: 一阶线性定常迭代为

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \left(\alpha \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} - \alpha \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (182)$$

迭代矩阵为

$$B = \alpha \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\alpha + 1 & 2\alpha \\ \alpha & 2\alpha + 1 \end{pmatrix} \quad (183)$$

而 B 的特征值为

$$a + 1, \quad 4a + 1 \quad (184)$$

因此

$$\rho(B) = \max \{ |\alpha + 1|, |4\alpha + 1| \} = \begin{cases} |\alpha + 1|, & -\frac{2}{5} \leq \alpha \leq 0 \\ |4\alpha + 1|, & \alpha < -\frac{2}{5} \text{ 或 } \alpha > 0 \end{cases} \quad (185)$$

而迭代收敛 \iff

$$\rho(B) < 1 \iff \max \{ |\alpha + 1|, |4\alpha + 1| \} < 1 \iff -\frac{1}{2} < \alpha < 0 \quad (186)$$

而

$$\min \rho(B) = \rho(-2/5) = 3/5 \quad (187)$$

因此当 $\alpha = -2/5$ 时, 收敛速度最快。

第十二周

第一题

证明：对于

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad (188)$$

使用Jacobi迭代和Gauss-Seidel迭代解线性方程 $Ax = b$ 均收敛，试比较哪种方法收敛快。

证明：定义

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (189)$$

注意到 A 与 $2D - A$ 的特征多项式均为

$$1 - 11x + 7x^2 - x^3 \quad (190)$$

因此 A 与 $2D - A$ 的特征值均为正数，进而 A 与 $2D - A$ 均为正定矩阵，从而使用Jacobi迭代和Gauss-Seidel迭代解线性方程 $Ax = b$ 均收敛。

为比较收敛速度，对于Jacobi迭代

$$B_J = I - D^{-1}A, \quad \rho(B_J) = \frac{\sqrt{33}}{6} \quad (191)$$

对于Gauss-Seidel迭代

$$B_G = I - (D - L)^{-1}A, \quad \rho(B_G) = \frac{11}{12} \quad (192)$$

而 $\rho(B_J) > \rho(B_G)$ ，因此Gauss-Seidel迭代更快。

第二题

证明：对于线性方程组 $Ax = b$ ，其中 A 为对称正定矩阵，迭代公式

$$x^{(n+1)} = x^{(n)} + w(b - Ax^{(n)}) \quad (193)$$

在 $0 < w < 2/\lambda_{\max}$ 时收敛，其中 λ_{\max} 为矩阵 A 的最大特征值。

证明：迭代公式为

$$x^{(n+1)} = (I - wA)x^{(n)} + wb \quad (194)$$

此为一阶定常迭代，因此迭代收敛的充分必要条件为

$$\rho(I - wA) < 1 \quad (195)$$

考察矩阵 $I - wA$ 的特征值，注意到

$$(I - wA)x = (1 - w\lambda)x \iff Ax = \lambda x \quad (196)$$

因此记矩阵 A 的最大与最小特征值为 λ_{\max} 与 λ_{\min} ，那么

$$\rho(I - wA) = \max\{|1 - w\lambda_{\max}|, |1 - w\lambda_{\min}|\} < 1 \iff 0 < w < \frac{2}{\lambda_{\max}} \quad (197)$$

第三题

求解方程 $x = 1 + 1/x^2$ 在 $x_0 = 1.5$ 附近的根, 迭代公式为 $x_{n+1} = 1 + 1/x_n^2$ 。

解: 记 $f(x) = 1 + 1/x^2$, 注意到

$$f(1.3) = \frac{269}{169} \in (1.3, 1.6), \quad f(1.6) = \frac{89}{64} \in (1.3, 1.6) \quad (198)$$

因此存在 $x^* \in (1.3, 1.6)$, 使得成立 $f(x^*) = x^*$ 。而

$$f'(x) = -\frac{2}{x^3} \in \left[-\frac{1000}{2197}, -\frac{125}{256}\right], \quad x \in [1.3, 1.6] \implies |f'(x)| \leq 0.92 \quad (199)$$

进而不动点迭代收敛, 收敛速度为

$$|x_n - x^*| < \frac{0.92^n}{1 - 0.92} |x_1 - x_0| \quad (200)$$

二分法收敛速度为

$$|x_n - x^*| < \frac{0.1}{2^{n+1}} \quad (201)$$

从而二分法收敛速度快。若要求误差小于 0.5×10^{-5} , 则使用求得根为

$$x^* = 1.46557 \quad (202)$$

第四题

求解方程 $x = \sqrt[3]{1 + x^2}$ 在 $x_0 = 1.5$ 附近的根, 迭代公式为 $x_{n+1} = \sqrt[3]{1 + x_n^2}$ 。

解: 记 $f(x) = \sqrt[3]{1 + x^2}$, 注意到

$$f(1.4) = \frac{1}{5} \sqrt[3]{370} \in (1.4, 1.5), \quad f(1.5) = \frac{1}{2} \sqrt[3]{26} \in (1.4, 1.5) \quad (203)$$

因此存在 $x^* \in (1.4, 1.5)$, 使得成立 $f(x^*) = x^*$ 。而

$$f'(x) = \frac{2}{3} x \frac{\sqrt[3]{1 + x^2}}{1 + x^2} \in \left[\frac{7}{111} \sqrt[3]{370}, \frac{2}{13} \sqrt[3]{26}\right], \quad x \in [1.4, 1.5] \implies |f'(x)| \leq 0.46 \quad (204)$$

进而不动点迭代收敛, 收敛速度为

$$|x_n - x^*| < \frac{0.46^n}{1 - 0.46} |x_1 - x_0| \quad (205)$$

二分法收敛速度为

$$|x_n - x^*| < \frac{0.1}{2^{n+1}} \quad (206)$$

从而不动点迭代收敛速度快。若要求误差小于 0.5×10^{-5} , 则使用不动点迭代求得根为

$$x^* = 1.46557 \quad (207)$$

第五题

求解方程 $x = 1/\sqrt{x-1}$ 在 $x_0 = 1.5$ 附近的根, 迭代公式为 $x_{n+1} = 1/\sqrt{x_n-1}$ 。

解: 记 $f(x) = 1/\sqrt{x-1}$, 注意到

$$f(1.4) = \frac{1}{2} \sqrt{10} > 1.4, \quad f(1.5) = \sqrt{2} < 1.5 \quad (208)$$

因此存在 $x^* \in (1.4, 1.5)$, 使得成立 $f(x^*) = x^*$ 。而

$$f'(x) = -\frac{1}{2(x-1)^{\frac{3}{2}}} \in \left[-\frac{5}{8}\sqrt{10}, -\sqrt{2}\right], \quad x \in [1.4, 1.5] \implies |f'(x)| > 1 \quad (209)$$

进而不固定点迭代不收敛, 若要求误差小于 0.5×10^{-5} , 则使用二分法求得根为

$$x^* = 1.46557 \quad (210)$$

第十三周

第一题

应用Newton法于方程 $f(x) = x^n - a = 0$ 和方程 $f(x) = 1 - a/x^n = 0$, 分别求出 $\sqrt[n]{a}$ 的迭代公式, 并求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{a} - x_{n+1}}{(\sqrt[n]{a} - x_n)^2} \quad (211)$$

解: 对于

$$f(x) = x^n - a, \quad f'(x) = nx^{n-1}, \quad f''(x) = n(n-1)x^{n-2} \quad (212)$$

迭代公式为

$$x_{k+1} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)x_k + \frac{a}{nx_k^{n-1}} \quad (213)$$

由于

$$f(\sqrt[n]{a}) = 0, \quad f'(\sqrt[n]{a}) = na^{1-1/n} \quad (214)$$

那么该迭代公式在 $\sqrt[n]{a}$ 附近平方收敛, 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{a} - x_{k+1}}{(\sqrt[n]{a} - x_k)^2} = -\frac{f''(\sqrt[n]{a})}{2f'(\sqrt[n]{a})} = \frac{1-n}{2\sqrt[n]{a}} \quad (215)$$

对于

$$f(x) = 1 - \frac{a}{x^n}, \quad f'(x) = \frac{an}{x^{n+1}}, \quad f''(x) = -\frac{an(n+1)}{x^{n+2}} \quad (216)$$

迭代公式为

$$x_{k+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)x_k + \frac{x_k^{n+1}}{an} \quad (217)$$

由于

$$f(\sqrt[n]{a}) = 0, \quad f'(\sqrt[n]{a}) = \frac{n}{\sqrt[n]{a}} \quad (218)$$

那么该迭代公式在 $\sqrt[n]{a}$ 附近平方收敛, 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{a} - x_{k+1}}{(\sqrt[n]{a} - x_k)^2} = -\frac{f''(\sqrt[n]{a})}{2f'(\sqrt[n]{a})} = \frac{n+1}{2\sqrt[n]{a}} \quad (219)$$

第二题

证明迭代公式

$$x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^2 + 3a)}{3x_n^2 + a} \quad (220)$$

是计算 \sqrt{a} 的三阶方法。如果初值 x_0 充分靠近根 \sqrt{a} , 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{a} - x_{n+1}}{(\sqrt{a} - x_n)^3} \quad (221)$$

证明：令

$$f(x) = \frac{x(x^2 + 3a)}{3x^2 + a} \quad (222)$$

那么 $f(\sqrt{a}) = \sqrt{a}$, 且

$$f'(x) = \frac{3(a - x^2)^2}{(a + 3x^2)^2}, \quad f'(\sqrt{a}) = 0 \quad (223)$$

那么方程 $x = f(x)$ 在 \sqrt{a} 附近存在且存在唯一解 $x^* = \sqrt{a}$ 。

(法一) 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n) - \sqrt{a}}{(x_n - \sqrt{a})^3} = \lim_{x \rightarrow \sqrt{a}} \frac{f(x) - \sqrt{a}}{(x - \sqrt{a})^3} = \lim_{x \rightarrow \sqrt{a}} \frac{\frac{x(x^2+3a)}{3x^2+a} - \sqrt{a}}{(x - \sqrt{a})^3} = \lim_{x \rightarrow \sqrt{a}} \frac{1}{a + 3x^2} = \frac{1}{4a} \quad (224)$$

因此迭代公式 $x_{n+1} = f(x_n)$ 是计算 \sqrt{a} 的三阶方法。

(法二) 由于

$$f''(x) = \frac{48ax(x^2 - a)}{(a + 3x^2)^3}, \quad f''(\sqrt{a}) = 0 \quad (225)$$

$$f'''(x) = -\frac{48a(a^2 - 18ax^2 + 9x^4)}{(a + 3x^2)^4}, \quad f'''(\sqrt{a}) = \frac{3}{2a} \quad (226)$$

因此迭代公式 $x_{n+1} = f(x_n)$ 是计算 \sqrt{a} 的三阶方法, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n) - \sqrt{a}}{(x_n - \sqrt{a})^3} = \frac{f'''(\sqrt{a})}{3!} = \frac{1}{4a} \quad (227)$$

第三题

用如下方法求 $f(x) = x^3 - 3x - 1$ 的在 $x_0 = 2$ 附近的零点, 零点的准确值为

$$x^* = 1.87938524 \dots \quad (228)$$

要求计算结果四位有效数字准确。

第一问

Newton法, $x_0 = 2$

解: Newton迭代为

$$x_{n+1} = \varphi(x_n), \quad \varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} \quad (229)$$

代入可得

$$x_{n+1} = \frac{2x_n^3 + 1}{3(x_n^2 - 1)} \quad (230)$$

代入数据可得

$$x_0 = 2, \quad x_1 = \frac{17}{9} \approx 1.88889, \quad x_2 = \frac{10555}{5616} \approx 1.87945, \quad x_3 = \frac{1264474496323}{672812825256} \approx 1.87939 \quad (231)$$

第四题

对于 $f(x) = 0$ 的Newton公式

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (232)$$

证明：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+2} - x_{n+1}}{(x_{n+1} - x_n)^2} = -\frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)} \quad (233)$$

其中 $f(x^*) = 0$ 。

证明：由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x^*}{(x_n - x^*)^2} = \frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)} \quad (234)$$

那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+2} - x_{n+1}}{(x_{n+1} - x_n)^2} = -\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_{n+1})/f'(x_{n+1})}{(f(x_n)/f'(x_n))^2} \quad (235)$$

$$= -\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_{n+1})(f'(x_n))^2}{f'(x_{n+1})(f(x_n))^2} \quad (236)$$

$$= -\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(f(x_{n+1}) - f(x^*))(f'(x_n))^2}{f'(x_{n+1})(f(x_n) - f(x^*))^2} \quad (237)$$

$$= -\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f'(\xi_{n+1})(x_{n+1} - x^*)(f'(x_n))^2}{f'(x_{n+1})(f'(\xi_n))^2(x_n - x^*)^2} \quad (238)$$

$$= -\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f'(\xi_{n+1})(f'(x_n))^2}{f'(x_{n+1})(f'(\xi_n))^2} \frac{x_{n+1} - x^*}{(x_n - x^*)^2} \quad (239)$$

$$= -\frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)} \quad (240)$$

第十四周

第一题

非线性方程组

$$\begin{cases} 3x^2 - y^2 = 0 \\ 3xy^2 - x^3 - 1 = 0 \end{cases} \tag{241}$$

在(0.4, 0.7)附近存在解，构造不动点迭代，使得其收敛至此解，并计算精确到 10^{-5} ，其中向量范数为 $\|\cdot\|_\infty$ 。

解：记

$$\Phi \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}}y \\ \sqrt{\frac{1+x^3}{3x}} \end{pmatrix} \tag{242}$$

那么原方程组的解为向量函数 Φ 的不动点。设迭代区域为 $D = [0.4, 0.6] \times [0.7, 1]$ ，由于 Φ 的Jacobi 矩阵为

$$\Phi' \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2x^3 - 1}{2\sqrt{3x^3(x^3 + 1)}} & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \rho \left(\Phi' \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right) = \sqrt{\frac{1 - 2x^3}{6\sqrt{x^3(x^3 + 1)}}} \leq \frac{\sqrt{109}}{2\sqrt{3}\sqrt[4]{266}} \approx 0.75 \tag{243}$$

进而在 (x^*, y^*) 的邻域内该不动点迭代收敛。迭代结果如下表

n	x_n	y_n
0	0.4	0.7
1	0.404145	0.94163
2	0.54365	0.937673
3	0.541366	0.843598
4	0.487052	0.844641
5	0.487654	0.873764
6	0.504468	0.873392
7	0.504253	0.863476
8	0.498528	0.863598
9	0.498598	0.866878
10	0.500492	0.866838
11	0.500469	0.865741
12	0.499836	0.865755
13	0.499844	0.86612

n	x	y
14	0.500055	0.866116
15	0.500052	0.865994
16	0.499982	0.865995
17	0.499983	0.866036
18	0.500006	0.866035
19	0.500006	0.866022
精确解	0.5	$\sqrt{3}/2 \approx 0.86602540$

第十五周

第一题

用改进Euler法和梯形法解初值问题

$$y' = x^2 + x - y, \quad y(0) = y \tag{244}$$

取步长 $h = 0.1$, 计算到 $x = 0.5$, 并与精确解 $y = -e^{-x} + x^2 - x + 1$ 相比较。

解：使用Euler法

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{10}(x_n^2 + x_n - y_n), \quad x_n = x_0 + nh \tag{245}$$

可得

$$y(0) = 0, \quad y(0.1) = 0, \quad y(0.2) = 0.011, \quad y(0.3) = 0.039, \quad y(0.4) = 0.06951, \quad y(0.5) = 0.118559 \tag{246}$$

使用梯形法

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{20}(x_n^2 + x_n - y_n + x_{n+1}^2 + x_{n+1} - y_{n+1}) \tag{247}$$

$$\iff y_{n+1} = \frac{1}{21}(x_n^2 + x_n + x_{n+1}^2 + x_{n+1} + 19y_n) \tag{248}$$

可得

$$y(0) = 0 \qquad y(0.1) = \frac{11}{2100} \approx 0.00524 \qquad y(0.2) = \frac{236}{11025} \approx 0.02141 \tag{249}$$

$$y(0.3) = \frac{45719}{926100} \approx 0.04937 \qquad y(0.4) = \frac{437114}{4862025} \approx 0.08990 \qquad y(0.5) = \frac{2347907}{16336404} \approx 0.14372 \tag{250}$$

与精确解的比较

	精确解	Euler法	误差	梯形法	误差
y_0	0	0	0	0	0
y_1	0.00516	0	0.00516	0.00524	0.00008
y_2	0.02127	0.011	0.01027	0.02141	0.00014
y_3	0.04918	0.039	0.01018	0.04937	0.00019
y_4	0.08968	0.06951	0.02017	0.08990	0.00022
y_5	0.14347	0.11856	0.02491	0.14372	0.00

第十六周

第一题

证明：对于任意 t ，如下Runge-Kutta方法为二阶精度

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(K_2 + K_3) \\ K_1 = f(x_n, y_n) \\ K_2 = f(x_n + th, y_n + thK_1) \\ K_3 = f(x_n + (1-t)h, y_n + (1-t)hK_1) \end{cases} \quad (251)$$

证明：截断误差为

$$T_{n+1} = y(x_n + h) - y_n - \frac{h}{2}(f(x_n + th, y_n + thf_n) + f(x_n + (1-t)h, y_n + (1-t)hf_n)) \quad (252)$$

其中

$$y_n = y(x_n), \quad f_n = f(x_n, y_n) \quad (253)$$

作Taylor展开

$$y(x_n + h) = y_n + hy'_n + \frac{h^2}{2}y''_n + O(h^3) = y_n + hf_n + \frac{h^2}{2}(f_x + f_yf_n) + O(h^3) \quad (254)$$

$$f(x_n + th, y_n + thf_n) = f_n + thf_x + thf_yf_n + O(h^2) \quad (255)$$

$$f(x_n + (1-t)h, y_n + (1-t)hf_n) = f_n + (1-t)hf_x + (1-t)hf_yf_n + O(h^2) \quad (256)$$

其中

$$f_x = f_x(x_n, y_n), \quad f_y = f_y(x_n, y_n) \quad (257)$$

因此

$$T_{n+1} = y(x_n + h) - y_n - \frac{h}{2}(f(x_n + th, y_n + thf_n) + f(x_n + (1-t)h, y_n + (1-t)hf_n)) \quad (258)$$

$$= y_n + hf_n + \frac{h^2}{2}(f_x + f_yf_n) + O(h^3) - y_n \quad (259)$$

$$- \frac{h}{2}(f_n + thf_x + thf_yf_n + O(h^2)) \quad (260)$$

$$- \frac{h}{2}(f_n + (1-t)hf_x + (1-t)hf_yf_n + O(h^2)) \quad (261)$$

$$= O(h^3) \quad (262)$$

因此该Runge-Kutta方法为二阶精度。