



மாதவிடாய், கர்ப்ப காலம் மற்றும் மெனோபாஸ் ஆகிய மூன்று முக்கிய நிலைகளிலும் உடலில் இன்சலின் மற்றும் ரத்தச் சர்க்கரை அளவில் பெரும் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. பிசிஓஎஸ் எனப்படும் சினைப்பை நீர்க்கட்டி பிரச்னை உள்ள இளம் பெண்கள், சாதத்தை முழுமையாகத் தவிர்க்கத் தேவையில்லை. மாறாக, புரதமும் நார்ச்சத்தும் நிறைந்த உணவுகளுக்கும், உடற்பயிற்சிக்கும் பழக வேண்டும்.

### காய்கறியில் தொடங்கி சாதத்தில் முடியுங்கள்!

சாப்பிடும்போது முதலில் நார்ச்சத்து நிறைந்த காய்கறி, கீரை, கூட்டு, இரண்டாவதாக, புரதச்சத்து கொண்ட பருப்பு, சாம்பார், முட்டை, மீன் அல்லது தயிர், இறுதியாக மாவுச்சத்து உள்ள சாதத்தைச் சாப்பிடும் முறையைப் பின்பற்றினால் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு சட்டென உயராமல் சீராக இருக்கும்.

ரத்தச் சர்க்கரையை உடனே உயர்த்தும் சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட் (சர்க்கரை சேர்த காபி, டீ, இனிப்புகள், குளிர்பானங்கள், கேக், பிஸ்கட், ஜூஸ், மில்க் ஷேக்) போன்றவை, செரிமானத்துக்குப் பின் ரத்தத்தில் சர்க்கரையை உயர்த்தும் காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் (சாதம், இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, பொங்கல், உப்புமா, இடியாப்பம், ராகி, கம்பு, சோளம், உருளைக்கிழங்கு), ரத்தத்தில் சர்க்கரை உடனடியாக ஏறுவதைத் தடுத்து, மெதுவாகவும் சீராகவும் கலக்கச் செய்து, குடல்நலனை மேம்படுத்தும் ஃபைபர்ரிச் கார்போஹைட்ரேட் (கீரைகள், காய்கறிகள், பருப்பு வகைகள், கொண்டைக் கடலை, பட்டாணி, முழுத் தானியங்கள், முழு பழங்கள்) என கார்போஹைட்ரேட்டில் மூன்று வகைகள் உண்டு.



↑ பாகமணி