


ரசம் சாதம், தொட்டுக்கொள்ள உருளைக் கிழங்கு பொரியல் சூப்பர் காம்பினைஷனாக இருக்கலாம். அதைச் சாப்பிட்டதும் சர்க்கரை அளவு தாறுமாறாக எகிறும். அதுவே கொஞ்சம் சாதத்துடன் சாம்பார் அல்லது ரசம் சாதத்துடன், கீரை, காய்கறி, பருப்பு, முட்டை, மீன் போன்றவற்றைச் சாப்பிட்டால், ரத்தச் சர்க்கரை சீராக அதிகரிக்கும்.

சைடிஷ்ஷை மெயின் டிஷ் ஆக்குங்கள்!

தட்டு நிறைய சாதம், பக்கத்தில் ஊறுகாய் போல கொஞ்சம் காய்கறி மற்றும் புரதம்... இப்படிச் சாப்பிட்டே பழகியவர்கள் நம்மில் பலரும். காய்கறிகள் மற்றும் புரதத்தின் அளவை அதிகமாகவும், சாதத்தின் அளவை கொஞ்சமாகவும் மாற்றிப் பழகுங்கள். அதாவது தட்டின் பாதியில் காய்கறி, கீரை, கூட்டு, பொரியல் அல்லது சாலட், கால் பகுதியில் சாதம், சப்பாத்தி அல்லது சிறுதானியங்கள், மீதி கால் பகுதியில் பருப்பு, சாம்பார், தயிர், சுண்டல்,



முட்டை, மீன் அல்லது சிக்கன் போன்ற புரத உணவுகளால் நிரம்புவதே சரியானது.

பீரியட்ஸ், பிரெக்னன்சி, மெனோபாஸ்... இப்படிச் சாப்பிடுங்கள்!

மாதவிடாய், கர்ப்ப காலம் மற்றும் மெனோபாஸ் ஆகிய மூன்று முக்கிய நிலைகளிலும் உடலில் இன்சலின் மற்றும் ரத்தச் சர்க்கரை அளவில் பெரும் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன.

பிசிஓஎஸ் எனப்படும் சினைப்பை நீர்க்கட்டி பிரச்னை உள்ள இளம் பெண்கள், சாதத்தை முழுமையாகத் தவிர்க்கத் தேவையில்லை. மாறாக, புரதமும் நார்ச்சத்தும் நிறைந்த உணவுகளுக்கும், உடற்பயிற்சிக்கும் பழக வேண்டும். கூடவே, இனிப்புகளையும் தவிர்ப்பதன் மூலம் இன்சலின் எதிர்ப்பைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.

கர்ப்பகால நீரிழிவு (Gestational Diabetes) உள்ளவர்கள், 'இருவருக்காகச் சாப்பிட வேண்டும்' என்ற தவறான எண்ணத்தைக் கைவிட்டு, மருத்துவர் ஆலோசனையுடன் சரியான அளவிலும் இடைவெளியிலும்

சத்தான உணவை உட்கொள்ள வேண்டும். மெனோபாஸ் காலத்தில் ஏற்படும் வயிற்றுப் பருமன் மற்றும் சர்க்கரை நோயைத் தடுக்க இரவில் சாதத்தைக் குறைத்து, காய்கறி, புரதம் மற்றும் தசைகளை வலிமையாக்கும் (Strength training) பயிற்சிகளை மேற்கொள்வது அவசியம்..."

- அறிவுறுத்துகிறார் டாக்டர் பாசுமணி

- தெளிவோம்...

சர்க்கரை ஏறாமலிருக்க 5 ரூல்ஸ்!

- சாதத்தின் அளவைக் குறைக்கவும்: முதலில் 20 சதவிகிதம் அளவு மட்டும் குறைக்கவும். அது பழகியதும் அளவை சிறுகச் சிறுகக் குறைக்கவும்.
- காய்கறிகள் இரட்டிப்பாகட்டும்: உணவில் ஒரு பொரியலோடு நிறுத்தாமல் கீரை, கூட்டு, அவியல் அல்லது சாலட் என காய்கறிகளின் அளவை அதிகரிக்கவும்.
- புரதச்சத்து கட்டாயம்: ஒவ்வொரு வேளை உணவிலும் சாம்பார், பருப்பு, சுண்டல், முட்டை, மீன் அல்லது தயிர் போன்ற ஏதேனும் ஒரு புரத உணவு இருக்கட்டும்.
- இனிப்பு பானங்களுக்கு 'நோ': சர்க்கரை போட்ட டீ, காபி, ஜூஸ், கூல் டிரிங்க்ஸ் மற்றும் மில்ஷேக் போன்றவற்றை முற்றிலுமாக நிறுத்தவும்.
- நிதானமாக மென்று சாப்பிடவும்: வயிறு 80 சதவிகிதம் நிறையும் வரை சாப்பிட்டால் போதும். உணவை அள்ளி விழுங்காமல், நன்றாக மென்று சாப்பிட வேண்டும். சிறிது நேரம் கழித்து 10-15 நிமிடங்கள் மெதுவாக நடைப்பயிற்சி செய்யவும்.