



புற்றுநோய் சிகிச்சை!

கீமோதெரபி பக்கவிளைவுகள் நினைத்து பயமா?



டாக்டர் கிரண் குமார் DVS

இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் (ICMR) தேசிய புற்றுநோய் பதிவேட்டு திட்டம் வெளியிட்ட புள்ளிவிவரப்படி, ஒவ்வொரு ஒன்பது பேரில் ஒருவருக்கு வாழ்நாளில் புற்றுநோய் ஏற்படும் அபாயம் இருப்பதாக இந்த ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது. இந்த எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் நிலையில், “கீமோதெரபி” என்ற சொல் கேட்டவுடன் பலருக்கும் மனதில் தோன்றுவது பயம் தான். இது குறித்து விளக்குகிறார் சிருங்கேரி சாரதா ஈக்விட்டாஸ் மருத்துவமனை மருத்துவ புற்றுநோயியல் பிரிவு தலைவர் டாக்டர் கிரண் குமார் DVS.

கீமோதெரபி என்றால் என்ன?

“புற்றுநோய் செல்கள் இயல்பான செல்களை விட பன்மடங்கு வேகமாகப் பெருகும் தன்மை கொண்டவை. இந்த கட்டுக்கடங்காத வளர்ச்சியை சக்திவாய்ந்த மருந்துகள் மூலம் தடுத்து நிறுத்தும் சிகிச்சை முறையே கீமோதெரபி.

அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு உடலில் கண்ணுக்குத் தெரியாமல் எஞ்சியிருக்கும் புற்றுநோய் செல்களை அழிக்க வேண்டியவர்களுக்கும், அறுவை சிகிச்சைக்கு முன்பாக கட்டியின் அளவைச் சுருக்க வேண்டியவர்களுக்கும், நோய் மற்ற உறுப்புகளுக்குப் பரவாமல் தடுக்க வேண்டியவர்களுக்கும் இந்த சிகிச்சை பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

பக்கவிளைவுகள் ஏன் ஏற்படுகின்றன?

கீமோதெரபி மருந்துகள் புற்றுநோய் செல்களை மட்டும் இனம் கண்டு தாக்கும் திறன் கொண்டவை அல்ல. வேகமாகப் பிரிந்து பெருகும் எந்த செல்லையும் இவை இலக்காகக் கொள்கின்றன. புற்றுநோய் செல்களின் முதன்மை பண்பே கட்டுக்கடங்காத, விரைவான பிரிவினை தான். இதே பண்பை இயல்பாகவே கொண்டிருக்கும் சில ஆரோக்கியமான செல் தொகுதிகளும் நம் உடலில் உள்ளன. தலைமுடி வேர் செல்கள், நகத்தை உருவாக்கும் செல்கள், எலும்பு மஜ்ஜையில் புதிய ரத்த அணுக்களை உற்பத்தி செய்யும் செல்கள், வாய் மற்றும் குடல் உட்புறத்தை மூடியிருக்கும் சவ்வு செல்கள் ஆகியவை இதற்கு எடுத்துக்காட்டு. கீமோதெரபி மருந்து ரத்த ஓட்டம் வழியாக உடல் முழுவதும் பரவும்போது, இந்த ஆரோக்கியமான செல்களும் தவிர்க்க முடியாமல் பாதிக்கப்படுகின்றன.

எலும்பு மஜ்ஜையின் செயல்பாடு குறையும்போது வெள்ளை அணுக்கள், சிவப்பு அணுக்கள், தட்டணுக்கள் ஆகியவற்றின் உற்பத்தி பாதிக்கப்படுகிறது. இதனால் சோர்வு, மூச்சு இறைப்பு, ரத்த சோகை, தொற்று எதிர்ப்பு சக்தி குறைவு ஆகியவை ஏற்படுகின்றன. குடல் உட்புறச் சவ்வு பாதிக்கப்படும்போது குமட்டல், வாந்தி, வயிற்றுப் போக்கு, வாய்ப் புண் ஆகியவை தோன்றுகின்றன. முடி வேர் செல்கள் பாதிக்கப்படுவதால் தற்காலிக முடி உதிர்்தல் ஏற்படுகிறது. இந்த பக்கவிளைவுகளின் தீவிரம் மருந்தின் வகை, அளவு, சுழற்சிகளின் எண்ணிக்கை, நோயாளியின் உடல்நிலை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து ஒவ்வொருவருக்கும் மாறுபடும். மேலும், இவை நிரந்தரமானவை அல்ல. ஏனெனில் ஆரோக்கியமான செல்கள் புற்றுநோய் செல்களைப் போலன்றி, சிகிச்சைக்குப் பிறகு தங்களை மீண்டும் சீரமைத்துக் கொள்ளும் இயல்பான திறன் கொண்டவை. இதனால் பக்கவிளைவினால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் சிகிச்சை முடிந்த சில வாரங்கள்/மாதங்களில் படிப்படியாகக் குறைந்து உடல் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பிவிடும்.

பக்கவிளைவுகளை பயமின்றி சமாளிப்பது எப்படி?

குமட்டலைக் கட்டுப்படுத்த மருத்துவர் பரிந்துரைக்கும் மருந்துகளை தவறாமல் உட்கொள்ள வேண்டும். முடி உதிர்்தல் தற்காலிகமானதுதான், சிகிச்சை முடிந்து சில மாதங்களில் மீண்டும் வளரும். சிகிச்சைக்குப் பின் ஏழு முதல் பதினான்கு நாட்களில் வெள்ளை அணுக்களின் எண்ணிக்கை குறைவதால் தொற்று அபாயம் அதிகரிக்கும். எனவே கைகளை சுத்தமாக வைத்திருத்தல், கூட்டமான இடங்களைத் தவிர்த்தல் அவசியம். புரதச்சத்து மற்றும் நீர்ச்சத்து நிறைந்த உணவை மருத்துவர் ஆலோசனையுடன் தொடர வேண்டும்.

கீமோதெரபி என்பது ஒரு தற்காலிகப் போராட்டம் மட்டுமே. ஆரம்பநிலை கண்டறிதல், சரியான மருத்துவ ஆலோசனை, சத்தான உணவு ஆகியவை இந்தப் போராட்டத்தை எளிதாக்கும்” என்கிறார் டாக்டர் கிரண் குமார்.

SSEH/26



Dr. Kiran Kumar DVS

MBBS, MD General Medicine, DM Medical oncology
Consultant & Head - Medical Oncology

Consultant - Medical Gastroenterology
Sringeri Sharada Equitas Hospital



Web: www.equitashospital.org
Contact: 044-499 444 44

175, Velachery Road, Gowriwakkam, Chennai, Tamil Nadu-600073