

மறை முகமாகவும் தாக்கங்களை ஏற்படுத்தலாம். குறிப்பாக, கறவை மாடுகள் தண்ணீர் மற்றும் தீவனம் எடுத்துக்கொள்ளும் தன்மை, பால் உற்பத்தித் திறன், இனப் பெருக்கம் ஆகியவற்றில் பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம்.

காற்றின் ஈரப்பதமும் அவசியம்!

பால் மாடுகளுக்கு ஏற்படும் வெப்ப அழுத்தத்தை வெறும் வெப்பநிலையை மட்டும் வைத்துக் கணிக்க முடியாது. காற்றில் இருக்கும் ஈரப்பதமும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. வெப்பநிலையும் ஈரப்பதமும் இணைந்து மாடுகளின் உடலில் ஏற்படுத்தும் வெப்பச் சுமையை 'வெப்பநிலை - ஈரப்பதக் குறியீடு' மூலம் கண்காணிக்கலாம். வெப்பச் சுமை அதிகரிக்கும்போது மாடுகளின் உடலில் உருவாகும் வெப்பத்தை வெளியேற்றுவதில் சிரமப்படுகின்றன. இதனால் மூச்சிரைப்பு, உடல் வெப்பநிலை அதிகரிப்பு, நாடித்துடிப்பு அதிகரித்தல், தீவனம் உண்ணும் அளவு குறைதல், தண்ணீர் அருந்தும் அளவு அதிகரித்தல் போன்ற மாற்றங்கள் ஏற்படலாம்.

அதிக பால் கொடுக்கும் மாடுகள்... கவனம்!

குறிப்பாக, அதிக பால் கொடுக்கும் மாடுகளுக்குக் கூடுதல் கவனம் தேவை. பால் உற்பத்திக்காக அவற்றின் உடலில் நடைபெறும் வளர்சிதை மாற்றச் செயல்பாடுகள் அதிகமாக இருப்பதால், வெப்ப அழுத்தத்தின் தாக்கமும் அதிகமாக இருக்கலாம். வெப்ப அழுத்தம் ஏற்பட்டதும் மாடு தன்னுடைய உடல் வெப்பநிலையைச் சமநிலையில் வைத்துக்கொள்வதற்காக அதிக ஆற்றலைச் செலவிடத் தொடங்கும். அதே நேரத்தில் தீவனம் உட்கொள்ளும் அளவும் குறையும். இதனால் உடலுக்குக் கிடைக்கும் ஆற்றல் மற்றும் ஊட்டச்சத்தின் அளவு குறைந்து, பால் உற்பத்தியிலும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. தேசியப் பால் மேம்பாட்டு

வாரியத்தின் தகவலில்... 'வெப்ப அழுத்தத்தால் முதல் கன்று ஈனும் காலத்தில் பால் உற்பத்தி 10 முதல் 30 சதவிகிதம் வரையிலும், இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது கன்று ஈனும் காலத்தில் 5 முதல் 20 சதவிகிதம் வரையிலும் குறையக்கூடும் என்று ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது' எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்தப் பால் குறையும் அளவு அனைத்து மாடுகளுக்கும் ஒரே மாதிரியாக இருக்காது. இனம், பால் உற்பத்தி அளவு, உடல்நிலை, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பண்ணை மேலாண்மை போன்ற காரணிகளைப் பொறுத்து மாறுபடும். இதனால் வெப்ப அழுத்தம் என்பது மாட்டின் உடல்நலத்துடன் மட்டும் தொடர்புடைய பிரச்சனை அல்ல. பால் உற்பத்தி குறைவதன் மூலம் பண்ணையாளர்களின் வருமானத்தையும் நேரடியாகப் பாதிக்கக் கூடியது.

தீவன இருப்பை அதிகரிக்க வேண்டும்!

பால் பண்ணைகளில் கால்நடைகளின் தீவனத் தேவையை வெப்பநிலையுடன் சேர்த்துப் பார்க்க வேண்டும். காலநிலை மாற்றங்களால் வறட்சி அல்லது மழைப் பொழிவில் ஏற்றத்தாழ்வு ஏற்பட்டால், பசுந் தீவனத்தின் சாகுபடிப் பரப்பு மற்றும் விளைச்சல் பாதிக்கப்படலாம். அதிக வெப்பநிலை என்பது தாவரங்களின் வளர்ச்சியையும் பாதிக்கலாம். தாவரத் திசுக்களில் 'லிக்னின்' உருவாக்கம் அதிகரிப்பதால் சில தீவனங்கள் மற்றும் பயிர்க்கழிவுகள், கால்நடைகளின் செரிமானத் தன்மையைக் குறைப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால் கால்நடைகளுக்குக் கிடைக்கும் ஊட்டச்சத்தின் அளவு குறைந்து, பால் உற்பத்தியில் தாக்கம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

எனவே, பண்ணையாளர்கள் தினசரி தேவைக்கு மட்டும் தீவனத்தைத் தேடாமல்,