



பணி. ஒரு பகுதியில் காய்ச்சல் அதிகரிக்கத் தொடங்கும்போதே அதை எச்சரிக்கை அறிகுறியாக எடுத்துக்கொண்டு, அங்கே கொசு ஒழிப்பு, சுகாதாரப் பணிகள், மருத்துவக் கண்காணிப்பு ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும்” என்கிறார் ரவீந்திரநாத்.

அரசு என்ன சொல்கிறது?

இதற்கிடையே, தமிழகத்தில் டெங்கு தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவிக்கிறது. இந்த ஆண்டு ஜனவரி முதல் இதுவரை தமிழகத்தில் 16,066 டெங்கு பாதிப்புகள் உறுதிசெய்யப்பட்டிருப்பதாகவும், 9 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் சுகாதாரத்துறையின் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

அரசு மேற்கொண்டுவரும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண் ராஜாவிடம் பேசியபோது, “டெங்கு பாதிப்பு கண்டறியப்படும் பகுதிகளில் உடனடியாகக் கள ஆய்வு நடத்தப்பட்டு, கொசு ஒழிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. மாநிலம் முழுவதும் 25,158 கொசு ஒழிப்புப் பணியாளர்கள் வீடு வீடாகச் சென்று கொசுப்பெருக்க இடங்களை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டுவருகிறார்கள். டெங்கு பரவலைத் தடுக்க, போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது. காய்ச்சல் பாதிப்பைக் கண்காணிக்க மாநிலம் முழுவதும் 5,085 அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் பதிவாகும் நோயாளிகளின் விவரங்கள் தினமும் கண்காணிக்கப்படுகின்றன. நாள்தோறும் 750 முதல் 1,000 வரை சிறப்பு காய்ச்சல் மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டுவருகின்றன. இதுவரை 12,087 முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு, 4.68 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பரிசோதிக்கப்பட்டுள்ளனர். டெங்கு நோயாளிகளுக்கு உரிய நேரத்தில் சிகிச்சை அளிப்பதற்காக மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் உள்ளிட்ட சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்கு சிறப்புப் பயிற்சியும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.



அரசு மருத்துவமனைகளில் காய்ச்சலுக்குத் தனி வார்டு அமைக்க உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது” என்றார் விரிவாக.

“காய்ச்சல் வந்தால் டெங்குதானா?”

“காய்ச்சல் வந்தால் டெங்குதானா?” என்ற கேள்வி இப்போது பலருக்கும் எழுந்திருக்கலாம். ஆனால், காய்ச்சல் வந்தவுடன் அது டெங்கு என்று முடிவு செய்துவிடக் கூடாது என்கிறார்கள் மருத்துவர்கள். சென்னையில் டெங்குவடன் இன்ஃப்ளூயன்ஸா ஏ, ரைனோ வைரஸ், RSV உள்ளிட்ட சுவாசத் தொற்றுகளும் பரவிவருவதாக, பொதுநல மருத்துவர் ராஜேஷ் தெரிவிக்கிறார்.

“காய்ச்சல் வந்தவுடன் தாமதமாகவே மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது. மருத்துவரை அணுகி, தேவையான பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். காய்ச்சலுடன் வயிற்றுப்போக்கு, கண்வலி, மூச்சுவாங்குதல் போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் கூடுதல் கவனம் தேவை. குறிப்பாக வயிற்றின் மேல் பகுதியில் வலி, தொடர்ந்து வாந்தி, ரத்த அழுத்தம் குறைதல் போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் தாமதிக்காமல் மருத்துவரை அணுக வேண்டும்” என்றும் சொல்கிறார் மருத்துவர் ராஜேஷ்.

டெங்குவைத் தடுக்க அரசு நடவடிக்கைகள் ஒரு புறம் தீவிரப்படுத்தப்பட்டாலும், வீடுகளிலும் சுற்றுப்புறங்களிலும் தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்துக்கொள்வதும் முக்கியம். கொசுப்பெருக்கத்துக்கு இடமளிக்காமல் பொதுமக்களும் கவனமாகச் செயல்பட்டால்தான் டெங்கு பரவலைக் கட்டுப்படுத்த முடியும்.

