

அடுத்தவர் விடும். புகையும் நமக்கு புகையே!

ஆய்வை அவ்வளவு எளிதாகக் கடந்து போக முடியாது.

எப்படி ஏற்படுகிறது?

அடுத்தவர் விடும் புகை என்பது, ஒருவர் தானாகவிரும்பிச் சுவாசிக்காத புகை. இதை இரண்டாம் நிலைப் புகை (Second Hand Smoke) என்றும் அழைப்பது உண்டு. அருகிலிருப்பவர்கள் அல்லது அடுத்தவர்கள் புகைக்கும் போது நமக்குள்

செல்லும் புகை இது. சிகரெட், பீடி, சுருட்டு, புகைக் குழாய் போன்ற புகையிலைப் பொருள்களை எரிப்பதால் வெளிப்படும் புகையைச் சுவாசிப்பதன் மூலம் ஒருவர் இரண்டாம் நிலைப் புகைக்கு ஆளாகிறார்.

ஒருவர் புகைக்கும்போது எவ்வளவு ஆபத்துகள் ஏற்படுகின்றனவோ அதே அளவு ஆபத்துகள் இரண்டாம் நிலைப் புகை மூலமும் ஏற்படலாம். பொதுவாக, புகையிலைப் பொருள்களை எரிப்பதால் வெளிப்படும் புகையில் உடலுக்குத் தீங்கு விளைவிக்கும் நச்சு வேதிப்பொருள்கள் அதிகமாக இருக்கின்றன. நீங்கள் புகைபிடிப்பவராக இல்லாவிட்டாலும், மற்றவர்கள் வெளியிடும் புகையைச் சுவாசிக்கும்போது இந்த நச்சுப் பொருள்கள் உங்கள் உடலுக்குள் செல்கின்றன.

எரிந்துகொண்டிருக்கும் சிகரெட், சுருட்டு அல்லது புகைக்குழாயின் முனையிலிருந்து நேரடியாக வெளிவரும் புகை வடிகட்டப்படாதது. ஒருவர் புகைபிடித்த பிறகு வெளியேற்றும் புகையைவிட, இந்தப் புகையில் சில சமயங்களில் இன்னும் அதிக அளவில் தீங்கு விளைவிக்கும் நச்சுப் பொருள்கள் இருக்கலாம்.

புகையிலைப் புகையில் 4,000-க்கும் மேற்பட்ட வேதிப்பொருள்கள் இருக்கின்றன. அவற்றில் சுமார் 69 வேதிப்பொருள்கள் புற்றுநோயை ஏற்படுத்தக்கூடியவை. மேலும், சுமார் 250 வேதிப்பொருள்கள் மனித ஆரோக்கியத்துக்குப் பல வழிகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துபவை. தார் (Tar), பென்சீன் (Benzene), பியூட்டேன் (Butane), அம்மோனியா (Ammonia), டோலுயீன் (Toluene), காட்மியம் (Cadmium), ஃபார்மால்டிஹைடு (Formaldehyde) போன்றவை அவற்றில் முக்கியமான வேதிப்பொருள்கள்.

என்னென்ன பிரச்சனைகள் ஏற்படும்?

இரண்டாம் நிலைப் புகை உடலின் பலதரப்பட்ட உறுப்புகளை, பல வழிகளில் பாதிக்கிறது. தொடர்ந்து அடுத்தவர் புகைக்கும் புகையைச் சுவாசிக்கும் பெரியவர்களுக்கு உயர் ரத்த அழுத்தம், தமனி ரத்தக் குழாய்கள் தடித்துப்போவது அல்லது கடினமாகிப்போவது அல்லது இறுகிப்போவது போன்ற இதய ரத்த நாள நோய்களை ஏற்படுத்தலாம். இவற்றின் விளைவாக, மாரடைப்பு, பக்கவாதம் போன்றவை ஏற்படும் ஆபத்துகள் அதிகரிக்கலாம். 'தொடர்ந்து இரண்டாம் நிலைப் புகைக்கு ஆளாகும் ஒருவருக்கு, புகைக்கு ஆளாகாதவருடன் ஒப்பிடும்போது இதயநோய் ஏற்படும் வாய்ப்பு 30% வரை அதிகரிக்கலாம்' என்கின்றன ஆய்வுகள்.