

வகுக்கும். எனவே நல்ல காற்றோட்டம் அவசியம். கிழங்கு கூன் வண்டு, நூற்புழு, அசுவினி ஆகியவற்றின் வருகையைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து அவற்றை உடனுக்குடன் கட்டுப்படுத்த உரிய மேலாண்மை முறைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

மண்ணில் உள்ள தீங்கு விளைவிக்கும் நூற்புழுக்கள் மற்றும் வண்டுகளைக் கட்டுப்படுத்த, ஒவ்வொரு வாழைக்கும் 4 முதல் 6 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை 60 கிராம் முதல் 200 கிராம் வரை வேப்பம்பிண்ணாக்கு இடவேண்டும். சந்தைத் தேவையின் நிலையை அறிந்து இலைகளின் அளவு, தரம், நிறம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தரம் பிரித்து கட்டுகளாக அடுக்கிச் சந்தைப்படுத்தலாம். இலைகளைத் தண்ணீரில் அதிக நேரம் ஊறவைத்து அடுக்கினால், இலை வைப்புக்காலம் குறைந்து விடும். இலையின் இலகுவான பகுதிகள் வெம்பி பச்சை நிறத்தை இழந்து விடும். நீண்ட நேரம் நீரில் ஊறவைக்காமல், நிழல் பாங்கான இடத்தில் வைத்து இலைகளைச் சுத்தமாக அலசி கட்டலாம். ஈரமான துணி அல்லது ஈரப்பதம் கட்டுப்படுத்தும் பொதிகளில் கட்டி, நிழலான காற்றோட்டமான இடத்தில் வைக்க வேண்டும்.

சந்தை வாய்ப்புகளையும் போக்குவரத்து வசதியையும் சரியாகத் திட்டமிட்டுச் செய்தால், வாழை இலை விவசாயம் ஒரு நிலையான வாழ்வாதாரமாக அமையும். வாழை இலைச் சாகுபடியில் குறுகிய காலத்திலேயே வருமானம் பார்க்க முடியும்” என்று விவசாயிகளிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தபோது, ஒரு கேள்வியை எழுப்பினார், ஆனந்தன் என்ற விவசாயி...

“சார், சில நேரங்களில் இலைகள் குருத்திலிருந்து வெளிவரும்போதே கிழிந்து விடுகின்றன. சில சமயங்களில் இலைகளில்

இலைப்பச்சையம் சுரண்டப்பட்டு நரம்புகள் மட்டும் தெரிகின்றன. இந்த இலைகளைச் சந்தைப்படுத்த முடிவதில்லை. இந்தப் பிரச்சனைக்கு என்ன காரணம்?” என்று கேட்டார்.

ஒளிச்சேர்க்கை தடைப்படும்!

“இலைகளுக்கு இதுபோல் குந்தகம் விளைவிக்கும் பூச்சிகள் மற்றும் நோய்களை வாழை விவசாயிகள் துல்லியமாக அறிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியம்.

பாதிக்கப்பட்ட இலைகளில் இந்தச் சல்லடை அறிகுறிகளை நாம் பல நேரங்களில் கவனிக்கத் தவறிவிடுகிறோம். இலைகள் நீள வாக்கில் சுருட்டப்பட்டோ அல்லது மடிக்கப்பட்டோ இருந்தால் அந்த இலைகள், சுமார் 15 சென்டிமீட்டர் நீளம் வரை விரியாமல் சுருண்டு விடும். மிகக் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட இலைகள் உதிர்ந்துவிடும். இலைகள் மிகக் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டால், முழு இலையும் நடு நரம்புகள் வரை சுருங்கி, ஒளிச்சேர்க்கை பெருமளவில் தடைப்பட்டு 20 சதவிகிதம் வரை மகசூல் இழப்பு ஏற்படும்.

இரவில் வேட்டையாடும் புழுக்கள்!

இலைகளைச் சல்லடை போல் மாற்றி, நரம்புகள் தெரியும் அளவுக்குச் சேதத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய புழு, இலை வெட்டுப்புழு என அழைக்கப்படுகிறது. ‘ஸ்போடாப்டிரா லித்துரா’ என்னும் பூச்சிகள், புழுப் பருவத்தில் இருக்கும்போது, இலைப்பச்சையத்தை உணவாக உட்கொள்ளும். ஆரம்பக் கால வளர்ச்சிப் பருவத்தில் உணவுக்காக இலைகளின் அடிப்புறப் பச்சையத்தைச் சுரண்டி உண்கின்றன. இந்தப் புழுக்கள் இரவில் முழுத்திறனுடன் இலைப்பச்சையத்தை வேட்டையாடும். இலைப்பச்சையத்தை மட்டுமே உண்ணும் என்பதால் எஞ்சிய இலை நரம்புகள் தெளிவாகத் தெரியும்.