

இதனால் பாதிக்கப்படும் இலைகள், நமக்குச் சல்லடை போன்று தெரியும். வாழைத் தோட்டங்களில் பெரும்பாலும் இந்த வகைப் புழுக்கள் இரவு நேரத்தில் அதிவேகமாகச் செயல்படுவதால் பெரும்பாலான விவசாயிகள் இதைக் கவனிக்கத் தவறி விடுகிறார்கள். மற்ற தாவரங்களில் இலைகளின் பரப்பளவு குறைவாக இருப்பதால் இளம் புழுக்களுக்கு உணவுப் பற்றாக்குறை ஏற்படும். பல புழுக்களுக்கு உணவு கிடைக்காத நிலை உருவாவதால் இறந்து விடும். அதனால், சிறிய இலைகளைக் கொண்ட தாவரங்கள், இளம் வெட்டுப்புழுக்களின் சேதாரத்திலிருந்து தப்பித்துவிடுகின்றன.

வாழையில் இலைப் பரப்பளவு அதிகமாக இருப்பதால் இளம் புழுக்களுக்கு உணவு அதிகமாகக் கிடைக்கும். இளம் புழுக்களோடு வளர்ந்த புழுக்களும் வாழை இலையைச் சேதப்படுத்துகின்றன. வளர்ந்த புழுக்கள் மிகவும் தீவிரமாக இலைப் பரப்புகளை உண்டு, வளரும் இளம் இலைகளை முழுமையாக விரியவிடாமல் செய்து விடும். மேலும், இந்தப் புழுக்கள் குருத்து சுருள் இலைகள் மற்றும் பிற இலைகளின் மென்மையான திசுக்களைச் சுரண்டியோ, வெட்டியோ அல்லது கடித்தோ சேதப்படுத்துகின்றன. இந்தப் புழுக்களைப் பகல் நேரத்தில் வாழையில் பார்க்க முடியாது. பகல் நேரங்களில், அவை மண்ணுக்குள்ளோ அல்லது செடியின் அடிப்பகுதிக்கு அருகிலுள்ள தாவரக் கழிவுகளுக்கு அடியிலோ மறைந்திருக்கும்.

அதிகாலையில் தென்படும்!

இரவு நேரத்தில் வாழை இலையின் பச்சையத்தை உணவாக எடுத்துக்கொண்ட இளம் புழுக்கள் அதிகாலை நேரத்தில் சல்லடையாக்கப்பட்ட நரம்புகளின் இடைவெளிகளில் தென்படும். முட்டை



குவியல்களிலிருந்து புதிதாக வெளிவந்த புழுக்களும் இலைகளின் மேற்பரப்பில் கூட்டமாக இருக்கும்.

இந்த வெட்டுப்புழுவின் முட்டை, புழு (கம்பளிப்பூச்சி), கூட்டுப்புழு மற்றும் வளர்ந்த நிலையிலான அந்துப்பூச்சி என நான்கு நிலைகளைக்கடந்து வாழ்க்கைச் சுழற்சியை நிறைவு செய்ய 32 நாட்கள் முதல் 60 நாட்கள் வரை ஆகும்.

இளம் புழுக்கள், வெளிர் பச்சை அல்லது பழுப்பு நிறத்தில் அடர்நிறக் கோடுகளுடன் காணப்படும். முதிர்ந்த புழுவின் ஓரங்களுக்குக் கீழே மஞ்சள் மற்றும் ஊதா நிறப் புள்ளிகள் காணப்படும். புழுப் பருவத்திலிருந்து கூட்டுப்புழு பருவத்துக்கு மாறி, பிறகு முதிர்ந்த பூச்சியாக வெளிவரும்.

வளர்ச்சியடைந்த பூச்சியின் முன்புற இறக்கையில் அலை போன்ற வெள்ளைக் கோடுகளும், பின் இறக்கையின் ஓரத்தில் வெள்ளை நிறத்தில் பழுப்பு நிறக் கோடுகளும் காணப்படும்.

கோடை உழவு அவசியம்!

முதல்கட்டத் தடுப்பு நடவடிக்கையாக, இலைகளிலிருந்து புழுக்களைச் சேகரித்து அழிக்க வேண்டும். அடுத்ததாக வாழையின் எந்த இலையின் பாகம் சல்லடையாக இருக்கிறதோ அதை அறுத்து அப்புறப்படுத்த

இந்தப் புழுக்களின்
முதிர்ந்த
நிலையிலான
பூச்சிகளை
விளக்குப்பொறி
வைத்துக்
கவர்ந்திழுத்து
அழிக்கலாம். மிகக்
கடுமையான பாதிப்பு
தென்பட்டால்
'பேசில்லஸ்'
துரிஞ்சியென்சிஸ்'
என்ற பாக்டீரியாவைப்
பயன்படுத்தலாம்.