



துல்லியமாக அறிந்துகொள்ளலாம். வண்ணத்துப்பூச்சியின் உணர்ச்சிக்கொம்பின் நுனிப்பகுதி தடித்தும், கொக்கி போன்றும் தலைப்பகுதியின் முன்புறம் நீண்டும் இருக்கும். ஆனால் அந்திப்பூச்சிகளிலோ உணர்ச்சிக் கொம்பு, பறவையின் இறகு போன்றும் சீப்பு வடிவத் தோற்றத்துடனும் முன் இறக்கையின் கீழ்ப்புறம் மடித்தும் அமைந்திருக்கும். இவற்றின் உருவ அளவு 4 சென்டிமீட்டர் முதல் 30 சென்டிமீட்டர் வரை இருக்கும். இந்தியாவின் மிகப்பெரிய அந்திப்பூச்சியான ‘அட்லஸ் அந்திப்பூச்சி’ சுமார் 30 சென்டிமீட்டர் அளவுடையது” என்ற தளவாய் பாண்டி, அந்திப்பூச்சிகளின் வளர்ச்சி நிலைகள் குறித்துப் பேசினார்.

### உமிழ்நீரைப் பயன்படுத்தி... கூட்டுப்புழு பருவம்!

“முழுமையான உருமாற்றம் கொண்ட பூச்சிகள், முழுமையடையாத உருமாற்றம் கொண்ட பூச்சிகள் எனப் பூச்சியினங்களை இரண்டாக வகைப்படுத்தலாம்.

முட்டை > கம்பளிப்புழு > கூட்டுப்புழு > முதிர்ந்த பூச்சி என நான்கு படிநிலைகளைக் கடந்து அந்திப்பூச்சி உருமாற்றம் பெறுகிறது. அது, தன்னுடைய உமிழ்நீரை மண் போன்ற பொருள்களோடு சேர்த்து மிகவும் கடினமான கூடு போன்றதோர் அமைப்பை உருவாக்கி, அதற்குள் கூட்டுப்புழு நிலையை அடைகிறது. இந்த அமைப்பின் மூலம் தன்னை எதிரிகளிடமிருந்தும் தற்காத்துக் கொள்கிறது. இந்த நிலை முடிவடையும்போது தன்னுடைய உமிழ்நீரையே பயன்படுத்திக் கூட்டை உடைத்து, முழு அந்திப்பூச்சியாக வெளி வருகிறது. முருங்கை மரத்தின் தண்டுப் பகுதியில் கூட்டமாகக் கம்பளிப்புழுக்களைப் பார்த்திருப்பீர்கள். இவை, ‘யூப்டெரோட் மோலிஃபெரா’ (*Eupterote mollifera*) என்னும் சிற்றினத்தைச் சேர்ந்த அந்திப்பூச்சிகள். இவை தம்கூட்டுப்புழு நிலையை மண்ணுக்குள் கழிக்கின்றன. இதன் பல்வேறு படிநிலைகளையும் கறிவேப்பிலை, ஆமணக்கு போன்ற தாவரங்களை உற்றுநோக்குவதன் மூலம் காண முடியும்.