

## யாரெல்லாம் புரதத்தைக் குறைக்க வேண்டும்?

வளர்சிதை மாற்றத்தில் குறைபாடு இருப்பவர்கள் மற்றும் சிறுநீரக பாதிப்பு உள்ளவர்கள், தங்களுக்குத் தேவையான புரதத்தின் அளவை மருத்துவர் அல்லது ஊட்டச்சத்து நிபுணரின் ஆலோசனையுடன் தீர்மானித்துக்கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக, டயாலிசிஸ் செய்துகொள்பவர்கள் புரதத்தை மிகவும் குறைத்துக்கொள்ளக் கூடாது. டயாலிசிஸ் செயல்முறையின்போது சில புரதங்கள் இழக்கப்படுவதால், உடலின் புரதத் தேவைகள் அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதாலும், இவர்களுக்குப் போதுமான அளவு புரதம் கிடைப்பது அவசியம். எனவே, சிறுநீரக பாதிப்பு உள்ள அனைவரும் ஒரே அளவு புரதத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அல்லது குறைக்க வேண்டும் என்று பொதுவாகக் கூற முடியாது. சிறுநீரகத்தின் செயல்பாடு, டயாலிசிஸ் செய்யப்படுகிறதா, உடல் எடை மற்றும் ஒட்டுமொத்த உடல்நிலை போன்றவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையான புரதத்தின் அளவு தனித்தனியாகத் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும்.

புரதச்சத்து இறைச்சியில் அதிகமாகக் காணப்பட்டாலும், ரெட் மீட் எனப்படும் சிவப்பு இறைச்சி வகைகளில் 'பியூரின்' (Purine) என்ற சேர்மம் அதிகமாக உள்ளது. இவை உடலில் செரிமானமாகும்போது யூரிக் அமிலம் உருவாகும். அதிக அளவில் சிவப்பு இறைச்சியை உட்கொள்வதால் சிலருக்கு ரத்தத்தில் யூரிக் அமிலத்தின் அளவு அதிகரிக்கலாம். யூரிக் அமிலத்தின் அளவு அதிகமாகும்போது, அது மூட்டுகளில் சிறிய படிகங்களாகப் படிந்து வீக்கம் மற்றும் கடுமையான வலியை ஏற்படுத்தும் பிரச்சனையான கீல்வாதம் (Gout) ஏற்படலாம். சிலருக்கு அதிக யூரிக் அமிலம் சிறுநீரகக் கற்கள் உருவாகவும் காரணமாக இருக்கலாம். எனவே, சிவப்பு இறைச்சியில் புரதம் அதிகமாக இருந்தாலும், அதை அளவோடு எடுத்துக்கொள்வது முக்கியம். ஏற்கெனவே ரத்தத்தில் யூரிக் அமிலம் அதிகமாக இருப்பவர்கள், கீல்வாதம், சீறுநீரகக் கற்கள் போன்றவற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், சிவப்பு இறைச்சியைத் தவிர்ப்பது நல்லது.