

• முனைவர் ந.குமாரவேலு, பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்,
கால்நடை உற்பத்தி மேலாண்மைத் துறை, சென்னை கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி |

வெப்பம், தீவனம், பால், இனப்பெருக்கம்... எல் நிளோ ஏற்படுத்தும் கால்நடை பாதிப்புகள், தீர்வுகள்!

மத்திய மற்றும் கிழக்கு பசிபிக் பெருங் கடலின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை வழக்கத்தைவிட 0.8 டிகிரி செல்சியஸ் வரை அதிகரித்துள்ளது. இதனால் உலகின் சராசரி வெப்பநிலை முந்தைய காலங்களைவிட 1.7 டிகிரி செல்சியஸ் முதல் 2 டிகிரி செல்சியஸ் வரை உயரக்கூடும் என ஆய்வாளர்கள் கணித்துள்ளனர்.

எல் நிளோ தாக்கத்தால் 2027-ம் ஆண்டு இதுவரை பதிவானதைவிட அதிக வெப்பம் கொண்ட ஆண்டாக அமைய வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. எல் நிளோ நிகழ்வால் கால்நடைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு மற்றும் அதை எதிர்கொள்ளும்

வழிமுறைகள் பற்றி இந்தக் கட்டுரையில் காண்போம்.

வெப்ப அயர்ச்சி!

கால்நடைகள் தங்கள் உடல்வெப்பத்தினை சமச்சீராக வைத்துக்கொள்ள அவற்றின் உடலியக்கம் செயல்படுகிறது. சுற்றுச்சூழல் வெப்பநிலை அதிகரிப்பதால் உடல் வெப்பம் இயல்பைவிட அதிகரிப்பது, மூச்சு இரைப்பு, வாயில் உமிழ்நீர் வடிதல், அதிக வியர்வை சுரத்தல், தனது உள்வெப்பத்தை வெளியேற்ற தீவனம் உண்பதில் நாட்டமின்மை போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படும்.

இந்த பாதிப்புகளைத் தவிர்க்க, வெயிலின் நேரடித் தாக்கத்திலிருந்து பாதுகாக்கும்

w
e
b
v
i
e
w

