

ஹைட்ரோபோனிக் முறையிலும், காற்று புகா பைகளில் ஊறுகாய்ப்புல் உற்பத்தி செய்தும் தீவனப் பற்றாக்குறையை ஈடுகட்டலாம்.

கால்நடைகளுக்கான ஓர் எளிய ஓ.ஆர்.எஸ். (ORS) கரைசல் தயாரிக்க, சுத்தமான குடிநீர் - 20 லிட்டர், சமையல் உப்பு - 100 கிராம், நாட்டுச் சர்க்கரை - 400 கிராம், ஆப்ப சோடா/பேக்கிங் சோடா - 50 கிராம், இளநீர் - 1 ஆகியவற்றை கலக்கினால், கால்நடைகளுக்கான எலக்ட்ரோலைட் (மின் பகுளி) கரைசல் தயார். பசு மற்றும் எருமைகளுக்கு 15 - 20 லிட்டர், கன்றுகளுக்கு 2 - 4 லிட்டர், ஆடுகளுக்கு 1 - 2 லிட்டர் என்ற அளவில் கோடைக்காலத்தில் தினசரி 2 - 3 வேளை கொடுப்பது நல்லது.

ஆடு, மாடு கொட்டகையினுள் தாது உப்புக் கட்டியை (Salt-Mineral Salt Licks) கட்டித் தொங்கவிடுவது நல்லது. குச்சி ஐஸ் சாப்பிடுவது போல ஆடு, மாடுகள் நக்கி சுவைக்கும். அவைகளுக்குத் தாது உப்புகளின் பயன்கள் கிடைக்கும்.

எல் நினோவும் பால் உற்பத்தியும்!

எல் நினோ நிகழ்வால் மிகவும் பாதிக்கப்படும் கால்நடைகள் கறவை மாடுகள் மற்றும் எருமைகள். மாட்டினங்கள் தாம் உண்ணும் தீவனத்தில் இருந்து கிடைக்கும் ஊட்டச் சத்துகளை அவற்றின் பால் உற்பத்திக்குப் பயன்படுத்தாமல், வெப்ப அயர்ச்சியின் தாக்கத்திலிருந்து தம்மைப் பாதுகாக்க வேண்டியுள்ளதால், பாலின் அளவு 10%-30% குறைந்து விடுகிறது. பால் கறக்கும் அளவு மட்டுமல்லாமல், பாலின் தரமும் பாதிக்கப்படுகிறது. கொழுப்பு மற்றும் இதர சத்துகள் குறைந்து பாலின் மதிப்பு குறைந்து விடுகிறது.

சுற்றுச்சூழல் வெப்பத்திலிருந்து பாதுகாப்பது, பசும்புல், சமச்சீர் அடர் தீவனம், போதுமான குடிநீர், சோடியம், பொட்டாசியம், குளோரைடு, கால்சியம், மெக்னீசியம், பாஸ்பேட் கலவையான எலக்ட்ரோலைட் என்ற மின்பகுளி கரைசலைக் குடிநீரில் கலந்து கொடுத்தல் போன்றவற்றால் நிலைமையைச் சரி செய்யலாம்.

இனப்பெருக்கத் திறன் குறைதல்!

அதீத வெப்ப அயர்ச்சியின் விளைவாக

ஹார்மோன் மாற்றங்களால் ஆடு, மாடுகளில் ஆரம்பகால கருச்சிதைவு ஏற்படும். இனச்சேர்க்கை நடந்த நாள் முதல் 30 நாட்களுக்குள் கருச்சிதைவு ஏற்பட்டால் வெளியில் தெரியாது. கருத்தரிப்புக் குறைபாடு, பசு மற்றும் கிடேரிகளில் பருவத்திற்கு வந்த அறிகுறிகள் தெரியாமல் போவது (Silent Heat) போன்ற பாதிப்புகள் உண்டாகும். இனப்பெருக்கத்திற்குப் பராமரிக்கப்படும் பொலி காளை மற்றும் கிடாக்களின் விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் தரம் குறைய நேரிடலாம்.

சுற்றுச்சூழல் வெப்பத்திலிருந்து பாதுகாப்பு, தீவன மற்றும் ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை, சரியான நேரத்தில் கருவூட்டல் செய்தல், நண்பகல் வேலை தவிர்த்து அதிகாலை மற்றும் மாலை வேளையில் இனச்சேர்க்கைக்கு விடுதல், கோடை மற்றும் வெயில் உஷ்ணத்தைக் குறைக்க தொழுவத்தில் மின்விசிறி, நீர்தொளிப்பான் போன்ற உடல் குளிர்விப்பு சாதனங்களைப் பயன்படுத்துதல் ஆகிய பராமரிப்பு முறைகளை நடைமுறைப்படுத்தி கால்நடைகளின் இனப் பெருக்கத் திறனை மேம்படுத்த வேண்டும்.

கால்நடை நோய்களின் தாக்கம்!

மழை அளவு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் வெப்ப மாற்றத்தினால் தண்ணீர் மற்றும் கொசு, ஈ, அக மற்றும் புற ஒட்டுண்ணிகளால் பரப்பப்படும் நோய்களின் தாக்கம் அதிகரிக்கும்.

தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். பண்ணைக் கழிவுகளைத் திறந்த வெளியில் கொட்டாமல் எருக்குழியில் போட்டு மக்கச் செய்து உரமாக்க வேண்டும்.

நோய் பரப்பிகளை ஒழித்தால் நோய் அண்டாமல் தடுக்கலாம்.

நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்க கால்நடைகளுக்குத் தடுப்பூசி போடுதல், குடற்புழு நீக்க மருந்துகளை மருத்துவர் பரிந்துரைப்படி தருதல், நோய் பரப்பிகளான கொசு, ஈ, மாட்டு ஈ, தொற்றுப்பூச்சி, பேன் போன்ற ஒட்டுண்ணிகளைக் களைய மருந்துக் குளியல் செய்தல், எலி ஒழிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றைச் செய்ய வேண்டும். அறிவியல் ரீதியாக கால்நடைகளை வளர்ப்போம், நாமும் வளர்வோம்.