எடுத்துக்காட்டு 3.8

i) கூட்டுக: $3x - 4y + z$ and $2x - z + 3y$ ii) $4x + 3y$ லிருந்து, $2x - 5y$ –ஐக் கழிக்க.

தீர்வு

i) $(3x - 4y + z) + (2x - z + 3y)$

$= (3x + 2x) + (-4y + 3y) + (z - z)$

$= (3 + 2)x + (-4 + 3)y + (1 - 1)z$

$= 5x - 1y + 0z$

$= 5x - y.$

மாற்றுமுறை :

	$3x$	$-4y$	$+z$
(+)	$2x$	$+3y$	$-z$
	$5x$	$-y$	$+0$

ii) $(4x + 3y) - (2x - 5y)$

$= (4x + 3y) + (-2x + 5y)$

$= (4x - 2x) + (3y + 5y)$

$= (4 - 2)x + (3 + 5)y$

$= 2x + 8y.$

மாற்றுமுறை :


	$4x$	$+3y$
(–)	$+2x$	$-5y$
	(–)	(+)
	$+2x$	$+8y$

சிந்திக்க

ஒரு எண்ணின் மூன்று மடங்கிலிருந்த அதன் இரண்டு மடங்கைக் கழித்தால் கிடைப்பது என்ன?

எடுத்துக்காட்டு 3.9

இரவு உணவு சாப்பிடுவதற்காக மணி தன் நண்பன் முகமது உடன் உணவகம் சென்றான். 2 இட்லிகளும், 2 தோசைகளும் மணி சாப்பிட்டான். முகமது 4 இட்லிகளும், 1 தோசையும் சாப்பிட்டான். x மற்றும் y முறையே, ஒரு இட்லியின் விலை மற்றும் ஓர் தோசையின் விலை எனில், அவர்கள் செலுத்தவேண்டிய பட்டியல் தொகையை (bill amount) x மற்றும் y இல் கணக்கிடுக.



படம் 3.6

தீர்வு

ஓர் இட்லியின் விலை 'x' எனவும், ஒரு தோசையின் விலை y எனவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, மணியின் பட்டியல் தொகை: $(2 \times x) + (2 \times y) = (2x + 2y)$

முகமதுவின் பட்டியல் தொகை: $(4 \times x) + (1 \times y) = 4x + y$

எனவே, மொத்தப் பட்டியல் தொகை $= (2x + 2y) + (4x + y)$

$= (2 + 4)x + (2 + 1)y = 6x + 3y.$

மாற்றுமுறை:

மொத்தத்தில், அவர்கள் சாப்பிட்டவை $2 + 4 = 6$ இட்லிகள்.

அதாவது $6 \times x = 6x$

$2 + 1 = 3$ தோசைகள்

அதாவது $3 \times y = 3y$

எனவே, மொத்தப் பட்டியல் தொகை $= 6x + 3y.$

7th_Maths_T1_TM_Chp3.indd 62 22-03-2019 12:22:14