| தேசிய நோய்த்தடுப்பு அட்டவணை | | | | |
|---|---|---|---|---|
| தேசிய நோய்த்தடுப்பு அட்டவணை – பிறந்த குழந்தைகள், குழந்தைகள் கருவுற்ற பெண்கள் | | | | |
| தடுப்பூசி | எப்பொழுது கொடுக்க வேண்டும் | அளவு | செலுத்தும் வழி | செலுத்தப்படும் இடம் |
| கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு | | | | |
| TT1– | கருவுற்றிருக்கு ஆரம்ப நிலையில் | 0.5ml | தசை வழி | மேல் கை |
| TT2– | TT–1* செலுத்தி 4 வாரங்களுக்கு பிறகு | 0.5ml | தசை வழி | மேல் கை |
| TT–உயர்த்திகள் | கடந்த 3 ஆண்டுகளில் கருவுற்றிருக்கும் 2TT அளவை பெற்றிருந்தால்* | 0.5ml | தசைவழி | மேல் கை |
| கைக்குழந்தைகளுக்கு | | | | |
| பி.சி.ஜி | பிறந்தவுடன் அல்லது முடிந்தவரை 1 வயது நிறைவடைவதற்குள் | 0.5ml (0.05ml 1 மாதம் வரை) | தோல் வழி | இடது மேல் கை |
| ஹெப்படைடிஸ் B | பிறந்தவுடன் (அ) முடிந்த வரை 24 மணி நேரத்திற்குள் | 0.5 ml | தசை வழி | மத்தியத் தொடையின் முன் பக்க வாட்டில் |
| OPV.O | பிறந்தவுடன் (அ) முடிந்தவரை முதல் 15 நாட்களுக்குள் | 2 சொட்டு | வாய் வழி | வாய் பகுதி |
| OPV 1,2,3 | 6 வது வாரம், 10 வது வாரம் மற்றம் 14 வது வாரம் | 2 சொட்டு | வாய் வழி | வாய் பகுதி |
| டி.பி.டி1,2,3 | 6 வது வாரம், 10 வது வாரம் மற்றம் 14 வது வாரம் | 0.5 ml | தசை வழி | மத்தியத் தொடையின் பக்க வாட்டில் |
| ஹெப்பி 1,2,3 | 6 வது வாரம், 10 வது வாரம் மற்றம் 14 வது வாரம் | 0.5 ml | தசை வழி | மத்தியத் தொடையின் முன் பக்கவாட்டில் |
| தட்டம்மை | 9 வது மாதம் முடிந்தவுடன் 12 வது மாதம் வரை | 0.5 ml | தோலுக்கு அடியில் | வலது கை மேல் |
| வைட்டமின் A (முதல் அளவு) | 9வது மாதம் தட்டம்மை ஊசியுடன் | 1ml (1 லட்சம் IU) | வாய் வழி | வாய் |
| குழந்தைகளுக்கு | | | | |
| டி P T உயர்த்திகள் | 0.5 ml | தசை வழி | மத்தியத் தொடையின் முன் பக்க வாட்டில் | 0.5 ml |
| 2 வது அளவு தட்டம்மை | 0.5ml | தோலுக்கு அடியில் | வலது கை மேல் | 0.5ml |
| OPV உயர்த்திகள் | 2 சொட்டு | வாய் | வாய் | 2 சொட்டு |
| ஜப்பானிய மூளை வீக்கம் (அ) முளை அழற்சி** | 0.5ml | தோலுக்கு அடியில் | இடது மேல் கை | 0.5ml |
| வைட்டமின் A*** | | | | |
| 2வது a வது அளவு | 2ml (2 லட்சம் 10) | வாய் | வாய் | 2ml (2 லட்சம் 10) |
| டி.பி.டி உயர்த்திகள் | 0.5 ml | தசை வழி | மேல் கை | 0.5 ml |
| TT | 0.5 ml | தசை வழி | மேல் கை | 0.5 ml |

*TT–2 அல்லது ஊக்குவிப்பான் அளவுகள் கருவுறுவதற்கு 36 வாரங்களுக்கு முன்பு கொடுக்கப்பட வேண்டும். தடுப்பூசி 36 வாரங்களுக்கு முன்பு கொடுத்திருந்தாலும் மீண்டும் செலுத்தப்பட வேண்டும். ஒரு வேளை அவர் முன்பு TT பெற்று கொள்ளாமல் இருந்திருந்தால் பிரசவிக்கும் இடத்தில் அப்பெண்மணிக்கு TT கொடுக்க வேண்டும்.

**JE (மூளைக்காய்ச்சலுக்கான தடுப்பூசி, நோய் பரவக்கூடிய மாவட்டங்களில் முகாம்களை அமைத்துக் கொடுக்க வேண்டும்.

***ஒன்று முதல் ஐந்து வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு வைட்டமின் A இரண்டாம் முதல் ஒன்பதாம் அளவைகள் ஆண்டொன்றுக்கு இரண்டு சுழற்சி முறையில் ICDS இணைந்து கொடுக்கப்பட வேண்டும்.



Nursing General_Tamil Ch-6.indd 93 14-06-2018 19:16:04