



உயிர் வேதிவினை சோதனை

- சர்க்கரை நொதித்தல் சோதனை
- லிட்மஸ் சோதனை
- இன்டோல் உற்பத்தி சோதனை
- மிதைல் சிவப்பு சோதனை
- சிட்ரேட் பயன்பாடு சோதனை

சீராலாஜிக்கல் சோதனை(ஊனீர் பரிசோதனை)

நோயாளியின் இரத்த மாதிரியில் (சீரம்) சீரம் எனும் பொருளை பிரித்தெடுத்து அவற்றில் எதிர்தோன்றிகளுக்கு எதிரான எதிர்பொருள் உள்ளனவா என்பதை கண்டறிந்து நுண்ணுயிரியின் வகையினை அறிதல்



பரிசோதனைகள்	HIV நோயினைக் கண்டறியும் முறை
எலிசா (ELISA)	– ஆரம்ப நிலை பரிசோதனை
வெஸ்டர்ன் பிளாட்	– உறுதியான பரிசோதனை (VDRL, RIA)

நுண்ணுயிர்களை கண்டறிவதின் முக்கியத்துவம்

I. சரியான நோயினை கண்டறிய செய்கிறது

II. நோய்க்கு சரியான ஆன்டிபயாடிக்குகளை பரிந்துரைக்கவும் பரிசோதனை முக்கியமாகும்.

III. நோயின் நிலையை மதிப்பீடு செய்வதற்காக பயன்படுகிறது.

IV. தொழிற்துறை தேவைக்கு நுண்ணுயிரிகளை கண்டறிதல் இன்றியமையாததாகும்.

V. சேமித்து வைக்கவும், பதப்படுத்தி வைக்கவும் தேவைப்படுகிறது.

6.3.5 சேகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகளின் வகைகள்

பஞ்சு சுற்றப்பட்ட குச்சி (ஸ்வாப்ஸ்): இது வழக்கமாக வியாதிக் கிருமிகளல்லாத சோதனை குழாயில் சேகரிக்கப்படுகின்றது. மாதிரி தொற்று அடையாதபடி எடுக்க வேண்டும். (இவை குச்சிகளில் பஞ்சுகளை சுற்றி தொற்று நீக்கம் செய்யப்படுகின்றது) (கண் தொண்டை, காது, மூக்கு, வாய் சீழ் பகுதிகளின் மாதிரி எடுக்கப்பயன்படுகிறது.) மாதிரி தொற்று நிறைந்த பகுதியில் இருந்து எடுக்கப்படவேண்டும்.)

சளி (sputum): இது தொற்று நீக்கம் செய்யப்பட்ட வாய் அகன்ற சோதனைக் குழாயில் சேகரிக்கப்பட வேண்டும். நோயாளியின் இருமலுக்குப்பின் நேரிடையாக சளி மாதிரியை சேகரித்து ஆய்வு கூடத்துக்கு உடனடியாக அனுப்ப வேண்டும்.

சிறுநீர்: தொற்று கண்டறியும் சோதனையில் இவை முக்கியமான ஒன்றாகும். சிறுநீர் சேகரிக்கும் முறையில் நேரங்கள், கையாளும் முறை கொண்டு முடிவு நன்றாக கிடைக்கப்பெறுகின்றது. (காலைநேர சிறுநீர், பொதுவான நேரங்களில்) சுத்தமான தொற்று நீக்கம் செய்யப்பட்ட சோதனை குழாய்களில் சேகரிக்க வேண்டும்.

மலம்: மலம் ஒட்டுண்ணிகள் மற்றும் பாக்டீரியாக்கள் கண்டறியும் பரிசோதைனைக்காக

Nursing General_Tamil Ch-6.indd 103 14-06-2018 19:16:11