வ. எண்	வழிகள்	பரவும் விதம்	எடுத்துக்காட்டு
1	நேரடித் தொடர்பு	தொடுதல்	ரூபெல்லா, தட்டம்மை சின்னம்மை
2	மறைமுக தொடர்பு	பொருட்கள்(உயிரற்ற)	சாதாரண சளி (இன்புளுயன்சா)
3	நீர்துளி தொற்று	உட் சுவாசம் உமிழ்நீர்	பன்றிக் காய்ச்சல், காசநோய்
4	நோய் கிருமி கடத்து பொருள் (Vehicle)	நீர், உணவு காற்று, இரத்தம்	காலரா, சால்மோனல்லா, ஸிஜல்லா, ஹெப்படைட்டிஸ்
5	காற்று முலம் தொற்று	நீர் துளிகள்	இன்புளுயன்சா
6	உயிரியல் மற்றும் இயந்திர முறை	கடத்தி (வெக்டர்) ஈக்கள், கொசுக்கள் பேன், தெள்ளுப்பூச்சி.	– சல்மோனல்லா – ஏடிஸ் ஏஜிப்டியா – பிளாஸ்மோடியம் பால்சிபாரம் – ரிக்கட்ஸியா டைபி



கண்களில் வழியும் கண்ணீரில் பாக்டீரியாக்களை கொல்லும் வேதிப்பொருள் உள்ளன. (லைசோஸைம்)

சில நேரங்களில் (அழுகை நல்லது)

6.5.2 நோய் தொற்றுதல் பாதையைக் காட்டும் நிலைகள் (course of infection by stage)

நுண்ணுயிர்கள் விருந்தோம்பியின் உடலில் நுழைந்ததிலிருந்து, நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை கடந்து பல்வேறு நிலைகளில் இனப்பெருக்கம் அடைந்து நோயினை உண்டாக்குகின்றன. அவற்றை தொடர்ந்து நோய் தீவிர நோயாகவோ அல்லது நீடித்தகால நோயாகவோ நிலைபெறுகின்றன.

- இன்குபேஷன் காலம்
- புரோட்ரோமல் காலம்
- இறுதிக் காலம்
- நோயிலிருந்து மீண்டும் ஆரோக்கியம் அடைதல்

இன்குபேஷன் காலம்: நோய் உண்டாக்கும் நுண்ணுயிர்கள் உடலில் நுழைந்ததிலிருந்து, நோய்க்கான முதல் அறிகுறிகள் தோன்றும் வரை உள்ள இடைப்பட்ட இடைவெளியே இன்குபேஷன் காலம்.

எ.கா. சாதாரண சளி – 1-2 நாட்கள்
புட்டாளம்மை – 18 நாட்கள்

புரொட்ரோமல் காலம்: குறிப்பிட்ட முடியாத குறுகிய மிதமான உடலில் தோன்ற துவங்கியதிலிருந்து குறைந்த ஜுரம், களைப்பு, மயக்கம் போன்ற குறிப்பிடத் தகுந்த அறிகுறிகள் ஏற்படும் வரை உள்ள கால இடைவெளி இந்த காலத்தில் நுண்ணுயிர்கள் வளர்ந்து பெருகி மேலும் நோயாளி நோயினை மற்றவர்களுக்கு பரப்பும் நிலையில் இருப்பார்.

நோய்க்காலம்: ஒரு குறிப்பிட்ட நோய்க்கான அடையாளங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள் வெளிப்படையாக தோன்றுவதற்கான இடைப்பட்ட காலம்

எ.கா. சாதரண சளி – தொண்டைப்புண்,சைனஸ், தலைவலி
நீர் வழிகள்: புட்டாளம்மை– காதுவலி, அதிக காய்ச்சல், பரோட்டிட், (உமிழ்நீர் சுரப்பி வீக்கம்)

நோயாளியின் நோய் எதிர்ப்புதிறன், நுண்ணுயிர்களின் வீரியத்தன்மை, நோய் தொற்றுதளின் அளவினை பொருத்து அமைகிறது.

Nursing General_Tamil Ch-6.indd 108 14-06-2018 19:16:14