	செவிலியசெய்கைகள்	காரணங்கள்
10	நோயாளியையும், பொருட்களையும் செல்லும் அளவு, நோயாளியின் நிலை, ஈரப்பத மூட்டியில் தண்ணீரின் அளவு போன்றவற்றைக் கவனி	நோயாளிக்கு ஏற்படும் பிரச்சினைகளை கண்டறிதல்
11	பாதுகாப்பு நடிவடிக்கைகள் பின்பற்றப்படுகிறதா என்பதை உறுதி செய்	
12	கைகளைக் கழுவு	
13	நேரம், செல்லும் அளவு, நோயாளியின் கண்காணிப்பு ஆகியவற்றை பதிவேட்டில் குறித்துவை	
14	நோயாளியை வாயை மூடிக்கொண்டு மூக்குவழியாக சுவாசிக்க அறிவுறுத்து	போதுமான அளவு ஆக்ஸிஜனை நோயாளிக்கு அளிக்க
15	8 மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை குழாயை அகற்றி சோப்பாலும், நீரினாலும் சுத்தம் செய்து உலரவை. மூக்குத்துளையை 8 மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை கவனி.	மூக்கிலிருக்கும் குழாயினால் எரிச்சலும், மியுக்கஸ் சவ்வு உலருதலும் ஏற்படும்.

ஆக்ஸிஜனின் அடர்த்தி நோயாளிக்கு ஆக்ஸிஜன் தேவைப்படும் அளவு மற்றும் செயற்கை சுவாசக் கருவியின் வகையைப் பொறுத்து மாறுகிறது.

பாதுகாப்பு நடிவடிக்கைகள்

1. நாட்பட்ட நுரையீரல் சம்பந்தமான நோய் உள்ளவர்களுக்கு 2-3 லிட்டர் ஆக்ஸிஜன் ஒருபோதும் அளிக்கக்கூடாது. எ.கா. (COPD) நாட்பட்ட நுரையீரல் அடைப்புநோய்
2. இரண்டு முனைகளும் நோயாளியின் மூக்கில் உள்ளதா என்பதை உறதிப்படுத்த வேண்டும்.

ஆக்ஸிஜனின் அடர்த்தி நோயாளியின் நுரையீரல் கொள்ளளவு மற்றும் வெண்டிலேட்டரின் தன்மை போன்ற பல காரணிகளால் மாறுபடுகிறது.

ஆக்ஸிஜனும், அடர்த்தியும் செல்லும் அளவும்	
செலுத்தும்அளவு	ஆக்ஸிஜன்அடர்த்தி
1 லிட்டர்/நிமிடம்	24 – 25%
2 லிட்டர்/நிமிடம்	27 – 29%
3 லிட்டர்/ நிமிடம்	30 – 33%
4 லிட்டர்/ நிமிடம்	33 – 37%
5 லிட்டர்/ நிமிடம்	36 – 41%
6 லிட்டர்/ நிமிடம்	39 – 45%


8.2.2 ஆக்ஸிஜன் முகமூடி முறையில் அளித்தல்

வரையறை

நோயாளியின் தேவைக்கேற்ப ஆக்ஸிஜனை சாதாரண அல்லது வெண்ட்சுரி முகமூடியின் வழியாக அளித்தல்

நோக்கம்

1. கடின சுவாசத்தை (dyspnoea) தவிர்க்க
2. அதிக அளவு அடர்த்தியான ஆக்ஸிஜனை அளிக்க



Nursing General_Tamil Ch-8.indd 153 14-06-2018 19:22:19