	செவிலியசெயல்	காரணங்கள்
8	மூக்குக்கு கீழ் இருந்து முகத்தில் முகமூடியை பொறுத்து முகமூடியின் உலோகப்பகுதி மூக்கின் வடிவத்தை ஒத்துப்போகும் படி அமை	முகமூடி முகத்தோடு நன்றாக பொருந்தியிருந்தால் கண், கன்னங்கள், கீழ்த்தாடை வழியாக வெளியேறும் ஆக்ஸிஜனின் அளவு மிகவும் குறைவாக இருக்கும்.
9	எலாஸ்டிக் பட்டையை நோயாளியின் தலையைச் சுற்றி சரியாக பொருத்து	நோயாளியை வசதியாக வை
10	எலாஸ்டிக் பட்டை செல்லும் காதுக்கு பின்னாலும், தலையிலும் பஞ்சு திண்டினால் பாதுகாத்து வை.	திண்டினால் பாதுகாப்பது காதுக்கு பின்னால் உள்ள தோலின் எரிச்சலைத் தடுக்கும்
11	பாதுகாப்பு நடிவடிக்கைகள் பின்பற்றப்படுகிறதா என்பதை உறுதி செய்.	
12	நோயாளியையும், உபகரணங்களையும் அடிக்கடி கவனி. செல்லும் அளவு, நோயாளியின் நிலை, ஈரப்பத மூட்டியில் தண்ணீரின் அளவு ஆகியவற்றைக் கவனி	நோயாளிக்கு ஏற்படும் பிரச்சினைகளை கண்டறிதல்
13	கைகளைக் கழுவு	நோய்க் கிருமிகள் பரவுவதைத் தடுக்க
14	தொடர்ந்து ஆக்ஸிஜன் அளிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தால், முகமூடியை அகற்றி 3–2 மணிக்கொருமுறை தோலை சுத்தப்படுத்து. முகமூடியை சுற்றி பவுடர் போடாதே.	அழுத்தமாக போடப்பட்டிருக்கும் முகமுடியும், ஈரப்பதமும் முகத்திலுள்ள தோலை எரிச்சலடையச் செய்யும்.
15	நோயாளியின் பதிவேட்டில் குறிப்புகளைப் பதிவு செய்.	

வெண்ட்சரி முகமூடி

கருத்தில் கொள்ள வேண்டியவை

1. *ஆக்ஸிஜனின் அளவு ஈர்க்கப்பட்ட ஆக்ஸிஜனின் பின்னம். FIO (Fraction of inspired oxygen) என்பதால் உத்தரவிடப்படலாம். அது சதவீதமாகவோ அல்லது நிமிடத்திற்கு எத்தனை லிட்டர் என்பதாகவோ இருக்கலாம்.*
2. *வெண்ட்சரி முகமூடியில் வண்ணத்தில் குறியிடப்பட்ட சொருகிகள் உள்ளன. அவை ஆக்ஸிஜன் செல்லும் அளவை எத்தனை சதவிகித ஆக்ஸிஜன் தேவை என்பதையும் காட்டுகின்றன.*

வெண்ட்சரி முகமூடியின் வழியாக செலுத்தப்படும் ஆக்ஸிஜன் அளவு மற்றும் அடர்த்தி		
முனையின் வண்ணக் குறியீடு	செல்லும் அளவு லி/நிமிடம்	ஆக்ஸிஜன் செலுத்த வேண்டிய அடர்த்தி
நீலம்	3 லி/நிமிடம்	24 %
மஞ்சள்	6 லி/நிமிடம்	28 %
வெள்ளை	8 லி/நிமிடம்	31 %
பச்சை	12 லி/நிமிடம்	35 %
ரோஜா	15 லி/நிமிடம்	40 %
ஆரஞ்சு	15 லி/நிமிடம்	50 %

Nursing General_Tamil Ch-8.indd 155 14-06-2018 19:22:19