ஆன்டிபையாட்டிக்குகள் பரிசோதனையின் முடிவை பாதிக்கும்.

5. நடமாட முடியாத நோயாளிகளுக்கு 2 படுக்கை மலத்தொட்டிகளை பயன்படுத்த வேண்டும். ஒன்று மாதிரியை சேகரிக்கவும் மற்றொன்று சுத்தம் செய்யவும்.


8.4 சிறுநீர் பரிசோதனைகள்

8.4.1 சர்க்கரை பரிசோதனை – பெனிடிக்ட் பரிசோதனை

பெனிடிக்ட் சோதனை இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவைக் அறிவதற்கு செய்யப்படும் பரிசோதனைகளில் இது பரவலாக செய்யப்படும் பரிசோதனையாகும். சர்க்கரையின் அளவைக் குறைத்தல் என்பது கார்போஹைட்ரேட் அடங்கியவைகள் அல்லது அல்டிஹைடு, கீட்டோனுறுப்பு மூலக்கூறுகளைக் குறைத்தலாகும். இது எல்லா ஒற்றை சர்க்கரைகளை (எ.கா. குளுக்கோஸ், ப்ரக்டோஸ், காலக்டோஸ்) மற்றும் பல இரட்டை சர்க்கரைகளை (லாக்டோஸ், மால்டோஸ்) உள்ளடக்கியது.

சிறுநீரில் குளுக்கோஸ் இருப்பதைக் கண்டறிய பெனடிக்ட் பரிசோதனை பயன்படுகிறது. சிறுநீரில் சர்க்கரை காணப்படுதல் நீரழிவு நோயின் அறிகுறியாகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?



8.4.2 தேவையான பொருட்கள்

பெனிடிக்ட் கரைசல்: (புதியகரைசல் அல்லது – 3 மாதத்திற்குமேற்படாதது)

ட்ராப்பர், சோதனைக்குழாய், சோதனைக்குழாய் தாங்கி, சாராய விளக்கு, தீப்பெட்டி, கழிவுத் தட்டு, கலன்கள்

பெனிடிக் கரைசலின் தரத்தை நிர்ணயித்தல்


பெனிடிக்ட் கரைசல் ஊதா நிறத்திலுள்ளது. இதன் உண்மைத் தன்மையை அறிய ஒரு சோதனைக் குழாயில் 5.மி.லி பெனடிக்ட் கரைசலை எடுத்து சூடுபடுத்தும் பொழுது அதன் நிறம் மாறா விட்டால் அதனைப் பயன்படுத்தலாம்.

8.4.3 செய்முறை

- ஒரு சோதனைக்குழாயில் 5.மிலி. (1 தேக்கரண்டி) பெனடிக்ட் கரைசலை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
- சோதனைக் குழாயை தாங்கியால் பிடித்து ஸ்பிரிட் விளக்கினால் கொதிக்கும் வரை சூடுபடுத்து.
- 8 – 10 சொட்டுகள் சிறுநீரை கொதிக்கும் பெனடிக்ட் கரைசலுடன் சேர்.
- திரும்பவும் கொதிக்க வைத்து குளிர வை.
- குளிரும் பொழுது திரவத்தின் நிறம் மாறுகிறது.
- கலர் மாறுதலையும், வீழ் படி வையும் கவனி.

8.4.4 முடிவு

கலவையின் நிறம் சிறுநீரில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவைக் குறிப்பதாக உள்ளது.



(ppt – வீழ்படிவுறுதல்)

Nursing General_Tamil Ch-8.indd 162 14-06-2018 19:22:24