நிறம்	சுமாராக குளுக்கோஸ் அளவு Mg/d[1]	
நீலம்		+
பச்சை நிறம்	500 –1000 mg/dl	+
மஞ்சள் நிறம்	1000-1500 mg/dl	++
ஆரஞ்சு நிறம்	1500-2000 mg/dl	+++
செங்கல் சிவப்பு நிறம்	72000 mg/dl	++++


8.4.5 அல்புமின் பரிசோதனை

- சோதனைக் குழாயில் ¾ பங்கு வடி கட்டிய சிறுநீரை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் (வடிகட்டுதல் சீழை நீக்கும்).
- சிறுநீரின் தன்மையை சோதித்துப்பார். சிறுநீர் காரத்தன்மையுடன் காணப்பட்டால் ஒரு துளி அசிட்டிக் அமிலத்தை சேர்ப்பதால் அமிலத் தன்மையுடையும்.
- சோதனைக் குழாயின் மேல் பாகத்தை ஸ்பிரிட் விளக்கால் சூடுபடுத்தி கொதிக்கவை.
- கலங்கல் தன்மை காணப்பட்டால் அல்புமினோ அல்லது பாஸ்பேட் உப்புகளோ காரணமாக இருக்கலாம்.
- சோதனைக்குழாயில் சில துளி அசிட்டிக் அமிலத்தை சொட்டு சொட்டாக விடு.
- தொடர்ந்து கலங்கலாக காணப்பட்டால் அல்புமின் இருப்பதைக் காட்டுகிறது.
- கலங்கல் தன்மை மாறி தெளிவாகக் காணப்பட்டால் பாஸ்பேட் உப்புகளாக இருக்கலாம்.
- சாதாரணமாக சிறுநீரில் அல்புமின் காணப்படுவதில்லை.
- சிறுநீர் அதிக அமிலத்தன்மையுடனோ அல்லது அதிகக் காரத் தன்மையுடனோ காணப்பட்டால் முடிவுகள் சரியானவைகளாக இராது.

8.4.6 அசிட்டோன் பரிசோதனை

- ஒரு சோதனைக்குழாயில் 5. மிலி சிறுநீர் எடுத்து அதனுடன் அம்மோனியம் சல்பேட்டைச் சேர்க்கவும்.
- சிறிதளவு சோடியம் நைட்ரோ புருசைடு படிகங்களைச் சேர்த்து நன்றாக கலக்கு.
- சோதனைக்குழாயின் சுவர்களின் வழியாக சிறிதளவு திரவ அம்மோனியாவை சேர்.
- இரண்டு திரவங்களும் சேருமிடத்தில் ஊதா நிற வளையம் தோன்றினால் அசிட்டோன் இருப்பதைக் காட்டுகிறது.

சர்க்கரையின் அளவை கண்டறிதல்



8.4.7 சிறப்பு குறிப்புகள்

- வினைப்பொருள்கள் (reagent) காய்ந்த 86°F அல்லது 30°Cக்கும் குறைந்த வெப்பநிலையில் வைக்கவும்.
- ரியஜெண்ட் மாத்திரைகளையும், குச்சிகளையும் (Reagent tablets and strips) குளிர்சாதனப் பெட்டியில் வைக்கக் கூடாது
- டப்பாவின் மூடியை அழுத்தமாக மூடி வைக்கவும்.
- நிறமாறிய அல்லது காலாவதியானவைகளைப் பயன்படுத்தக்கூடாது.

8.4.8 பித்த உப்புகளுக்கான பரிசோதனை (ஹே பரிசோதனை – Hey's test)

- ஒரு சோதனைக்குழாயில் அரையளவு சிறுநீரை நிரப்பிக் கொள்ளவும்.
- சல்பர் (sulphur) பொடியை சிறுநீரின் மேல் தூவவும்.

Nursing General_Tamil Ch-8.indd 163 14-06-2018 19:22:24