படுக்கையிலே இருக்கும் நோயாளிகளுக்கும் ஏற்படுகின்றன.

அல்லது சக்கர நாற்காலியில் உள்ளவர்களுக்கும் ஏற்படுகிறது.

படுக்கைப் புண்கள் ஏற்பட 4 காரணிகள்

வெளிப்புற அழுத்தம்: உடலின் வெளிப்புறங்களிலோ, முக்கியமாக எலும்பு புடைப்புகளின் மீதோ அழுத்தம் ஏற்படும் பொழுது இரத்த தந்துகிகள் நசுக்கப்படுகிறது. இதனால் திசுக்களுக்கு ஆக்ஸிஜன் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் குறைகின்றன. இத்துடன் வீக்கம், ஆஸ்டியோமைலட்டிஸ், நோய்த்தொற்று, திசுக்களின் இறப்பு மற்றும் படுக்கைப்புண் ஏற்படுகிறது. வெளிப்புற அழுத்தத்தின் காரணமாக சேக்ரம் மற்றும் காக்கிஸ், இடுப்பெலும்பு மற்றும் குதிகால்களில் படுக்கைப்புண்கள் ஏற்படுகின்றன.

உராய்வு: உராய்வின் காரணமாக தோலுக்கடியில் உள்ள இரத்தக்குழாய்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன. இரண்டு பரப்புகள் ஒன்றுடன் ஒன்று உராய்வதன் காரணமாக அமைகின்றன. முழங்கைக்கு அடியில் உள்ள தோல் உராய்வின் காரணமாகப் பாதிக்கப்படுகிறது. நோயாளியின் முதுகு நோயாளியை இழுப்பதாலோ, தள்ளுவண்டிக்கு நோயாளியை மாற்றும் பொழுது துணியை இழுப்பதாலோ பாதிக்கப்படுகிறது.

வெட்டுதல் (Shearing): கீழ்ப்புற திசுக்களிலிருந்து தோல் தனியாகவருதல். நோயாளி உட்கார்ந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது தோல் படுக்கைத் துணியோடு ஒட்டிக் கொண்டிருக்கலாம். இந்நிலையில் அசைத்தல் தோலை திசுக்களிலிருந்து கீழ் நோக்கி வர செய்கிறது.

ஈரம்: அழுத்தப்புண்கள் ஏற்பட ஈரமும் முக்கிய காரணியாகிறது. வியர்வை, சிறுநீர், மலம் காயங்களிலிருந்து வரும் ஒழுக்குகள் போன்றவை அழுத்தம், உராய்வு மற்றும் பெயர்தல் ஏற்பட்டதை அதிகப்படுத்துகிறது. இவை சுற்றியுள்ளதோலை மெலிவுறச் செய்வதால் அழுத்தப்புண்கள் ஏற்பட அதிக காரணமாகின்றன.

8.6.3 அடையாளங்களும் அறிகுறிகளும்

படுக்கைப்புண்ணின் தொடக்க அறிகுறிகளாவன

- தோலின் நிறத்திலும் தன்மையிலும் அசாதாரண மாற்றம்.
- வீக்கம் (swelling).
- தொடும் போது வலி உணர்தல் (tenderness).
- சீழ் ஒழுகுதல்.
- வசதியின்மை (discomfort).
- தோலின் வெப்பநிலை மற்ற பகுதியிலுள்ள தோலை விட குறைவாகவோ அல்லது வெது வெதுப்பாக இருத்தல்.
- நீர்வீக்கம் (local edema).
- சில நாட்களில் தோலின் நிறம் கரு நீலமாகவோ, நீலமாகவோ மாறுதல்.
- தொடர்ந்த அழுத்தத்தின் காரணமாக இரத்த ஓட்டம் தடைபட்டு திசு இறப்பு ஏற்படுவதன் காரணமாக அந்த இடத்தில் திசு அழுகல் ஏற்படுகிறது.

8.6.4 படுக்கைப் புண்ணின் நிலைகள்

நிலை 1

எலும்பின் மேலுள்ள தசைகள் சிவப்பு நிறமாக தோன்றுதல்.

நிலை 2

சிறிதளவு தோல் இழப்புடன் ஆழமில்லாத திறந்த காயம் அழுகல் இல்லாமல் இளஞ்சிவப்பு நிறத்துடன் காணப்படல். திறந்த அல்லது மூடிய கொப்புளத்தினுள் அழுகல் இல்லாமல் காணப்படல். இந்த நிலை தோல் சிதைதல், தீக்காயம், பெரினியல் டெர்மடைடிஸ், தோலுறிதல் ஆகியவைகளை விளக்க பயன்படக் கூடாது.

நிலை 3

தோல் முழுவதும் இழந்து போதல் தோலடிக் கொழுப்பு காணப்படலாம். ஆனால் எலும்பு, நார் மற்றும் தசைகள் வெளித்தெரிவதில்லை.

Nursing General_Tamil Ch-8.indd 168 14-06-2018 19:22:26