முதலுதவிக்கான நினைவு குறிப்புகள் தீவிர இரத்த ஒழுக்குகளை சமாளிக்க உதவும்

P – Position (நிலை)

E – Expose & Examine (வெளிப்படுத்து மற்றும் ஆய்வு செய்)

E –(Elevation) உயர்நிலை

P – (Pressure) அழுத்தம்


இரத்தபோக்கை தடுப்பதற்கான முதலுதவி சிகிச்சைகள்

வெளிப்புற இரத்த ஒழுக்கு	உட்புற இரத்த ஒழுக்கு
எந்த இடத்தியிலிருந்து இரத்தம் வெளியேறுகிறது என்பதை சரியாக அறிதல் வேண்டும்	வசதியான (ஆறுதலான) நிலையினை வழங்கு.
சுத்தமான துணியைத் கொண்டு அவ்விடத்தை தூய்மையாக்க வேண்டும்.	எவற்றையும் வாய் வழியாக கொடுக்க கூடாது.
இரத்த ஒழுக்குகளை நிறுத்த ஒரு மென்மையான துணி துணிகளை கொண்டு அவ்விடத்தில் உறுதியாக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் காயம்பட்ட பகுதியை இதய பகுதிக்கு மேல் தூக்க வேண்டும்.	காயம்பட்ட நபர் ஒருவேளை சுயநினைவற்று போகும் நிலையில் ABC's சரிபார்க்கவும் வேண்டும்
பத்து நிமிடங்களுக்கு மேல் இரத்த ஒட்டம் நிற்கவில்லை என்றால் காயம்பட்ட பகுதியை இதய பகுதிக்கு மேல், உயர்த்தி பிடித்தல் வேண்டும். இரத்த ஓட்டத்தை குறைக்க வேண்டும்.	சுயநினைவற்று இருப்பாராயின் ஒருபக்கமாக சரிந்த நிலையில் படுக்க வைத்து சுரப்பு உந்துதலை தடுத்தல். இரத்த ஓட்டத்தை குறைக்க வேண்டும். காயம் அடைந்தவரின் உடலை வெதுவெதுப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும்.

வெளிப்புற இரத்த ஒழுக்கு	உட்புற இரத்த ஒழுக்கு
ஒவ்வொரு 20 முதல் 30 நிமிடங்களுக்கும் இரத்த ஓட்டத்தை மறுமதிப்பீடு செய்ய வேண்டும். காயம் அடைந்தவரின் உடலை வெதுவெதுப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும்.	அதிர்ச்சிக்கு சிகிச்சை அளிக்க அவரின் கால்களை 8 முதல் 12 அங்குலம் உயர்த்துதல் வேண்டும்

வெப்ப பக்கவாதத்தின் விளைவுகள்

- நம் உடலின் வெப்பநிலை 106 டிகிரிக்கு மேல் அதிகமாகும் பொழுது 10லிருந்து 15 நிமிடங்களுக்குள் நமது உடலால் அந்த வெப்பநிலையை கட்டுபடுத்த முடியாததால் வரும் விளைவே வெப்ப பக்கவாதம் ஆகும்.
- இது அதிக வெப்பமான சூழ்நிலையால் அல்லது மலேரியா போன்ற நோய்களினால் ஏற்படுகிறது.
- அதிக நேரம் வெப்பம் மற்றும் ஈரபதம் நம்மீது படும்போதும் ஏற்படுகிறது.
- அதிக நேரம் வெப்பமான சூழ்நிலையில் இருப்பதால் ஏற்படுகிறது.
- மது அருந்துவதினால்



மேலாண்மை

- பாதிக்கபட்டவரை குளிர்ந்த இடத்திற்கு மாற்றி ஆடைகளை களைய வேண்டும். பாதிக்கபட்டவர் சுய நினைவுடன் உள்ள நிலையில் இருந்தால், தலை மற்றும் தோள்பட்டையை தாங்கிய வண்ணம் பாதி உட்கார்ந்த நிலையில் அமர வைக்க வேண்டும்.
- பாதிக்கபட்டவர் உணர்விழந்த நிலையில் இருந்தால் அவரை தேற்றி மீள் நிலைக்கு (recovery position) கொண்டுவர முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டும்.

Nursing General_Tamil Ch-9.indd 184 14-06-2018 19:33:30