A – மூச்சுகுழாய் பாதிக்கபட்டவரின் வாயையை திறக்க வேண்டும்.

B – சுவாசம்:- சுவாசதன்மையை பரிசோதிக்க வேண்டும்.

C – CPR 30 இதய அழுத்தம் தொடர்ந்து 2 செயற்கை சுவாசம் ஆரம்பித்தல் வேண்டும்.

D – நடுக்கத்தினை குறைத்தல்.

9.6 எலும்பு முறிவு

எலும்பில் ஏற்படும் முறிவு அல்லது விரிசல் எலும்பு முறிவு எனப்படும்.

இடப்பெயர்வு என்பது மூட்டு எலும்புகள் தன் இருப்பு நிலையில் இருந்து இடம்பெயர்வது ஆகும். எலும்பு முறிவு என்பது எலும்பு உடைந்துவிடுவது.

எலும்பு முறிவு

மூடப்பட்ட முறிவு

சேதமடைந்த எலும்பை சுற்றியுள்ள தோலில் இடைவெளி காணப்படாது

திறந்த முறிவு

சேதமடைந்த எலும்பை சுற்றியுள்ள தோலில் இடைவெளி அல்லது சிதைவு காணப்படும்




863Q76

காரணங்கள்

நேரடி விசை – விசை தாக்கப்பட்ட இடத்தில் எலும்பு முறிவு ஏற்படுதல்.

மறைமுக விசை – விசை தாக்கப்பட்ட இடத்தில் முறிவு ஏற்படாமல் வேறு ஒரு இடத்தில் முறிவு ஏற்படுதல்.

வகைகள்	
எளிய முறிவு (Simple)	இந்த வகை எலும்பு முறிவில் முறிவடைந்த எலும்பு தோலை கிழித்து
கலவை முறிவு (Compound)	காயத்திலிருந்து நீண்டு கொண்டிருக்கும்.
பச்சை கொம்பு எலும்பு முறிவு (Green)	எலும்பின் ஒரு பகுதியில் முறிவு ஏற்படும்.
நொறுக்கப்பட்ட எலும்பு (Common)	இந்த வகை எலும்பு முறிவில் எலும்பு பல துண்டுகளாகப்படும்.
இறுகிய எலும்பு முறிவு	முறிவடைந்த எலும்பு பகுதி ஒன்றோடு ஒன்று இயக்கப்படும்.



எலும்புமுறிவின்வகைகள்



பச்சை கொம்பு எலும்பு முறிவு பத்து வயதிற்குள்ளாக உள்ள குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும். ஏனெனில் அவர்களின் எலும்பு பெரியவர்களின் எலும்பை விட மென்மையாகவும் மற்றும் நன்கு வளையக்கூடிய தன்மையுடையது.

எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டால் கண்காணிக்க வேண்டியவைகள்

1. வீக்கம்
2. அடிப்பட்ட இடத்தில் வலி
3. அசைவு / நகர்வதில் சிரமம்
4. மாறான திசையில் இயக்கம்.
5. பாதிக்கப்பட்ட பகுதி குறுகி அல்லது முறுக்கப்பட்டு அல்லது வளைந்து காணப்படுதல்.

Nursing General_Tamil Ch-9.indd 188 14-06-2018 19:33:31