## CPR– ன் அவசியம்

- பாதிக்கபட்டவர் சுயநினைவிழத்தல்
- சுவாசமின்மை
- நாடிதுடிப்பின்மை

### அவசியமின்மை

பாதிக்கபட்டவருக்கு விருப்பமில்லை எனில் CPR முறையை மேற்கொள்ள கூடாது.

### CPR படிகள்

CPR முறையை மேற்கொள்வதற்கு முன் பாதிக்கபட்டவர் பாதுகாப்பான சூழ்நிலையில் இருப்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

**படி–1:** அசைத்து மற்றும் சத்தம் போடுதல் பாதிக்கபட்டவர் உணர்விழந்திருந்தால் அவரை தட்டி தோற்பட்டையை அசைத்து அவர் உணர்வுடன் இருக்கிறாரா என்பதை கண்டறிய வேண்டும்.

பாதிக்கபட்டவர் பதிலளிக்கவில்லை எனில் உதவிக்கு மற்றவரை அழைக்கவும்.

**படி–2:** மூச்சுவிடுதல் மற்றும் இரத்த சுற்றோட்டத்தை பரிசோதித்தல்.

மூச்சுவிடுதல் முறையை பரிசோதிக்கும் முறை:

- வழக்கமான மார்பக அசைவுகள்
- மூச்சுவிடுதல் முறையை கேட்பது
- மூச்சுவிடுதல் முறையை உணர்வது
- இரத்த சுற்றோட்டத்தை கண்டறிய பாதிக்கபட்டவரின் கழுத்தின் ஒரு பகுதியின் மூச்சுகுழாய் அருகே நடுவிரல் மற்றும் ஆள்காட்டி விரலை வைத்து பார்க்க வேண்டும்.
- நாடிதுடிப்பு மற்றும் மூச்சுவிடுதல் இல்லை எனில் CPR முறையை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
- பாதிக்கபட்டவர் மூச்சுவிடுதல் வழக்கமாக இருந்தால் மீள் நிலைமையில் வைக்க வேண்டும்.





### படி–3: 30 இதய இயக்க மீட்டு கொடுத்தல்

- பாதிக்கபட்டவரின் அருகே முழங்காலிட்டு அமர வேண்டும்.
- உள்ளங்கையின் அடிப்பகுதியை மார்பகத்தின் நடுவில் வைத்து மற்றொரு கையை அதன்மேல் வைத்து பினைத்து கொள்ளவும்.
- பின்னர் கைகள் மடங்காமல் பாதிக்கபட்டவரின் விலா எலும்பின் மீது செங்குத்தாக அழுத்தவும். அழுத்தும்போது விலா எலும்பு 4-5 செ.மீ மார்பு கூட்டின் உள்ளே இறங்க வேண்டும்.
- நிமிடத்திற்கு 100 லிருந்து 120 முறை மார்பின் மீது அழுத்தத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
  - 1 நொடிக்குள் 2 முறை செய்ய வேண்டும்.
  - 30 முறை இதய இயக்க தசை மீட்டு கொடுக்க வேண்டும்.

### படி–4: 2 செயற்கை சுவாச முறை

- மூச்சுகுழாயை தலையை திருப்பி தாடையை உயர்த்தி திறக்கவும், இரண்டு விரல்களால் தாடையை பிடித்து கொள்ள வேண்டும்.
- பாதிக்கபட்டவரின் மூக்கை சுட்டுவிரல் மற்றும் கட்டை விரலால் மூடிக்கொண்டு, நன்கு ஆழ்ந்து மூச்சை இழுத்து கொண்டு, பாதிக்கபட்டவரின் வாயை உதடுகளால் மூடி அடைத்து கொள்ளவும்.
- மூச்சை முழுவதுமான பாதிக்கபட்டவரின் வாயில் செலுத்தவும். அதே வேளையில்



Nursing General_Tamil Ch-9.indd 192 14-06-2018 19:33:32