திரும்ப வைத்தலும் வட்ட சுழற்சி முறையில் நடை பெற வேண்டும்.

15. மேற்கண்ட செயல்முறைகள் முடிந்த பிறகு சுத்தப்படுத்தி பொருட்களை மீண்டும் பயன்படுத்த முன்னர் இருந்த நிலையில் தட்டில் வைக்க வேண்டும்.

இரத்தஅழுத்தம் (Blood Pressure)

இரத்த அழுத்தத்தினை அளவிடும் முறைகள்.

1. இரத்த அழுத்தத்தினை அளவிடும் முறைகளை தெளிவாக நோயாளிக்கு விளக்க வேண்டும். பின்னர் நோயாளியை அமர வைத்து மேசையின் மீது கையை தாங்குதலுடன் வைக்கச் சொல்ல வேண்டும்.
2. இரத்த அழுத்தமானியின் பட்டையை (Brachial artery) மேல் வைத்து மெதுவாக நோயாளியின் முழங்கைக்கு 5 செ.மீ மேல் சுற்றவும். பின்னர் முனைகளை உள்ளே சரியாக இருக்கும்படி சொருகவும்.
3. Brachial-துடிப்பினை உணர்ந்து கொண்ட பின்னர் விரல் வைத்து ஸ்டெதெஸ்கோப் கொண்டும் அறிய வேண்டும்.
4. வால்வை மூடி பல்பை அழுத்தி உறையினுள் காற்றை, நாடித்துடிப்பு மறையும் வரை செலுத்தவும் மேலும் 20 மி.மீ பாதரச மட்டம் உயரும் படி பார்த்துக் கொள்ளவும்.
5. வால்வை மெதுவாக திறந்து உறையிலுள்ள காற்றை வெளியேற்றவும். அப்போது முதல் ஒலி எப்போது வருகிறது என்பதை இரத்த அழுத்தமானியில் கவனிக்கவும். இந்த முதல் ஒலி சிஸ்டாலிக் (systolic reading) அளவு ஆகும். காற்று வெளியேறும் பொழுது ஒலிசத்தமாகவும், தெளிவாகவும் இருக்கும்.
6. தொடர்ந்து காற்றை மெதுவாக வெளிவிடவும், ஒரு கட்டத்தில் சத்தம் மிகவும் குறையும். இது Diastolic அளவு எனலாம். இந்த அளவினை குறித்துக் கொள்ளவும்.
7. பாதரசத்தின் அளவு பூஜ்ஜியத்திற்கு வரும் வரை காற்றை வெளியேற்றவும்.
8. எடுத்த அளவில் ஏதேனும் சந்தேகம் இருப்பின் மீண்டும் அளவினை எடுக்கவும்.
9. அளவினை பதிவு செய்து கொள்ளவும். சிஸ்டாலிக் அழுத்த அளவை முதலிலும் டயாஸ்டாலிக் அளவை இரண்டாவதாகவும் எழுதவும் (உம்) 120/80 மி.மீ Hg.
10. இரத்த அழுத்தமானியின் பட்டையைக் கழற்றவும்.

பிராணவாயு சிகிச்சை – கேனுலா முறை (Oxygen Therophy- Kannula method)

வரையறை

இம்முறையில் மிகவும் குறைந்த அளவு பிராணவாயு ஒரு முறை மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிகினால் செய்யப்பட்ட குழாய் மூலம் அளிக்கப்படுகிறது. இந்தக்குழாயில் நாசித்துவாரங்களில் சொருகுவதற்கு ஏதுவாக இரண்டு சிறு குழாய்கள் உள்ளன.





Tamil - Practical 2.indd 283 14-06-2018 19:56:21