	செவிலியல் செயல் (Nursing action)	நோக்கம் (Rational)
9	நோயாளியின் தலையைச் சுற்றி எலாஸ்டிக் பட்டையை பொருத்தவும்.	நோயாளியின் வசதியை உறுதிப்படுத்தவும்.
10	காதுகளுக்குப் பின்பும் தலைக்குப் பின்பும் எலாஸ்டிக் பட்டைகளை உறையிடு.	உறையிடுதல் அந்த இடத்தில் எரிச்சல் ஏற்படுவதைத் தடுக்கும்.
11	முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை சரியான முறையில் உள்ளதா என உறுதிப்படுத்தவும்.	
12	பிராணவாயு செல்லும் வேகம், மருத்துவநிலை, ஹுமிடிபையரில் நீரின் நிலை போன்றவற்றையும் நோயாளியையும் அடிக்கடி சோதிக்கவும்.	ஏற்படும் பக்க விளைவுகளை கண்டறிதல்.
13	கைகளை நன்கு சுத்தம் செய்யவும்	நோய் கிருமிகள் பரவுதலைத் தடுக்கும்.
14	முகமுடியைக் கழற்றி ஒவ்வொரு 3–2 நேரத்துக்குப்பின் தோலை உலர வை பவுடர் போன்றவற்றை முகமுடியை சுற்றி பயன்படுத்தாதே.	இறுக்கமான முகமூடியும் ஆக்ஸிஜன் மூலம் வரும் ஈரப்பதம் போன்றவை முகத்திற்கு எரிச்சலைக் கொடுக்கும்.
15	நேரம், பிராணவாயு செலுத்தும் வேகம் மற்றும் கண்காணிப்பு போன்றவற்றை ஆவணப்படுத்தவும்.	

சிறப்பான கவனிக்கப்பட வேண்டியவைகள்: (Special consideration)

1. பிராணவாயுவின் அளவை F10 வில் உள்ளது போல் (Fraction of Inspired oxygen) சதவிதமாகவோ அல்லது ஒரு நிமிடத்துக்கு பயன்படும் லிட்டர் அளவு எனவோ கூறலாம்.
2. ஆக்ஸிஜன் முகமுடியானது அதன் நிறத்தினைக் கொண்டு ஆக்ஸிஜன் அளவு முடிவு செய்யப்படுகிறது.

ஆக்ஸிஜன் அளவு மற்றும் ஆக்ஸிஜனின் வேகம் வெஞ்சுரி முகமூடியில்

நாசிலின் நிறம் (Nazzel colour code)	செறிவின்–செலுத்தலின் அளவு (நிமிடத்திற்கு) ஒரு நிமிடம்/லிட்டர்	செலுத்தப்பட வேண்டிய ஆக்ஸிஜனின் அடர்த்தி அடர்த்தியின் சதவிகிதம் %
நீலம் (Blue)	3 ஒரு நிமிடம்/லிட்டர்	24%
மஞ்சள் (Yellow)	6 ஒரு நிமிடம்/லிட்டர்	28%
வெள்ளை (White)	8 ஒரு நிமிடம்/லிட்டர்	31%
பச்சை (Green)	12 ஒரு நிமிடம்/லிட்டர்	35%
ரோஜா நிறம் (Pink) அல்லது ரோஸ்	15 ஒரு நிமிடம்/லிட்டர்	40%
ஆரஞ்சு (Orange)	15 ஒரு நிமிடம்/லிட்டர்	50%

Tamil - Practical 2.indd 287 14-06-2018 19:56:21