கலக்கிய பின்பு, பாத்திரத்தில் உள்ள வெந்நீருடன் கலக்கவும். இந்தக்கலவையை தேவையான அளவு எடுத்து பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் பூசவும். பின்பு வெப்ப அழுத்தங்களை (Hot compressor) தரவும். பத்து முதல் பதினைந்து நிமிடங்களுக்குப் பின்பு பிளாடஸ் (Flatus) குழாயை செலுத்தி பிளாடஸ்ஸை வெளியேற்றவும்.

கை முழுகுதல் மற்றும் கால் முழுகுதல் (Arm soak and foot soak)

முழுகுதல் என்பது பாதிக்கப்பட்ட பகுதியை முற்றிலுமாக (எ.கா. கை மற்றும் கால்) மூழ்க வைத்தல் அல்லது சல்லடைத்துணியில் மருந்துக் கரைசலை நன்கு பூசி அப்படியே கட்டி வைத்தல் என்று கூறலாம். இம்முறை சுத்தம் அல்லது கிருமி நீக்கும் முறையாகவும் பயன்படுத்தலாம். இம்முறை கிருமிநீக்கம் திறந்த காயமடைந்த நோயாளிகளுக்கு உகந்தது. கீழ்க்காணும் காரணங்களுக்கு இம்முறையை செயல்படுத்தலாம்.

1. கொழுப்பு அமிலத்தை நீர்த்துப் போகச் செய்யவும், கீழ்க்கட்டை விரைவு படுத்தவும் வெப்பத்தைத் தருதல்.
2. மருந்துகளை பயன்படுத்துதல்
3. காயத்தைச் சுற்றியுள்ள பாழடைந்த திசுக்களை சுத்தம் செய்தல்
4. வீக்கம், இரத்த ஓட்டம் மற்றும் தசைப்பிடிப்புக்களை நிவர்த்தி செய்தல்

105 - 110°F வெப்பநிலையில் உள்ள வெதுவெதுப்பான நீரில் வெப்ப சிகிச்சை பெற்ற பகுதிகளை மூழ்க வைக்க வேண்டும். இச்சிகிச்சை 20 நிமிடங்களுக்கு தொடர வேண்டும். சரியான வெப்ப நிலையை இச்சிகிச்சை முழுமைக்கும் தொடரும் வகையில் இடையிடையே வெப்பநிலையை சோதித்து கரைசலை சேர்க்க வேண்டும் அல்லது புதுக்கரைசலை தயாரிக்க வேண்டும். இச்சிகிச்சையின் போது நோயாளியை மிகவும் வசதியான நிலையில் கை கால்களுக்கு தலையணை வைக்க வேண்டும். சிகிச்சை முடிந்த பின்பு உடல் பகுதியை நன்கு உலர வைக்க வேண்டும்.

அகச்சிவப்புக் கதிர்கள் (Infrared Rays / Lamps)

அகச்சிவப்பு விளக்குதல் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்படும் அகச்சிவப்பு கதிர்கள் சிகிச்சைக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

புற ஊதாக் கதிர்கள் (Ultraviolet Rays / Lampsis)

புற ஊதாக் கதிர்கள் கண்ணுக்கு தெரியாத வெப்பக் கதிர்களை பாதிக்கப்பட்ட பகுதிக்கு செலுத்துகிறது. புறஊதாக்கதிர்களை உமிழும் இவ்விளக்குகள், சிகிச்சைக்கு பாதுகாப்பான வெப்பத்தினை திசுக்களுக்கு அளித்து உதவுகிறது.

மருத்துவ பயன்கள்

1. படுக்கைப்புண்களை குணமாக்குகிறது.
2. இணைப்புதிசுக்களை மென்மையாக்குகிறது.
3. பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் வலி, தசைகளின் பிடிப்பு மற்றும் சுளுக்கைக் குறைக்கிறது.

சாதாரண விளக்குகளிலிருந்து வெளிப்படும் ஒளிக்கதிர்களை விட புறஊதா மற்றும் அகச்சிவப்புக் கதிர்கள் மிகவும் கடுமையாகவும் அதிக வெப்பத்தையும் தரக் கூடியன. இக்கதிர் வீச்சுக்களின் பாதிப்புக்கள் பின்வருவன :

1. தோலின் நிறம் மாறுதல்
2. வைட்டமின் உருவாகுதல்
3. பாக்டீரியாக்களை அழிக்கும் முறை

இச்சிகிச்சை பொதுவாக 20 முதல் 30 நிமிடங்களுக்குத் தொடர வேண்டும்.

முன்னெச்சரிக்கை: (Precautions)

சிகிச்சையின் போதும் மற்றும் சிகிச்சைக்குப் பின்பும் தோலை நன்கு கண்காணிக்க வேண்டும். நோயாளி மற்றும் சிகிச்சை அளிப்பவர் இருவரும் பாதுகாப்பு கண்ணாடிகள் போன்றவற்றை தவறாமல் பயன்படுத்த வேண்டும். இதன் மூலம் கதிர்களால் ஏற்படும் பாதிப்பை தவிர்க்கலாம்.

Tamil - Practical 3.indd 298 15/06/18 10:28 AM