வண்ணம், நிறம்	தோராயமாக குளுகோஸ் mg/dl	(குறியீடு) அளவு
நீலம்	--	--
பச்சை	<500 mg/dl	குறைந்த அளவு காணப்படுகிறது.
பச்சை வீழ்படிவு	1500-500 mg/dl	+
மஞ்சள் வீழ்படிவு	1500-1000 mg/dl	++
ஆரஞ்சு வீழ்படிவு	2000–1500 mg/dl	+++
சிவப்பிலிருந்து செங்கல் நிறத்துக்கு வீழ்படிவு	>2000 mg/dl	++++


7.2 அல்புமின் கண்டறியும் சோதனை (TEST – FOR ALBUMIN):

- சோதனைக்குழாயில் நான்கில் மூன்று பங்கு அளவு வடிகட்டிய சிறுநீரை எடுத்துக் கொள்ளவும். (சிறுநீரில் உள்ள சீழை(pus) களை வடிகட்டுதலால் நீக்கலாம்)
- அமிலத்தன்மையை சோதிக்கவும். காரத்தன்மையாக இருப்பின் ஒரு துளி அசிடிக் அமிலத்தைக் கலந்து சிறுநீரை அமிலமாக்கவும்.
- சோதனைக் குழாயில் மேலே உள்ள மூன்றாம் பகுதியை ஸ்பிரிட் விளக்கின் மூலம் சூடுபடுத்தி கொதிக்க வைக்கவும்.
- பாஸ்பேட் அல்லது அல்புமின் காரணமாக மேல் பகுதியில் வெண்மையான மேகம் போல் தோன்றும்.
- அசிடிக் அமிலத்தை சொட்டு சொட்டாக வெண்மையான கலங்களில் சேர்க்கவும்.
- கலந்த பின்பும் வெண்மை நிறம் மாறவில்லையெனின் அல்புமின் இருப்பது உறுதியாகிறது.
- வெண்மைநிறம் மாறி தெளிவானால் பாஸ்பேட் இருப்பது உறுதியாகிறது.
- சாதாரணமாக சிறுநீரில் அல்புமின் கலந்திருக்காது.
- சிறுநீரில் அதிக அமிலத்தன்மை அல்லது காரத்தன்மை இருப்பின் தவறான முடிவுகளைத் தரும்.

7.3 அசிட்டோனுக்கான சோதனை (TEST FOR ACETONE)

- 5மிலி சிறுநீரை சோதனைக்குழாயில் எடுத்துக் கொண்டு அதிகப்படியாக அம்மோனியம் சல்பேட்டைச் சேர்க்கவும்.
- சோடியம் நைட்ரோபுரூசைடு (Sodium Nitroprusside) படிகங்களை சிறிதளவு சேர்த்து நன்கு கலக்கவும்.
- சோதனைக்குழாயின் பக்கவாட்டில் மிகவும் மெதுவாக அம்மோனியா கரைசலை சேர்க்கவும்.
- சிறுநீருக்கும் அம்மோனியா கரைசலுக்கும் இடையே உடனடியாக ஊதா வண்ண வளையம் (Purple permanganate colour) உருவாகுமானால் அசடோன் இருப்பதை உறுதிசெய்கிறது.

ரோக்ராஸ் டெஸ்ட்



சிறப்பு குறிப்புகள்

- ரீஏஜெண்ட் பாட்டிலை (Reagent Bottle) குளிர்ந்த, உலர்ந்த இடத்தில் 86°F (30°C) –க்கு குறைவான வெப்ப நிலையில் வைக்கவும்.

Tamil - Practical 7.indd 314 14-06-2018 20:01:44