- சுத்தமான கண்ணாடித் தகடுகள் 'பூச்சு'(smear) களைச் சேகரிக்க பயன்படுகின்றன.
- கலனில் நச்செதிர் கரைசல் இல்லாதவாறு பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் அவை மாதிரியின் நுண்ணுயிர் வளர்ச்சியை பாதிப்பதால் முடிவுகளில் மாற்றம் ஏற்படும்

சிறுநீர் மாதிரி சேகரித்தல்

ஒருநேர சிறுநீர் சேகரிப்பு முறை

ஒரு நேர சிறுநீர் சேகரிப்பு முறை என்றால் ஒரு நேரத்தில் கழிக்கப்படும் சிறுநீரின் அளவாகும். பொதுவாக அதிகாலை மாதிரிகள் சேகரிக்கப்படுகின்றன. பொதுவாக 100–120 மி.லி சிறுநீர் பொதுவான பரிசோதனைகளுக்கு போதுமானது.

இனப்பெருக்க உறுப்புகளை சுத்தம் செய்தபின் நோயாளி சுத்தமான சிறுநீர் கலனிலோ அல்லது கழிவுத் தட்டிலோ அல்லது நேரடியாக சிறுநீர் சேகரிக்கும் கலத்திலோ சேகரிக்குமாறு கூற வேண்டும். சேகரிக்கும் போது கலத்தின் வெளிப்புறத்தில் படாதவாறு பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

இடையில் எடுக்கப்படும் சிறுநீர் சேகரிக்கும் முறை

இனப்பெருக்க உறுப்புகளை சோப்புநீரால் கழுவிய பின் நீரால் கழுவு. பெண் நோயாளிகளுக்கு லேபியாவைப் (labia major) பிரித்து சுத்தம் செய்து சிறுநீர் மாதிரி சேகரிக்கப்படும் வரை அப்படியே வைத்திரு. ஆண்களுக்கு ஆண்குறியின் முன்தோல் பின் இழுக்கப்பட்டு இனப்பெருக்க உறுப்புகள் சுத்தம் செய்யப்பட்ட பின் சிறுநீர் மாதிரி சேகரிக்கப்பட வேண்டும்.

கழிப்பறையிலோ, கழிவு நீக்கத் தொட்டியிலோ சிறுநீர் கழித்துக்கொண்டிருக்கும்போது சிறிது நேரம் நிறுத்தி நுண்ணுயிரறச் செய்யப்பட்ட கலனில் தொடர்ந்து சிறுநீர் கழிக்கச்செய்ய வேண்டும். போதுமான அளவு சேகரிக்கப்பட்டபின் சிறுநீர் கழிப்பதை நிறுத்தி கலனை அப்புறப்படுத்தி தொடர்ந்து சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும்.

24 மணி நேர சிறுநீர் சேகரிக்கும் முறை

24 மணி நேர சிறுநீர் கழித்தல் என்பது 24 மணி நேரத்தில் கழிக்கும் எல்லா சிறுநீரையும் சேகரித்தலாகும். காலை 6 மணிக்கு சிறுநீர் சேகரித்தலைத் தொடங்கி கழிக்கப்படும் சிறுநீரை ஊற்றிவிடு. அதன்பின் கழிக்கப்படும் மொத்த அளவிடப்பட்டு அடையாளச்சீட்டு ஒட்டப்பட்ட கலனில் சேகரிக்கப்பட வேண்டும். மறுநாள் காலை வரை தொடர வேண்டும். காலை 6 மணிக்கு நோயாளியை சிறுநீர் கழிக்கச் செய்து முன்பு சேகரித்த கலனோடு சேர்க்க வேண்டும்.

சுயநினைவற்றவர்களுக்கும், குழந்தைகளுக்கும் சிறுநீர் சேகரித்தல்

ஆண் குழந்தை அல்லது சுயநினைவற்ற ஆண் நோயாளிகளின் ஆண் உறுப்புடன் ஒரு சோதனைக் குழாயோ, ஊசிக் குழாயோ, நிரோத்தோ ரப்பர் குழாயுடன் இணைக்கப்பட்டதாக இருக்கும். ஒட்டும் பிளாஸ்திரியின் மூலம் இணைக்கப்பட வேண்டும். பெண்களுக்கு வாயகன்ற கலனை அல்லது புனலை ரப்பர் குழாயுடன் இணைக்க வேண்டும். அகன்ற பாகத்தை வால்வுடன் 'T' பைண்டர் மூலம் இணைக்க வேண்டும். ரப்பர் குழாயை கலனோடு இணைக்கும்பொழுது சிறுநீர் சேகரமாகிறது.

கோழை மாதிரி சேகரித்தல்

நீர் உறிஞ்சாத கோழைக் கலன்களோ அல்லது அகன்ற வாயுள்ள கலன்களோ கோழை சேகரிக்கப் பயன்படுகிறது. நோயாளியிடம் கலனைக் கொடுத்து நன்றாக இருமி நுரையீரலிலிருந்து மாதிரி எடுக்க வேண்டும் என்றும், மூக்கு அல்லது தொண்டைப் பகுதியிலுள்ள கோழையை சேகரிக்க வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்த வேண்டும். மாதிரி பல் துலக்குவதற்கும், உணவு உட்கொள்ளுவதற்கும் முன்பு சேகரிக்கப்பட வேண்டும். வாய் நீரினால் கொப்பளிக்கப்படலாம். ஆனால் நச்செதிர் வாய் பராமரிப்பு கரைசல்களை மாதிரி சேகரிக்கும் முன் பயன்படுத்தக் கூடாது.

Tamil - Practical 9.indd 319 15/06/18 10:36 AM