உறுதிப்படுத்துதல். நோயாளியின் நாக்கு அடியில் வெப்பமானியை வை. நோயாளியிடம் அதை கடித்து விடக் கூடாது என்றும் மெதுவாக உதடுகளை மூடிக் கொள்ளுமாறு கூறுதல்.

5) வெப்பமானியை தொடர்ச்சியாக இரண்டு நிமிடம் வைத்திரு அந்த நேரத்தில் நோயாளியினுடைய நாடித்துடிப்பையும், சுவாசத்தையும் அறிதல் வேண்டும்.

6) வெப்பமானியை வாயில் இருந்து எடுத்து விட்டு அதன் வெப்பநிலையை குறித்து கொண்டு பின் குமிழ் பகுதியை கீழ் நோக்கியவாறு வைத்து சோப்பு தண்ணீர் கொண்டு சுத்தம் செய்து வெப்பமானி முழுவதுமாக பாக்டீரியா தாக்காத வண்ணம் சுத்தப்படுத்த வேண்டும்.

7) அழுக்கு கலந்த நீரை கிட்னி தட்டில் சேகரித்து சோப்புக்கரைசலால் நனைக்கப்பட்ட சிறிய பஞ்சு உறைகளை பேப்பர் பையில் போடுதல் வேண்டும்.

8) அதற்குரிய சோதனைகுழாயில் அல்லது கண்ணாடி பாட்டில் உள்ள திரவத்தில் வெப்பமானியை மீண்டும் சொருகி வைக்க வேண்டும்.

9) பின்பு வரைபடத்தில் வெப்பநிலை அளவிட்டு வரைதல் வேண்டும்.

பயன்படுத்திய சாதனங்களை பத்திரமாக வைத்தல்

1. பயன்படுத்திய அனைத்து கருவிகளையும் சுத்தப்படுத்தி மீண்டும் பயன்படுத்த தயார் நிலையில் வைக்க வேண்டும்.
2. வெப்பமானியை சோப்புடன் கழுவி பின்பு குளிர்ந்த நீரில் கழுவுதல் வேண்டும்.
3. தொற்று நோய் நீக்கு திரவத்தில் 2 அல்லது 5 நிமிடத்திற்கு வெப்பமானியை சொருகி வைத்தல் வேண்டும்.
4. மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்காகத் தட்டில் இருந்தவற்றை சரிவர அமைத்தல் வேண்டும்.

அளவைகள் மாற்றம்

1. செண்டிகிரேடை பாரன்ஹீட்டாக மாற்ற
2. செண்டிகிரேட் அளவை ஒன்பதால் பெருக்கி, ஐந்தால் வகுத்து 32 ஐ கூட்டவும்
3. பாரன்ஹீட்டை செண்டிகிரேடாக மாற்ற
4. பாரன்ஹீட் அளவில் 32 ஐ கழித்து ஐந்தால் பெருக்கி ஒன்பதால் வகுக்கவும்.

$$F = (9/5 \times C) + 32$$

$$C = (F-32) \times 5/9$$

அசாதாரணவெப்பநிலைகள்

1. குறைந்த வெப்பநிலை – 35 °C - 36.1° C (95 - 97 °F)
2. மிகக் குறைந்த வெப்பநிலை– 35° C க்குகீழ் (95° F)
3. காய்ச்சல் அல்லது (pyrexia) பைரக்ஸியா
   - குறைந்த காய்ச்சல்– 37.2° C - 38.3° C (99° - 101° F)
   - சாதாரணக் காய்ச்சல் - 38.3° C - 39.4° C (101° - 103° F)
   - கடுமையான காய்ச்சல் – 39.5° C - 40.5° C (103° - 105°F)
   - மிகக் கடுமையான காய்ச்சல் – 40.5° C க்குமேல் (105° F)



பழமையான வெப்பநிலைமானியைக் கண்டுபிடித்தவர் கலிலியோ கலிலி என்பவராவார்.

5.6 நாடித்துடிப்பு (Pulse)

நாடித்துடிப்பு என்பது ஒரு எலும்பின் மீது அழுத்தக்கூடிய இடத்தில் தமனியின் விரிவடைதலை உணரக் கூடியதாகும்.

நாடித்துடிப்பு உணரக்கூடிய இடங்கள்

ரேடியல் (Radial) மணிக்கட்டில் பெருவிரலுக்கு கீழ் உட்பக்கமாக 2 அல்லது 3 விரல்களை வைத்து உணரலாம்.

கரோடிட் (Carotid) கழுத்தின் பக்கத்தில் உணரலாம்

Nursing General_Tamil Ch-5.indd 74 14-06-2018 19:12:49