டெம்போரல் (Temporal) தலையில் கண்ணுக்கும் காதுக்கும் இடையில் உணரலாம்.

பேசியல் (Facial) கீழ்த்தாடை முடியும் இடத்தில் உணரலாம்.

பெமோரல் (Femoral) தொடைச் சந்து பகுதியில்.

அண்டீரியர்பாண்டேனல் (Anterior Fontanalle) இளம் குழந்தைகளுக்கு தலையின் மேற்பகுதியிலுள்ள எலும்புகள் பொருந்தாத இடத்தில் உணரலாம்.

கவனிக்க வேண்டியவை


1. எண்ணிக்கை – ஒரு நிமிடத்தில் துடிப்புகளின் எண்ணிக்கை.
2. தாளகதி– துடிப்புகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி.
3. வலிமை– தமனிகளின் சுவர்களுக்கெதிராக கொடுக்கும் அழுத்தம்.

ஓய்வாக உள்ள நிலையில் நாடித்துடிப்பின் அளவு

வயது வந்தோர் 60 – 80 / நிமிடம்

குழந்தைகள் 80 – 100 / நிமிடம்

இளம் குழந்தைகள் 100 – 140 / நிமிடம்



5.6.1 நாடித்துடிப்பின் அளவை மாற்றக்கூடிய காரணிகள்

1. பாலினம்:– பெண்களின் நாடித்துடிப்பு ஆண்களின் நாடித்துடிப்பை விட சற்று கூடுதலானது.
2. உடற்பயிற்சி:– உடற்பயிற்சியின் போது நாடித்துடிப்பின் எண்ணிக்கை கூடுகிறது. ஓய்வின் போது எண்ணிக்கை குறைகிறது.
3. உணர்ச்சி:– கோபம், பயம், மகிழ்ச்சி போன்றவை நாடித்துடிப்பின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கின்றன.
4. பசியும், களைப்பும்:– நாடித்துடிப்பின் எண்ணிக்கையை குறைக்கிறது.
5. மருந்துகள்:– சில மருந்துகள் (எபிநெஃபரின்) எண்ணிக்கையை கூட்டுகின்றன. டயாக்ஸின் போன்றவை குறைக்கின்றன.
6. வலி:– திடீரென தோன்றும் வலி எண்ணிக்கையை கூட்டுகிறது.
7. குறைந்த இரத்த அளவு:– நீரற்ற நிலை இரத்த ஒழுக்கு மற்றும் அதிர்ச்சி போன்றவை நாடித்துடிப்பின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கின்றன.
8. இதயம் மற்றும் தைராய்டு சம்பந்தமான நோய்கள் நாடித்துடிப்பின் எண்ணிக்கையை மாற்றுகின்றன.

டேக்கிகார்டியா நாடித்துடிப்பு 100க்குமேல் /நிமிடம்

பிரேடிகார்டியா நாடித்துடிப்பு 60க்குகீழ்/ நிமிடம்

5.6.2 நாடித்துடிப்பை அளவிடுதலும் பதிவு செய்தலும்

பொதுவாக நாடித்துடிப்பு வெப்பநிலை அளவிடும் சமயங்களில் அளவிடப்படுகிறது. ஆனால் அறுவை சிகிச்சைக்குப்பின், விபத்துகள் மற்றும் இதய நோய்களின் போது 15 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை அளவிடப்பட்டு பதிவு செய்ய வேண்டும்.

அளவிடும் முறை

1. நோயாளியை வசதியான நிலையிலிருத்த வேண்டும்.
2. நோயாளியின் கை நன்றாக தாங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

Nursing General_Tamil Ch-5.indd 75 14-06-2018 19:12:49